



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2566/A/1




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2566/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2566/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2566/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2566/A/1




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2566/A/1

D. 53.

2566⁽¹⁾ / A / 1

A. XVIII. 0.21



Dublin
160 A. B.
2 Nov. 128

~~CLAVDII~~
51647
GALENI PER

GAMENI DE COMPO-

sitione pharmacorum localium,

Libri decem,

IANO CORNARIO

medico interprete.

Nunc ad fidem variorum exemplarium

perspecti & eorum recentissima

collatione ab innumeris

mendis emen-

dati.

REM MAXIMAM SIBI



PROMITTIT PRVDENTIA.

Ex Libri
Quinque
D. m.

LVGDVNI,

Apud Gulielmum Rouillium,

Sub scuto Veneto. 1549

Handwritten text at the top of the page, likely a title or heading, written in a medieval script.

Main body of handwritten text in the upper half of the page, consisting of several lines of script.


Main body of handwritten text in the lower half of the page, continuing the script from the upper section.

INDEX EORVM

QVAE HISCE DE-
CEM LIBRIS CON-
TINENTVR.

* * *

A



Abcessus maximè gaudem aro- matum facultatibus.	623
Acanthion quid.	41
Achariston medicamentum	304. & 319
Achores capitis quid sint.	74
Achorum remedia.	75 & inde
Achoribus inflammatis remedia.	77
Acopa quæ dicantur.	538
Adipson catapotium sitim extinguens.	652
Aegilops quid sit.	376
Aegilopum remedia.	377
Aegyptia compositio.	224
Aegyptia ad callos & albugines.	309
Aërianum collyrium.	327
Albuginum oculi curatio.	360
Aloë illota ad ventris subductionem aptior est quàm lota.	639
Aloë non habet fortem vim purgatoriã.	640
Alopecia vnde fiat.	4
Alopecia sola etiam purgatione sanantur.	6
Alopecia qualia requirat pharmaca.	8

A 2

INDEX.

Alopecie cōgruentia simplicia pharmaca.	12
Alopecie conuenientia pharmaca composita.	13
Alopecie qualis debeatur victus ratio.	28
Alteratio quid.	693
Andromachus Romę artem medicam factitauit.	470
Ambustorum remedium.	396
Amuleta ad capitis dolorem.	165
Amuleta dentium dolori reluctancia.	421
Amuleta hepatis & splenis facientia.	744
Anginę remedium.	490
Anginis conueniens stomaticum.	473
Anhelosi qui vocentur & quō curentur.	619
Ani vitiorum remedia.	786 & 787
Anodynon quid.	605
Anodyna pharmaca.	ibid. & 753
Anthera medicamentum.	491
Antherę compositio.	422
Antidotus ex vrsino felle.	710
Aphthę quid sint, vnde fiant, & quibus ferē obueniant.	517 & 518 & inde.
Aphtharum remedia.	ibid. & 520
Aphtharum varię species: & qua ratione internoscantur.	529
Apophlegmatismi quid.	199
Apophlegmatismorum compositiones.	ibi.
Aphroditarium compositio.	321
Aqua quę per plumbeos canales deriuatur fug	

INDEX.

fugienda est.	569
Aquæ inter cutem remedia.	745
Ardor quid appelletur.	108
Aridum pharmacum ad tuendam oculorum valetudinem.	301
Aromaticum collyrium.	346
Aromaticum malagma.	684
Artemonium collyrium.	342
Arteriæ olim dictæ sunt venæ.	535
Arteria aspera vnde dicta.	ibidem
Arteriæ quæ pharmaca dicantur.	534
Arteriæ veterum dissimiles sunt facultati- bus.	535
Arteriæ compositiones.	545
Arteriæ duplici vase coquendæ.	562
Arthritis quid sit, & vnde fiat.	808 & 825
Arthritidis curatio.	825 & 826
Asclepiadæ negligentia in describendo phar- maca capitis dolori facientia.	170
Asclepiadæ rasura in curandis alopeciis.	30
Asclepiadeum Paccij.	336
Asclepiades ob rerum naturalium studium philosophicus fuit appellatus.	616
Asclepios Machaonis.	338
Aster anicetus collyrium.	328
Aster in exuperabilis.	ibid.
Aster stomachicus.	668
Asthmatici qui dicantur. 619 & quomodo curentur. 620 & fol. multis sequent.	

INDEX.

Astmaticis remedia.	ibidem
Astringentia vehementer omnia etiam refri- gerant.	43
Astringentium quæ sit vis.	441
Atarachum collyrium.	347
Athanasia, antidotus hepatica.	701
Athenipion panchrestum.	349
Atramentum sutorium contrariè penitus ho- mini naturæ est.	654
Attalica, stomachicis, cibû reiicientibus, cho- lericis, cæliacis & dysentericis faciès.	666
Auditus grauitati remedia.	217
Auriculares compositiones. 198 & inde mul- tis fol. seq.	
Auri incidētia corpuscula quō eximēda.	239
Auribus incidentes pulices & vermiculi quo pacto extrahendi.	240 & 241
Auribus exulceratis ex plaga & fractis reme- dia.	245
Auriû affectionib ⁹ extra meatû remedia.	243
Auriû dolores variis ex causis fiūt.	189 et 190
Aurium doloris ex frigidityte curatio.	190
Aurium doloris ex inflammatione oborti curatio.	191
Aurium doloris remedia. 207 & 208 & mul- tis fol. sequen.	
Aurium fœtoribus pharmaca.	221
Aurium humectatum remedia.	233
Aurium inflammationibus cû exulceratio- ne	ne

INDEX.

- ne remedia. 220 & 221
 Aurium inflammationis cum fluxu remedia. 221
 Aurium meatus ab obturatione liberantia
 pharmaca. 194 & 195
 Aurium purulentarum remedium. 215
 Aurium sonitus variè, ac variis de causis ac-
 cidit. 227 & 228
 Aurium sonis remedium. 229 & 230
 Aurium veribus remedium. 226
 Aurium viceribus remedia. 197
 Authemeron pharmacum splenicis. 742

B

- B** Alautiū cibis penitus non cōuenit. 458
 Balneum dictum pharmacum. 322
 Barbæ non enascenti remedium. 37
 Barbam denigrantia pharmaca. 57
 Basilicum malagma. 685
 Basilidion pforicum. 349
 Basilis compositio. 310
 Befasa quid sit. 745
 Biennij confectio ad hydropes. 752 & 753
 Bithynum emplastrum. 748
 Bulini curatio. 677

C

- C** Calculosorum remedia. 804
 Calliblepharon pharmacum, exornan-
 dis palpebris accommodatum. 306
 Callos & cicatrices exterentia pharmaca. 345
 Caluites unde generetur. 4

INDEX.

Caluitiei incipienti medicamentum.	23
Caluities vnde generetur.	4
Caluitiei præter ætatem accidentis reme- dium.	37
Caluitiei remedia.	55
Capilli duobus modis corrumpuntur.	4
Capilli ad capitis sanitatē cōducūt.	48 & 49
Capillis rareſcentibus faciens medicamen- tum.	27
Capillorum deſluuiū qua ratione curetur.	42
Capillorum deſluuiū quibus ferè accidat.	43
Capillorum proſluuiis faciens medicamentū 45 & 46	
Capillos criſpoſ facientia.	57 & 58
Capillos denigrantia pharmaca.	56
Capillos in capite generantia.	47
Capillos tingentia.	56 & multis fol. ſeq.
Capiti plurimæ affectiones accidunt.	2
Capitis doloreſ multū inter ſe variāt.	103 104
Capitis dolorum ex ardore remedia.	107
Capitis dolorum ob bilioſum humorem ſi- gna & remedia.	153
Capitiſ totiuſ dolorum citra manifeſtas cau- ſas obortorum remedia.	129
Capitiſ doloriſ ex contuſione remedia.	168
Capitiſ dolorum per totiuſ corporiſ conſen- ſum curatio.	153 & 154
Capitiſ dolor ex ebrietate & meri potu quo- modo curandus.	117
Capitiſ	

INDEX.

Capitis dolorum in febribus curatio.	154
Capitis doloris ex frigore signa.	114
Capitis dolor ex frigore qua ratione curari debeat.	108
Capitis doloris ex plaga aut casu remedia.	122 & 168
Capitis dolores ex stomacho productos qua ratione curare oporteat.	135
Castorium torreretur non debet.	205
Cataplasmata hepaticis congrua.	703 & 704
Cataplasmata eadem imponuntur splenicis quæ hepaticis.	743
Catapotia ad sanguinis reiectionem dolorē sedantia.	602
Catapotia ad stomachi subuersiones.	651
Catapotium hepaticis.	705
Catapotium splenicis.	733
Cephalæa quid, & eius signa.	155
Cephalææ curatio.	ibid. & 156
Ceratum stomacho conueniens.	628 & fol. sequen.
Chalaziorum & critharum remedium.	313
Chelidonium collyrium.	345
Chemoseos, hoc est vtriusq; palpebræ di- stortionis ex inflammatione ortæ cura- tio.	353
Cicatrices & callos ex terentia pharmaca.	340 & 341
Cichorij facultates.	704

INDEX.

Cinnabarium collyrium.	347
Cinamomi loco utimur optimæ cassiæ du- plo pondere.	657
Clidion ad dysentericos.	773
Clysteribus quando utamur.	440
Clyster validus non solum ea quæ circa ven- trem & mesaræum sunt, euacuat, sed etiam quæ circa hepatis sima hærent.	148
Coctionis frustratæ species tres.	693 & 694
Cœliacis faciens pastillus.	644
Cœliacis remedia.	650
Colica pharmaca.	753 & 761
Collyriorum plurimæ compositiones.	314
Collyrium ex cornu ceruino.	329
Collyrium ex terra samia.	328
Columella quid vocetur.	493
Columella inflammata qualia requirat reme- dia.	ibid. & fol. seq.
Columellæ laxatæ remedium.	480. & 512
Columellæ tumentis & eius remedia.	512
Comptoria ab exornatoria medicinae parte quomodo differat.	48
Congius sex sextarios Romanos capit.	470
Contrariorum notio quando cōtingat.	69
Coriadrum ructui acido remedium est.	67
Critharū, q̄ & posthæ dicuntur remedia.	36
Croceum Asclepium oxydoricum.	34
Crocerum Nilei malagma.	62
Croceum prædicon collytion.	3
Cro	

INDEX.

Croci historia.	755
Crocus in decoquendo vires amittit.	455
Cruditatis curatio.	671
Cruditatem quæ sequantur.	672
Crustarum os infestantium curatio.	486
Cygnus collyrium.	327
Cyphi Aegyptiorum pharmacum.	697
Cyphoides antidotus.	ibid. & 700
Citinus quid sit.	457
D	
D Eambulatio quâdo capitis dolētibus cōueniat & vbi sit magis idonea.	120
Deduiū capillorū quid, eiusq; curatio.	42
Dentes à dolore præseruantia.	427. & fo. seq.
Dentes qua ratione citra dolorē tollēdi.	412
Dentes ipsi aliquando dolent.	400
Dentes per totam vitam crescunt.	401
Dentes cōsimilem inflammationi affectio- nem aliquando sustinent.	402
Den. erosi ne vacillēt, neq; foetorē faciāt.	414
Dentes erosos absq; dolore cōseruantia.	416
Dentes mobiles & prominentes qua ratione curentur.	418. & inde
Dentibus denigratis remedia.	414
Dentibus motis remedia.	415
Dentium dolores varij sunt.	399
Dentium doloribus remedia.	405. & inde
Dentium perforatorum remedia.	409
Dentium stuporis remedia.	421
Den	

INDEX.

Dentitioni puerorum quid faciendum. ibid.	
Dentium stuporis remedia.	421
Dentifriciorum compositiones.	430
Dentium foramina unde fiant.	402
Deorū manus medicamēta dici possunt.	499
Destillationis remedium.	576
Diacodyon, arteriacæ.	546
Diacodyon cōfectio iuxta veterū tradi.	563
Diacodyon confectio Galeni.	567
Diacodyon confectionis vsus.	569
Diarhodon inculpabile.	335
Diasmyrnum compositiones.	17
Diasmyrnon emplastrum.	97
Diasmyrnon odorum ad quæ faciat.	338
Diocleum collyrium.	326
Dolorū sedantia pharmaca.	605
Dolores aurium ex flatu ventoso aut crassis & lentis humoribus curatio.	194
Dothienes unde nascantur & quo pacto cu- rentur.	380
Drachma Romanis est denarium.	665
Dysenterici fiunt, qui aquæ per plumbeos ca- nales deriuatæ fecem combibunt.	569
Dysentericis remedia.	771
Dyspnoici qui propriè dicantur.	623
Dyspnoicorum remedia.	621 & inde

E

E Chini succus facit ad inflammationes & prolapsam sedem.	794
Eclegma	

I N D E X.

Eclegma ad tussim.	287
Eclegma hepaticum.	780
Eclegma nectareum.	766
Elephantiasis principium curantia.	382
Emplastra ad splenis inflammationes recen- tes.	735
Emplastra viridia lichenica.	395
Enneapharmacos.	790
Epicaumatum remedium.	326
Epiporæ remedia.	317
Epithema hydropicis congruum.	745
Epithemata cœliacis & dysentericis.	786
Epithemata ad splenis inflammationes re- centes.	735
Epithema splenicis tumorem eliquans.	738
Epulidum curatio.	422
Errhinorum compositiones.	174
Errhinum Nicerati medicamentum quod naribus attractum morbum regium ex- purgat.	725
Eunuchi cutē pueris cōsimilem habent.	20
Euphorbium fortiter calfacit.	10. & 756
Euphorbij descriptio.	756
Excoriatoria lichenum.	392
Exornatoriæ & comptoriæ medicinæ sco- pus.	48
Experientia & ratio velut iudicandi instru- menta nobis à natura data sunt.	628
Experientia medicamentorum faculta- tes.	

INDEX.

tes ostendit. 106

Experientiae incertitudo. 638

F

Faciei pruritus & principium elephan-
tiasis curantia. 382

Famisi gentis, quem bulimon vocat Græ-
ci, curatio. 677

Faustianum eclegma. 562

Fauus capitis vlcus, vnde fiat, & quomodo
curetur. 74

Febribus per circuitum repetentibus potio
Ambrosia dicta. 584

Ficosi tumores in quo à variis differant, &
qualia remedia postulent. 379

Filix quibus sit remedium. 706

Fomentorum ad aurium dolores varia ge-
nera. 237

Fomenta ad dentium dolores. 41

Furfures in capite vnde fiant. 70

Fursurum remedia. ibid. & duob. fol. seq.

Furunculi vnde nascantur, & qualis eorum
curatio. 384

G

Galenus inuenit stomaticum medica-
mentum ex nucib⁹, & neruorū sau-
ciatorum, curationem. 44

Genarum crassarum, callosarum, rubrarum
ac glabrarum remedia. 35

Gingiuarum doloris remedia. 42

Gi

INDEX.

Gingiuarum inflātionibus remedia.	ibi.
Gingiuis cruentatis remedia.	410
Gingiuis madore laxis remedia.	426
Graue olētia oīa stomachū subuertunt.	656
Gurgulio quid vocetur.	493
Gurgulionis inflammati remedia.	501
Gutturis aspretudini arteriace.	558

H

H Aemalopum remedia.	356
Hæmatitinum Synerotis.	339
Hæmoptoicorum remedia.	597
Hæmorrhoidum remedia.	792
Hæmola quid sit.	745
Harmonia, medicamentum.	582
Helcydria. i. pustule vlceroſe, quō curēt.	101
Hemicrania qd, vnde fiat, & ei⁹ sympto.	181
Hemicraniæ curatio. ibid. & mult. fol. seq.	
Hepar calida intemperie ſi laboret, colliqua tiones fiunt.	695
Hepatica affectio quid.	696
Hepaticus quis dicendus.	ibidem
Hepaticis facientia amuleta.	744
Hepaticorum remedia.	683. & 697
Hepate affectio q̄lia ſequant̄ excremēta.	688
Hepatis actiones quatuor.	692
Hepatis actio præcipua.	ibidem
Hepatis corpus compagis eſt humecta.	712
Hepatis intemperiei curatio, quos habeat ſcopos.	696
Hepa	

INDEX.

Hepatis plurimi morbi.	689. & 690
Hiera ex aloë dupliciter paratur.	639
Hiera ex colocyntide quid præftet.	5
Hiera Themisonis.	663
Hieræ picræ compositio.	138
Hieracis collyrium.	342
Hieraticum malagma.	684
Horæum collyrium.	332
Humiditates capitis null ⁹ cōseqt̃ dolor.	104
Hydropicis remedium.	731. & 745
Hygidium collyrium.	328
Hygieni collyrium aureum.	348
Hypoglossis compositio.	573. & 574
Hypoglottides quæ dicantur.	558
Hypopion quid, & quomodo fiat.	363
Hypopiorum curatio.	ibidem. & 364
Hyposphagmatum remedia.	356

I

I Beridis herbæ descriptio.	823. & 824
Ictérica pharmaca.	723
Ictericis antidotus.	701
Icterici qua ratione fiant.	723
Ictericorum curatio.	ibid. & inde
Ictericorum differentia.	723
Indicum aërianum collyrium.	342
Inedia quando vtamur.	440
Infusa dysentericis commoda.	777. & inde
Intemperierum differentia.	69
Intemperies hepatis varia.	ibid.

Interr

INDEX.

Intertriginum remedium.	397
Ipothierium malagma.	746
Ischamos compositio.	272
Ischias quid sit, & unde fiat.	807
Ischiadis curatio. ibid. & multis fol. seq.	
Ischiadicis vomitus auxiliatur.	811
Isochryson, collyrium.	346
Isothæos, compositio.	585
Isothæos colicæ.	764
Lac Caninum pueris dentes emittentibus prodest.	421
Ladanum quas vires habeat.	42
Leontarium collyrium.	337
Leuce emplastrum album.	93
Lichenica emplastra.	385
Lichenici pastilli.	386
Lichenosi in mento tumores unde fiant & qualia remedia postulent.	379
Lichenum excoriatoria pharmaca.	392
Lien habet actionē toti corpori cōem.	729
Ligamenta plurimi medici nervos ligato- rios appellant.	667
Limnitis adarce & adarcium vocatur.	12
Lippitudo quid sit.	287
Lippitudinis curatio.	ibidem
Lippitudinis remedium.	331
Liuorum & sugillationum profundarum remedia.	372
Luscioforum remedia.	361

B

INDEX.

Lutron compositio.	322
Luxatis faciens remedium.	682.
Lychnium medicamentum.	315
Lynceus collyrium.	341
Lyfiporion collyrium.	336
M	
M Acer quid vocetur.	463
Malagmata quæ dicantur.	679
Malagmatum compositiones variæ.	680
Malagma ex meliloto.	684
Malagma ex seminibus.	748
Malagmata ad hepar & præcordia, quædam ex eis etiam ad totum vêtrem & splenem faciunt.	715
Malagma ad splenicos.	738
Manna quid propriè vocetur æquo à thure differat.	296
Manna emplastrum.	397
Medicamentis fortibus qua methodo vten- dum.	16
Mediorum pharmacorum qualis sit com- positio.	450. & 451
Melinum aromaticum malagma.	683
Melinum atarachum, collyrium.	347
Melinum delicatum collyrium.	334
Melinum Hygieni emplastrum.	94
Melinum Leucij emplastrum.	94
Mellis facultates.	699
Menses ducens pharmacum.	663
Men	

INDEX.

Menti eruptiones qualia pharmata requi- rantur.	380.
Menti tumores.	179
Milphæ palpebrarum defluuia appellan- tur.	299
Molares compositiones ad dentium dolo- res.	424
Monoheumerum Sergij ophtalmici.	320
Morbi regij differentia.	722
Mulieres pueris similem habent cuticu- lam.	20
Myocephalis faciens collyrium.	336
Myrrha in decoquendo vires amittit.	455
Myrrhæ odor plurimus etiam sanis capitis dolorem inducit.	131
Mysterium, compositio.	611

N

N Aribus sanguine stillantibus quid fa- ciendum.	268. & 269
Narium affectiones.	257
Narium putredini ac foetori remedia.	264
Naribus illapso quomodo eximenda.	265
Nasi ulcerum remedia.	261
Nectarea antidotus.	701
Nectareum, eclegnia.	766
Nectarium Marci compositio.	320
Nectarium, pharmacum.	337
Nephriticis antidotus.	701.

INDEX.

Nephriticae compositiones.	803
Nephriticarum compositionum duplex est differentia.	799
Neruis per consensum affectis malagma.	683
Nicerati errhinum medicamentum quod na- ribus attractū morbum regiū purgat.	725
Nili collyrium diarhodon, hoc est ex ro- fis.	331
Nutritio quid vocetur.	693
Nyctalopum, hoc est lusciosorum reme- dia.	361

O

Occhiput non facilè exurit à sole.	110
Ocularia pharmaca quæ sint & quibus prædita esse debeant.	292. & 293
Oculares compositiones liquidæ.	307
Oculariæ compositiones plurimæ, variis o- culorum morbis inscriptæ.	314
Oculi albuginibus remedia.	360
Oculi prolapsus remedium.	330. & inde
Oculis conuenientia medicamēta arida.	299
Oculis obuientes fluxiones quam victus rationem requirant.	350
Oculis purulentis remedium.	329
Oculis scabris remedia.	357
Oculis suffusis pharmaca quæ conueniant.	298
Oculorum affectiones qualia medicamenta requirant.	274

INDEX.

Oculorum cruentatorum remedia.	356
Oculorum fluxione calida tentatorum remedia.	352
Oculorum ex inflammatione dolentium remedia.	354
Oculorum obliationes.	153
Oculorum pterygiis remedia.	360
Oculorum tumores ex plaga orti qua ratione curentur.	357
Oculorum tunicis induratis quæ conueniāt medicamenta.	297
Oculorum valetudini tuendæ aridum pharmacum Galeni.	301
Oculorum vlcera quomodo curanda.	290
Oculos imperturbatos conseruantia collyria.	342
Odorata stomacum roborant.	656
Oleum lucernarum est partium tenuium.	18
Ophiasis vnde nascatur.	4
Opium insigniter stupefacit.	759
Ophthalmia quid sit.	287
Ophthalmiæ curatio.	ibid. & 288
Organa vocis quæ sint.	537
Ori adhibenda pharmaca qualia esse debeant.	442
Ori destinata pharmaca quem habeant scopum.	429
Oris crustarum curatio.	486
Oris tunica rarior est ac mollior quàm cutis	

B 3

INDEX.

quæ totum corpus ambit.	447
Oris vitiorum remedia.	481
Oris vlcera (aphthæ vocantur) quomodo curentur.	517
Orthopnoææ qualis curatio.	619
Orthopnoici qui dicantur.	ibid.
Orthopnoicis remedia.	624
& 625	
Oxidoricum hoc est visum exacuens col- lyrium ex hæmatite.	342
Ozæna vnde fiat & eius curatio.	257
Ozænarum remedia.	258. & 260

P

P Aeonium, catapotium Andrea.	733
Palpebrarum aspritudinis curatio.	285
Palpebrarum pilis pungentibus remedia.	
313	
Palpebrarum scabris affectionibus quæ con- ueniant pharmaca.	297
Palpebris ficosis remedia.	345
Panchrestos Erasistrati.	308
Panchrestum Athenipion.	349
Panchrestus compositio.	615
Papularum menti ficosas eruptiones curan- tia.	382
Parotides vnde fiant, & earum cura- tio.	246
Past	

INDEX.

Pastilus hepaticus.	706
Pastillus ad ictericos.	725
Pastillus splenicus.	733
Pediculi in capite unde nascantur.	73
Pedicularum remedia.	ibidem
Pericalamitis, dicitur calami cortex.	40
Peripneumonicis remedium.	575
Peripneumonicis faciens malagma.	685
Phaon medicamentum.	318
Phanion Neapolitæ.	323
Phanium Serapiacum.	324
Pharmaca nihil sunt per se nisi vtentē rectē fuerint adepta.	499
Pharmaca nonnulli viginti aut etiam triginta annos suam vim retinent.	11
Pharmacis fortibus quando vtendum & quo modo.	280
Pharmacorū compositio quam requirat curam.	90
Pharmacorum vehementia pro constitutionis affectuum proportionē semper augenda est aut minuenda.	464
Pharmacum vnum nō potest esse ad multas affectiones optimum.	654
Philadelphium compositio.	325
Philonis anodynon.	754
Philonis antidotus mirificē semel tantū exhibita hepatis intemperiem sanat.	700
Phlogion medicamentum.	315

INDEX.

Phenix Apollonij collyrium.	339
Phosphoros compositio.	317
Phthificis remedium.	191
Pilorum affectiones quæ sint.	3
Pilos attenuantia pharmaca.	67.& 68
Pilos corrumpentia pharmaca.	62
Pilos subnigros facientia.	50
Plethora quid & quomodo fiat.	109
Podagra quid sit vndeq; fiat.	808
Podagræ curatio.	809
Prodicis prolabentis remedia.	791
Polyarchion malagma.	685
Polypodes quid & quomodo curentur.	257
Polypodum remedia.	260
Pompholix lota nulli pharmacorū mordacitatis expertum, inferior est.	277
Potio ad ictericos.	723
Potionis hepaticis conuenientes.	312
Potiones hydropicis.	731
Præcordiorum doloribus malagma.	682
Præcordiis inflammatis malagma.	683
Priapismus quid sit, & vnde fiat, & quomodo curetur.	796
Proteus collyrium.	348
Proteus excoriatorium emplastrum.	397
Psilotra medicamenta.	65
Psittacinum collyrium.	330
Psoricum Aëlij.	303
Psoricum collyrium.	349
Psydra	

INDEX.

Psydraciorum curatio.	101
Pterygiis oculorum remedia.	360
Priloseos curatio.	358
Pudendi affectuum remedia.	795
Pudendorum vlcera qualia requirant remedia.	794
Pueri maximè frequenter singultiunt.	660
Pulmonis vlcerationum remedium.	575
Punicorum malorum tres differentiæ.	459
Purgatione quando vtamur.	440

Q

Q Vartanis commodum catapotii ano- dinum.	610
Quinque folium ab aliquibus eupatorium dicitur.	406

R

R Atio & experientia velut iudicandi in- strumenta nobis à natura data sunt.	628
Raucedo multis de causis fit.	536
Raucedinis remedium.	573
Regij morbi differentiæ.	722
Reiectio cibi vnde fiat, & quomodo.	653
Renum affectionibus remedia.	800
Rhinema collyrium.	341
Rhinion Phædri.	308. & 309
Rhocadum remedium.	338
Ructu acido affectis remedium.	671

INDEX.

S

Sacrificuli confectio.	584
Sanguinē mingentibus remedium.	596
Sanguinem reiectantibus arteriace.	558
Sanguini reiectionis curatio.	592
Sanguinem reiectantibus remedia.	594
Sanguinis ex auribus eruptioni remedia.	
224	
Sanguis è naribus erumpens qua ratione fi-	
statur.	268
Scylatium compositio.	323
Sedis vitia difficilia curatu sunt.	786
Sedis vitiorum remedia.	787
Sereos facultates.	704
Sicula, colicæ.	770
Singultus stomacho varijs de causis accidit.	
653	
Singultus stomachi remedia.	658
Singultientium remedia.	678
Sphericum Triphonis collyrium.	345
Spheritis dicitur cupressus quæ pillulas pro-	
ducit.	34
Sphendarni id est aceris radix quā habeat	
facultatem.	706
Sphragis compositio.	321
Sphragis Neapolitæ.	ibidem
Sphragis Paccij.	ibidem
Splen actionem habet toti corpori commu-	
nem.	729
Splen	

INDEX.

Splen à natura celerrimè indurari solet san-	
guinem in venis ipsius obturato.	728
Splen obstructus qualia requirat pharmaca.	
ibidem. &	729
Splenem tomentem eliquans & consummās	
pastillus.	733
Splenis affectionibus induratis remedia.	736
Splenis inflammationibus recētibus epithe-	
mata & emplastra.	735
Splenici qui propriè dicantur.	730
Splenicis facientia amuleta.	744
Splenicis cataplasmate eadem imponuntur	
quæ hepaticis.	743
Splenicorum remedia.	682. & 685. & 730
Splenicis tumorem eliquans epithema.	738
Staphylomatum curatio.	360
Staphylomatum remedia.	329
Sternutatoriorum compositiones.	174
Stomachi varię sunt affectiões atque omnes	
ferè in totum ex cruditate oboriūtur.	670
Stomachi affectus qualia requirant medica-	
menta.	628. & 629
Stomachi affectionum curatio.	ibidem
Stomachi ardoribus remedia.	652
Stomachi subuersio quid, & vnde fiat.	648
Stomachi subuersionibus remedia.	650
Stomachi subuersionibus voluulosis reme-	
dia.	655
Stomachi	

I N D E X.

Stomachi supinitas vnde fiat.	648
Stomachicæ confectiones.	637
Stomachica Galli	646
Stomachica ab Asclepiade conscripta.	648
Stomachici qui dicantur.	637. & 638
Stomachicis qui sibi conueniant.	675
Stomachus roboratur odoratis.	656
Stomatica pharmaca omnia, quomodo cūq; parata, iuxta propria tēpora oportuna ac commoda fiunt.	465
Stomatica pharmaca quæ propriè vocen- tur.	467
Stomaticorum pharmacorum quis sit sco- pus.	439
Stomaticorū pharmacorū cōpositiōes.	459
Stomaticum medicamentū ex nucibus.	447
Stomaticum ex nucibus medicamentum à Galeno inuentum ibidem.	448
Stuporis dentium remedia.	421
Succi omnino corrumpuntur, si absque mel- le reponantur.	496
Suffusionum curatio.	360
Suffusis oculis conuenientia pharmaca.	298
Sugillatorum remedia.	364
Supinitas stomachi vnde nascatur & quomo- do curetur.	653
Surdaſtri qui ſint.	233
Surditatis remedia.	238
Syco	

INDEX.

Sycofes quid ſint.	291
Sinanchis conueniens ſtomaticum.	473

T

T Emporum doloris remedia.	129
Thalafferum collyrium.	343
Tapſiæ vis poſt annos multos exoluitur.	9
Theodotium Phlacianum Harpocratiũ inſcriptum.	323
Therinum collyrium.	328
Thoracis vtilis antidotus.	697
Tridacine dicitur lactuca ſylueſtris.	113
Toſi articulorum.	809
Tonſillis inflammatis remedia.	477
Trichiaſis remedia.	312
Trypherum collyrium.	326
Tunica oris rarior ac mollior eſt, quàm cutis quæ totum corpus ambit.	441
Tuſſi recenti catapotium.	581
Tuſſis remedia.	583

V

V arus, græcè ionthos dictus, quid ſit	378
Varorum curatio.	ibidem
Varis calloſis remedia.	380
Venæ	

INDEX.

Venæ sectione, purgatione clysteribus & inedia quando vtendum.	440
Vesicæ affectuum remedia.	800
Vini facultates.	699
Viride collyrium.	330
Viscerum doloribus malagma.	684
Viridia emplastra.	395
Visui obtuso faciens collyriam.	343
Visum exacuentes compositiones.	309
Ulcerosæ, pustulæ quomodo curentur.	101
Ulcera oculorum quomodo curanda.	290
Vnde fiat priapismus, quid sit & quomodo curetur.	795
Voci interceptæ remedium.	172
Vocis organa quæ sint.	537
Vomentibus cibum remedia.	650
Vomitibus ischiadicis auxiliatur.	655
Vomitibus ob imbecillitatem grauati stomachi oborti, qua ratione curentur.	653
Vomitibus voluulosis vnde fiant.	ibidem
Vox intercepta & vox rauca differunt sola magnitudine.	537
Vox rauca multis de causis fit.	ibidem
Vox intercepta ad plures causas sequitur.	536
Vrinam ciens confectio.	709
Vrfa informem quandam velut carnis mo- lem parit.	41
Vrfa vna quid.	601
Vteri	

I N D E X.

Vteri affectuum notæ & remedia.	797
Vteri suffocationibus remedium.	669
Vua non est pars aliqua oris sed affectio.	493
Vuæ passivæ facultates.	698

F I N I S.

CAPITULA PRI-
MI LIBRI.

De alopecia, caluicie, & ophiasi. Cap. I.

De defluuio capillorum. Cap. II.

De tincturis capillorum. Cap. III.

De pharmacis pilos corrumpentibus.
Cap. IIII.

Quæ pilos attenuant. Cap. V.

De furfuribus. Cap. VI.

De phthiriasi, hoc est morbo pediculari.
Caput VII.

De Achoribus, hoc est vlceribus capitis
manantibus. Cap. VIII.

Ad psudracia & achoras, pustulasq; vlce-
rosas, helcydria græcis appellatas, &
eruptiones in capite. Cap. IX.

CLAVDII GA-
LENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE

*pharmacorum localium siue se-
cundum locos, liber primus*

*Iano Cornario medi-
co, interprete.*

* *



V O D non solum affe-
ctus qui curatur curatio-
nē ipsam indicet, sed tum
ipsius ægri temperamen-
tum, tum affectæ particu-
læ natura, nō parum illam
simul demonstret, id ipsum sanē ante in cu-
randi methodo docuimus: quemadmodum
etiam quomodo quis ex simplicibus medi-
camētis per se compositum aliquod faciat,
compendio quidem in illa ipsa methodo, fu-
sius verò in septem libris ante hunc itē edi-
tis, totius disciplinæ adhibita ratione osten-
dimus. Nunc verò quomodo quis per se ex
methodi ratione pharmacorū compositio-
nes præparet, ad singulas corporis partes


a

conuenientes, & quomodo à prioribus medicis inuentis rectè vtatur, percurrere propositū est, à capite initio factō velut omnes etiam ante nos Medici fecerunt. Accidunt autem capiti plurimæ affectiones cum reliquis omnibus partibus communes: verū capillorum affectionem cum paucis cōmunē habet: propterea quod pilosum esse iuxta primam rationem non multis inest. Generatio enim pilorum eadem est quæ terræ nascentium, quæadmodum in libris de temperamentis est demonstratum. Quemadmodum enim ex istis quædam arte & arbitrio agricolæ: quædam verò iuxta naturales causas proueniunt: Eodem modo & in animalium corporibus contingit, quū aruo quidem alicui triticum, aut hordeum, aut aliud quoddam cerealium seminum, in se insita habenti, caput adsimiletur. Aliis verò herbis quæ iuxta humidiores regiōes proueniūt, reliqui totius corporis pili similem generationem habeant: non enim secundū primam rationem, sed per accidens quoddam natura eos generare solet. Et pili quidem palpebrarum ac superciliarū non paruatam vtilitatem animalibus exhibent, velut alibi est ostensum: menti verò & pudendorum pili minoris vtilitatis gratia producti vidētur. Quapropter etiam affectiones pilo

pilorū in oculis & superciliis, præcipuè nos ad
 curā sui ipsarū impellūt: secundū verò locū
 capitis capillorū affectiones habēt, deinde
 menti & pudendorū. Sunt autē pilorū affe-
 ctiones, perfecta perditio, & coloris ipso-
 rum alteratio, velut in vitilagine alba, Leuce
 græcis appellata, fieri consuevit. Ad hæc
 etiā in alopeciis & ophiasī nō modicū atque
 indecorum detrimentū simul capillis acce-
 dit. Quidam igitur promiserūt veluti has,
 sic etiā incipientem caluiciem, se ne auge-
 scant prohibituos: sunt autem qui hoc im-
 possibile esse dicunt, Itaque ad alopeciarū
 & ophiasis curationē progressi, pharmaca
 scripserunt per quæ perfectam ipsarū sana-
 tionē pollicentur. At verò plerique medicī
 ex ipsorum vsu aliquando nō solum succes-
 su longè frustrantur, sed etiam vehemen-
 ter nocent, vt affectio ipsa incurabilis red-
 datur: quod sanè ipsis etiam circa alia phar-
 maca cōtingit, quibus citra methodi ratio-
 nem vtūtur. Ego verò id quod Hippocra-
 tes præcepit, in artis operibus facere semper
 annitor: nimirū vt quod auxilii loco adhi-
 betur, velut ille scripsit, iuuat vel certè non
 noceat. Quod verò pharmacorū citra me-
 thodū vsus nō solū nō proffit, sed frequēter
 etiā obfit, ex illo sanè discere, licet, iam ve-
 rò ordiēdi, quod proposuimus tēpus adest.

De Alopecia, Caluicie & Ophiasis.

CAPVT I.



Vemadmodum plantæ aliquæ ob humoris inopiam resiccatae corrumpuntur, aliquæ verò ob humoris alieni ab ipsarum natura attractione: eodem modo & capilli aut propter humorum ex quibus nutriri consueverunt inopiam, aut propter eorundem vitiationem corrumpuntur. Et propter inopiã sanè humorum caluicies contingit, propter vitiatos verò humores Alopecia, & Ophiasis, Vnũ quidẽ ambæ secundũ morbosam affectionem malum, nomina autẽ iuxta figurã habentes diuersa: serpenti enim similis læsa capitis pars in ophiasis apparet. Alopecias autem ob id appellatas fuerunt quod vulpibus frequẽter accidant. Nos autem propter quid sic appellari contingit non quærimus, vnde verò oriatur causam quærentes, eam ipsam humorum vitiatorum redundantiam comperimus. Quales autem tandem sint corrupti humores, ex colore cutis capitis cognoscas: aliquibus enim mutata albidior apparet, aliquibus nigrior, aut pallidior. Quare in istis primum totius corporis purgationẽ adhibebis, aut pharmaco pituitam ducente exhibito, aut quod bilẽ pallidã, aut nigram trahit, coniectura redundantis humoris excol

SECUNDVM LOCOS, LIB. I.

colore cutis facta. Ego verò semper per hie-
ram purgaui, aliquando veratro nigro adie-
cto, vbi atræ bilis expurgare volui humo-
rem, aliquando scammonia, si amara bilis pur-
ganda esset: si verò pituitosiorē exuperare
coniecissem humorem, nihil ammiscui. Ta-
les enim præsertim ex capite, hiera ex colo-
cynthide purgare consuevit, simulque cum
his etiam alios quosdam humores, etiam si
scammonia, aut veratrū nigrū, aut epithy-
mū non addatur. Quin & ex aloë catapotia
que tum scammoniam tum colocynthidem
admixtam habent, commodius ita affectos
purgare solent. Cæterū post totius corpo-
ris purgationē, Apophlegmatismis pituitā
è capite detrahare præstat, atq; deinde lo-
calibus auxiliis vti: de quorū cōpositione
dicturū me hoc opere recepi. Oportet enim
velut in aliis, sic & in his affectioni mederi,
cuius accessio siue symptoma est vitiatum
capillus. Siquidē igitur vitiatum humor cir-
ca vnū locum fuerit collectus, scopus me-
dendi erit vt is quā celerrimè euacuetur,
prius quā ab ipso cutis in quendā malum
habitum deducatur: tātum vt etiam si quis
vitiatum ipsius humorem euacuet, & boni
sanguinis influxū præparet: is adeò etiam à
malo in ipsa habitu prius inducto corrup-
patur. Si itaque vitiatum humorem in cute

6 DE COMPOSIT. PHARMACO.

euacuare volueris, discussoriis pharmacis opus habebis. Atqui contradicet forsan aliquis, communem scopum in omnibus affectionibus quæ ex influxu humorû fiunt, contrari ac subuerti ratus: repelli ipsos debere asserens partem refrigerando ac adstringendo, non attrahi calfaciendo: esse autem discussoria omnia facultate calida. Et certè affirmamus nos quoque verè hæc dicta esse: Incipientes enim ophiases & alopecias per huiusmodi pharmaca prohibere oportet ne augeantur: non tamen principium ipsorum alopeciam aut ophiasin appellari, sicut neq; psoram aut lepram iam appellamus quæ ex lichene orditur. Ego itaque quæadmodum nostis, etiam iam factas alopecias aliquando sola purgatione sanavi, nullo amplius medicamento post ipsam ad locum affectum admoto vt autem ampliorẽ eius rei experientiam facerem, ex eiusmodi quopiã successum impulsus. Adolescens quispiam bonæ habitudinis & exercitiis adsuetus hanc affectionem in capite habebat: erat autem satis familiaris mihi, vt diætam ipsius qua iam per tres aut quatuor menses vsus erat, probè nossem, explebat enim se quotidie fermè fungis. Hunc itaque sola hiera ex colocynthide purgaui, bis in quinque diebus: in prima sanè purgatiõe quatuor ex ea drachmis,

mis, in secūda quinq; exhibitis. Prius quā
 verò ad has purgationes peruenirem, cata-
 potia ex aloë vndecim ei præbui ciceribus
 ferè magnitudinem parem habentia. Ha-
 bent autem catapotia hæc. Colocynthis
 partem vnā, aloës & scammoniæ vtriūsq;
 partes duas, his ego vnā partem succi ab-
 sinthii addo. Antea verò etiam mastichen-
 chiam & bdellium adieci, Hoc enim modo,
 Quintus vtebatur. Verū propter quid ea
 reiecerim postea, alio sermone explicabi-
 tur, quem in compositionis purgantiū phar-
 macorum libros reſeruo. Quū igitur post
 has tres purgationes homini pituitam è ca-
 pite deducere per apophlegmatismos vel-
 lem, atque deinde pharmacum quoddā ad
 affectam partem adhibere, contigit ipsum
 de repente in profectionem quandam able-
 gari: in qua quū boni succi cibus, de quibus
 à me instructus erat, vteretur, post dies for-
 tè viginti rediit ab affectione circa capillos
 penitus curatus. Ex hoc sanè successu inci-
 tatus ego, quum in aliis eandem curationē
 fecissem, expectaui vt viderem quid citra
 pharmacorū ad caput adhibitionē, esset se-
 quuturū. Curati sunt itaq; omnes hoc mo-
 do, nō tamen in iam inueteratis huiusmodi
 experientiæ periculū feci. Difficulus enim
 eluūtur in his cuti impacti, serosi humores,

8 DE COMPOSIT. PHARMACO.

multò verò magis in his quibus iam ipsa cutis ad malum habitum peruenit desperanda est per solas purgationes curatio. Atq; hæc quidē necessariò præfatus sum. Cæterùm de pharmacis affectioni huic cōmodis iam dicere incipiam. Euacuatiua igitur omnino esse oportet ipsa affligentis humoris, verū euacuare nihil potest quod nō discutiēdi vi sit præditū, eam verò vim citra calefactionem habere nō potest. Sed si quidem ex vehementer calfacientium numero fuerit, cutem exuret: quod si verò nō vrat, in principio quidē præclarè iuuabit, progressu verò réporis cuticula capitis super resiccata talis euadet, qualem in caluis videmus. Nō tamē simpliciter moderatè calidū esse pharmacum oportet, intra videlicet fines scopi propositi retentum. Nam & tenuium partium ipsum esse conuenit, quod sanè in altum sit progressurum, vnde radices capillorum generationis suæ principiū habent: & vi qualē diximus præditū: propterea quod crassior sit & durior capitis cutis, & ob id medicamento opus habeat efficaciore. Itaq; si supra hoc quòd vitiatos humores discutiat, etiā idoneū sit ad bonū sanguinē adtrahendum, velut est thapsia, optimum sanè pharmacū est censendum. At verò quū thapsia lōgè calidior sit quàm affectioni sit ex usu,

mer

merito eius adhibitionem per se vitamus: exulcerationes enim in cute excitare cōsuevit, & omnino quosdam inflammatos tumores, qua propter necessario quādā quæ eius vehemētiā mitigent admiscemus. Id ipsum verò ceratum ex oleo apparatus præstare potest. Sit autem tenuium partium oleum quale est Sabinum, præstat item moderatè esse vetustum. Ad hanc rem confert item oleum cicinū, quod mox ab initio eiusmodi naturam habet, quali præditum est Sabinum inueteratum. Quod si neutrū horū ad manū sit, ex reliquis græcis oleis citra olearum germina apparatus quodcunque tandē admiscemus, præsertim si sit vetustū. Perspicuum itaque esse opinor oleum ex Iberia, aut Hispania, aut quomodocūque quis eam appellare velit, fugiēdum esse, itemq; quod ex oliuis nondum plenè maturis apparatus, Omotribes & omphacinum à græcis appellatum. Vsus sum autem & sola thapsia vehementi eius facultate larga atque ammixtione exoluta. Verū nōsse operæpretium est circa thapsiæ vsum, maximam differentiam esse recentis ad vetustiore. Vis enim huius pharmaci post annum multum exoluitur, atque amplius adhuc post duos annos, ausimq; ferè dicere inutilem penitus eius vsum ad triennium progressæ. Eius igitur

ætatis animaduersione habita imparē aquæ
modum admiscebis. Ad recentem enim plu-
rimum aquæ addes, eamque sæpe singulis
diebus illines: ad eam verò quæ per tempus
imbecillior reddita est, minus adfundes,
quo & ob crassitudinem diutius adhærere,
& propter liquiditatem non statim deflue-
re contingat. Quin & quum compositum
pharmacum paras quod thapsiæ ammixtio-
nē requirit, quale est quo ego assiduè vtor,
non æquale semper pondus thapsiæ ammi-
scebis, sed quântum pro tempore ætatis eius
conuenit, tantum ipsum pondus augebis.
Cæterùm de hac tota re paulò post dilige-
tius quum ad composita peruenero expli-
cabo, vbi prius simplicia pharmaca affectio-
ni huic familiaria recensuero. Etenim ex
his quæ fortiter calfaciunt est euphorbiū:
quæ autem sufficienter, laurinum siue oleū
siue vngentum, aut quocunque tandem no-
mine id appellare velis. Nam & his vnà cū
calfaciendi ac discutiēdi facultate inest vis
adtrahendi sanguinem in locum ab ipsis ca-
lesactum. Licet igitur ipsis per se vti, eu-
phorbio quidem in oleo trito ac leuigato,
laurino verò solo citra alterius ammixtio-
nem illito: si tamen nimis fluidū appareat,
parū ceræ addatur. Quū verò multò cali-
dius sit recens euphorbiū, si quidē eo quod
duo

duorum aut trium annorum est vteris, ad libram vnam romanam olei, euphorbii vnciam vnā iniicies, quæ sanè duodecima olei pars existit, recenti verò euphorbio parcè vtaris, quàm minima eius parte primū amixta, aut etiam ceræ vncia vna insuper addita, quo videas quantum hominem excalefaciat: licebit enim tibi vbi rursus vti voles, denuò addere siue oleum siue cerā malis. Eodem modo etiam thapsia vtendū est, omnibusq; fortibus medicamētis. Peccatum enim infrā modū nullum detrimētū affert, suprā verò aliquando exasperat & exulcerat cutem, inflammationēq; suscitāt. Atqui etsi in sequētibus cōpositis pharmacis quādoque euphorbium. aut thapsia scribatur, pondus ipsorum in vigore existentium nō veterū intelligere oportet. Valde enim vetusta omnino fugere oportet, nō solum in his pharmacis, sed omnibus etiā aliis, quæ videlicet succi & liquores, & flores, & folia, & fructus, & radices, & semina existūt, quādo sanè etiā Metallica ipsa per lōgioris temporis situm vires suas amittāt. Vtimur tamen quibusdā pharmacis viginti aut etiam triginta annorū: propterea quod nōdum vergentē omnino habeant ætatē: alia enim aliātum vigentē, tum vergentē seu inclinatam ætatem habēt, atque etiā si ita dicere libeat
sen

12 DE COMPOSIT. PHARMACO.

senectam. Vnūquodq; autē propriū vigo-
rem his qui ea saepe viderūt indicat, tum ex
odore, tum ex gustu, aliquando etiā ex co-
lore, & secūdum crassitiē cōpage. Quem-
admodum in aliis omnibus pharmacis non
solum quòd calefaciant operapretium est
cognoscere, sed & quāta distantia quotoq;
ordine id faciāt. Sic item in his quæ alope-
ciis cōferūt pharmacis nosse oportet quòd
calidissimū quidem ex eis est euphorbiū,
Eo autem minus calidum est thapsia, post
thapsiam autem sinapi & nasturtium. Iuxta
aliū autē modum limnitis nulli horū se-
cundum est, habet autem præter hanc duas
alias appellationes: nam & Adarcium &
Adarce vocatur. Post hæc succedunt sul-
phur, & nitri spuma, ipsumq; nitrum molle
vstum, & quod Berenicarium appellatur,
quemadmodū & Aphrolitrū album, leue,
ac laxum, quod nullam in se terreā *aspe-
ritatē habet. Deinde veratrū vtrunque &
erucæ semen, & laurinū siue oleū siue vn-
gentū velis appellare. ad hæc alcyonium
vtrūque vstum & nō vstum: præstat tamen
vstum: & calami radices itēq; cortex, ambo
vsta. Quin & pix liquida, & cedrinū quod
aliqui cedriam appellant, & muriū stercus,
vrsæq; adeps: præstat autē si vetustior ex-
tet, quāquam etiā hyenæ, leonisq; ac pardā-
lis

* Aliàs
crassitiem

lis ac anseris adipēs cōueniunt, & quicūque
tenciū partiū substantiā habent, quo prom-
ptē in cutis profundū penetrare queāt, atq;
ad radices vsque capillorum perringāt. Sed
& amygdalæ amaræ totæ vstæ commodæ
sunt, & thus aceto acerrimo subactū. Sub-
actum autē intellige quum pluribus diebus
& maxime ad solē frequēter cum acri ace-
to sit cōtritum. His itaq; omnibus pharma-
cis licet vtaris, ad fortia quidē cerato liqui-
do addito, debilibus verò oleo laurino im-
butis. Et inueteratas quidē ac difficulter cu-
rabiles cum fortibus persanare conaberis,
incipientes autem & paruas cum debilibus.

Ad Alopecias composita.

CAeterum pharmaca cōposita, quæ par-
tim à prioribus medicis qui alicuius
æstimationis fuerunt, magnopere sunt lau-
data, partim vero à nobis ipsis per longam
experientiam sunt examinata ac probata,
eiusmodi existūt. Euphorbii, thapsiæ, lauri-
ni, singulorū drach. 2. sulphuris viui, veratri
vtriusque drach. vnā, neque refert albo an
nigro veratro quod ad manū sit vtaris. his
ammisce ceræ drach. 6. laurino aut cicino
aut veteri oleo liquefactas, vtereque hoc
vt fortissimo pharmaco, ad inueteratas &
ægrè curabiles alopecias. His etiā aliquan-
do nasturtii drach. vnam, aut alcyonii vsti
drach.

drach. i. ammiscui. præstat autē in hūc vsum alcyonium quod durius est & magis asperum. Quod si thapsia nō adsit, pro ipsa tantum pōdus seminis nasturtii aut erucæ addes, aut ipsum adeo nasturtiū. Si verò laurinum non habeas bonum, picem liquidam adde: laurinum nanque picem liquidam nō multum excellit, thapsia verò reliquorum respectu maximū excessum habet. Hoc sanè pharmacū omnium quæ ad hāc affectionem efficaciter faciunt fortissimū & valentissimū est, quando videlicet affectio ægre recipit curationem. Quæ enim parua est & incipiens etiamnum, sola purgatione sanatur, & per singula quæ recensui simplicia vsta, laurino aut cedrino, aut liquida pice, aut cicino vel veteri oleo excepta. Ammiscui etiam aliquādo mel pro cerato, minori tamen copia & pondere, neque peius euasit pharmacū. Porro quæ ex adipibus cōponuntur modica item thapsia ammixta, similiter prosunt, præsertim si euphorbiū & adarciū addatur. Sit autē adeps trium generū leonini, pardalii, & hyænæ, cuiusque pars vna. Si vero hyænæ adeps nō adsit, sufficit præsentibus reliquis duobus vti, anserino ammixto: Si vero omnes quatuor habeas, simul omnes miscebis, addito insuper si adsit ursino. Ad totā verò eorū molē duodecimam

timam thapsiæ aut euphorbii partē addere
 satis est: aut si omnino fortius facere velis,
 imbo addes: nam & per experientiam hæc
 ipsa pharmaca efficacia sunt iudicata. Maio-
 ris enim experiētiae habendæ gratia, peten-
 tibus subinde medicis à me amicis, singulis
 aliud atque aliud eorū quæ experientia co-
 gnita habui, rudi modo digestū exhibui, &
 reperta sunt sanè plurima ex eis optimè cō-
 ducentia. Verūm ante omnia methodi me-
 mini sse oportet circa eorū vsum, quæ com-
 munis in omnibus præsertim fortibus phar-
 macis existit, quare etiā sape eius mētionē
 facio, utpote in qua magna omnino vis sita
 est. Qui enim singulis fortibus pharmacis
 utitur, in principio quidē ipsa molliora ad-
 hibebit, ammixtione videlicet eorum quæ
 vires ipso forū exoluunt: qualia sunt oleum &
 cera, & ex simplicibus quæ diximus debi-
 lia, velut est thus, & calami cortex ac radi-
 ces exustæ, & amygdalæ amaræ, & quæcū-
 que eius generis existunt. At verò post pri-
 mum vsum quū iam secundo adhibere vo-
 les, intueri oportet qualem alterationem in
 affecta particula prius admotū pharmacū
 fecit, atq; illius respectu aut vehementiam
 facultatis eius lenire, aut augere. Velut in
 hac quā iam tractamus affectione, primum
 quidem capillos nouacula tollere oportet,
 dein

deinde affectam cutē per linteolum neque
asperā neq; molle nimis cōfricare, ac vide-
re ad quātū ruborē per huiusmodi molimē
ac cōfrictionē peruenit. Magnā enim spem
succesuræ curationis tibi iniiciet, si per mo-
dicas defrictiones rubefiat, quæ moderatæ
affectiōis significatio existit. Si verò per
multas tandē, grauiorē tum affectiōē, tum
curationē indicat, præsertim quū quædam
cuticulæ etiam si multū confrices nō rube-
fiant. Manifestū igitur est has omniū diffi-
cillimē curari, sicut cōtra facillimē, quæ fa-
cile rubescūt: quæ verò inter has medio mo-
do habent, tantū inter se differūt, quantum
vel ad pessimas vel moderatissimas acce-
dunt. Atq; hæc quidē obiter & extra propo-
sitū dicta sunt, quāquam nō omnino præter-
rem sint. Rursus itaque ad id quod propo-
suerat reuersus methodi te cōmonefaciā
quam vsus pharmacorū requirit. Post pri-
mam igitur pharmaci cuius vsū elegeris
adhibitiōē, intueri conuenit primū quidē.
An etiā ante cōfrictionem cutis coloratior
appareat: deinde autem an cum pauciore
quā prius frictiōe, aut an cum æquali
quidem, magis tamē quā prius rubicunda
fiat. Præ omnibus verò animaduertere opor-
ret ne in fortiū pharmacorū admotione cu-
tis vltra quā cōuenit concalescat, id quod
tum

tum ex colore ipsius, tum digitorum tactu deprehēdes. Colore nanque flavior apparebit, & digitorum cōtactu satis calidam cognosces. Horum itaque animaduerfionē habere oportet: periculū enim est iterū atque iterū repetito eorū vfu, cutem exuri. Quare ad molliora transeundum est, aut eodem vtendum quidem, sed cerati, aut adipis, aut liquoris cuiusdam oleosi ammixtione, vi ipsius exoluta. Vtendū est & olei calidi dulcis irrigatione, & cataplasmate ex pane, fomentisq; & scarificationibus ac cucurbitis, & ceratis, viriū item refectrice diæta. Cæterū in perseuerāte affectione vtendum est assidua rasura, & rubificatorio ex sinapi velut est prædictum, itemq; frictionibus præscriptis, & sequētibus diebus illita pice aut oleo cedrino, & post confrictionem scarificationibus. Quidam vero aciculas colligantes hoc modo vt aciem ad cutem vergentem habeant, per ipsas cutem compungunt. Verū post rubificationē per defrictionem inductam, & post scarificationem, pharmacis quæ ex alto euocare ac meatus trāsmutare possunt, Metasyncritica Græci appellant, vtemur. In omnibus autē cōmunis scopus hic sit, vt in aëre calido pharmacum ipsum adhibeamus, & maximè si fieri possit in loco insolato, qui non habeat au-

ram ipsum perflantem, hyemis autē tempore præstiterit in balneo his pharmacis vti.

De pharmacis cōpositis ad Alopecie affectionem à senioribus medicis conscriptis.

H Eras quidem igitur in ferula iuxta dictionis seriē sic scribit: Alcyonium quod asperius est vstum ac cum oleo tritū ac leuigatū loco illinito, sit autem oleum maxime ex lucernis acceptū. Hæc quidem sunt Heræ verba: Verū nosse oportet medium esse viribus hoc pharmacum, & propterea ad medias magnitudine alopecias curandas sufficiens. Moderatum equidem pharmacum est si calami radicem aut corticem, aut amygdalas amaras, aut eius generis quippiā vstum cum oleo cōmittas. Fortia verò sunt quæ ex euphorbio & thapsia & adarco apparantur. In medio vero istorū est alcyonium vstum, sed & ipsum moderatius redditur oleo ammixto, fortius verò liquida pice aut laurino affuso. Miscetur item prædictis adipibus, & sanè ego cuidam qui ad hanc affectionem vrsino adipe vsus erat, nec quicquam profecerat, alcyonium ammiscere consului, à quo postea breui sanus euasit. Cæterū oleum lucernarū nō ob aliam rationē aptum est, quàm quòd magis tenuium partium existit, id quod ipsi ex lucerna in qua veluti coquitur accedit, sitque
tum

tum veteri, tum cicino ad simile, veluti si
etiā aliās ad ignem oleum velis calefacere.
Itaque & sordes quæ in candelabris liquido
luto similes gignūtur, his qui apud nos ruri
degunt cognitæ sunt, ad vlcera in medio
digitorū pedum curāda efficaces, quæ vlce
ra frequenter illis oboriuntur propter illu
uiem & negligentia perluendi ea singulis
diebus. his itaque sordibus lutosi consului
cuidam rurali alopecia quam scalptā mihi
ostēderat illinire, vnā cum assidua loci rasu
ra: qui sanē ab ipsis persanatus, etiā alios ten
tauit hoc modo curare, vtpote qui putaret
omnē alopecia ab hoc pharmaco posse cu
rari. Verū ego quū moderatā eius affectio
nem essem intuitus, speraui ipsum quidem
per illas sordes sanitatem consequuturum.

*Aliud compositum pharmacum Heræ
pueris aptum.*

Aliud autē deinceps pharmacum He
ras post præscriptum, iuxta seriem di
ctionis hoc modo scripsit: Seminis erucæ,
partem vnā, nasturtii, partem vnā, nitri,
partem vnā. In aliquibus autem exemplari
bus simpliciter scriptum est. Erucæ, partem
vnā, nasturtii, partē vnā, nitri, partē vnā,
cōtritispicē liquidam affunde, & loco prius
cōfricato impone: atq; vbi abstuleris phar
macum, locū spōgia calida imbuta extere.

auferes autē bis per diem, & in pueris maximē efficax conspicitur hoc pharmacū. Fortius enim est priore, Verūm inueteratam & agrē cedentem alopeciam non curauerit, quod ipsum etiā Heras indicat, qui in pueris ipsum maxime efficax adscripsit, hoc est in corporibus molli cute præditis, Ex huiusmodi enim vitii humores facilē discutiuntur. Habent autem consimilem pueris cuticulam eunuchi & mulieres.

De his quæ Crito ad Alopecias conscripsit.

Crito verò in tertio libro eorum quæ ad corporis ornatū pertinent, sic scripsit: Ad affectionē alopeciā appellatā quæ capillos deuastat, & cōmuniter deformitatem inducit, subscriptis compositionibus vtendum est, vt Heraclides Tarētinus tradit: Amygdalas amaras cū corticibus vstas ac tritas aceto excipe, modico item affuso melle: vsu vero expetente loco per mundū linteolū præfricato, assiduē illine. Prodest autē maximē etiā assidua rasura antequam pharmacum imponatur. Aliud quo Moscus vsus est: Herinaceorum marinorum testas exustas & aqua subactas locis præfrictis impone. In quibusdam exemplaribus non aqua, sed adipe vrsino excipi debere Herinaceorum cinerē reperi, quod mihi magis placuit. hoc enim modo efficacius redditur.

tur. Aliud, Calami radices vstas adipe
vrsino excipe atq; impone. Aliud, Tha
psia corticem tritum cum aceto imposito.

Aliud, Chamæleonis radicē cum ace
to diligenter tritā imposito. Hæc præfatus
Criton deinceps ita scribit. Quod si verò
perseueret affectio, subscriptis compo
sitionibus vtendum est. quibus verbis planè
indicat per præscripta medicamenta mo
deratas affectiones sanari: itaque deinceps
quæ ad fortiores affectiones conducunt
scribit, quæ iuxta seriē dictionis ipsius hoc
modo habent.

*Quæ Heraclides ad inueteratas Alope
cias descripsit.*

AD alopecias velut Heraclides Taren
tinus tradit, Orestini ad alopecias in
ueteratas: muscerdæ drach. 2. thuris drac. 2.
aceto acerrimo dissoluta præ rasis locis il
line. Aliud, Herinaceorū marinorum
vnā cum testis exustorū drach. 2. gallarum
omphacitidum, tantundem. amygdalarum
amararum vstarum, tantundem. muscerdæ
drach. 1. aceto dissoluta & probè trita im
ponito. Aliud Orestini, Pilorum vrsi
vstorū, adianti vsti, radicū calami vstarum,
foliorū fici vstorū, pāniculi Cilicii vsti, sin
gulorū æquales partes adipe vrsino & ce
dria excipe. Vsus verò tēpore, loco foto &

per fici folia cōfrictō, ac per nitrū exterso,
pharmacum quotidie illine. Quod si cutis
superficies exuiceretur, ceratum ex oui lu-

* In qui- teo impone,* & farinarum tritici ac hordei
busdā exē succum recentē superline. Aliud Ortho-
plaribus nis Siculi accōmodatū. Cineris ranarum
manu scri minimarū in ollula vstarum, partem. i. mu-
ptis locus scerdæ, veratri albi, radicis calami vstæ, pi-
hic sic legi peris albi, singulorum æquales portiones
tur & li- aceto excipe, & ad præfrictum ac prærasum
liorū, & locum vtere. Aliud, Cineris vngularū
tritici, & caprinarum vstarum, succi thapsiæ, alcyo-
ordei suc- nii, muscerdæ, spumæ nitri, myrrhæ, piperis
co recenti. albi, zingiberis, singulorum æquas partes
probè tritas felle caprino excipe.

*Quæ Cleopatra in libro eorum quæ ad cor-
poris ornatum pertinent scripsit.*

IN libro Cleopatæ de ornatu corporis,
ad alopecias descripta sunt pharmaca,
quæ iuxta illius dictionis seriem hoc modo
habent: Sandaracham tritam largoque vi-
sco quercino exceptam, & in linteolum in-
ditam, loco per nitrū prius præparato im-
ponito. Ego verò etiam nitri spumam ad
prædicta ammiscui, & egregiè efficax phar-
macum reperi. Aliud, Scillæ drach. i.
veratri albi drach. i. ex aceto trita prærasis
& nitro confictis illinito. Aliud, Si-
napis drach. vnam, nasturtii drach. vnam,
trita

trita ex aceto, prærafis & nitro exterfis locis imposito. præstat autem locum vuln-
 sculis impactis scarificare. Aliud, Cor-
 tici calami drach. 4. spumæ nitri drach. 4.
 pice liquida exceptis vttere. Cæterum locū
 assiduè radere oportet, & cum linteolo cō-
 fricare, sic enim quàm celerrimè pilos pro-
 ducet. Aliud, Muscarum capita cōtri-
 ta affrica. Aliud, Muscerdas tritas illi-
 ne, loco prius per linteoli affrictum sub-
 cruento reddito. Aliud, Amygdalas
 amaras vnā cū corticibus exustas cum ace-
 to & melle contere, & loco per defrictio-
 nem subcruento reddito illine, idque ipsum
 assiduè facere perge, & locum nouacula ra-
 de: sic enim capilli citò prodibunt. Aliud,
 Cæterum ea quæ sequitur compositio om-
 nes vi sua præcellit, faciens itē ad proflu-
 uium capillorū, cū oleo aut vngēto dissolu-
 ta, facit & ad rarefcentes in principio capil-
 los, & in caluicem prolabentes. Estq; omni-
 no admirabilis: Muriū domesticorū vstorū
 partem vnā, panniculi ampelini* vsti partē * ἡ ἀπὸ λῆ-
 vnam, dentiū equinorum vstorum partem *vor. in ve-*
 vnam, adipis vrīni partem vnā: medullæ *tu s'to exē-*
 ceruinæ partem vnā, cortici calami partē *plari legi*
 vnā. Hęc omnia arida leuigētur, & sufficiē- *tur id est*
 ti melle ammixto ad crassitudinē mellis re- *vel linei.*
 digātur, indeq; adeps & medulla liquefacta

addantur, & pharmacū ipsum in æream pyxidem reponatur, ex eoque alopecia donec capillos producat defricetur. Similiter autem & proflui capilli quotidie ex eo illinantur. Porro inter hæc ipsa pharmaca itemq; ea quæ deinceps describentur, non difficile est diiudicare quæ acriora ac fortiora, rursusque quæ molliora & imbecilliora existant, modò quis ea quæ in principio dixi in memoriam reuocet. Ita enim & rectus eorū vsus continget, nimirū ad mediocres alopecias mediocribus adhibitis, ad fortiores fortioribus, velut etiā ad eas quæ fortissimæ sunt, fortissima remedia admouentur.

Quæ Archigenes ad Alopecias cōmoda cōscripsit.

Archigenes itē hæc pharmaca ad alopecias hac verborum serie descripsit. Alopecias leues & in superficie hærentes, nitro confricatas ac linteolo extensas, verbenaca in sole trita acetoque diluta largiter illine. Aut eodē modo extensis betæ folia impone, insuperque linteolo humectationem. Cæterū in altū progressas cū aceto, nitri gleba, aut sepia testa, aut aspera squatinæ cute, aut fici foliis vsque ad dilationē defrica: deinde deterfo sanguine, betam ex vino coctam impone, aut caricas
vsta

vstas cū vino, aut lētis farinā cum vino pro
 cataplasmate adhibe. Aut buprestis cū ace-
 to, aut ranunculo, aut ari radice in cerati
 formam redactis, & per noctem impositis,
 bullas ex alopecia excita: mane verò bullas
 punctas, allio aut buselino, aut fremij
 foliis intege. Probe faciūt etiā post excita-
 tas bullas hippocāpi marini vsti, & cū modi-
 co atramento sutorio crudo trito inspersi,
 itemque ossa maxillarū suillarū vsta. Aut
 rasis & cū nitri spuma extersis, & cū alcyo-
 nio ex acri aceto confictis donec cruentæ
 reddantur, nucū ponticarū putamina vsta
 cum melle leuigata illine, atq; id bis in die
 facito: sedat ac sistit eas vt plurimū in die-
 bus decem. Aut mures domesticos in olla
 exustos tritosque, axungia excipe, & præ-
 frictis cū allio allopeciiis in splenio impo-
 ne, idque donec capilli enascantur quotidie
 repetere. Aut ranūculos paruos similiter exu-
 re, eorumque cinerē cū pice sæpe vsquequo
 crassa facta sit feruefacta illine, loco neque
 raso neq; prius cōfrictō. Aut muscerdas &
 thus æquali portione cum aceto ad mellis
 crassitudinē redacta loco prius rubificato
 illine. Aut ficus aridas vstas cū oleo tritas
 illine. Aut veratrū albū, piper, muscerdas,
 præfrictis, & conscalptis ex aceto illine. Aut
 raphano & cepis oblique concisis probè

confrietas illine. Aut alcyonium torrefactum cum digito oleo madefacto diligenter affrica, donec morsum percipiat, & correctam alopeciā emendabis. Aut alcyonium ad lucernā torrefactū, adipemq; vrsinū similiter liquefactum misce, & præfrictis ad solem, illine. Aut præpunctis pro more, cepas tritas cum melle cataplasmatibus modo impone. Aut raphani corticem eodē modo. Aut facta scarificatione, calami corticē superiorem quē Aegyptii Siphtheriū appellant, vstum cum pice liquida committe, spleniumque impone, & quater aut quinquies solue, deinde ex terge ac aliud splenium impone. Quidam nitri decimā cineris ipsius partem ammiscēt, valdeq; eis succedit. Aut squamam stomomatis ferri cum aceto & oleo illine eodem modo. Aut felis siue crocodili stercoris drach. 6. sinapis drach. 4. cū acri aceto illine. Aut cantharidas vstas pice liquida exceptas ad cerati liquidi formam redige, præfrictisque ex nitro asso locis, & exterfis in splenio impone, & per noctē sine: mane verò tolle, locumque exiccare permitte vsquequo circum circa rūpatur: vbi verò eruperint capilli eos assiduē rade. Aut nasturtiū: vel vt alii piper, muscerdas, veratrum album, æqualibus portionibus ex aceto illine. Aut cum aspera squatina cute, aut folio

folio ficulneo, aut pumice leui, superne alopecias cruentas facito, deinde que amygdalas amaras vstas cum aceto mulso illinito, idque assidue facito ac radito: augescunt enim statim capilli. Aut testudinis marinæ sanguinem illine, ex laudatissimis enim hic est. Aut hippopotami coriū vstū illine. Aut nuces ponticas vstas & staphidas sylvestres cum vnguento laurino. Hoc enim ab Archigene laudatur. Aut muscerdas & veratrum album illinito. Aut corticis calami vsti & nitri æquas partes cum pice liquida ad magmatis formam redige. Aut nuces amaras vnā cum corticibus vstas ex aceto aut melle crassius illine, idque loco prius per linteolum exterso: post verò assidue radito, Aut ammoniacum thynnium cum succo tithymalli affricato. Aut felis stercus aridum ex aceto. Aut rhois drach. 4. vel. 2. sinapis drach. 2. cū acri aceto illine. Aut amygdalas amaras & pumicem illine. Dionysodorus autē medicus, Soleam inquit, nouā vstam cū acri aceto illine. Egregiè autē facit ad inueteratas alopecias, si thapsiæ succum aut radicem cerato exceptū loco imposueris, etiā si nihil præterea aliud facias. Decedit enim superna cutis & sanie serosa madet, capilliq; sua sponte subnascuntur. Vides itaq; quomodo Archigenes ex thapsiaphar

pharmacum collaudet, neq; enim aliud eo præstantius reperias, Auget autē fidē commoditatis eius consona historia experimenti, quapropter & ego omnia apud Empiricos medicos obseruata hic adscribo.

Quæ Asclepiades in libro de Alopecia scripsit.

Non recentioris nunc mentionē facio Asclepiadæ, qui memorabiles sanè pharmacorū cōpositiones in multis libris conscripsit, sed vetustioris Bithyni videlicet. Hic itaque Asclepiades curādi viā se reperisse gloriatur, per quā multos immediabiles alopecias habentes sanatos dicit. Verū plus ad curationem totā diætā valere quā pharmacata ipsa tradit. De diætā itaque hæc scribit: Abstinendum itaque ab omni vino in totū propter has ipsas causas. Manifestum verò est inde, ipsum antea retulisse causas, quas si quis discere velit ex libri ipsius lectione requirat. Deinde subiungit: Abstinendū etiā à nimia repletionē. Prohibet autem & carniū esum, & casei, & lactis, & leguminum, omniumq; simpliciter quæ etiam exigua copia accepta plurimum nutriunt & inflant. Quin & exercitia plurima fugere iubet, velut etiam assidua balnea, & multas exudationes. Cæterū de pharmacis iuxta seriem dictionis sic scribit.

bit. Est autem primū vnguentum tale: Spu-
 mæ nitrī partes duas, salis ammoniaci partē
 vnam, vsta trita acerrimoq; aceto diluta do-
 nec strigmentorum crassitudinē accipiant,
 præscalptæ leuiter alopeciæ, quo densetur
 & cruentus reddatur, locus moderate illi- * *Vetu-*
 nimus, defricamusq; donec caput ea conci- *stus codi.*
 piat, & pharmacum in altum probè defera- *sic habet*
 tur, atq; ita quiescere vsq; ad crepusculum *deinde se-*
 sinimus, postea ad vesperam idē repetētes, *quenti die*
 similiterq; sequenti ac tertia die, magnam ex *aceto*
 permutationem reperimus. Sistitur enim *perfriētis*
 nome siue vlceratio serpens, & capilli velli- *ad crepu-*
 cati, imò & vi tracti resistunt, & non euel- *sculū vsq;*
 luntur. * Deinde sequēti die præfriētis ace- *quiescere*
 tum cataplasmatism modo imponimus, vsque *sinimus,*
 quo bullæ exurgant, & cutis leuem exulce- *quòd ubi*
 rationem incurrat: post verò pertusis bullis *fecerimus*
 ad biduum aquositatem effluere sinimus *cataplas-*
 quæ ab ipsis vlceribus prodit. Indeque rur- *ma impo-*
 sus eodem vngento vtimur, vlceratis tantū *nimus.*
 locis parcentes eosq; transgredientes, Sa-
 nos verò cōtingētes, eosq; defricātes* vsq; * *In vetu-*
 ad crepusculum quiescere sinimus, quo idē *sto codi.*
 repetentes paulatimq; confricantes] vsque *hæc nō ha-*
 ad septimum aut octauum id facere pergi- *bentur.*
 mus diem: quo sanè tēpore videmus iam ab
 extremis alopeciæ non amplius tenues vt
 ante, & languinosos prodire pilos, sed lon-
 giores

giores & robustiores, consimilesq; postea paulatim etiam in partibus denudatis ex- crescentes, vicissimq; tenues & imbecilles deficientes. Contingitque simile quiddam quale in vlceratis videmus. In vlceribus enim cicatrix ab extremo initium faciens, postremum in medio vlcere desinit ac coit. Ita in alopecia partes pilosis vicinæ primū conualescunt & densæ pilis redduntur, quæ verò in medio sitæ sunt omnium postremo pilos producant. Si itaq; curatio hoc modo processerit, reliquis medicamentis nihil opus habebimus, sed vno hoc per multum tempus semper vtimur: ceditq; benigniter affectio, nisi omnino magna nuditas existat. Medio autē tempore scalpturam per acutum cœlū assiduè facimus. Aliquando etiam cuspide acuti spiculi cute pertusa, per fissuras ipsas sanguinē moderate elicimus. Hæc his verbis præfatus Asclepiades, deinceps de rasura contra quàm alii tradit: neq; enim assiduè sed per interualla affectā partem radere iubet, vbi iam mediocriter densi capilli in ea fuerint exorti: prodeuntes autem iam & adhuc tenues rasura non dignatur. Cæterū post rasuræ factam mentionem, deinceps hæc verba scribit. Quod si verò remoretur capillorum exortus ad subscriptas cōpositiones confugimus. Sunt autem

autem tales: Herinacii terrestres caput aut
corium, vstum tritum ac melle subactū illi-
nito. Aliud, Hippocampus marinus &
nitri parum coexure, adipeq; anserino am-
mixto, loco nitro præparato illine. Aliud,
Thapsiama aqua maceratam illine. Aliud,
* Muscerdas aceto tritas illine. Aliud, * *Græc. ta*
Calami Cyprii folia in olla exurito, dein- *men codi-*
de resina pinus cinerem ipsum excipito, & *habēt mu-*
præscarificatæ alopeciae imposito ac obli- *ris ster-*
gato. Aut corticem siue comam calamorū *cus.*
eodem modo præparato, ampliusque nitri
parem cineris modum ammisceto, & pice
exceptis vtitor. Est autē non mualidū sed
plurimum efficax. Post hæc verò etiā mu-
scarum Asclepiades meminit, iubens quā
plurima ipsarū capita mox vbi captæ sunt,
nudis alopeciae partibus affricari, atque id
maximē vbi alopecia fuerit exulcerata.
Etenim confert, inquit, muscarum sanguis
partibus tūc per pharmaca ex nitro ac aliis
composita exacerbatis, nimirum quum nō
mordeant hæc ipsas tātum, sed bullas etiā
in eis excitent.

Quæ Soranus ad Alopecias conscripsit.

PRæfatū quædam quæ iuxta propriæ
sectæ ductum digessit, meminitq; eo-
rum quæ Asclepiades scripsit: deinde verò
hæc, hæc verborum serie subtextit. Quapro-
pter

pter ubi recens malum est, primum abstinentia proderit, deinde simplex cibus bonus succi, & irrigatio ex oleo dulci calido, & panis in cataplasmate, fomentaque & scalpura, & cucurbita, ac cerata. Vires ite reparentur. Inueterata autem iam affectione assidua rasura, & rubificatio ex sinapi, & frictiones praescriptae, ita ut in sequentibus diebus picem superlinas aut oleum cedrinum. Proderit item rubificatio ex affricu foliorum fici aut caparum, aut linteoli pollici aut indici obuolupti, & post frictionem scarificationes. Quidam vero acus conligantes ita ut cuspides ipsarum in eundem locum porrigantur, per ipsas cutem compungunt. Caeterum post rubificationem per defricationem inductam, postque scarificationem pharmaca conueniunt ex alto euocantia ac transferentia, metasyncritica graecis appellata, tum illita, tum emplastri modo imposita. Eiusmodi autem multa particulatim existunt, Nam & cepae tritum, & raphani cortex, utrumque cum melle impositum valet. Aut spumae nitri partem unam, * rhois partes duas, salis ammoniaci partem unam, vsta & cum acri aceto trita ad strigmentorum crassitudinem redigantur. Scripta sunt & alia multa, inquit, apud Asclepiadem & Heraclidem Tarentinum, Elephantidemque

ac

* Graeci
codi. loco
rhois habent
cera: haec tamen
lectio violatur
melior sic
etiam vetus
interpres
videtur habuisse.

ac Moschionē in libro de ornatu. Ex quibus sanè & ipse ea quæ ex Asclepiade præscripta vidisti excipit, & alia item quædam quorum deinceps mentionem faciam: Adipis vrsini partem * vnam, cineris folio. * *Alias* rum calami vstorum partem vnam, squa- *duas &* mæ stomomatis ferri partem vnam, aceto *fortè me-* & oleo veteri subacta illine. Aliud, Ster *lius.* coris felis aut crocodili drachm. 8. sinapis drachm. 4. ex acri aceto. Aliud, Hordei vsti & muscerdæ par pondus ex acri aceto, Aliud, Nasturtium & muscerdas, veratrum album, piper, æquali mensura ex acerrimo aceto. Aliud, Sinapi & nasturtium aut spondylium vsta trita ex aceto illine. Aliud, Ranarum vstarum drach. 18. pumicis vsti drachm. 12. alii 15. habent. sinapis drachm. 8. nitri drachm. 4. nucum vstarum, drachm. 24. Aliud, Præstat & ceratum ex pipere, pyrethro, calce, & oleo myrteo. Oportet autem & partē affectam præfricare vel per alcyonium vstum, donec morsum persentiscat, vel per herinacii marini vsti cinerem linteolo inuolutum, donec locus rubescat, Alia pharmaca quæ partim mihi, partim præceptoribus meis, partim amicis medicis in vfu fuerunt. Pumice rubificatorio præfricato, præfomentatoq; & thapsiæ succū donec cutis eleuetur

illinito, deindeque fomento adhibito, cerato rosaceo utitur. Aliud, Foliorum ac radicis calami vstorum, pilorum vrsi, adiantum, adipis vrsini, picis liquidæ, pilorum caprarum vstorum, cedriæ, omnium octo par pondus accipe, liquidaque cum aridis committe, & præfrictis adhibe. Aliud, Fici folia cum aceto donec lanugo prodierit affri-

* Aliàs albas quam
lectionem
habuit ve
tus inter-
pres.

ca: deinde verò herbæ quæ Stœbe appellatur succum illine. Aliud, Ranas * paruas vstas pici liquidæ tepidæ insperge, deinde neque prærasis neque præfrictis illine. Aliud, Spumæ nitri, drach. 4. stercoris muris, drach. 2. corticis calami vsti, drach. 2. pice liquida excipito, & splenium formato, idque præraso ac cum nitro præparato loco imposito, & ante biduum vel triduum non auferto. Aliud, Sinapis & stercoris felis æquas vtriusque partes, loco præfricto illinito. Aliud, Scarificato ac sepiæ atramentum illinito, aut * marrubium viridetritum illinito. Aliud, Sphæritidis folia torrefacta cum aceto leuigata imposito. Appellatur autem sphæritis, cupressus quæ sphæria, id est, pilulas producit. Aliud, Nuces amaras vnâ cum putamine vstas, prærasis ex aceto & melle illine. Aliud, Herinaciorum marinorum testas vstas, ex melle & aceto prærasis illine.

* Aliàs
porrum.

Ali

Aliud, Alcyonium vstum & muriũ ster-
cora cum porri succo illine. Aliud, Ra-
dicis thapsiæ, drach. 4. radice chamæleonis,
drach. 2. visco probe subacto excipe & cata-
plasmatis modo impone, quumq; exacerba-
tus æger fuerit adime. Aliud, Foliorũ
calami græci vstorum, drach. 4. muscerdæ,
drach. 2. herinaciorum vstorum, drach. vnā
cum aceto trita illine. Aliud, Salis am-
moniaci, drach. vnā nitri, drach. vnā, vtrũq;
torrefacito, acetoq; rigata ter in die illini-
to, loco prius cū nitro preparato. Aliud,

Amygdalarum amararum tostarũ obo-
los tres, pumicis obolos duos, salis ammo-
niaci, obolos 3. similiter illine ex aceto.

Aliud, Piper, muscerdas, veratrum al-
bum æquali pondere cum aceto * illine. ** In vetu*

Aliud, Squamam stomomatis ferri cum *stis codi.*
aceto & modico oleo illine. Aliud, Lo- *hic addi-*
cum per pumicem proritato, & sulphuris, *tur* &
spumæ nitri ammoniaci singulorum, & quas *oleo.*
partes mixtas cum aceto illinito. Aliud,

Alcyonii drachmam vnā, sulphuris
viui drachmas * 6. muscarum ad aridita- ** Aliàs 2.*
tem torrefactarum cyathum vnum, mu-
scas per se terito itemque sulphur, alcyo-
nium verò aqua coctum vnā cum siccis le-
uigato, felle suillo ac aceto paulatim af-
fusus vsquequo strigmentosum reddatur.

Deinde axungiam à rotis derasam, & manum
emollitam vt emplastri forma confiat mi-
sceto, & prærasa alopecia ac rubificata phar-
macum vt optimum confidenter illinito.

Aliud, Alicam aceto maceratam teri-
to, & pauculo succo cyrenaico adiecto, præ-
fricto loco illinito. Aliud, Loco præ-
fricto ac scarificato caricas assatas cum pas-
so cataplasmatris modo imposito. Aliud,
Passum illinito, ac deinde ferulam vstam
inspergito. Quæ deinceps sequuntur duo
pharmaca admiranda sunt, & verbis eius qui
ea prodidit inscripta ad alopecias, caluicię,
raritatem capillorum ægrè curabilem in

† Græ.co. capite, in mento ac superciliis. Pilorū * vrsi
habet ouis vnc. vnam, radicis calami, vnc. 6. filicis cum
quomodo radice quadrantem ac vnciæ dimidium, ca-
et Aëtius staneorum hispidi corticis quadrantem, la-
et vetus narum succidarum quā pinguissimarum,
interpret sexuncem, capita muscarum nume. 36. mu-
legisse vi- scas 5. capitibus reiectis. Omnia in nouam
detur. ollam indita in furnum mittito, deinde ci-
nerem ipsorum terito. Habeas autem in vi-
no Aminę prius trita ladani vnciam vnam,
myrrhæ, vnci. vnam, adiiciaturque olei ve-
teris sextans, & cedrini vnc. vna malabatri-
ni sextans: deinde inspersis aridis tritis me-
dicamentum reconde, atque vbi linteolo
alopeciam præfricueris, deindeque aut ce-
pa

pa aut scilla vellicaueris, aut fici folio lente exscalpseris, pharmacum ipsum illitu affrica. Insequentibus verò diebus locum rigido ac aspero lintheolo confricato, atque hoc modo illinendo vsque ad menses duos progreditor. Quod si amplius in hac curatione perseveraris, etiam caluiciem ea persanabis. Ad caluescentes præter ætatem remedium, Adipis taurini insolati lib. vnā, adarces vnc. vnam, succi thapsiæ sesquiunciam, alii vnciæ dimidium habent, myrrhæ bonæ vnc. vnam, polytrichi lib. dimidium, callitrichi lib. dimidium, mēbriæ sinini libr. vnam, splenis asinini lib. vnam, ladanum tantundem. Ego ladanum in vino modico maceratum contriui: adipem verò aquæ vapore, liquefeci, deinde asini membrum assatū donec insumatur radito: splenem verò cum callitricho & polytricho in noua olla torrefacito, contusisq; quæ contundi possunt ac cribratis, omnia gleucino aut sabino excipito, & ante balneum vtitor capite prius pectinato. Manifestum verò est quod eadē pharmaca etiam ad menti pilos non enascentes conducunt. Aliud, Fœni græci sextarios. 4. seminis lini sextarios. 2. ladanum bessum, succi acaciæ sexuncem, folii malabathri sexuncem, gallas nume. 20. onychis aromatici sextantem, calami Syriaci

38 DE COMPOSIT. PHARMACO.

sextantem & vnc. dimidium, alii vnc. vnam habent, bdellii sextantem, myrti vsta sextarium vnum, musci, quem alii splachnō, alii bryon aromaticum vocant quadrantem: iridis astragalitidis, alii illyricæ sextantem. Singula per se contundito, ac per cribrum arctius excutito, & deinceps vt præscriptū est misceto. Vsu verò expetente, pharmaci tertiam partem, aut quantum sufficit, in æreum aut testaceum vas conicito, deinde vini Italici odorati tātum vt liquidum reddatur ammisceto, atque ita prunis impositū donec semel ebulliat cum lignea virga agitato, animaduersione habita ne comburatur. Post verò illines ægro in aquā defidere iussu, sensimq; in solio sedēti affricabis, ac pro more capite ex aqua perfuso pharmacum ablues. Deinde autem staphidem syluestrem per se tusam ac cribratam, post quartum vsus diem pharmaco ammiscabis, similiterq; coques, eodemq; modo illines, parcè tamen ac cautè ne in oculos destillet. Vngento autē à balneo vteris, olei myrtei lib. i. cum ladani triente contrita. Constans & certa est pharmaci huius facultas, neque citra effectum dilabitur. Aliud ad eadem, Pericalamitidis vnc. i. myropisso ceri, sordis pilorum barbæ hircinæ vtriusq; vnciæ dimidium, adipis infantis informis
lib

libram vnam, succi foliorum dionysiaci tenerorum, succi foliorum ladonidis tenerorum, succi callicereos, succi herbae verbenacae, succi foliorum calami, singulorum cyathos 3. cynomori, herinaciorum marinorum vstorum, vtriusque sextantem aut amplius si melius reddere pharmacum velis, acanthionis terrestris corium vstum. Hæc omnia ad plures dies in pila plumbea terere oportet, donec omnia probè leuigata vniantur, atque etiam donec à pila quippiam detritum eis accedat. Vtere loco contente ex erudo linteolo ex lino præfrictò, ac deinde cum althææ siue hibisci radice deterfo, illinito. Hoc pharmacum eo modo scriptum reperit Claudianus amicus noster in libello ex membranis contexto, eo qui pharmaco vsus fuerat vita defuncto. Multi autem faciebat eius possessionem, propterea quod duos quosdam caluescere iam incipientes ex eo curatos conspexisset ita vt neque vltèrius caluicies progredieretur, ipsæque denudatus locus pilis densus redderetur. At verò nos hoc ipsum obscurè & coniecturaliter scriptum nacti, singulatim considerabamus quid tandem singulis significaretur, quumque iam hoc, iam aliud mente conciperemus, per magnam experientiam tandem nos veritatem reperturos sperabamus. Ve-

rūm in præsens quidem quod sentimus scribimus, scripturi etiam in posterum si quid experientia cognitum repererimus. In præsens autem pericalamitidem, calami corticem dici putamus. Nam & aliās ipsum eiusmodi affectionibus convenire scimus maximè vltum, nouimus item alios ex eiusmodi pharmaca composuisse, quapropter credibile est quoniam cortex calamo circum adharet pericalamitin ipsum appellari. Potest autem etiam id quod ab aliquibus limnestrum, ab aliis adarce & adarciū dicitur, pericalamitis appellari, propterea quod calamis adnascatur. At verò myropissoceram picem & ceram dici estimamus, vngento quopiam ad huiusmodi affectiones congruenti eliquata, velut est gleucinum & laurinum, nardinum, lentiscinum, sesaminum & cedrinum. Cæterūm barbæ hircinæ sordes statim nobis visæ sunt de ladano dictæ esse: nam ad has affectiones convenire in confesso est. Et sanè generatio eius circa mentum hircorum in quibusdam locis contingit, quod ipsum & Rufus Ephesius per hos versus indicat:

*Inuenias in Eremborum quoque ladanon orbe
Caprarum circa mentum, gratissimus illis
Succus is è cisthi folio decerptus amico.
Imbuti hoc villi menti laterumq; madescunt,*

Non

Non tamen ad morbos hoc præstat, laudem ab
odore

Egregio quo spirat habet, quòd plurima mixta
Pharmaca Erempi habeant diuinis viribus au-
cta,

Orta solo & campo longè lateq; patienti.

An quidem igitur hoc solum ladanum
is qui pharmacum composuit iniicere iu-
bet non satis manifestum est: possibile est
autem per vnã speciem totum genus ab
eo designari. Porro infantem informem vi-
detur mihi vrsam dixisse, Vrsam enim pa-
rere aiunt informem quandam velut car-
nis molem, verum post per linctum ma-
tris animal formari ac effigiari. Dionysia-
cum autẽ vitem mihi dicere videtur, quan-
quam & de hedera dici posse aliquis opi-
nari queat. At verò quod ladanidem lau-
rum appellet nemini puto dubium esse.
Calliceros autem fœnum græcum appel-
lare videtur: nominatur autem hæc planta
apud nos in Asia Aegoceros. Cynomo-

rum deinde rubum canis verisimile

est dici. Acanthiona autem po-

stremum terrestrem, he-

rinacium terrestrem

appellatum ab

eo existi-

mo.

C 5

De defluuio capillorum.

CAPVT II.



Et & alia pilorum affectio quæ ad raritatem cutis, inopiamque substantiæ pilos generantis con-
sequitur. Quapropter etiam eu-
ratio hoc modo laserum, non eundem sco-
pum quem alopecie habet: in alopecie e-
nim vt vitiatum humor consumatur, in-
tentionem summam ac primarium scopum
habemus. In his verò vt capitis habitum
roboremus, & boni succi allationem pro-
curemus, cutemque ad densitatem ac rari-
tatem moderatam reuocemus. Quam ob
rem sanè ad pharmaca humectantia aliquid
moderatè adstringens ammiscere oportet,
quale est ladanum, quod vtraque in se mo-
deratè complectitur quæ ad hoc sympto-
ma conueniunt, caliditatem videlicet me-
diocrem, & adstringendi vim iuxta eandem
proportionem, propter hoc itaque oleo mi-
xtum quo illi possit, symptoma, siue acces-
sionem defluuii capillorum sistit. At verò ma-
nifestum est capitis frictionem necessariò
huius pharmaci vsui præmitti, & multitudi-
nis pilorum refectionem, aut si anni tēpus id
feri permittit perfectā ablationē. Ita enim
in affricu & illitu robusta & calida redde-
tur cutis, & moderatum densitatē acquirat,
eam

eam videlicet quæ secundum naturam est. Consuevit autem hæc circa pilos oblæsiō sæpe his qui ægrotarunt accidere. Rarò autem citra morbum, & magis sanè diæta salubri & vires reficiente opus habet. Multique citra medicamentum perfectè sanati sunt, atque id breui. Composuerunt tamen medici eius gratia pharmaca moderatam densitatem cuti inducentia, ita tamen vt ne simul eam refrigerent: quæ enim vehementer adstringunt, omnia etiam refrigerant, & alimenti influxum reprimunt, propter cuius inopiam capilli defluunt. Intentio itaque medicamentorum est sanguinem affluentem non solum non præpedire, sed etiam prolektare, cogere autem sensim & adstringere rarefactam cutem. Tale autem sponte naturæ est ipsum ladanum, quod quia ceræ similem compagem habet, largo aliquo conuenienti liquore indiget, quo capiti illini possit. Præstat igitur huiusmodi liquorem similem ladano esse, hoc est, ex contrariis facultatibus mixtum, adtractoria nimirum & coactoria. Nequaquam ergo oleum Sabinum aut vetus aut Cicinum ad hanc rem aptum fuerit, sed in Hiberia aut Hispania, aut quomodocūque tandem appellare velis, natum. Habet enim & adstrictorium quippiam, atque amplius
ad

adhuc eo lentiscinum, sponte naturæ tale
 existens, quale est ipsum ladanum. Quare
 neque expertus sum, neque mente concipe-
 re possum, vllum præstantius pharmacum
 fore ad defluos capillos, quàm est quod ex
 ladano & lentiscino oleo permixtum con-
 stat. Manifestum autem est quod raso qui-
 dem cuipia, crassius admouere medicamen-
 tum oportet: ad ipsam vero cutem præse-
 ctos & attonsos habētibus pilos, liquidius.
 Quod enim comam alere non oporteat
 priusquam quis curetur, euidēs puto. Quod
 si verò large defluant capilli, & coniectare
 possis multam raritatē cutis capitis factam,
 non ineptū fuerit in præsens myrteū oleum
 pro lentiscino ad ladanum ammiscere. Li-
 cebit etiam aliquādo vngentum nardinum
 adhibere in ætate frigida, & tempore hye-
 mali. Bonum autem pharmacum ad omnia
 est diuitum fœminarum vngentum, quod
 Romæ vocāt foliatum. Non minus autem
 eo commodum est, imò magis quod appel-
 lant Spicatum, Quare cum his vel solis di-
 uites vngi iubeto, & cum optimo nardino.
 Ladanum verò in duplo vase liquefacito,
 & liquefacto vnà cum nardino ex prædictis
 pretiosis vngentis quodcunque ad manum
 fuerit ammisceto. Atque hæc quidem me-
 dicamenta mihi suffecerunt vnà cum refe-
 ctor

storia ac salubri diata, quæ in plerisque
etiam sola suffecit. Composuerunt autem,
ut dixi, quidam ex prioribus medicis phar-
maca ad defluos capillos, in quorū relatio-
ne vbi inuicē dissentiant exponāt. Primum
autem referam cōpositiones ab Hera scri-
ptas, quarum priorem quidem laudo, poste-
riore verò curiosam & præter rem auctam
existimo. De priore verò ita scribit.

*Compositiones pharmacorum ad defluos
capillos ab Hera scriptæ.*

Heras in ferula duo subscripta phar-
maca habet, iuxta hanc ipsam dictio-
nis ipsius seriem, ad hoc vteapilli in capite
ne defluant: Ladanum in vino austero ri-
gatum terito, & oleo myrteo ac vino vi-
cissim affuso ad mellis crassitudinem redi-
gito, ex eoque ante & post balneum, caput
allinito. Præstat autē & polytrichon quod
quidam Adiantum vocant, dimidia ladani
portione adicere, & cum myrteo aut nar-
dino vti. Hæc de priore compositione lo-
quutus Heras, deinceps hæc scribit. Com-
positio olei ad defluos capillos, quæ & ni-
gros eos facit. Intra calendas & Idus Iu-
lias, nuces virides centum tundito, eisque
olei *primarii sextariū, id est affundito, & * Aliàs
aluminis liquidi libras 3. Hæc simul in vas olei boni
nouum testaceum præmadefactum indito, ꝛnc. i. s.
idip

idipsumque quàm diligentissime oblitum, in loco neque humecto nimium, neque calido reposito, & per menses tres sub terra situm finito, deinde auferto oleoq; utitor. Hæc ipsa secundi pharmaci est descriptio, quæ plus quàm cõuenit ipsum pharmacum adstringens reddit. Quapropter ut vehementem adstringendi vim ipsius corrigeret is qui primus hoc pharmacum composuit, defodere ac velut putrefacere ipsum iussit, inde nimirum magis tenuium partium reddere in eo commixta conatus. At verò tale pharmacum in tempore, regioneque ac natura corporis calidis commodum fuerit, adeò ut in cõtrariis non tutum sit tali uti, Etenim perfrigeratas eius usu mulieres vidi, ut inde in grauedinẽ ac raucedinem defluxumque à capite ad fauces delaberentur.

Quæ Archigenes ad defluos capillos conscripsit.

ARchigenes in primo libro pharmacorum secũdum genus ad defluos capillos in hæc verba scripsit: Ladani & absinthii æquales partes, & iuniperi baccas rotritas, in linteolum illigato, & in oleo per dies 5. macerato, ex eoque caput illinito, & neque capilli defluent, neque furfures habebunt. Aut dum capillospectis, adiantum
cum

cum myrteo aut rosaceo oleo adhibeto. Aut adianti, myrti nigræ æquales partes, gallæ duplum, cum oleo veteri, aut lentiscino, aut myrteo, ad mellis crassitudinem redige ac vtere. Aut thus & misy, & gal- lam, & adiantum, æquis partibus cum vino maris experte ad mellis spissitudinē in sole terendo redige. Aut molliter cocta donec nigrescant, deindeque cum oleo veteri, aut lentiscino, aut myrteo mixta in vsum adhi- be. Aut brassicam aridam tufam cum aqua impone. Aut loti radicem eodem modo.

Quæ Cleopatra in libro de ornatu scripsit.

QUÆ à Cleopatra in libro de ornatu scripta sunt, illius ipsius verbis sic habet: Ad capillorum in capite generationem, calamorum tenerorum radices rufas exuccato, muscasque in* ollula torrefactas succo admisceto, & adipem vrsinum ac oleum cedrinum in vinum trita ac vnita, iisdem addito, & ad illinendum exhibeto, Quo verò odorem obtundas vinum aut passum affundito. Aliud, Non longè post præcedens his verbis conscriptū: Quo capilli enascantur lini semē siccum vnà cum calamo suo exurito, tritumque cum oleo sesamino illinito. Aliud paulò inferius scriptum hoc modo: Ad defluos capillos ter- ram cimoliam solidissimam vino austero &

* Pulicem
la.

& mororum succo, tanto quantum combi-
bere potest, rigato, eiq; hyoscyami tenuis-
simè triti acetabulum adiicito, indeq; pa-
stillos formato quos in vmbra ficcatos in
vas figulinum nouum reponito. Vsu verò
postulante aqua dissolutos illinere iubeto,
Deinde quum exaruerint per dies quinque
eluito, rursumq; illinito. Facit item ad fa-
ciei & colli impetigines. Aliud, Capil-
los augens cito, densansq; ac denigrans.
* Aliàs cū Ladanum * cum oleo & vino dulci leuiga-
melle vel. tum ac crasse factum præfrictis illinito. Nō
longe quoque postea aliud pharmacū scri-
ptum est his verbis. Ad defluuium capillo-
rum citra morbum accidens. Brassicam arī-
dam tritam ex aqua impone, aut loti radi-
cem eodem modo.

*Quomodo comptoria ab exornatoria
medicinæ parte differat.*

Comptoriæ quidem scopus est, vt pul-
chritudinem acquisititiā inducat,
Exornatorię verò medicinę partis, vt quic-
quid secūdam naturam est id omne in cor-
pore custodiat, ad quod consequitur etiam
naturalis pulchritudo. Indecoro enim aspe-
ctus est caput alopecia vitiatum, velut etiam
oculi pilis palpebrarū denudati, similiterq;
superciliorum capillorum defluuium. Non
solum vero ad pulchritudinem, sed multo
prius

prius ad ipsam partium sanitatem capilli ipsi conducunt, quemadmodum in libris de vsu partium est demonstratum. Quid attinet autem dicere de lichenis, aut p̄lora, aut lepra? quum pr̄ter naturam talia existant. At verò faciei colorem per pharmaca nitidiorē aut rubicundiorē facere, aut pilos capitis crispōs, aut fuluos, aut nigros, aut quemadmodum mulieres solent, in longitudinem auctos, h̄c ipsa & quæ huiusmodi sunt comptoriæ maliciæ existunt, non medicæ artis opera, Verūm propter societatem quandam quam cum illis habent, quandoque ad regiarum fœminarū, atque adeò ipsorum Regum imperium, etiam comptoria adiungimus, vtpote quum his negare non liceat, docendo tamen cōptoriam ab exornatoria medicinæ parte differre. Quapropter visum est mihi ea quæ Crito scripsit pharmaca capillos conseruantia, eosdemq; augentia, ex primo illius de ornatu libro subscribere.

*Quæ Crito ad conseruandos ac augendos
capillos scripsit, itemq; quæ à deflu-
uio ipsos præseruent.*

IN primo libro Exornatoriorum statim in principio post præfationem Crito h̄c verba scripsit. Ad conseruandos itaque capillos subscriptis compositionibus vten-

d

30 DE COMPOSIT. PHARMACOS.

dum est. Heraclidæ Tarentini conseruatua capillorum. Freinii florem cum oleo tritum illine, idem etiã eos denigrat. Aliud,

Ladanũ vino austero maceratũ ac tritũ oleo myrteo excipe, eoq; pilos ante balneũ subline. Aliud, Verbenacã rectam appellatam vnã cum radicibus arefactam cõtundito & per angustissimũ cribrũ concernito, deinde oleo ammixto vt strigmenti crassitudinem accipiat, in vas æreum reponito, atq; vbi cõputruerit, pro oleo similiter vtitor. Aliud, Ladani partes duas, polytrichi quod quidam Adiantum appellant, partẽ vnã, vino & oleo myrteo excipe ac vtere, Nos autẽ pro myrteo nardino vsi sumus. Aliud, Quod ipsum & subnigros reddit: Baccarum myrti nigrarũ quadrantem, ladani tantundem, dissoluta cum acaciæ fructus, hoc est, siliquarũ ipsius spinæ appellatarum, decocto contere: atque vbi limi crassiciem acceperint, nardino, aut myrteo, aut aliquo alio hedyfmate excipe.

Aliud; Vngentũ cõseruans pilos, quod ipsum etiam subnigros reddit. Baccarum myrti nigrarum sextarium vnum, seminis apii sextarium vnum, seminis betæ sextarium vnum, virgultorum myrti sextarium vnũ, adianti sextarii dimidiũ, ladani tantundem, vini nigri sextarios sex, vsquequo penitus,

nitus dissoluantur coquito, atque vbi tertia
pars superfuerit, olei cuiusdā aut hedyisma-
tis sextarios 2. aut 3. addito, rursūq; co-
quito. Vbi verò bis aut ter ebullierit, li-
quorem exprimito ac diligēter per saccum
excolatum in hydriam recōdito. Vfu vero
expetente* in præfasis penitus vritor, illitis
ex eo bis per diem capillis. Aliud, Passi
cretici sextariū vnum, ladani vnc. 1. corticis
nucum pinearū vsti sextantem, polytrichi
vsti vnc. 1. adipis vrsini libram vnam, succi
betæ cyathos 3. Ladanum & passum donec
cogantur in vnam cōpagem coquito, de-
inde reliqua iniicito, & sublata in vas plum-
beum seruato vsus autē tempore quantum
sufficit in quocūq; velis hedysmate diluito.
Vfus eius debet esse quotidianus, quidam
verò raso capiti pharmacū illeuerunt nullo
hedysmate dilutū. Aliud, Ladani vnc. 1.
passi sextariū vnū, corticis nucū pinearum
vsti drach. 2. alii sesquidrachmam habent,
*spongiā marinā vstā tritā vnam, pan-
niculi Cilicii vsti triti cyathos 3. polytrichi
vsti triti cyath. 2. adipis vrsini lib. 1. coquito
& apparato vt dictum est. Aliud quod
pilos conseruat, & defluentibus quoque au-
xiliatur, Seminis apii sextantem, *calli-
trichi sextantem, thuris sextantem, nuces
iuglandes numero 15. ladani sextantem, sextantē.

* Aliās eo
omnino co-
moto. quā
lectionem
habuit ve-
tus inter-
pres græcē
verò xi-
vāp sic
etiam ha-
betur in
Aëtio.

* Græcus
cod. habet
spherā ma-
rinā ve-
tus inter-
pres spu-
mā inter-
pretatur.


* Vetu-
stus cod.
græ. hic
addit he-
tae seminis

corticis nucis pineæ lib. i. Omnia in nouam ollam coniecta, & cum argilla probè obtrata, in balnei fornace assato, deinde extracta terito, & adiecta adipis vrsini libra vna subigito, & in pyxide ilicea reponito. Vsu verò expetente quantum satis videbitur ex pharmaco accipito, ac quocunque velis hedyismate conquassato, ex eoq; caput bis in die illinito. Quidam verò capite raso pharmacum illinunt cum solo adipe vrsino subactum. Aliud ad caluiciem quo vsus est Andromachus iunior, Leporum ventres sex accipito, probeq; siccatos in testaceo vase torrefacito, ad eosq; baccarum myrti quadrantem & virgultorum eiusdem tantundem coniicito, indeq; adianti quadran-

* Ex re- tem addito, * omniaq; simul attente torretusto codi. facta tundito, ac per angustū cribellum ex-
hæc sunt cernito, deinde adipis vrsi ac phocæ æquis
huic loco partibus adiectis subigito, ac emollito, sub-
addenda latumq; pharmacū in pyxidem plumbeam
acaciæ suc recōdito. At vero vbi vsus tempus instite-
ci tantun rit, quocunq; velis hedyismate ipsum dilui-
dem fru- to, ac vtitor. Atq; de his quidem hætenus.

Et uñ rubi
canis tan-
tundem.

De tincturis capillorum. C A P. III.



Vum verò post præscripta phar-
maca Crito alia quædam scribat,
quæ quidem cōseruationē capil-
lorū promittūt, verūm primū
ipso

ipforum opus est vt tingant ipsos, quo siue nigri, siue flauī reddantur, visum sanè est mihi in principio ea relinquere, quū omnia talia manifestè comptorii generis existant. Quandoquidem haud scio quomodo dogma commune inoluerit, vt vetulæ feminae capitis capillos denigrent, tanquā turpe sit canos habere. Atq; hoc ipsum etiā maritis probatur, qui onerosum esse aiūt, spectaculum aniculae vxorē cano capite habere. Quæcunque quidē præ deliciis seipsas ornant, harum nulli tale quippiā à me petenti exhibui, Quæcunq; verò honesti respectu, quo notæ culpam effugerent, & importunitatē maritorū vitarēt, capillos suos nigros reddere cupierunt, ne tamen ex adstrictoria vi nigrorem inducentium obladerētur, illis consului cedriæ vsum, ita vt tribus aut quatuor horis ante balneum illinerent, & postea detergerent, idque per quatuor aut quinque dies facere pergerēt. Ad hoc enim quod nihil lædit, amplius etiam commodum est eis quæ facilè à frigore offenduntur, Nimirum pharmacum existēs cedria quod abunde calefactet. Oportet autem ipsam citra olei ammixtionem adhibere capitibus vehementi resiccatione & calefactione indigentibus, quibus scilicet humida & frigida intemperies per se inest. Aliis verò

oleo mixtum adhibere pharmacū oportet. Quin & defluentes capillos corrigit, & nō defluētes auctiores reddit. Cæterū odorem eius vitant delicatæ mulierculæ, qui sanē non iniucundus est his quæ in eius usu aliquādiu perseverarūt. Porro in Asia apud nos agrestes mulierculæ montana incolentes, nō cedria solū illinuntur oleo permixta, tum capiti, tum reliquo vniuerso corpori, Sed & picē liquidam cum oleo eodem modo permixtam, ad radices capillorū capitis illinunt, vocantq; hoc cōpositū pharmacum pisselæon, hoc est, oleum picatum, quod omnino aliud est ab eo quod pissanthos, hoc est, flos picis appellatur, quod ipsum liquidæ pici incumbit & superstat, tenuium magis partium quā ipsa pix existens, tum compage, tum etiam facultate. Huiusmodi itaque pharmaca tarde canescere faciunt, nulla vtentium oblæfione. At verò quæ ex austeris & acerbis composita sunt, magnopere lædunt. Cæterū materiam ex qua cōfiunt hæc, adstringentis qualitatis ac facultatis existentem, etiam quippiam tenuium partium habere oportet, quod non in superficie tantum, sed & in profundo cutem permutent, vsque ad locum radicū capillorum progrediendo. Atque hæc quidem est Methodus componendi
ea:

ea: habes autem in simplicium pharmacorū tractatu particulatim materias ipsorum, in quibus facultates & qualitates earum dictæ sunt, quapropter ex illis tum ea quæ iam à prioribus composita sunt iudicare ac quali nam vi prædita sint inuenire potes, tum etiam per te ipsum de integro noua componere. Vtile autem hoc est & ad cognitionem affectionum quas iam incurrent aliquæ mulieres, & ad futurarum prænotionem, præsentiumque sanationem. Nō solum enim in periculo versatas saepe scio fœminas, sed & mortuas, ex perfrigeratione capitis per huiusmodi pharmaca induta, læsio autem eis maxime accidit, aliquando quidem in stuporem attonitū, aut comitiales, aut veternum, aut soporē profundiores, aut animi apprehensionē, Catalepsi in Græcis appellatam, de labentibus: aliquando verò destillationibus indissolubilibus apprehenduntur, vt inde etiam pulmo afficiatur, & tabes ex eis consequatur. Offenduntur autem citius quæ frigidius temperamentum capitis habent, tardius verò quæ calidius. Frigidæ enim particulae frigidis affectionibus, calidæ calidis facilius corripuntur. Atqui periculū minus subeunt, vt pote quā à minore causa lædantur, quæ frigidius tēperamentū habet:

At verò calidæ propterea quod ægrè & vix tandem à frigidis causis lædi possunt. quum sanè à magnis causis fuerint exuperatæ, maiorem læsionem incurrunt, quæ communi & vniuersali rationi subiacet, in Aphorismis ab Hippocrate relatæ, In morbis minus periculum subeunt ægrotantes, quibus congruus naturæ, ætati, habitui, ac tempori adfuerit morbus, quàm quibus nihil secundum hæc ipsa congruerit.

De pharmacis capillos denigrantibus. Archigenis.

PAULò antè dixi quòd non ex mea sententia medicus eiusmodi pharmaca cōtrectat, Verùm quum regiæ aliquando fœminæ, quibus minime negare licet nigros aut flauos capillos reddere expetant, eā sanè ob rem etiam Archigenem puto, quam honestissimū virum, de illis scripsisse in hæc ferè verba. Denigrant capillos hæc. Radicem capparis tritā cū muliebri lacte, aut vtraliis placet asinino, ad tertias coquito, & ad noctem pro cataplasmate imponito. Aut vrina canis in quinq; aut sex dies adseruata lauato. Aut corticē radicis* ilicis donec mollis fiat coquito, cumque cataplasmatismodo imponito, cum aqua verò decocti lauato. Aut quod in fremio intrinsecus nigrum est, cum oleo myrteo tritum

* ἰσίδριον
ῥηγ. Αἰτίῃ
habet hoc
loco. i. ra-
dicis capri
fici.

tum affricato. Aut spumam argenti, cimo-
 liam, alumen liquidum, pari mensura prælo-
 tis & siccatis capillis in noctem illinito, &
 betæ foliis superne obligato. Aut selinusiam
 terrā, argenti spumā, calcem viuā, cum aqua
 ad mellis crassitudinem redige, & capillo
 ex lixiuio liquido præloto illinito, simili-
 terque betæ foliis impositis obligato. Ma-
 ne verò distentos pilos defricato. Aut ab-
 sinthii, ofsium palmarum syriacarum, faba-
 rum ægyptiarum, onanium vstorum cinerē
 pari mensura cū vino Mendefio ad strigmē
 ti crassitudinē redigito, & cerato myrteo
 liquido ammixto affricato. Aut corticis
 salicis succum cum oleo affricato, Summē
 denigrat. Aut nodos ad racemorum simi-
 litudinem ex arbore nuce enatos coquito,
 & bitumine liquido ammixto vtitor. Post
 prædicta etiam hæc Archigenes adscripsit,
 Denigrant barbam, Suber aridū, & plum-
 bum vstum cum betæ crudæ succo mellis
 spissitudine illita finito vsq; ad prandium,
 deinde abluito. Aut ferri recrementum ac
 plumbū in aceto cocta ad tertias, illine ci-
 tra oleum. Post hæc Archigenes ex com-
 ptoria damnata arte accepta hæc scripsit.
 Fuluos autem reddunt capillos lupini crudi * Et fla-
 cum aqua & nitro illiti. Flauos ac crispas uos addis
 pilos reddentia. Crispas* autem reddes vet. codi.

capillos si spuma salis cum myrrha confri-
caueris. Aut succo carpasi illine, & mane-
bunt crispī ac nigri. Aut myrti baccis ac be-
tæ semine æquali pondere cum oleo tritis
vtitor. Aut asphodeli radicem cum mero
illine. Aut lupinorum cortices ac parum
nitri in aqua ad quatrīdium macerato ac
vtitor. Horum pharmacorum mentionem
ob id feci vt ostenderem necessariò quosdā
etiam honestissimos viros taliū sibi com-
pteriorum experientiam parare. Quando
enim Archigenes hæc scribere nō est veri-
tus, multo amplior venia Critoni dāda est,
qui in Imperatoriis ædibus est medicatus.
Apparet autem & Heraclidem Tarētinum
multa & probata pharmaca comptoriæ
speculationis scripsisse, quanquā nondū
tantæ deliciæ fœminas occupant, quantæ
nunc sunt. Verū quæ Heraclides, & Cleo-
patra, & quicūque alii post ipsos interiecto
tempore medici scripserunt, ea omnia Cri-
to coaceruauit, ad quem tanē remitto eos
qui quomodo capilli nigrescant aut flauē-
scant, & alia huiusmodi, discere volūt. Scri-
psit enim quatuor de ornatu libros qui in
omnium manibus versantur. Quid igitur
ego nunc ipsa frustra transcriberem? quum
possint ex illo discere qui adeò ea cognosce-
re velint. In primo quidē libro omnia quæ
ad

ad capillos pertinent statim in principio scripta sunt, reliqua verò deinceps iuxta proprium quodque ordinem. Quo itaque facile inuenire queant singula talium pharmacorum absq; longa inuestigatione, visum mihi est capita singulorum librorum indicare. In primo itaque libro capita hæc sunt. **PRIMI** libri Critonis de ornatu Capita. Conseruantia capillos. Augentia capillos. Præseruantia capillos. Tincturæ canorum. Tincturæ flauos & auricolores capillos reddentes. Smegmata capillorum. Illitiones præseruantes. Faciem erugantia. Illitiones faciem nitidam reddentes. Cataplasmata faciē nitidam reddentia. Superciliorum illitiones. Supercilia denigrantia. Oculorum illitiones. Illitiones ex stibio. Ad graueolētiam nariū. Dentifricia. Manducationes. Ad foetorem sub aliis affricationes. Manducationes ad foetorē oris. **SECUNDI** libri capita. Quæ nigredines colli repurgent. Illitiones ad exudationes sub alis. Illitiones mamillas conseruantes. Ventrē purgantia. Smegmata manus nitidas reddētia. Ad nigredines à partu. Ad rugas à partu. Ad fissuras à partu. Illitiones ad eminētes vmbillicos. Quæ pueros impuberes cōseruāt. Quæ virgini

ginitatem conseruant. Ad humectas & frigidas mulierculas. Ad cicatrices nigras. Psilothra capillorum. Smegmata attenuantia pilos omnis generis. Illitiones capillos disperdentes. Smegmata totius corporis. Repurgatoria nitorē inducentia omnigena. Conspersiones aromaticæ vestium. Odorata tincturæ vestiū. Aspersiones thalamorum & ambulacrorum. Suffimentorum omnigenorum cōpositiones. Illitionum & vngentorū omnis generis compositiones, videlicet amygdalini, balanini, nucum, sesamini, myrtei, lentiscini, laurini, rosacei, gleucini, melini, œnanthini, sampsuchini, telini, susini quod aliqui crinum, hoc est, liliaceum appellāt, cicini, irini, narcissini, phœnicini, cyprini, crocini, nardini, amaracini, hedychroi, mendeii, malabathrini. TERTII libri Critonis capita. Ad furfures omnigenos. Ad capitis eruptiones. Ad achoras, hoc est, vlcera manantia. Ad pediculos & lendes. Ad alopecias. Ad scabiosas faciei affectiones. Ad lētigines. Ad maculas à sole prouocatas. Lotiones faciei. Ad stigmata. Ad liuentia. Ad sugillata. Ad varos. Ad pustulas nocte erumpētes. Ad menti tubercula. Ad menti lichenes, lichenorum illitiones. Epithemata ex-

coria


coriatoria. Emplastra viridia quæ ab ex-
 coriatione imponuntur. Emplastra alba
 ad cicatricem inducendam. Pharmaca
 emollientia quæ lichenis affricantur.

Q V A R T I libri capita. Ad alphos,
 id est, vitiligines nigras & albas. Ad
 cicatrices nigras. Ad leucas, hoc est,
 vitiligines altius insidentes. Ad lepras.
 Ad vngues scabiosos. Ad pruriginosas
 affectiones. Ad tubercula parua psidra-
 cas græcis appellata & ad excoriata. Ad
 serpiginosas affectiones. Ad scabies.
 Ad thymos verrucæ genus. Ad verru-
 cas. Ad formicarias verrucas. Ad umbi-
 lici inflationem. Ad intestinorum dela-
 psionem. Ad hydrocelas. Ad apellas.
 Ad procidentes anos. Ad chimethla hye-
 mis tēpore oborta vlcera. Ad rimas pe-
 dum. In his quatuor libris Crito diligē-
 tissimè omnia fermè exornatoria pharma-
 ca scripsit, appositis etiam comptoriis quæ
 spuriam pulchritudinem non veram indu-
 cunt, quapropter etiam ego ea relinquam.
 Solumque mentionem eorum faciam quæ
 pulchritudinem secundum naturam con-
 seruant. Quanquam enim vel maximè co-
 gnita habeam smegmata corpori nitorem
 inducentia, itemque quæ in virginibus ma-
 millas conseruant, & quæ impuberū puero-
 rum

62 DE COMPOSIT. PHARMACORUM
rum testiculos ad multum tempus paruos
conseruant, similiter & quæ pilorum exor-
tum cohibent, verecundor tamen eiusmodi
scribere, atque multo magis eas quas Crito
tradidit cōspersiones vestium aromaticas,
odoratasque vestium infectiones, & asper-
siones thalamorum ac ambulacrorum. Suf-
fimētorum item omnis generis varietates,
illitionumque & vngentorum. Extra enim
medicinæ documenta talia existunt. At ve-
rò vbi decoris secundum naturam conserua-
tiua scripsit, si quādo locus ita tulerit ea re-
feram, ac primū quidem quæ circa capillos
medicis vtilia mihi videntur, docebo.

De pharmacis pilos corrumpentibus.

CAPVT IIII.



Vemadmodū ex pharmacis quæ
pilos augment, alia medici vsus,
alia comptorii existunt, Eodem
modo & quæ ipsos corrumpunt.
Aliquando enim & his medici necessariò
vtuntur iuxta triplicem eorum differentiā,
Nempe quum quædā ex eis propriè psilo-
thra appellantur, Alia Attenuatoria capil-
lorum, alia verò ipsos penitus extirpantia.
Hæc itaque postremo loco nominata peri-
culosi sunt vsus. Ex eis enim illitæ corporis
par

partes, non solum in posterũ depiles omnes penitus redduntur, sed & vsque ad caput, & mentum, superciliaque & palpebrarum pilos nuditas ipsa procedit. Reliquæ verò duæ differentiaẽ usum minimè periculosum habent. Et quæ quidem pilorum denudatoria sunt, & propriè, vt dixi, pilothra vocantur, tantum non quotidie in omnium muliercularum, fermè etiam quorundam virorum, usu habentur. Altera verò quæ tenuiores pilos reddũt & minores, eis conueniunt qui duros & magnos, multosque & crassos pilos habent, & ob id suillis non absimiles existunt. Cæterũ hæc ipsa secundum excessum & defectum inter se differũt, quum vnum genus sit pharmacorũ quod in hunc usum compositum est, nimirum eorum quæ erodentem, & vstoria habent facultatem: præstant autem erodentem facultatem habentia, quod minori periculo admoventur: periculosiora autem quodammodo sunt vstoria, quæ si quis paulo negligentius adhibeat, bullas excitant, & exulcerant, & aliquantulum cutem exurunt. At verò particularem eorũ syluam omnem in cõmentariis de simpliciu pharmacorũ facultate tradidi, Sed tamẽ exempli gratia ea quibus assidue vtor recẽsebo. Ex liquidis igitur est lixiuiũ tali vi præditũ, Ex aridis autẽ & metallicis
arse

arsenicum & sandaracha, & calx non extincta, quam plerique viam, Græci verò etiā solius asuesti nomine appellant. Manifestū itaque est vehementem ipsorum vim per admistionem imbecilliorum pharmacorum tum liquidorum tum aridorum frāgi, quorum congruentem mixturæ modum conjecturaliter primū faciet virium eorum expertus. Deinde verò per experientiam defectum corriget, aut etiam addet. Quo verò etiam eorum quæ per experientiam iudicata sunt notitiam habeatis, adscribam ea quæ in primo libro de ornatu à Critone sunt relata, vbi prius ostendero etiam medicis sapiuscule ipsorum vsum necessarium esse. Quemadmodum tincturas expetentibus, honestè negare possumus, vt quæ cōptoriæ sint malicie, Sic depilatoria negare minimè licet. Si enim moderatos quispiā habeat capillos, non subseruiemus ipsi ad superfluas delicias. Si verò multos & longos durosque habeat, honestum esse videtur & rationabile ipsos pauciores, & tenuiores, mollioresque ac rariores facere. Contingit autem aliquando necessitas, vt eis qui multos & alte nixos, non tamē duros habēt, in totum pilos tollamus, quando aut picatione opus habet totum corpus (quādoque enim hoc præsidio iuxta medicinæ rationem

nem vtimur) aut quando pharmacum Em-
plaston, hoc est quod meatus obducatur, im-
ponere velimus: tunc enim necessario à par-
te pilos prius tollimus, quod quidem per
nouaculam facere licet. Quidam verò siue
reuera siue fictè nouacula timorem confi-
tentur, quoniam periculum sit ex ea cutem
fauciari, Quidam autē nō citra rationē for-
tasse metunt, maximè quum partes guttu-
ris radi oportet, Quapropter necessariū est
medicum etiam huiusmodi pharmacorum
experientiam habere, tum quod ad compo-
sitionem, tum quod ad vsum attinet.

*Psilothra à Critone hac verborum
serie conscripta.*

P Silothra capillorum, auripigmenti auri-
coloris scrupulos. * 7. aut 10. calcis vi * *Aliàs:*
ua tantundem, amyli sextantem, terræ quæ *uncias*
Romanis Selinusia appellatur * vnci. vnā. *duas.*
Omnia trita & per angustiss. cribrum ex- * *Aliàs:*
cussa reponito. Vfus verò tempore ex phar *uncias*
maco quod sufficit acceptum aqua conquis *duas.*
fatto, deinde illinire iubeto ac animaduer-
tere ne exurat. Aliud, Euestigio leuē
reddit: Calcis viua partes 2. auripigmenti
partē 1. hæc in mortarium plumbeū conie-
cta, aqua aut ptisanæ succo affuso terito, at-
que vbi nigra reddentur, calefacta illini ma-
ximè in balneo iubeto, leue enim corpus

e

reddunt. Quod si verò tenuis capillus ena-
 * *novi ap.* scens subeat, * calcem coquito, & auripi-
 id est li- gmentum cum aqua terito, & in vas fictile
 xiiii ha- non picatū coniecta coquito, atque vbi co-
 bet græc. acta fuerint, nigraq; reddita illinito. Pa-
 cod. ridis saltatoris psilothrū, Statim pilos au-
 fert: Sādarachē vnc. * i. calcis viux sextar. i.

* Aliās Trita cum aqua diligenter coquito, atque
 duas. vbi ebullire cœperint ablatis vtitor. Expe-
 rimentū huius facies, si pinulā in ipsum psi-
 lothrū immergas, breui enim glabra fiet.

Aliud, Amyli vnc. i. calcis viux vnc. i.
 auripigmēti vnc. i. cōtusa & cribrata repo-
 ne, vtereq; vt dictū est. Heraclidæ Tarē-
 tini psilothrū, Euestigio pilos tollit: Cal-
 cis viux sextar. i. cimoliæ sextar. i. pumicis
 vsti sext. i. auripigmēti ptes 4. trita ac leui-
 gata reponito. Vsus verò tēpore aqua dilu-
 tis, vt dictum est vtitor. Hæc quidē igitur
 Crito scripsit. Cæterū eorū vsus melior est
 quēadmodū nūc mulieres vtūtur, post cor-
 poris videlicet illitionem in tepidam balnei
 domū ingrediētes, atq; vbi exudare cœpe-
 rint, strigili pharmacū ex aliqua corpis par-
 te detrahētes, deinde quū simul auferri pi-
 los senserint, reliquū corpus oē abluentes.

Quæ pilos disperdant.

Scriptum quoq; de his est, quæ pilos di-
 sperdant in comptoriis libris, quæ sanè
 iam

iam ex medica materia exciderunt. Quapropter & ego simplicium tantum ex eis faciam mentionem, in simplicium item pharmacorum tractatu à me relatorum. Iuxta rationem enim proposita pharmaca componunt. Ex lepore marino, hepate thunni putrefacto, cedria, ranarum in viridibus arundinetis degentiũ * cruore siue mucos, mari- * *ἡ χλωρὰ*
næ testudinis sanguine, lachryma vitis al- *habet ve-*
bæ, lachryma hederæ, similiterq; bryonia, *tus codex*
ac oleo quod insulsum appellatur. Ex mari *id est vel*
nis itē scolopendris, urticaq; marina, & stel *locis, vide*
lis marinis, nitro ac amurca ad hæc ammi- *licet virē*
xtis. Quin & fortiora his ex herinaceis & *tibus pro*
salamandra componūt in oleo coctis. Am- *ixώσαν.*
miscunt autem ipsis & alcyonia & sandarach-
en, & quæcunq; alia eius generis existūt.

Quæ pilos attenuant. CAP. V.

V Tetur etiam aliquādo medicus
velut dixi, his quæ pilos atte-
nuāt, quæ nō eandē cū depilato-
riis facultatē habent, Quā enim
in simplicium pharmacorum commentariis
exterforiam facultatem appellauimus, eius-
dē sunt etiā ea quæ pilos attenuant. Quem-
admodum autem in omnibus eiusdem ge-
neris pharmacis, differentia secundum ex-
cessum & defectum existit, Sic etiā in exter-
foriis habet. Ordei itaq; farina, & fabarum,


ampliusq; erui, spuma nitri, ac ipsum nitru,
familiaria pharmaca sunt omnibus ad tol-
lendas sordes vsurpata. Afsiduus autem eo-
rum vsus etiam pilos attenuat. Quæcunque
verò fortiori vi extersoria prædita sunt, in
his qui valde duos & magnos pilos habet
adhibere conuenit. Eius itaq; generis phar-
macorum est nitrum vstum, & nitri spuma:
& aphrolitrum spumofum. In afsiduo autē

* *Varia* vsu faciunt item. * Nigra appellata vasa
reperitur Alexandriotica, contusa videlicet & tenui
huius loci cribro excreta. Cæterum pauperibus ego
lectio: cod. etiam fictilium, & clibanorum in quibus ali
vetus ha- quid sub textu coquitur, testas, itemq; pumi
bet καλαί cem vstum, ac non vstum indicaui. Vili au-
va, id est tem & gratis habuerit quis circa mare de-
purpurea gens, aut vrbe quapiam non longè à mari
Aëtius ta sita, testas vstas, tum buccinorum, tum pur-
mē habet purarum, aliorumq; ostreorum. Sepiæ verò
καλιννα testam etiam citra vstionem. atque hæc qui-
δὲ σακκα. dem pro valde egenis indico, pro aliis verò
alcyonium, & herbam lanariam, vtrunque
veratrum, Bryoniæ itemq; dracunculi radi-
cem, aristolochias, canchry, & panacis radi-
cem, & quæcunque eius generis existunt:
plura enim, vt dixi, relata sunt in simpliciū
pharmacorum tractatu. At verò si hæc ipsa
odorata facere volueris, cyperum, & meli-
lotum, rosasq; ficas, & iunci odorati flo-
rem,

rem, iridem illyricam, melissophyllumque & cydoniam herbam, eis ammiscebis. Et si pro diuitibus paraueris, spicam nardi indicam, celticamque & montanam iniicies, & terram Eretriada. Addes etiam folium malabathri, amomum, myrrham, crocum, costum, & hedycroum. Qui verò pretiosiori materiae parandae non sufficit, ei viliores hi qui exornatoria composuerunt, excogitauerunt. Quorum etiam Crito meminit in primo de ornatu sic scribens: Ollam nouam figulinam magnam, operculum habentem accipito, in eamque cimoliae glebas pro situr ratione coniecito. Componantur autem haec quantum fieri potest ad theatri formam, ut in medio ipsarum locus vacuus relinquatur. Inter glebas autem vicissim mala cotonea recentia viginti locentur, haec autem per interualla variare iubeto, deinde operculo imposito marcescere ipsa mala finito. Vsu autem expetente quantum satis videbitur accipito, terito, ac uti iubeto. Post psilothrorum verò impositionem, suauem quendam odorem habet. Aliud, Rosas quam odoratissimas per diem vnam in umbra refrigeratas, quo humor saltem ab eis desiccetur, in vas figulinum componito, eodemque modo (ut dictum est) glebas cimoliae indito, ita ut rosae substernantur,

70 DE COMPOSIT. PHARMACO.
rursusq; inter glebas eadem imponantur,
deinde operculo addito, combibere finito.
Vfus iam demonstratus est.

De furfuribus. CAP. VI.



Vibuscum se scalpentibus, furfuribus similia ex capitis cute decidunt, & propterea furfures medici hanc accessionem siue symptoma appellant, à vitiatis serosis humoribus proveniente quos consumere scopus est eis qui malum hoc sanare volunt. Manifestum igitur est discussoria & extensoria pharmaca adhibenda esse præparato prius universo corpore, si vitiatis humoribus repletum videatur. In omnibus enim huius rei meminisse oportebit, etiam si aliquando in sermone relinquatur. Ammiscuerunt autem quidam prædictis pharmacis quædam adstringentia, quo per ea affectum membrum corroboretur, ut ne facile in seipsum suscipiat influentes humores serosos, sed resistat eosq; repellat: & ob hoc sanè Archigenes in pharmaco ex atramento sutorio composito hæc verba adiecit, Hoc inquit adeò efficax est, ut neque in posterum fiant. Crito equidem in tertio libro de ornatu, eiusmodi pharmacorum syluam scripsit in principio statim ipsius libri, quare velut paulò antè dixi,

min


minimè necessarium est me ipsa hic rursus describere, quum omnes illius habeant libros. Cæterùm quæ Archigenes scripsit indicabo ob id maximè, quod quibusdam ex eis adscripserit. Quod non permittant symptoma hoc rursus fieri. Scribit autem hoc modo suis ipsius verbis: Diæta eis cōstituitur flatus expers, nihil ex crassi succi cibis habens admixtum, quales sunt tubera, fungi, bulbi, legumina, carnesque maximè bubulæ, ac quæ similia existunt. Sint autem cibi quibus vescuntur boni succi, faciles concoctu, & mel iisdem addatur. Intinctus conferunt, acetum cum sapa. Condiementa, cuminum & fœniculum, Aliis parce vtantur, & à bellariis omnibus maximè abstineant. Vinum conducit eis album & tenue: voluptatis verò gratia dulce, & vinum mulsum. Ex fructibus optima est vuaræfacta, deinde ficus, quibus ante cibum reliquum vesci præstat. Verùm ante omnia bonæ concoctionis cura habenda est, Deambulationes lenes plurimæ & mane & vespere optimæ sunt, lauatio ex frigida balneis præstat. Si verò quis calida lauit, incongrua ei est longior in aëre mora, & perfusio capitis præ folio est eligenda, postea verò larga frigida adfusione refrigerato. Dormire ad satietatem vsque vtile est, Ira,

indignatio, versatio in sole, & vehemens refrigeratio vitanda, omnia item quæ caput replent. Archigenis ad furfures capitis. Quibus furfures caput occuparunt, his cum fœno græco, betæ succo, ac nitro præfrictis & extersis, cimoliam felle bubulo aut suillo acetoque subactam illine. Deinde post horam ablue, atramentumque sutorium ac nitrum cum oleo trita illine. Aut myrobalanum & fabaceam farinam æquali pondere trita, in aqua quoque, & affrica, Aliud, Amygdalas amaras decorticas cum aqua aut aceto affrica, quæque exaruerint capilli calida ablue. Aliud, Aut maluam syluestrem aqua marina ad decimæ partis residuum coctam terito & affricato. Aliud, Aut nitri spumam & atramentum sutorium, æquis partibus cum vino, ter aut quater in mense affricato, hoc adeò efficax est vt neque in posterum fiant. Aliud, Aut vini Rhodii fecem, & pumicem, & nitrum, pari pondere cum lupinis adfrica. Aliud, Aut cimoliam cum fœni græci cremore adhibe. Aliud, Aut nitrum assatum & bulbum. Aut hæc omnia simul pari pondere affrica. Aliud, Aut vbi picis liquida serum illeueris, alumen insperge.

De

De Pthiriasi, hoc est, morbo pediculari.

CAPVT VII.



Pediculorum generatio quibusdam in capite contingit aceruatim, ex multis videlicet humoribus calidis quidem, sed non ad tantam caliditatem progressis, ad quantam perueniunt acres & serosi humores. Quare manifestum est in profundo cutis, pedicularis morbi affectionem fieri, vbi etiam animalia hæc generari possibile est, non in superficie cutis, in qua furfures consistere diximus. Pharmaca itaque ipsorum necessario exiccantia sunt, & quæ ex alto trahere ac euacuare possunt, magis utique quam ea quæ furfuribus conueniunt. Atq; hæc quidem Methodus est ea componendi. Verum sylua eorū quæ experientia cōstant. (Oportet enim, vt dixi, in omnibus maximè attendere ac confidere his quibus experimētum testimonium præbet,) in tertio libro Critonis de ornatu scripta est, Apponā autē etiā nūc ego ab Archigene scripta hac serie verborū. Remedia morbi pedicularis: Morbo pediculari affectis hæc cōferunt. Staphidis syluestris partes 2. sandarachæ & nitri vtriusq; partē 1. cū aceto & oleo capiti illine. Aut Rhoen qui in obsonia additur cum oleo tritū similiter illinito. Aut oxylapa-

thiradicē cū oleo eodem modo. Aut veratrū albū, & staphidē syluestrē, & nitrū parī pōdere cū oleo in balneo adhibe. Aut cum aqua marina, aut muria meraca cum aceto perfundito. Quod si nuditas pilorū adsit, syluestrē staphidem cū oleo & aceto imposito. Aut alumen tritum cum oleo illinito.

De Achoribus, hoc est, viceribus capitis manantibus. CAP. VIII.



INter affectiōes cutis capitis cōnumeratur quoq; ea quæ Achor appellatur, ex genere tumorum præter naturā existēs: propriam autem & singularem appellationē nacta, ob accessiōē, quæ ad eam consequuntur proprietatem: valde enim tenuibus foraminibus eroditur, quæ tenuem in se humorem modicē viscosum complectuntur. Ad similitudinē verò eius proximē accedit alia cutis affectio quæ fauus, græcis Cerion vocatur: maiora tātum foramina habens, in quibus humor hymettio melli similis continetur. Generatio ipsis ex humore mixto est, qui partim tenuem serosumq; ac mordacē, partim verò crassum succū in se habet. Tenuis itaque humor utpote mordax, primum quidem ad scalpendum ipsos impellit, progressu verò temperis ad scalpturam tū tumor augetur, tū foramina circa ipsum
erum

erupūt. Manifestū igitur est euacuare oportere humores affectionem ipsam operātes. Qui si etiam influant amplius, prohibēdus primum est ipsorū influxus, per capitis euacuationem, præmissa totius corporis purgatione, velut in alopeciiis est proditum. At verò si parua affectio existat, sola localia & partialia appellata remedia, citra totius corporis euacuationem suffecerint. Cōuenient autem ipsis ob crassitudinem videlicet & viscositatem humoris eas generātis, pharmaca quæ ipsum incidant, quæque facultate sua necessariò discutiant & repellant. Atqui acetum ex incidentium ordine existens, vltra hoc quod discutit, præcipuum quiddam in se habet, quo reprimat ac quod influit depellit, vtpote quod substantia sua modice calidum est, plurimum vero frigidum & partium tenuium: talī nanque facultate præditum esse, in primo de simplicium pharmacorum facultate demonstratum est. Sit itaq; acetum exquisitè acidum, in quo nulla penitus vini qualitas appareat: hoc ipso sanè pharmaca metallica appellata, modo hoc, modo aliud imbues, achoribusq; ex eis medeberis. Incipere autem ab imbecillioribus præstat, præsertim si dolor simul ipsis adsit. Cimolia igitur ad hanc rem apta est, & Cretica lemniaq; terra,
*pom

* Et *sa-* * pompholyxq; & spodium, spuma argenti
mia, addit & cadmia tenella. Quod si neque ex his
vetus cod. quiescat malum, pharmacum ex charta sic-
 cum aceto dilutum illinito, Neque obscurū
 est tollendos prius capillos. antequam talia
 admou eas. Si verò acrius tibi ex charta
 pharmacum appareat, miscebis ipsi argenti
 spumam: siquidem sufficienter mordacita-
 tem eius exoluere velis, pari copia: si verò
 modicè tantū remittere velis, minori, quē
 admodum etiā si plurimum eius vim exol-
 uere placeat, maiorem eius copiam addes.
 Porro quum aliquando ruri degenti mihi
 pharmacum ex charta ad manum non esset,
 conspecta in ægri domo inutili aliās charta
 faculam postulauī, exusta q; charta ac aceto
 diluta, locum affectum illeui, hominem quē
 ad me postridie venire iussi: sciebam enim
 quòd quum duræ carnis esset pharmacum
 ferre posset, qui vbi venisset, parum aberat
 quin curatus esset: quare ad aliud pharma-
 cum non transiui, sed eodem vti iussum, po-
 stera die perfectè sanitati restitutum con-
 spexi. Prudenti igitur viro, quod sæpe iam
 dixi, opus est, & qui tum curandorum mor-
 borum substantiam, tum ægri naturā pro-
 bè norit. Insuper q; pharmacorum facultatē
 non iuxta genus tantum, sed & iuxta quan-
 titatē cognoscat, quo singulis diebus quali
 præ

praesidio opus sit coniecit, In extendenda
 nim aut exoluenda pharmaci, quod prio-
 ribus diebus admotum fuit, facultate in quan-
 tum sanè affectio ipsa indicat, congrua cura
 io consistit. Ad Achoras inflammatos.
 Quod si quando in vlcus manas inflamma-
 tum simul & dolorosum incidas, lenies pri-
 mum per humectum concoctoriumq; ac emol-
 liens & acrimoniur arcens pharmacum dolo-
 rem, Tale autem est parygrum appellatum, ab
 Hera aliisq; plurimis descriptum. Satis mani-
 festum autem est quod ipsum in manu per
 specillum latum cum rosaceo emollitum &
 ad vngenti formam redactum, non empla. * *καλίστο-*
 tri forma, qualem à principio habebat, ad- *μαι κατὰ*
 nibere oportet. Cōueniunt etiam hoc tem- *ait vet.*
 pore, ea quæ ad sedem ex vlceribus aut ru- *cod. græ. i.*
 pturis dolentem faciunt, de quibus priuatim *eligam*
 destinato sermone ac tempore dicetur, Si *ego medi-*
 cut etiam conueniunt ea quæ caneros miti- *cameta à*
 gant. Hæc igitur omnia vbi prius confide- *præstatis*
 raueris, etiam particularem pharmacorum *simis medi*
 varietatē vtiliter cognosces. * De qua ego *cis ea sub-*
 quoque dicere aggrediar, Quæ apud præ- *inde scri-*
 stantissimum quemque medicum laudata *pturus, et*
 reperi pharmaca deinceps scripturus. Ad *hanc lectio-*
 Achoras Archigenis. Archigenes in pri- *nē habuit*
 mo pharmacorum iuxta genus, ad Acho- *vet. inter-*
 ras sic scripsit. In quibus Achores, aut pa- *pres.*
 pulæ

pulæ feruidæ, aut eruptiones circa caput
 vlcerosæ sunt, ab omni acri & falso absti-
 neant, itemque acido. Deinde deraſis capil-
 lis, aut ter, aut ſæpius quotidie ex calida in
 qua myrtus, aut lentifcus, aut rubus, aut
 bryonia, aut ſycomorus, aut lupini, aut len-
 tes, aut asparagi radix incocta ſint, lotis &
 maximè vbi multa ſanies effluxerit, ſali-
 cis folia ex aqua imponito, aut lentem cum
 melle, aut asparagi radicem coctam eodem
 modo, Aut fœnum græcum betæ ſucco ma-
 ceratum pinguibus emplaſtris vſu cognitis
 ammiſceto ac vtitor. Aliud præclarè fa-
 ciens. Pinus corticem cum cerato. Aut
 cadmiam cum oleo veteri illinito. Aut
 cinnabari ſimiliter tritum imponito. licebit
 & myrti baccas, aut ordeum vſtum, aut ar-
 genti ſpumam, aut ceruſſam, aut oſtreorum
 teſtas vſtas ammiſcere, ſingula etiam cum
 oleo veteri illinire. Aut ſpodium & man-
 nam ex vino. Egregie conſtanter facit &
 chalcitis cum aceto & oleo veteri illita.

Aut betæ decoctum cum modica cimolia,
 ſale & vino ammixtis, in balneo affrica. Aut
 hyoſcyamum & ſempervivum minus, trita
 cum roſaceo mellis ſpiſſitudine illine. Aut
 vlceribus ex ſmegmate quopiam repurga-
 tis, Terram cimoliam torrefactam cum vi-
 no, aut fecem vini rhodii vſtam cum vino
 vete

veteri, aut radicis cucumerū syluestris decoctum adfundito ac proluito. Aut tragacantham aut argenti spumam, aut sandarachæ duplum, cum vino, aut etiā cum oleo myrteo, vt pingui quopiam illinito. Aut argenti spumā & calcem pari pondere cum aceto & oleo illine. Aut chalcitidem cum myrteo oleo vel suillo felle liquido illine. Hæc quidem Archigenes scripsit, doctrinam tradens nō modò Empiricā sed etiam indefinitam. Inuenire itaque est apud Empiricos, qui sanè non in contentiosis sermonibus vitam contriuerunt, sed in medicæ artis operibus diligenter versati sunt, quod in quibusdam apparentibus cognitionibus euidencia discrimina retulerunt, qualia & ego paulo antè in alopecia feci. faciā autem & nunc in his quæ Archigenes scripsit pharmacis. Quædā enim ex eis incipiētes achoras, citra humorum in vniuerso corpore vi-
tiationem aut eorūdem multitudinē redundantem, sanāt, adstringentē nimirum & repulsiuā vim habentia. Quædam verò vbi maguū quoddam malum minantur Achores, eos aūgeri prohibent, simul & quod influit repellentia, simulque quod iam in eis continetur concoquentia & discutientia, quæ euidēs est mixtæ facultatis esse oportere. Quædam autem eis quæ in superficie
hæc

hærent, paruisque tantum auxiliantur, quæ moderatis viribus prædita esse oportet, & nihil quod irriter habere, ex discussoria nimirum facultate. Alia autem viribus omnino robustissima sunt, adeo ut etiam Achoras ex crassis ac viscosis humoribus obortos, ineluibilerque cuti infartos euacuare possint, atque id adeo valide ut etiam si obdura- tum quid habeant, id ipsum deturbare valeant, quanuis ipsum cutis habitum in eiusmodi malum habitum inducant, ut quod influit corrumpatur, etiam si commodum id existat. Hæc autem sunt ex efficacissimis pharmacis composita, quale retulit Archigenes vbi- salem ad reliqua discussoria ammiscet. Sal enim & chalcitis, & vini fex vsta & sanda- racha, & calx viua fortissima viribus phar- maca sunt, calfacientia, mordentia & discu- tientia. Eius generis est etiam fel calidorum & siccorum animalium, quorum non meminit Archigenes, sed vnus suilli tantum, quod omnium moderatissimum existit: ad cuius fa- cultatem etiam proximè cinnabari accedit, propinquum deinde locum habent conchæ vstæ, & hordeum, & post hæc oleum vetustum. Quemadmodum autem hæc emouent, secant & discutiunt violenter impactum, Sic repel- lunt adstringentia, Aliqua quidem simplici- ter citra contrariæ facultatis ammixtionem, aliq

aliqua verò per dominium adstringentis in
 eis facultatis. Myrti equidem earumq; bac-
 cæ, & pinus cortex, ex eorum numero sunt
 quæ non habent contrariæ facultatis am-
 mixtionem, velut etiã rubus & fycomorus,
 quãuis moderatius adstringant, quàm myr-
 ti earumque baccæ, sed tamen adstringendi
 vim sensibilibiter in se habent. Mixtæ autem
 facultatis est oleum myrteum. Nam & ex
 oleo, & ex baccarum myrti, aut ipsius etiam
 myrti succo est compositum. Oleum autem
 ipsum emollientem habet facultatē, Myr-
 tus autem eiusque baccæ adstringentē, non
 mollire, sed cogere & stringere natã. Ro-
 faceum item quanquam minus quàm myr-
 teum adstringat, tamen & ipsum mixtæ fa-
 cultatis existit. Quemadmodum autē hæc
 per præparationē mixtas vires habent, Sic
 alia spõte naturæ talia sunt, velut lentiscus,
 cyperus, & lētes: quod ipsum in sermone de
 his est demonstratum. Cæterùm discussoria
 & repurgatoria, citra sensibilē caliditatem,
 facultate præstant ex eis quæ iam Archige-
 nes retulit, Beta ipsa, & cimolia vsta, prius-
 quàm verò vritur imbecillior viribus quàm
 beta est, sed fortior his est cucumeris, &
 bryoniæ ac asparagi facultas. Spuma vero
 argenti præstantius quidem quàm cimolia
 vsta pharmacum est, Multo verò debilius

quàm ad propositæ affectionis sufficiat melam. Cadmia autem moderate habet ad mediæ magnitudinis achoras. Citra mordacitatē verò resiccat spodium. Manna autem etiam concoquit. Oleum verò ut iam dixi, laxantem quidem habet vim, sed eam non adeò fortem, atque ob id per mixturā facile exuperatur, itaque ubi fuerit cum obducentibus meatibus & refrigerantibus permixtum, velut est cerusa, possibile est hanc magis vim suam demonstrare, quæ est cogere, oppilare, & adstringere substantiâ corporum quæ contingunt. Porro hæc omnia in Archigenis sermone confusa sunt, neque in quibus achoris, neque quādo eis utendum sit, ipso demonstrante. Utitur autē & vino in eodem sermone, neque apponit quale probet. Atqui multiuga circa vinū differentia existit, Aliud enim austerū, aliud acerbum, aliud dulce, aliud acre manifeste est, aliqua etiā plures qualitates simul ex se ostēdunt, nimirum & dulce quippiā & adstringens & acre cōplectentia. Quādo igitur simpliciter quis scribat, dilui debere quippiā vino, lectorē cōiectare oportet quē scopū pharmaci cōpositio habeat, & ad illum respiciendo, id quod aptum fuerit vinū eligere, Adstringens quidem ubi repellere velit, ac re vero in quibus discutere. Reliquis itē uter-

tur

tur quemadmodum vniuscuiusque vim demonstrauimus in loco vbi de vinorū differentiis docuimus. Acetū verò in omni occasione ad achoras aptissimū est, vtpote crassos & viscosos humores secās, atq; id quod influit discutiensq; & repellens. Verū ipso nō vtique per se quispiam vtetur, siquidem non proluere aut lauare achoras velit, sed ad diluenda cum eo pharmaca, moderata quidē in quibus incipit & adhuc parua est affectio, fortia verò in maioribus & diuturnioribus, fortiora autē adhuc in inueteratis iam & ægerrimè curabilibus. Verū differentia pharmacorū iuxta fortitudinē iam ante à me relata est, Cæterū ex relatis ab Archigene pharmacis, in totum non vti exoptem semperuinoq; & cerusa, Illud enim strenuius refrigerat quā cōuenit incipientes achoras refrigerari. Cerusa verò modicam quidem habet frigiditatē, & ex pharmacis est obducentibus meatus, pro ea autem vti possumus spodio & pompholyge.

Quæ Apollonius in primo de facile parabilibus ad Achoras scripsit.

Apollonius in primo de facile parabilibus ad achoras primū quidē sic scripsit: Rosaceo oleo caput illine. Deinde post hoc, betæ succū similiter illine. Tertiū deinceps, Testudinis sanguinē eodem modo

adhibe. Quartū, Laurino oleo caput illine,
 Et quintum, Crocinum vngentum inunge
 eodem modo. Ex his sanè primum debilis-
 simū est pueris & mulierculis teneræ carnis
 in principio affectionis vtile existens, Cōco-
 quit enim & discutit ac repellit, eaq; omnia
 moderatè facit. Secundum verò vbi betæ
 succo vti cōsultat, efficacius quidem est ro-
 faceo, discussoriā vim habens, nō tamen ad
 fortes ac iam obfirmatos achoras sufficit,
 At verò testudinis sanguis curiosum & su-
 peruacaneum est pharmacū, neque vnquam
 tentavi eius periculum facere. Quod verò
 deinceps scriptū est laurinum, fortiter cal-
 facit & discutit, opusque habet corporis to-
 tius & capitis euacuatione, quo discutiāt
 humores achoras facientes. Crocinū dein-
 de vngentum discussoriū quiddam habet
 & astringens, & cōcoctorium, atque ea tria
 fortiora in ipso sunt quàm in rosacei natu-
 ra: ex eis igitur quæ de illo dicta sunt, etiam
 de hoc ratiocinari licet. Post hæc autem
 ipsius verbis ita scriptum est; Tauri urinam
 affrica, Deinde sequitur, facit & cameli uri-
 na eodem modo. Utendum autē eis, inquit,
 ad plures dies. Verū ego vtique dixerim
 ad ipsum, Nō esse quod ad multos dies, sed
 ne ad vnum quidem, purus homo tolerare
 queat, vt vllius alicuius eiusmodi animalis
 urina

vrina capiti affundatur, præsertim in affectione adeò parua, & quæ facile curari potest, Bis enim *per omnia (quod dicitur) di-
 stans est, rosaceo videlicet vti, quod penitus exiguum habet ad propositum symptoma facultatem, & tauri ac cameli vrina quæ acerrimæ grauissimæq; & penitus iniucunda existunt. Deinceps verò tale quoddam pharmacum his verbis scriptum est: Furfurum chœnicern dimidium in aquæ heminis duabus madefacito, posteaq; terito ac succum excolato, cumque dimidia aceti hemina ad limi spissitudinem coquito, & ex eo caput fricato, Deinde aqua in qua beta, aut fœnum græcum, aut lupini cocti sint, abluito. Vngento autē irini fece vtitor. Hoc pharmacum discussorium est citra mordacitatem, ex repurgantibus atque extergentibus appellatis cōpositum. Eiusmodi enim facultatis sunt furfur, beta, & lupini: discutit autem simulque calefacit non vehementer fœnum græcum: ex eo autē genere est & irini vngenti fex. De aceti verò facultate antea quoque dictum est, quod aptum sit ad achorum affectionem, quare hoc vt cōuenientissimo & efficacissimo pharmaco vtendum est.

Aliud deinde post hoc pharmacum scriptum est ab Apollonio his verbis: Cucumeris sylvestris radices decoquito, & suc-

cū affricato. Didicimus autē cucumeris radicem plurimū discussoria facultatis esse. Et postea hoc pharmacum scriptū est: Terræ cimoliæ, sulphuris viui, par pondus cum aceto terito, & in balneo affricato, calidāq; abluito. Hoc illinire etiam conuenit pharmacum, non solū vt dixit in balneo adhibere. Omnes enim habet facultates quibus affectio indiget, aceto quidē ipsas habente velut antea est dictum, Solū verò sulphur vltcrius quā conuenit excalfacere & discutere potest. Quapropter cimoliā ei probē ammiscuit, quæ compositionē ex vtroq; ad moderatam temperaturā reducit. Cæterū quod sequitur pharmacū vbi inquit, Maluā exiccatam & tusam in vrinā inspergito & affricato reprehendo, in quantū etiam superius vrinæ vsum detestatus sum, etiam si facultatem eius affectioni cōuenire nō negauerim. At quod deinceps scriptum est, in quo ait fici folia in aqua coquito, & aquam sub diuo ad solem exponito, iniecta que in ipsam fece vsta affricato, post hac verò repurgantibus pilos, eluito. Acre valde hoc exterforium medicamentum est, quod si in balneo tantū adhibeatur, non vehementer valet achōras irritare, præsertim si quis, vt ipse deinceps iubet proluat, hoc est, ex aqua dulci caput perfundat. Ad illitionem verò eiusmo

eiusmodi pharmaco vti periculosum est.
 Est enim plurimum acre medicamentū fex
 vsta, quemadmodū in libris de simplicium
 medicamentorū facultate est cōmonstra-
 tum. Quod verò sequitur pharmacū securi
 vsus est, eoque confidenter quis vtetur ex
 spuma argenti laurinoq; composita. Miror
 autem quomodo, vt laurino simile, oleum
 simplex ammiscet, sic quodāmodo scribēs,
 Argēti spumam cum oleo albo, aut laurino
 tritam, vbi calida praelaueris circumlinito.
 Longe enim deficit à laurini facultate, oleū
 commune quod album appellauit, ea ipsa
 vsus est à laurino distinctione. Quin &
 quod post hoc scriptum est, cōsimilē habet
 absurditatem: pro spuma enim argēti ceru-
 sa vtitur, diluit autem, ipsam myrteo aut
 laurino, quum multā omnino differentiam
 hæc pharmaca habeant: alterū enim repul-
 sorium est, alterum verò plurimum calfacit
 & discutit. Vsusque eorum est repulsorii
 quidem in principio, discussorii verò vbi
 humor qui achoras generat iam est firma-
 tus, Amplius autem deinceps quum rubi ca-
 nini folia cōtundere & exuccare iubet, de-
 indeq; oleo miscere, imbecille est pharma-
 cū, & incipienti adfectioni solūmodo aptū
 vt pote quū rebus caninus adstringat. Tale,
 pharmacū est etiā plūbago cū cerusa, vino

subacta vsquequo ad compagem quæ illini
 queat redigantur, Porro contrariæ prædi-
 ctis facultatis sunt quorum æqualiter, nulla
 distinctione apposita meminit, id videlicet
 quod ex nasturtio, & quod ex Scilla cōstat.
 De priore quidem hæc verba tradens. Na-
 sturtii & salis parem modum adipi anseri-
 no ammisceto, tertio ac vritor. De altero
 verò sic scribit: Scillam in fornace velut cu-
 curbitam cinere obruito, quumque mollis
 fiet, exprimito, deinde ad succum oleo non
 multo ammixto, illinito. Manifestum verò
 est multò vehementius esse quod ex nastur-
 tio apparatus. Quod verò deinceps tradit
 ex mitigatoriorum pharmacorum genere
 est, quod ubi dolor quispiam vehemens cir-
 ca achoras existit, donec eum leniat, conue-
 nienter adhibetur. Si verò duros & inuete-
 ratos achoras discutere velimus, omnino
 imbecille est. Scripsit autem in hūc modum
 de eo Asclepiades: Olei quàm optimi hemi-
 nam in pilam plumbeam infundito, & plum-
 beo pistillo terito, donec crassum & subni-
 grum reddatur. Deinde seorsum spumæ
 argenti libram. 1. & cerusæ tantundem teri-
 to, oleoque ammisceto. Postea verò eloto
 & siccato capite pharmacum illinito. Neq;
 verò ex simplici tantum oleo, sed quādoq;
 rosaceo, quandoq; myrteo apparatus, & ad
 rugas

rugas ani intumescences rimasque ac fissu-
 ras sedis, ad vlceraque dolentia, omniaque
 alia quæ ex fortiorum pharmacorum vsu
 exacerbata sunt, optimum medicamentum
 habebis, Egregiè enim ea lenit, etiam si ser-
 pendo exedentia, aut etiam cancerosa, aut
 quomodocunque maligna existât. Nequa-
 quàm itaq; eius cõpositionem nunc scribe-
 re oportuit, sed quemadmodum ego antea
 dixi, sufficiebat illud dicere quòd dolorifi-
 ci achores eiusmodi pharmacis mitigantur.
 Commune enim hoc est in omnibus dolore
 adfectis, propriè autem faciens ad achoras.
 Deinceps autem tale pharmacum scripsit:
 Spumæ argenti drach. 8. foliorum rutæ te-
 nerorũ drach. 5. olei drach. 8. aceti heminæ
 quartam partem, simul trita capiti illinito.
 Hoc sanè pharmacum multo vsu habemus
 exploratum. Propinquum autè ipsi faculta-
 te est id quod consequenter ab eo est con-
 scriptum, iuxta hanc commensurationē. Ce-
 rusæ drach. 6. spumæ argenti drach. 4. ceræ
 tantundem. sulphuris drach. * 6. olei rosacei * *Aliàs. 9.*
 aut myrtei quod satis est vt ceratum liqui-
 dum fiat. arida cū cerato cõmittito, caputq;
 inde illinito. Hoc autem & ad omnes in to-
 to corpore eruptiones vehementer commo-
 dum est, vt ritè sit ab Apollonio cõscriptũ.
 Quin & quod postea sequitur plurimũ di-

scussorium est, ut quod spumã nitri habeat multam, adeò ut nisi olei multitudine castigetur, acrius sit quam cõuenit. Iubet autem ad vnã spumã argenti partem, quintuplum spumã nitri ammisceri, hisq; dum teruntur paulatim oleum adfundi, donec ad compagem illitioni aptam redigantur.

Quæ Crito ad achoras pharmaca scripsit.

IN Methodo de curandis morbis vniuersales facultates pharmacorum ad singulos morbos recẽsui, verũ paucorum definitæ materiæ exemplorũ mentionẽ feci, dilata tum multitudinis ipsorũ cõmemoratione. At verò in præsentì, quam nunc in manibus habemus, tractatione, omnia quidem quæ omnes pharmaca scripserunt, longum fuerit recensere, Quæ verò à probatis medicis per experienciã tradita sunt, Ea omnia visum est mihi conducibilius enumerare, quo etiam inter se propinqua, & quæ omnino eadẽ apparent, paululum verò iuxta apponderationẽ aut præparationẽ euarient, hi qui in his scriptis versantur cognoscant, eaq; maximè præparèt quorũ materias in promptu habet. Cõtingit enim aliquãdo ut aut in totũ ea quæ in cõpositionẽ miscetur non reperiamus, aut talia reperiamus, ut ipsa iniicere non audeamus. Caterũ eius maximè in cõponendis pharmacis cura ha-

ben

benda est, vt bona integraq; & in vigore
 sint omnia quæ ammiscuntur. Ob id igitur
 etiã iã omniũ quæ Crito tradidit mētionē
 faciã, nã id sanè diligentius achorũ curã tra-
 ctasse mihi videtur, In quinq; itaq; sermo-
 nes doctrinã de ipsis distinxit, quos primũ
 & ipse recēsebo. PRIMVS Critoni sermo
 de achorũ curatione. Scribit itaq; Crito
 hæc verba. Ad achoras in capite cōtingētes,
 qui plerunq; furfuribus præcedētibus fiunt,
 & fermè etiã scabie, in principio subscriptis
 cōpositionibus vtemur. Ad achoras recen-
 tes, glutē fabrilē aqua coctũ obline. Aliud,
 Papaueris syluestris & hyoscyami folia cū
 oleo impone. Aliud, Fici * virgulta aut
 folia tenera trita cum aqua imposito. In
 inueteratis verò cū aceto terito. Aliud,
 Nucum amaranũ nucleos in aquam tepidã
 iniectos & decorticatos, cū aqua terito, &
 cerati crassitudine prærasis imposito. In
 inueteratis cum aceto diluito. Aliud. Re-
 crementi ferri & rosarũ par pondus cū vi-
 no terito & imposito. Quidam verò trita
 cerato rosaceo excepta adhibēt. SECUN-
 DVM sermonem ad achorũ affectionem
 his verbis conscripsit. Circuntensa autem
 cute, & ob id molestiam inferēte, subiectis
 compositionibus vtendum est. Lipara seu
 pinguis compositio ad achoras, p̃lydracas
 papu

* ἀγριας
 id est silæ
 stris addis
 vet. cod.

papulas feruidas, intertrigines. Est cōmo-
da quoque vitiis sedis. Spumæ argenti dra-
chma 50. foliorum rutæ tenerorū drach. 25.
aceto diluito, & rosaceo aut myrteo exce-
pta, cum penna illinito. Alia, Spumæ
argenti drach. 200. cerusæ drach. 150. rutæ

* *Herbæ
pedicula-
riæ.*

drach. 100 * staphidis sylvestris drach. 25.
aceti sextarios. 3. myrtei libras. 3. particula-
tim singula terito, & affuso liquore, vt di-
ctum est composito. Alia, Cerusæ

* *Aliàs.*

drach. 150. spumæ argenti drach. * 100. rutæ
drach. 100. myrtei sextarios. 3. particulatim

200.

* *Aquam
habet vet.
codi.*

trititis * liquorem affundito. Alia, Ce-
rusæ vltæ drach. * 100. rutæ drach. 100. mā-
ne thuris tantundē. corticis pinus drach. 50.

* *Aliàs.*

olei myrtei sextarios. 1. acetis tantundem
similiter cōponito. Alia, Recrementi

50.

* *Aliàs.*

plumbi drach. 100. pāpinorum vitis drach.
100. thuris drach. * 100. myrrhæ & spumæ

50.

nitri tantundem, acetis & myrtei quantum
sufficit. Intertio autē hæc tradit. At vbi
affectio inueterata fuerit, subscriptis com-
positionibus vtendum est, & deinceps ita
scribit. Damocratica compositio ad acho-
ras humectos & inueteratos. Ladani drach.
octo, cerusæ tantundē, sulphuris viui drach.
4. vino & myrteo oleo subactis vtitor.

Alia, Spumæ argenti drach. 8. pampi-
norum vitis drach. 8. succi hypocistidis
drach.

drach. 4. spumæ nitri drach. 2. gallarum
drach. 3. aut. 2. ex aceto & myrteo adhibe.

Alia, Malicorii, gallarum acaciæ ful-
uæ, parem modum. Malicorium & gal-
las vino macerata coquito, acaciam ve-
rò vino dilutam reliquis probè tritis adiici-
to, quumque rectè omnia cōparata fuerint
myrteo excipito. Alia, admodū bona Spu-

mæ argenti, cerusæ, hyoscyami, misyos* ra-
mulorum cicuræ, æquales portiones, thuris
vsti, ramulorum oleæ tantundem, aceto &
oleo lentiscino exceptis vtere. Alia valde
commoda. Cerusæ vste drach. 8. spumæ
argenti drach. 8. atramenti sutorii drach. 4.
Rhois rubri drach. 4. sulphuris viui drach. 2.

opii* drach. 2. myrrhe drach. 2. aceto & len-
tiscino oleo excipe. *Q V A R T V M* ve-
rò sermonem de achoris curandis hac ver-
borum serie cōscripsit. Quando verò ex
his quæ ad achoras scripta sunt pleraque re-
siccant, magisque dolorē inferunt, vt pote
cute in ipsis affectis circuntensa, itaq; sub-
scriptis cōpositionibus vtendū est per quas
post hæc omnia citra dolorem emendari.

Leuce emplastrum album inexuperabi-
le. Faciēs ad humectos achoras, & qui ægræ
tolli possunt, facit, & ad papulas feruidas
& intertrigines. Spumæ argenti drach. 100.
ceræ drach. 100. alii. 50. habent, cerusæ
drach.

* Vsti, vt
vet. codi.

* Vetus co-
dex nō ha-
bet opium
sicut nec
vet. inter-
pres.

drach. 100. thuris drach. 25. aluminis scissi
 drach. 16. terebinthinæ drach. 25. piperis
 albi drach. 3. olei sextariū. 1. arida tundito.
 Oleum verò & argēti spumā ac cerusam in
 ollam nouā cōiecta ad prunas coquito, atq;
 vbi mutationē acceperint, cerā & resinā ad
 dito, ac donec non inquinet amplius manus
 agitato, deinde ab igne ablatis, & quodam
 modo refrigeratis arida adiicito, & in pilā
 translata diligenter emollito. Vritor autē
 in linteolum impactis, soluitoq; tertia die.
 Magis autem cōmodarit pharmacū hoc si
 cum Melino emplastro Pasionis fuerit per-
 mixtum, ita vt emplastri in exuperabilis,
 Anicetum Græci hoc appellant, partes duæ
 Melini autē Pasionis vna pars cōmittātur.
 Alia, Cerusæ drach. 120. spumæ argenti
 drach. 80. ceræ drach. 24. terebinthinæ
 drach. 12. mannæ drach. 16. aluminis scissilis
 drach. 8. olei heminas. 2. committe vt dictū
 est. Melinum Leucii emplastrū, quod omnē
 fluxum resiccat, faciēs ad achoras inuetera-
 tos & humectos. ceræ drach. 8. sandarachæ
 drach. 4. adipis vitulini drach. 4. terebin-
 thinæ drach. 2. thuris drach. 1. myrrhæ drach.
 vnam aluminis scissi vsti drach. 1. corticis
 pinus drach. 1. olei myrtei quod satis est: li-
 quefacta cum aridis cōmittito. Aliud Me-
 linum Hygieni, resiccans omnem fluxum.

Spu

Spumæ argenti lib. i. cerusæ lib. i. salis fos-
 filis lib. i. aluminis scissi libræ dimidiū, atra-
 menti sutorii sexuncē. olei sextarios. 2. aceti
 sextarium. i. Oleū, salē, cerusam, spumā ar-
 genti donec nō inquinent manus coquito,
 arida verò tusa, cribrata, acetoq; diluta, ad
 refrigeratū pharmacū addito paulatim ad-
 stillando ac assiduè agitando, deinde in pi-
 lam translata ac probè emollita, tollito ac
 vtitor. Thebæi emplastrū ad achoras hu-
 medos. Spumæ argenti drach. 48. cerusæ
 drach. 24. corticis thuris drac. 12. gallæ om-
 phacitidis drach. 12. ceræ drac. 8. resinæ tere-
 binthinæ drach. 16. olei sesquiheminā, com-
 ponito vt dictū est. QVINTVM postremū
 sermonē de achoris Crito ita orditur. Cæ-
 terū vbi affectio decreuerit & cicatrix per-
 fectè fuerit obducta, ad totius mali trās-
 lationē subsequētib; cōpositionib; vten-
 dum est. Deinde smegmata plura scribit,
 vnumquodq; iuxta hanc cōpositionis for-
 mam. Smegma ad achoras, fursures, aspe-
 ritates & scabies. Terræ cimoliæ lib. i.
 nitri rubri. lib. i. retrimentorū quæ ab ex-
 pressa myrobalano reliqua sunt sexuncē, aliū
 lib. 6. habent. myrrhæ drach. 8. piperis albi
 drach. 8. nardi celticæ drach. 4. cassiæ drac.
 4. costi. drach. 4. contusa & cribrata repo-
 ne, ac vtire in balneo. Aliud, Nitri rubri
 lib.

lib. 4. terræ cimoliæ tantundē. retrimētorū
ab expressa myrobalano lib. 2. cyperi lib. 1.
alii. 4. baccarum lauri lib. 1. iridis aridæ
lib. 1. radiceis bryoniæ, alcyonii, amygdala-
rum repurgatarum, cornu ceruini vsti, sin-
gulorum* lib. 1. Composito vt dictum est.

* Aliàs li
brā. S.

Aliud, Fecis vini vstæ quam Romani
feculā, nos tryga appellamus lib. 24. aquæ
pluuiialis sextarios. 48. thuris lib. 2. terræ
samæ lib. 2. olei Sabini lib. 4. alii sexta-
rios. 4. ceræ lib. 3. & dimidiam. Fecem &
aquam in dolium figulinum non picatū cō-
iecta ad dies. 7. madescere finito, & ter in
die cum ferula agitato. Sequēti deinde die
dilutum & sacco excolatum liquorem in
vas æreum stanno oblitum transferto, &
igni impositum coquito, luculentiore au-
tem igne vtaris: atque vbi tertia pars reli-
qua sit, oleum & ceram iniice, rursusque ad
lentum ignem decoque: postquā verò in-
iecta fuerint liquefacta, thus, & terram sa-
miam trita, addito, conquassato, & in vi-
treum vas robustū trāsferto, Tenuia enim
rumpuntur. Vsus autem tēpore affectos lo-
cos circunlinens & diligenter conficans,
abluere iube. præstaret quidem in balneo
id facere, quod si fieri nequeat, in domo ab-
luatur. Cōmodum est pharmacū ad omnes
sordes, asperitatemque ac scabiem cutis,
item

itemq; ad lichenas. Aliud, Fecis vini vstæ
lib. 1. aqua pluuiæ sextarios 6. thuris albi lib.
2. mastiches li. 2. alcyonij lib. * 1. ammoniaci * Aliàs 2.
thymiamatis lib. 2. terræ samiae lib. 2. olei ro
facei lib. 2. ceræ Tyrrhenicæ albæ lib. 2. fecē
in aqua vt dictum est macerato, ter singulis
diebus cum ferula strenue agitando. Deinde
excolatum per saccum liquorem in vas stan
no oblitum transferto, positumq; ad ignem
ad dimidiam partem coquito, deinde lique
scibilia adicito, atque vbi dissoluta fuerint,
alchyonium tenuissimè tritum infarcito. Ha
beas autem ad manum prompta, in fecis a
qua dissoluta, probeq; trita, thus, ammo
niacum, mastichen, terram samiam, eaq; stri
gmentitia prædita crassitudine, reliquis in
farcito ac diligenter conquassato, & ablatis
vtitor. Aliud Diasmyrnum appellatum.
Fecis vstæ libr. vigintiquatuor aquæ
pluuiæ sextarios quadraginta octo, olei
Sabini lib. quatuor ceræ lib. quatuor terræ
samiae lib. duas thuris lib. duas mastiches lib.
vnā * ammoniaci Thymiamatis lib. vnā * Alcyonij
myrrhæ drachm. octo. Composito ac vti- libr. 1. sic
tor vt dictum est. vet. cod.

*Que Cleopatra in libro de ornatu ad
achor. us scripsit.*

PORRò quæ Cleopatra ad achoras scri
pserit ea deinceps referentur illius ipsius

verbis. Fœno græco tenui cocto, & in betæ
nigræ succo macerato caput eluatur: aut be
tæ decocto, aut terra cimolia in his macera
ta, Post ablutionem verò myrto cum vino
& oleo trita illinatur, superneque betæ folia
imponantur. Aliud ad valde vlceratos.

Cerusæ frictæ drach. 2. thuris drach. 2. sul
phuris drac. 1. trita ex oleo illinito. Aliud,

Quod & ad furfures facit. Nitri, atra
menti sutorij, vtriusq; drachm. 1. terito affu
so oleo & illinito. Aliud ad achoras.

Myrrham & myrti albæ folia viridia vi
no trita illinito. Aut terram cimoliam tor
refactam cum vino nigro illinito. Aut ce
rusæ & plumbaginis æquales partes cum
myrteo tritas illinito. Aut sulphuris viui,
drach. 6. thuris masculi: drachm. 1. aluminis
scissi, staphidis sylvestris, erucæ, spumæ ni
tri, singulo. drac. 1. atramenti sutorij drac. 1.
rutæ ramulos tres, terito aceto moderatè af
fuso, itemque laurino, aut myrteo, aut cro
cino, aut oleo veteri adstillato, quo pinguis
compositio fiat, eãq; vbi prius hoc smegma
affricueris illinito. Smegma, Hyssopi
choënicem. 1. lupinorum choënicas 2. ptisanæ
choënicem 1. fabæ fresæ choënicem 1. radices
cucumeris sylvestris drach. 4. Hæc trita mi
sceto & adfricanda præbeto. Idem & ad le
pram & ad varos facit.

Que

Quae pharmaca Soranus ad achorum scripsit.

QVandoquidem verò & Soranus de achoris, tum in quarto de medicina tum in vnico medendi libro quem Monobibulum inscripsit pharmaca quaedam tradidit, quae etiam nobis per experientiam cōstant, partim quidem proprio, partim verò praeceptorum, aut medicorum amicorū vsu cognita. Quare etiam ea ipsa hic apponemus iuxta ipsius dictionem hoc modo tradita. Vbi multus saniei fluor existat, & vexatio doloris vehementer incumbat, lenticulā coctam tritam cum modico melle cataplasmatim modo imposito. Aut panē cū coriandro, aut plantagine, aut solano, aut seride, aut polygono, aut perditio herba. Soranus quidem igitur velut in implicata affectione eius modi remedia adhibet, iuxta propriā sectam ratiocinatus. Apparent autē reuera cōmoda in principiis & circa generationes communis repellendi ratione. Deinceps verò inquit. Vbi autem exacerbationes remiserint, radendi sunt loci, & fœni græci decocto aut betæ, & similium, ex aqua, non vrina confricandi. Quemadmodum etiā nos prius reprehendimus eos qui per vrinam eiusmodi * mixturas *habet vet.* faciunt. Postea verò pharmaca scribit etiam *cod. id est* nobis, vt dixi, cognita. Plumbaginis, sulphuris viui, æquales partes terito, & affuso *confricationes.*

rosaceo, aut myrteo, aut lentiscino donec strigmentosum reddatur, illinito. Aliud.

Sulphuris viui, spumæ argenti, cerusæ, omnium æquales partes, croci dimidiam, trita cum passo cretico illinito. Aliud, Rutæ leuigatæ, drachm 4. Spumæ argenti drachm. octo aceto & oleo rosaceo ammixto illine.


Aliud. Spumæ argenti drachm. viginti, calcis viuæ, drachm. viginti aceti heminā vnā: terito ac velut liparam aliquam seu pinguem compositionem illinito. Aliud.

Chalcitidis drac. duas, sandaraches drach. quatuor spumæ argenti drach. vnā vino austero & myrteo oleo simul trita illinito. Deinceps verò Soranus aliud fortè pharmacum conscripsit, quod pro suæ sectæ instituto Metasyncriticum, hoc est, quod ex alto euocat humores ac transfert, appellauit: conuenit autem in inueteratis & ægrè cedentibus achoris, ex eiusq; vsu quispiam medicus nobis amicus magnum nomen adeptus est. Olei cedriui sextariū vnum, aceti acris sextarios tres, coquito donec exhalet acetum, deinde ad iice adipis suilli veteris sale seruati lib. duas eoq; liquefacto, ollam ab igne aufero, & nitri triti bessēm, sulphuris viui sexuncem: sandaraches vnciam vnā infarcito. Postquam verò illitum pharmacum exaruerit, in balneo per prædicta sinegmata confri

fricari iube, perq; vinum & oua ac nitrum, & per radicum cucumeris syluestris decoctum, aut fece rhodia, & pumice, cum aqua calida.

Ad psydracia, & achoras, pustulasq; vlcerofas, helcydria Græcis appellatas, & eruptiones in capite.

C A P. I X.



D præscriptas affectiones conuenienti diæta vti oportet, corporisq; ac capitis purgationem adhibere: per pilulas ex aloë, colocynthide & scammonia, ita vt brassicæ succo coactæ ex his pilulæ exhibeantur. Deinde ipsa locali curatione vtendum est, cuius generis est, adiantum cum rosaceo illitum. Aut fœni græci decoctum adfrictum. Aut malua cum farina ordeacea pro cataplasmate imposita. Aut melilotum cum farina fœni græci ex vino impositum & cicerum decocto, ipsumq; cicer coctum impositum, nuces amaræ commansæ & illitæ. Discutit autem maximè & lilij radix affricta, & thus cū vino & aqua, & lupinorum amarorum decoctum affrictum, bulbi cū nitro affricti, thus ex aceto illitum, putamen mali punici cum laurino illitum. Aut anchusæ radicem vstam & tritam cum oleo donec strigmentitiam crassitudinem accipiat, cum pinna illinito, & ægrum iuuabis.

FINIS PRIMILIBRI.

CAPITULA SECVN-
DI LIBRI.

*De omni capitis dolore, dimidiaq; eius
partis affectione vniuersalis doctrina.*

Caput *I.*

De cephalæa capitis dolore antiquo. Ca. II.

*De Hemicrania, hoc est, dimidiæ partis ca
pitis affectione. Cap. III.*

CLAVDII GAL- LENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE

pharmacorum secundum locos,

liber secundus Iano Cor-

nario medico, in-

terprete.

*

De omni capitis dolore, dimidieq; eius par-
tis affectione vniuersalis doctrina.

CAPVT I.



VICVNQVE citra di-
stinctionem indiscrimina-
timq; doloris capitis auxi-
lia scripserunt, maius de-
trimentum, quàm emolu-
mentum his qui eis fidem
habuerunt, attulerunt. Neque enim omnes
ob vnam affectionem caput dolent: sed tum
ipsæ affectiones plures sunt, tum curatio
ipsarum singularum propria existit. Vna
etenim affectio est iuxta intemperiem sim-
plicem citra humorum complexum. Alia iu-
xta humorum qualitatem, velut etiam ter-

tia quæpiam alia iuxta multitudinem tantum ipsorum humorum contingit, Quibus accedit ea quæ fit, quum humores transitus liquorum ac vaporum obturarint. Et ad hæc alia est, quum in quibusdam capitis partibus, propter imbecillitatem, flatuosus spiritus innascitur. Quandoque etiam ob causam aliquam externam & laessentem, procatarcticen Græci appellant, velut est ardor, frigiditas, ebrietas, plaga, capitis dolor contingit. Vehementissimi igitur capitis dolores fiunt iuxta caliditatem & frigiditatem, maximè quum inæquales existunt. Moderati verò iuxta siccitatem, Ad humiditates verò nullus consequitur dolor. Eodem modo quum ob redundantes humores siue iuxta omnes capitis partes, siue iuxta vnam quancunque tandem, siue duas, dolor contingit, vehementior quidem ob calidos & frigidos, Moderatior autem ob resiccantes citra caliditatem aut frigiditatem manifestantur oboritur. Humectantes verò penitus nullum dolorem inducunt, quantum ad qualitatem ipsorum attinet, ob multitudinem sanè instrumentalium partium morbos faciunt, non tamen similiarium partium vllum aliquem, in quibus solùm affectiones iuxta intemperiem simplicem fiunt. At verò affectiones ob humorum multitudinem, citra qui

quidem obturationem, caput grauant: cum obturatione verò, si quidem ea moderata fuerit, moderatæ dolorosæ, sin fortis, fortiter contingunt. Quod si etiam mordacem qualitatem humorum multitudo completur, etiam iuxta hanc dolorem augebit. Atque hæc quidem differentiæ sunt affectionum, quantum ad causas attinet eas producentes. Aliæ verò sunt iuxta affectarum partium naturam. Aliquando enim extra caluariam affectio est, aliquando intra. Et quandoque quidem omnium exteriorum aut interiorum est, quandoque non omnium, sed vnius tantum corporum generis, Arteriarum videlicet, aut venarum, aut neruorum, aut membranarum, aut cutis, aut ipsius adeò cerebri. Itaque difficillimum est affectum cognoscere locum, siue vnus, siue plures vno existant, aut qui tandem hi ipsi extent: nec verò affectionem inuenire promptum est, sed hoc exercitato homine indiget, qui tum per rationis exercitium, tum per multam & assiduam affectionis ægrorum inspectionem, eam cognoscat. Proprietates enim aliquæ quidem omnino dici non possunt, quædam verò ægrè circa ægrotantia corpora ostendi possunt, utpote quæ tantum his qui eas sæpe viderunt cognobiles existant. Nō parum verò ad affectionis cognitionem fa-

ciunt quædam ex causis laceſſentibus & externis, quæ priuatim procatactica medicis Græcis vocantur, velut quum manifestus ſensus & offeſſa ægros ardoris aut frigoris contingit: & facile ſanè eiufmodi affectiones recentes ſanantur: probeq; & ritè ab eis initium ſumpſerunt medici, qui præſidia ac auxilia morborum cum diſtinctionibus deſcripſerūt. Multa quidem igitur à vetuſtioribus pharmaca ſimplicia & compoſita ad huiufmodi affectiones deſcripta ſunt: Mihi verò etiam hic ſatis erit ex recentioribus apponere, qui ſanè tum ea quæ veteres inuenire conſcripſerunt, tum ipſi etiam alia quædam addiderunt. Et quidem vniuerſum curationis ſcopum ſingularum affectionū ratio nos docet, At verò materiæ facultates experientia ipſa demonſtrat. Per hanc igitur auxiliorum copia progreſſu temporis augetur, Atque adeò nunc tempus adest ſermoni, propria auxilia iuxta ſingulas affectiones deſcribendi, Initium ab his quæ ſecundum qualitates ſola à naturali cuiusque particulæ ſtatu diſceſſerunt, facturo.

Quæ Apollonius ad capitis, propter ardorem, dolorem conſcripſit.

Apollonius igitur in primo de parabilibus ad capitis dolorem propter ardore

dorem sic scripsit: Rosaceo assidue caput irrigato. Aut lanam siue linteolum rosaceo tingito & imposito. Aliud, Narcissino vngento similiter vtitor. Aliud

Melino vngento eodem modo vtitor.

Aliud, Aut mori succo per linteolum expresso, cum pari rosaceo vtitor. Aliud,

Portulacæ folia tusa, per se, & cum polente flore imposito. Aliud, Cupressi, **Πικραλῶν* folia trita per se & cum polentæ flore imposito, Aliud, Solanum per se & cum polentæ flore imposito. Aliud, Sesamum *id est, irā* terito & rosaceo adstillato imposito. *vel ama-*

Aliud. Vitis folia cocta trita cum mulsâ *ruletiam,* aqua imposito. Aliud, Folia ricini con- *et fortè* tusa & in octo aquæ heminas coniecta sub *melius, sic* diuo per noctem exponito & cum aqua ca- *vetus in-* put perfundito, & posthæc descripta iam *terpres.*

ante imposito. Aliud, Conyzæ odo- **Εὐπνοῖα* ræ fasciculum decem & sex digitorum, in *interpre-* aquæ heminas octo coniectum sub diuo *vetus vi-* per noctem exponito, & leniter aquam ef- *detur le-* fundito. Vitendum & cibi subtractione, & *gisse id est* ventris euacuatione, somnoque & quiete. *in locis*

Vitanda autem maximè vinum, sol, & bal- *qui perbe-* neum. Amplius autem & **fomenta,* clamor, *ne perspi-* contentio omnisque mentis perturbatio, & *rantur, nō* percussio. **In bona autem animi habitatione* *autem v-* & firmitate degendum. *trā.*

Ad

Ad capitis dolorem ex frigore.

IRino vngēto calido caput rigato, Vtere etiam lanis ac linteolis in eo madefactis.

Aliud, Laurino vngento similiter vtere. Aliud, Farina cocta cum aqua mulsa vtitor. Aliud, Lauri folia tenera cum irino vngento trita capiti infunde. Aliud,

Sampsuco cū vino trita aut rosaceo similiter vtitor. Aliud, Cyperum tusum adipe anserino ammixto, capiti illinito.

Aliud, Cornu cerui exurito, eiusque acetabulo, vinum odoratū dupla mensura ammisceto, terito ac illinito. Aliud, Conuenient & fomenta per spongas calida imbutas & expressas, maximè si lauri folia tenera in aqua fuerint incocta, aut sampsuci, aut cyperi, Et lanarum mollium fasciculi vngento irino & vino rigati, capitiq̃ue circumpositi, Item tegmina, & repor, & ciborum subtractio, ac ventris euacuatio. Amplius autem & somnus & quies, & corporis tranquillitas ac lætitia. Vitanda verò similiter clamor, contentio, vini potus, & frigiditas. Hæc quidem auxilia aduersus capitis dolorem ex ardore obortum Apollonius scripsit. Appellant autem ardorem ex sole æstiuo circa caput factam perseuerantem caliditatem. Omnes enim homines in sole æstiuo diutius versantes capite incalēscunt,

scunt, non tamen omnibus æqualiter cali-
 ditas permanet, sed statim quiescit, quibus-
 dam etiam ante balneū, plerisque verò post
 lotionem: quibuscunque autem permanse-
 rit, affectionem capitis iam* iuxta habitum * Κατὰ
 non simplicem modo cōtactum factam pu- ^{ἔστιν κατὰ}
 tantes, ardorem appellant. Aliquando igi- ^{ῥισιν.}
 tur sola intemperies consistit, affectione cir-
 ca caput calidiore facta: aliquando verò
 etiam humorum aut vaporum multitudo
 ad ipsum caput decurrit: & maximè quum
 redundantia quædam humorū, quam Era-
 sistrati sectatores plethoran, hoc est, pleni-
 tudinem vocant, in toto corpore ober-
 rat, fit autem hæ quatuor humoribus ex
 æquo auctis, aut etiam sanguine solo, Nam
 quum alius quispiam humor redundarit, ve-
 lut est pituita, & flava bilis itemque nigra,
 cuiusmodi auctiōnem siue redundantiam,
 non plenitudinem, neque simpliciter mul-
 titudinem, sed cum appositione, pituitæ,
 aut bilis flauæ, aut nigræ, in corpore factam
 multitudinem dicunt. Cæterum eis qui ex
 ardore caput dolent, cutis tactui aridior ad
 primum contactum apparet oculosque ru-
 bros habent, frigidisque tum perfusionibus,
 tum illitionibus gaudent. Principio igitur
 repulsoria curatione vtendum est, ex refri-
 gerantibus & adstringentibus constante,
 Post

Postea verò mitigatoria & concoctoria
pharmaca ad repulsoria ammiscere oportet.
Deinde etiam ex discussoriis quippiam
addendum, paulatim detractis pharmacis
quæ repellunt. Optima sunt autem censen-
da quæ tenuium partium substantia prædita
adhibentur. Quapropter in principio quidē
melius est rosaceo probè apparato quàm fri-
gidissimo caput perfundere, lanæ fasciculo
in orbem circumposito, iuxta frontem qui-
dem, vbi pilosa eius pars desinit, iuxta vtrun-
que verò eius latus, vbi pili ipsi aures con-
tingunt: & retro in loco post verticem, non
tamen longè inferius. Neque enim faci-
lè exurit capitis ea pars quæ occiput, &
græcis Inion appellatur: neque etiam citra
molestiam, refrigerantia sustinet, propterea
quòd isthic principium medullæ spinalis ex-
istat, ad stipitis modum in multos ramu-
los diuisæ, in sexaginta puto iuxta nu-
merum nervos. At verò regio capitis iu-
xta sinciput, propter laxitatem coarticula-
tionis iuxta coronalem futuram, & ob os-
sium tenuitatem & raritatem, facilè tum ca-
liditatem tum frigilitatem omnium quæ
adhibentur pharmacorum intrò distribuit,
Quare siue refrigerare oporteat ex calidi-
tate ardorem, siue calfacere frigiditatem,
aptissimus est capitis iuxta sinciput locus.

Opti

Optima autem in principio refrigeratio ex rosaceo frigido, æstiuo tempore existente, in quo maximè ardoris affectio oboriri cōsuevit. Dictum autem est mihi de rosaceo iam saepe, quòd optimum ex oleo crudo, quod Omotribes & omphacinon bifariam appellant, citra salis admixtionem confectum, rosis quàm plurimis in eo maceratis præparatum. Sit autem rosaceum non vetus, sed eo ipso anno confectum, siue in vere, siue principio æstatis, Proximum à rosaceo chamæmelinum locum habet, in his corporibus quibus vehementem frigiditatem inducere veremur, qualia sunt fœminarū, & eunuchorum, ac puerorum, & quicunque molli carne præditi albumq; habētes colorem, solis sunt insueti, Mensuram autem tum rosacei tum chamæmelini, quod ad refrigerationem attinget, ex prædictis corporis habitibus, & ex ardoris magnitudine inuenire oportet, considerata simul ægri ætate, & ambientis nos aëris temperie, non minus autem & domo in qua æger decūbit. Refrigerabis autem quæcunque adhibere voles, in aqua vehementer frigida collocata: quæ si nō adsit, niuem vasculo circumpones. Hoc auxilium siue humorum siue vaporum multitudo in caput impetum faciat, præclarè auxiliatur. Repellit enim eos infraque in corpus detrudit, adeò

adeò vt ego in sexcentis hoc medendi modo vsus, nullo alio habuerim opus. Nam & frigidorum fontium multa Romæ vbertas est, & niuis apud nos in Pergamo, & in plurimis Asiæ Græciæque ciuitatibus. At verò in calidis regionibus qualis est Aegyptus, in qua & fontium frigidorum & niuis penuria est, necessarium est præfrigerato rosaceo, per expositionem sub diuum per integram noctem, & per obuersionem ad auræ alicuius afflatum, Ita demum addere ei semper ui succum, aut portulacæ, aut lactucæ, aut psyllij, aut polygoni, Quin et solani aliquando paululum & pampinorū vitis, & vuarum immaturarum. Tales enim sunt adhuc tempore æstatis. A papaueris verò & mandragoræ succo abstinendum, non enim citra damnum refrigerat. vitanda etiam quæ cum refrigeratione manifestè adstringunt: quare si quando necessitas postulet, parum quiddam ex eis ad refrigerantia ammiscere oportet. Propterea sanè & Solani succum, aut nunquam penitus, aut omnino modicè ammiscemus, sic etiam mali punici, & mali cotonei, & mespili. Ad hanc tamen rem maiorum punicorum acidorum succus præstantior est, magis enim refrigerat. Porro quum aliquando ruri degerem nihilque horum ad manum esset, cucurbitæ ramenta

ex

ex succata ad vuc immaturæ succum amini-
 scui. Poterit autem quispiam in tali loco
 etiam seridis succo vti, lactucæq; tum hor-
 tensis, tum sylvestris, quam propriè Thri-
 dacinem Græci appellant: hortensem enim
 Thridacem vocant. Quin & sycomorum
 succus aptus ad refrigerandum. Sint autem
 non valde matura. Quod si calius sit æger,
 aut omnino breues habeat pilos, maxima
 vbertas refrigeratium existit. Quæcunque
 enim ad Erysipelata auxiliaria scimus ex ca-
 taplasmatis & liquidis ceromatis, ea omnia
 ab ardore exustis conueniunt. Cæterùm
 Apollonius Ricini folia tenera tūsa in aquā
 conicere iubet, & deinde per totam noctem
 vasculum in quo cōtinentur sub diuum ex-
 ponere, & postera die vti. Ego quidem igi-
 tur non valde expertus sum ricini faculta-
 tem, verisimile est autem Apollonium qui
 longo tempore in Alexandria vixit, per ma-
 gnā experientiam vim eius cognouisse.
 Atqui oleum ex ricino factum manifestè
 cognoui calidius esse facultate oleo quod
 apud nos est: quare etiam si non præsens sit,
 veteri vtimur. Puto autem & potamoge-
 tonem & Niliacum Stratioten quiddam re-
 frigeratium habere, mirorque eorū Apol-
 lonium nullam mentionem fecisse. Quin &
 Tribolus apud nos, velut etiā Polygonum,

h

quiddam refrigerans habent, tenera videlicet, & nondum dura ac sicca facta. Conyzam autem non solum refrigerare impossibile est, verum & moderatè calfacere potentem noui, & miror sanè cur Apollonius eam inter refrigerantia retulerit. Quod si & ab arboribus & fructicibus auxilia ad caput præter naturam calidius petere oporteat, vitex conuenientior ad hoc existit, & vitis, & lentiscus, & platanus, si quis eorum teneris germinibus acceptis, deinde tritis, ab ipsis succum exprimat. Erasistratus verò magnum quoddam præseruatium in calidis habitibus tradit, quum videlicet eos solem perferre oportet, Si spongiam latam & densam ac cauam in aqua madefactam, & probè expressam capiti imponas. Porro signa dolentium caput ob frigiditatem, contraria sunt eis quæ ex ardore oboriuntur: Nam & incontracta minimeque arefacta, & decolor ipsorum facies existit, & frigidis neque gaudent, neque ab eis iuuantur. Quemadmodum autem ardor non ægre solubilis affectio est: Ita neque frigiditas ex ambiente nos aëre contracta difficulter curatur si recens est, sed sufficit oleum rutaceum calidum, sincipiti vt dictum est affusum, perfecte hominem liberare. Si verò vehemētiori calfactione opus sit, Euphorbium ad oleum
con

coniiciatur, & quaecunque ex pipere phar-
 maca constant. Inungenda autem est facies
 * & nares hisce vngentis, maximè quidem
 irino & amaracino, & nardino. *Quin & * cō- * Et au-*
 ptoria vngenta ex calfacientium numero *res vetu.*
 existunt, atque adeò ipsa opulentarū fœmi- *cod.*
 narum pretiosa vngenta, quæ foliata & spica * *Cōmage*
 ta Romæ appellant. Opobalsamum verò se- *num hic*
 pe experti sumus, nullum manifestum com- *habet vet.*
 modum ad vllam aliquam affectionem cal- *cod. & lō-*
 factione indigentem conferre. Quemadmo *gè melius.*
 dum autem rutaceum conuenire dixi, Sic
 etiam sampsuchinū & laurinū laudo, itē quæ
 serpyllinum, sæpe & in plerisque ipsis vsus.
 Dandum etiam vinum tenuium partium, &
 motus corporis præcipiendus, lauacraq; ca-
 lida, & quando que à raphano vomitus.

*De inueteratis capitis affectionibus
 calidis & frigidis.*

IN inueteratis capitis doloribus ac affe-
 ctionibus necessariò pilos radimus, aut
 valde ad ipsam vsq; cutē præsecamus, phar-
 macaq; tum emplastrorū ac ceratorum for-
 ma, tum etiam liquida adhibemus: atque ea
 quidem quæ emplastrorum ac ceratorū for-
 mam habent, rasīs penitus adhibemus, liqui-
 da vero his qui breuissime præfectos pi-
 los habent. Est autem & horum materia
 multiformis, quod partim quidem magis,

partim verò minus refrigerantque & cal-
faciant. Ea igitur quæ frigefaciunt ex his
quæ erysipelata curant transferenda sunt,
calfacientia verò ex pharmacis calfactoriis
componenda. Quorum simplicissimum est
ex euphorbio præparatum. Sufficit autem
vnciam euphorbij vnam, ad tres ceræ lique-
factæ in olei libra vna conicere. Utendum
autem oleo ad omnes affectiones calefa-
ctione opus habentes, neque omphacino,
neque eo quod vulgò ab omnibus hispa-
num appellatur, neque omnino eo quod
cum olearum germinibus præparatur. Sed
eo quod ex maturis oliuis conficitur apud
plerasque gentes citra germinum iniectionem.
Optimum autem ex eis quæ ego noui,
est sabinum, non procul ab vrbe Roma in
Sabinorum regione prognatum. Ceterùm
pharmaca quæ recentiores medici seipsos
Methodicos appellantes, Metasyncritica,
hoc est, ex alto euocantia ac transferentia
appellant, ea omnia ad huiusmodi affectio-
nes commoda existunt, ex quibus optima
in septimo libro huiusmodi tractationis,
quæ ante hanc à me edita est, relata sunt.
Tempus igitur iam est me ad aliam capitis
transire affectionem, adscripturum primò
quæ ab Appollonio conscripta sunt, quæ
iuxta illius dictionem hoc modo habent.

Que

*Quæ Apollonius ad capitis dolorem, ex
ebrietate & meri potu, scripsit.*

VTendum est omnibus descriptis auxi-
liis ad dolorē capitis ab ardore obor-
tum. Quod si dolores amplius inualescant,
rutæ folia cum aceto & rosaceo trita strig-
menti crassitudine capiti illinenda. Aliud,

Nuces amaras cum aceto & rosaceo ad
strigmentitiam spissitudinem tritas capiti
illinito. Aliud, Iridem siccam ac viti-

cem* aridum cum aceto & rosaceo, eodem * *Viridē*
adhibe modo. Aliud, Lauri baccam & *habet cod.*
rutæ folia cum aceto & rosaceo trita adhibe *vet. & sic*
to. Conueniet autem somnus, fames, quies, *interpre*
corporis tranquillitas. In potu aqua calida, *vet. legit.*
aqua mulsa, & euacuatio. Hæc quidē Apol-

lonius scripsit, atq; huius rei gratia laudare
virum decet, quòd cum discrimine de vno-
quoque auxilio scripsit, quum neque Archi-
genes idipsum fecerit, quem quum poste-
rior Apollonio natu sit, apponere quidpiã
ad discriminum certitudinem oportebat:
verum quæ ipse in priore de pharmacis li-
bro conscripsit, paulo post referentur. At
verò quæ ego per longam experientiam de
capitis dolore ex vini potu cognoui, iam
exponam, utpote qui spei quidem utilitatis
ipsorū ex affectione inueni, diligētē autem
cōprobationem per multā experiētiā feci.

Capitis itaque dolorem ex vinorum tempera-
 ratura calidorum productum indicat, quod
 ipsum caput omnino vaporibus repletur,
 quandoque etiam humoribus calida tempe-
 rie præditis. Nam & citra vini potum eius-
 modi ad caput promptè deferuntur. Cura-
 tione itaque opus est, quæ scopum primum
 vniuersalem & communem omnibus ha-
 beat, nimirum euacuatione indigentem. Quum
 verò calidi sint qui caput repleuerunt humo-
 res, etiam refrigerante eos medela opus erit.
 Iubendi igitur sunt, si crudum adhuc in eis
 vinum permaneat, vt tepida aqua hausta vo-
 mant: quod si etiam post concoctionem ca-
 put doleant, refrigerantibus vtendum est ac
 repellentibus, Quale est rosaceum per se &
 cum aceto, aut hederæ aut brassicæ succo.
 Quin & ipsa brassicæ folia calida macerata,
 capitique circumposita ac obligata, natura-
 liter ebrietati resistunt. Cæterum somni ac
 quietis cura imprimis habenda est: quod vbi
 factum fuerit per totum diem, ad vespere-
 ram lotum, boni succi cibis, non tamen
 calfacientibus nutrire oportet. Sunt au-
 tem tales ptisanæ succus, & sorbitio ex ali-
 ca, & panis ex aqua, & oua sorbilia absque
 garo: ammisceatur autem, eis ex melle quan-
 tum ad edulcandum satis fuerit. Si verò ad
 mel accipiendum non fuerint appositæ, sales
 aro

aromatum condimentis ad saporem edulcati, pro eo addantur. Ex oleribus est lactuca, vt pote boni succi & refrigeratoria, & brassica, vt quæ vapores resiccet. Sic & ex leguminibus lēs est. Potu verò omnino aqua vtendum est, at verò quum stomachus in quibusdam propter aquæ potum subuertatur, Malum punicum eis insuper exhibendum est aut solum per se, aut cū alica flaccida calida, probè cocta, Quin & mala cestiana appellata in vrbe Romana, citra cocturā quidem sunt austera, post cocturā verò stomacho commoda fiunt. Coquenda autem sunt ipsa in ollam nouā aqua calida infusa, deinde malo in olla suspensio, igneque sub ollam coniecto, quo vapor ex aqua calidus sublatus cocturam ipsi malo præbeat. Vuæ passæ etiam & pira, aliqua quidē cruda, aliqua verò vt malum ipsum cocta, stomachū corroborant. Abstinentium verò à glandibus palmarum proprietatem enim quandam habent capitis dolorem inducendi. Quod si verò post hæc probè dormire non possint, ad balneum postride quā celerrimè inducantur, calidaque aqua eis in balneo sape affundatur, deinde vbi dormierint aut omnino interposito tempore quieuerint, rursus ad balneum ducendi sunt, deinde veluti pridie connutriendi.

Si verò moderatè habeant, & aquam bibe-
 re non possint, permittendus est eis potus di-
 lutus ex vinis aquosis, quale est in Italia Sa-
 binum. In Asia Titacazenum, & arsyenium,
 & Aruisium. Quin & moderate habenti-
 bus gallorum testiculi, & alæ, & ex pisci-
 bus petrosi, & teneris carnibus præditi ex-
 hibebuntur, & columbarū pulli. Hæc verò
 omnia citra garum & vinum, in albis ac sim-
 plicibus iunculis coquantur, In quibus aqua
 sola cum oleo, & anetho, ac modico por-
 ro, cocturam perficiat, modico adiecto sa-
 le, non statim in principio cocturæ, sed quū
 iam aliquo modo flaccida facta fuerint ac
 victa. Manifestum verò quod tum hoc tū
 omnes qui caput dolent, augescēte adhuc
 & vigente dolore, quiescere melius est. re-
 mittenti verò ac decrescēte, in locis aptis
 deambulare, Apti sunt autem his qui calferi
 opus habent loci calidiores, qui frigeri,
 frigidiores, Et antè cibum quidem pluri-
 bus deambulationibus vtendum, post ac-
 ceptum verò cibum breuibus & lentis.
 Oportet autē neque multa comedere, neq;
 statim deambulare, sed post duas aut tres
 aut etiam plures horas. Quòd si quando ex
 vaporibus & humoribus in caput sublatis
 reliquæ quædā relinquuntur tenuibus po-
 ris ac meatibus impactæ, & ob id etiam ca-
 pitis

pitis dolor perseueret, à rosaceo quidã abstinere expedit, Vtendum est autem primũ quidem chamæmelino moderatè calido, postea verò irino: maximo pere enim huiusmodi affectiones iuuant. In balneo vero caput calida perfundatur, non solum ob id vt quippiam circa ipsum discutiatur, sed & somni conciliandi gratia, quapropter etiam secundum, aut tertium etiam, ad vesperam balneum apparandum est, acceptis ab eo lactucis ex aceto, modico aut omnino nullo addito garo, verũ aqua affusa multa, vt acetum planè exæquet, nisi omnino aquosum sit acetum, nam & huiusmodi magis quàm acerrimo opus habet. Caliditatem enim in se aliquam tale acetum complectitur. Post hæc verò postera die, quæ magis caput calfaciant adhibenda, Ita vt ad irinum aliquãdo Amaracinũ vngētum addamus, aliquãdo verò Nardinũ. Quandoque etiam preciosa, quibus opulentæ fœminæ etiam si nihil habeant mali, vt consueuerunt. Per huiusmodi sanè medicationis ductum, capitis dolores ex vini potu obortos in totũ persanauimus, nullo ab Appollonio præscripto pharmaco vsus. Quũ enim per ea quæ iam dixi scopum contingerẽ, in nullo ab Appollonio scriptorum spem aliquam posui, tanquam ritè ac probè ab ipso relata essent, &

superuacaneum amplius erat eorum exper-
mentum facere. Caterum post prædictas
tres affectiones capitis dolorem inducentes,
Apollonius quartam hanc insuper addidit.

*Ad dolorem capitis ex plaga aut ca-
su. Apollonij.*

Rofaceo & aceto tepesactis caput ri-
gato. Aliud, Rosis siccis maxi-
mè coctis, aut certè in passio maceratis, aut
aqua mulsa tritis pro cataplasmate vtitor.
Aliud, Meliloto similiter apparato vti-
tor. Aliud, Myrti albæ folia tenera cū
vino & myrrha trita imponito. Aliud,
Irino vngento & aceto illinito. Aliud,
Absinthium tritum cum vino & myrrha
itidem trita imponito. Aliud. Pulegio
trita ex vino similiter vtitor. Aliud. Pu-
legium & myrrham trita similiter adhibe-
to, Aliud, Apii comas cum vino coctas
ac tritas imponito. Aliud, Mala coto-
nea cocta ex vino imponito. Cōueniēt &
fomenta per spongiæ aqua calida imbutas,
Et mollium lanarum fasciculi aceto & ro-
faceo conspersi. Ad hæc & quies, & cor-
poris tranquillitas. Subtractio cibi, euacua-
tio, fuga eorū quæ offendere possunt, qua-
lia sunt, sol, balneum, vini potus, clamor,
contentio, & ex his quæ alimenti loco ex-
hiben

hibentur, acida & acria ac salsa. Hæc quidem Apollonius scripsit de capitis doloribus ex conspicua plaga obortis. Verùm operæ prætium est nosse nos, eiusmodi affectionem nullā aliam quā inflammationem esse, quæ non explaga solū aut casu, sed citra etiam manifestam causam, iuxta omnes corporis partes, propter humorū influxionem fieri consuevit. Siquidem igitur plaga vulneris aut contusionis causa existat, plures scopi erunt ad remediōrū inuentionem. Vnus quidem in vulnere, ad quod conglutinantibus & inflammationē arcentibus pharmacis vti oportet, postquam vlceris labia fibulis impositis constrinxerimus. Alter verò in contusione, & tertius in doloribus, qui quandoque in ipsis solis percussis partibus fiunt, plerunque verò etiam ad vicinas partes extenduntur. Etenim pellicula quæ caluariam ambit, & cutis quæ forinsecus circumtenditur, vtraque propriam substantiam continuam habet per omne caput extensam: & ob id sanè sæpe caput ipsum vniuersum dolere contingit, præsertim si vsque ad pelliculā os caluæ ambiētem plaga penetret, quam diducta pellicula caluariam ambiente, osseque conscalpto, iuxta concarnationis modum curare oportet. Quod si per cōmunionem membranæ

cal

caluam ambientis, quam ad duram cerebri membranam circa suturas habet, etiā intra caluariā inflammatio ipsa distribuatur, non absq; periculo eiusmodi capiti dolor existit. Contingit autē non parum sæpe in casu præsertim ex sublimi factō, vt quædam circa cerebrum aut membranas eius, partes, abrumpantur: quod vbi cōtingit, etiam amplius capitis dolor inualescit, ipsa que affectio tota ægre curabilis redditur, & periculum ingens ac præceps imminet. Optimum itaque fuerit in his, nisi ætas prohibeat, & nisi vitalis facultas debilis appareat, à venæ sectione curationis initium facere, & convenientibus capitis irrigationibus subinde vti, ex lana nimirum oleo dulci imbuta, capite que ex ea contacto. Quod si quippiam horum, siue ætas, siue virium debilitas, aut etiam ambo simul, sanguinis detractionem fieri præpediant, aluum per clysterē euacuabimus, tum vt superflua in ipso recrementa extrahamus, tum vt humores qui ad affectas partes inde ferri consueuerunt reuellamus, atque inde auxiliis ad inflammationes commodis vtemur. Si verò membrana cerebri fuerit vulnerata, egregiē ipsam conglutinat, inquit Archigenes, calaminthæ succus infusus, & farina milii arida inspersa. Deinde butyrum & rosaceum, ac adeps
suillus

suillus ifulsus vetus, tepefacta ac mixtim in-
fusa. Caterùm hoc modo affectos à vino
& cibis crassioribus abstinere oportet, ma-
ximè si febris sint correpti. Atqui prædi-
ctam euacuationem consulit etiam Apol-
lonius, qualem autem fieri oporteat non
ostendit. At verò acetum rosaceo ammisce-
ri iubet, quemadmodum in phreniticis &
letargicis in principio plurimi medici facere
consueuerunt, verùm non rectè mensuram
vtriusque dicere reliquit, Empiricorum si-
mili transiitione vsus, nō indicatione dog-
maticorum. Affectio enim ipsa nobis in-
dicat auxilia, Quantitatem autem singulo-
rum, & particularem materiarum differen-
tiam simul tum affecta particula, tum a gri
temperamentum indicat. Et ad hæc vitalis
facultas, deinde ætas, & ambientis nos aëris
temperatura, iuxta regiones, anni que tem-
pora, & prædominantem anni constitutio-
nem euarians. In phreniticis quidem igitur,
quum omnia quæ* intra caluariam, circaq; * *Extra*
cutem & pelliculam caluariam ambientem *legendum*
ab affectione immunia sint veteres conue- *est, vt vet.*
nienter acceptū ammiscuerūt: ea ratiōe per- *codi.*
suasi, quam in cōmentariis de pharmacorū * *Sic ha-*
compositione per longū recensui: quando *bet vetu.*
videlicet ad affectiones in profundo cer- *cod. & re*
poris obortas, pharmaca * diuersa ab his *est.*
quæ

quæ ad affectiones in superficie hærentes destinata sunt, adhiberi oportere dixi. Exoluitur enim omnium ipsorum vis in transitione per profundum, & ob id ad propria affectioni auxilia, aliquando contrariæ & nocentis facultatis pharmaca ammiscemus. Quum nanque inflammatio dolorem inducat, maximè contrarium est acetum reliquis auxiliis ammiscere, ut pote quod neque mitigandi neque laxandi vim aliquam in se complectatur, Sed quum per sinciput, (neque enim per aliam quampiam capitis partem transitus patet) pharmaci facultatem intra penetrare velimus, tunc sanè ad ammixtionem alicuius eorum quæ propria natura auxiliantur ac in profundum ducunt, devenimus: tenuium partium substantiam quandam inuenientes, quâdoque quidem frigidam, velut acetum: quandoque verò calidam, velut euphorbium, affectione quæ curationi subiacet considerata ac perspecta, num calfacientibus opus habeat an refrigerantibus. Iuxta hanc igitur ratiocinationem, si quidem crassæ cerebri membranæ nudæ rosaceum offeratur, quemadmodum in his quibus capitis ossiculum aliquod excisum est fieri consuevit, solum ipsum leniter tepescitum adhibemus. Quum verò citra de-

nuda

nudationem, per capitis iuxta sinciput par-
 tem, sana & integra existente caluaria, rosa-
 ceum ad cerebri membranam peruenire ve-
 limus, acetum ei vt eò perducatur ammisce-
 mus, Cuius item rursus vehemens facultas
 tum per viarum transicionem, tum per ro-
 sacci mixturam exoluitur. Quapropter
 Apollonius in eo quod acetum rosaceo in-
 definite ammiscere iussit, peccauit. Cutis
 enim capitis aut quæ post eam est membra-
 næ caluariam ambientis inflammationes,
 citra quidem vehementem dolorem obor-
 ta, per modici sanè aceti ad rosaceum am-
 mixtionem iuuari possunt: lædentur autem
 vbi magna fuerint doloremque vehemen-
 tem induxerint. Deliquit amplius Apollo-
 nius, quod neque tempus vsus singulorum
 ab eo descriptorum auxiliorum apposuit,
 Quædam enim incipientibus & nascenti-
 bus adhuc inflammationibus auxiliantur,
 Quædam etiam in vigore consistentibus
 aut decrescantibus, aut etiã induratis opem
 ferunt. Rosaceum itaque cum aceto inci-
 pientibus. In vigore verò consistentibus,
 rosaceum solùm adhibemus, Quemad-
 modum etiam in induratis absinthiumq; ac
 pulegium ei ammiscemus. At verò quæ ci-
 tra indurationem decrescunt inflammatio-
 nes pharmacis laxantibus appellatis solùm
 opus

opus habet. Relata est autem tum materia; tum compositio ipsorum in prioribus huiusmodi tractationis commentariis quos edidimus antequam hoc opus sumus aggressi: * Sic enim *fi:* * quibus etiam ostendimus quod affecti-
dauiimus loci multam indicationem faciunt simul cum
bunc locum ipsis affectionibus ad inuentionem reme-
ex vet. co diorum. Quum igitur affectiones ab-
dice. Appollonio descriptae quatuor sint, quae ca-
 pitis dolorem faciunt, ob manifestas cau-
 sas obortae: deinde verò ex ordine transie-
 rit ad eas quae ex obscuris causis producun-
 tur: meritò sanè quis ipsum reprehenderit:
 non solum quòd à dogmatica descuerit
 doctrina, sed quòd neque Empirica sit
 usus. Distingunt enim etiam hi affectio-
 nes per symptomatum concursus syndro-
 mas ab ipsis appellatos, qui sanè accessio-
 num ad morbos ipsos congregationes
 sunt, quae omnibus euidenter apparent: in
 quibus concursibus etiam externas & la-
 cessentes causas ipsi comprehendunt, tan-
 quam partes totius concursus existant. Ve-
 rùm nullam talem congregationem, neque
 symptomatum siue accessionum, neque si-
 gnorum Apollonius scripsit, quemadmo-
 dum discemus ubi & ad sequentem viri do-
 ctrinam nò minus quàm ad priorem animù
 adhibebimus.

Con

*Condependens ex precedenti Apollonij doctrina,
ad temporum ac totius capitis dolores, ci-
tra manifestas causas abortos.*

Vngento Mendefio caput illine. Aliud, Adipem anserinum Mendefio vngento dilutum illine. Aliud, Myrrham vino quàm optimo tritam, & ad succi ptisanæ crassitudinem redactam illine. Aliud, Myrrham vngento pretiosissimo tritam similiter adhibe. In pueris autem sinciput dolentibus, myrrha cum oleo trita vtitor. Aliud, Viticis sementritum & aqua dilutum imponito, aut linteolo illitum similiter imponito. Aliud, Lolii farinam cum adipe anserino contritam pro cataplasmate imponito, adipe prius liquefacto. Aliud, Portulacam per se & cum lini semine tritam imponito. Aliud, Oleæ folia tenerrima oleo ac vino nigro affuso terito ac imponito. Aliud, Cinerem quencunque habes aceto aut aqua diluito, eoque caput rigato. Aliud, Solanum & terram figulinam trita ac leuigata imponito. Aliud, Halicacabi fructum cum adipe anserino, aut vngento balanino tritum adhibeto. Aliud, Lentisci folia trita ex aqua imponito. Aliud, Blitum tritum ac oleo dilutum adhibeto. Aliud, Ricini semen aqua tritum

imponito. Aliud, Coriandri semen & anethi trita ac melle mixta imponito. Aliud, Melanthium tritum ac oleo dilutum imponito. Aliud, Cuminum & adipem anserinum trita imponito. Aliud, Succum papaueris fabæ ægyptiæ quantitate, & salis partes duas, & pulegii partem vnam, cum aceto & vngento optimo trita illinito. Conuenit item cibum subtrahere, & aluum euacuare, caputque contegere, amplius verò & quiete agere, omnemque motum vitare. Quod igitur Apollonius quemadmodum dixi, indefinite tradendo, hæc remedia ad capitis dolores, dupliciter peccarit, neque vt dogmaticus vir affectiones explicans, neque vt Empiricus earum concursus, id ipsum ex illius ipsius dictione didicimus, Quod verò & pharmacorum facultates inter se non parum differant, ex tota virium ipsorum perpenſione discere licet. Etenim primum ab eo descriptum simplicis est potentia laxantis. Talis enim est Mendesij vngenti facultas, Secundum verò eandem vim intense possidet, in quo ad Mendesium vngentum anserinus adeps ammiscetur. Tertium autem propter myrrham quidem resiccatorium est, vnaque calfacit, propter vinum verò adstringit, vtile his existens in quibus

bus redundantem humiditatem simul repellere ac discutere proposuimus. Scimus porrò myrrhæ odorem plurimis etiam sanis dolorē capitis inducere, quare sanè eos ipsos qui iam caput dolent non parū offendet. Eiusdem autem facultatis est & quod sequitur quartū. Quintū verò non propè ad horum vim accedit, vbi scilicet cataplasma ex aqua & viticis semine cōponit, quod non solum ab vtraque facultate tum calefaciendi, tum resiccandi, quibus ea præstāt, quæ ex myrrha composita sunt, multum deficit, sed & contrarium facere potest in his qui caput ob frigiditatem dolēt. Quod verò deinde sequitur ex lolii farina & anserino adipe compositum, in quibus resiccare intendimus vtile est, neque in capite solum, sed & in aliis partibus rationabiliter adhibetur, id ipsum verò ob anserinum adipem citra molestiam resiccantē contingit. Abundè enim pharmacum hoc & mitigat & sedat dolorem. Verū quod deinceps sequitur, de quo hæc verba scripsit: Portulacam perse & cum lini semine tritam imposito, refrigeratorium est pharmacum, præclarè faciens ad affectiones calidas. Quod verò post hoc scriptum est hoc modo: Olea folia tenerrima oleo ac vino nigro affuso terito & imposito, dolorem quidem non mi-

tigat, verum humiditates succorum euacuat. At verò quod deinceps scriptum est forti facultate præstat, in quo videlicet iubet cinerem aceto aut aqua dilui, eoque caputrigari. Si quidem enim ex aceto præparetur inueteratas affectiones & in scirrhum induratas sanare potest, non tamen doloris mitigantium existit. Si verò cum aqua cinis diluatur ac percoletur, fortitudine quidem plurimum ab eo deficiet quod ex aceto constat, neque tamen sic doloris mitigantium erit. Quemadmodum neque id quod postea descriptum est, ex terra figulina & solano compositum. Superfluum autem compositionem. Apollonius in eo quod ex halicacabi fructu constat, ostendit, utpote quod neque prædictis, neque postea dicendis quicquam amplius habeat. Quemadmodum sanè ea quæ deinceps sequuntur singula alia facultate prædita sunt. Non ritè autem fecit hæc omnia indefinitè tradendo, Quid enim simile habet cataplasma ex blito cum oleo trito, ad illud quod ex ricini semine, aut coriandri, aut Melanthii componitur. Calefaciunt enim hæc & resiccant, Blitum verò debiliter humectat & frigefacit. Porro quod in fine sermonis ipsius scriptum est, primum neque ab ullo in usum assumi experiundi gratia consue-

lue

luerim, nedum sæpe. Rarò enim cogimur
 pharmacis ex opio vti, quum videlicet præ
 doloris vehementia homo de vita pericli-
 tatur, quanquam & tunc solidæ partes ex
 eius vsu offendantur, adeò vt post hæc
 correctione opus habeant. Sic & ex opio
 collyria multis detrimento fuerunt, adeò
 vt debilem oculum reddiderint, & visus
 hebetudinem, Amblyopiam Græcis appel-
 latam induxerint: velut etiam auditus gra-
 uitatem inducunt, quæcunque ad vehe-
 mentem aurium dolorem expapaueris suc-
 co composita sunt. At verò ob capitis do-
 lorem vehementem nemo vnquam animi
 deliquio comprehensus mortuus est, neque
 seipsum occidit, quemadmodum quidam
 coli dolore vexati fecerunt. Vtcunque e-
 nim doleant, longè minor ipsorum dolor
 est, quàm eorum qui coli, aut auri, aut ocu-
 li, aut dentis dolore vexantur. Mitigan-
 tur illi ipsi perfusionibus & cataplasmatum
 impositione & illitionibus.

*Quæ Archigenes ad capitis dolorem reme-
 dia conscripsit.*

RElato igitur iam Apollonio, ad Ar-
 chigenem transeamus, qui in priore
 libro de pharmacis secundum genus ei in-
 scripto, hoc modo scripsit. Archigenis

ad capitis dolores citra febrem obortos.

Communitè in principio auxiliatur eis aquæ potus, parcitas cibi, solutio alui. Hæc præfatus deinceps pharmaca multiformia conscribit. Præstabilius igitur mihi videtur singulatim vnaquaque ipsius dictione in manus sumpta, eâ considerare, & primû sanè principium eius collaudare, in quo manifestè discrimen à febris carentia inductû distinxit. Fuit itaque Apollonius non quidem vulgaris medicus, velut & Mantias & Heraclides Empiricus, verûm ad diligentiam quam circa artem fecit, etiam hoc Archigeni accessit, quod posterior natu illis ipsis fuit. Cæterûm maximum hoc censi debet, his qui artem quamcunque tandem rationalem ediscere ritè volunt, quum natura apti ad eam fuerint, ingeniosi quæ & à pueris in primis disciplinis eruditi. Plerique autem ex his qui eiusmodi artes tractant, non ut ipsi sapientes in his euadant, sed ut vulgò tales videantur studio habent. At verò Archigenes ut si quis alius, quæ ad medicam speculationem attinent diligenter ediscere studuit, atque ob id meritò scripta quàm plurima memorabilia reliquit. Non tamen in omnibus sanè quæ tradidit irreprehensibilis mihi videtur, verûm velut ipse pleraquæ eorum virorum à quibus adiutus opt

optimus euasit, reprehēdit, sic par est ipsum delinquentem à nobis posteris * redargui. * *iseta-*
 Difficile enim est vt qui homo sit non in *reda ha-*
 multis peccet, quādam videlicet penitus *bet vetus*
 ignorando, quādam verò male iudicando, *cod. sicut*
 & quādam tandē negligentius scriptis tra- *et vet. in*
 dendo, Quemadmodum sanè & nunc mihi *terpres le*
 in distinguendo non febrientes à febrici- *gisse vide*
 tantibus peccasse videtur, quum non om- *tur id est*
 nes eorum qui non febriunt distinctiones examina-
 & discrimina apposuerit. *ri.*

De his qui ex stomacho caput dolent.

STatim igitur primū in his discrimen est doloris capitis ex stomacho producti, Quidam enim etiam si modicus quispiam humor acris in ventre, & praesertim circa os eius congregetur, statim caput dolent, atque ob id si diutius famem tolerant offenduntur. Augetur enim ipsis in ediam ferētibus eiusmodi humorum malitia. Eos igitur qui hoc modo affliguntur sanare oportet, ita vt nihil remediorum capiti adhibeamus, quando quidem neque proprius est hic capiti affectus, sed ab humorum in ventre malignos vapores excitātium in ipsum adscensu affligitur. Quemadmodum alii in suffusorum symptomata ob huiusmodi humores incidunt. Quæ igitur horum erit cura? vt videlicet affligentes in ventre hu-

mores quam celerrimè euacuemus. Euacuatur autem ad vomitum procliuus facilè. ab aquæ potu, Aegrè vomētibus verò difficilius, adeò vt etiā digitorum siue pinnularum immissione venter ad vomitum irritatus, quibusdam nihil amplius effuderit. His igitur conabimur quàm primū cibum boni succi ac stomacho commodū exhibere, si res ita ferat à balneo, si non, ante balneum tantū cibi offeremus, vt ne lædantur inde postea lauantes. * A cœna autem postridiè vestridiè modicum absinthium in potu dabimus, * eoque modo in posterum diætā ipsis constituemus, donec valdè bene concoquētes ipsos videamus, atque tum sanè modicum panem eis præbebitur circa tertiam aut quartā horam, aut paulò prius vel etiā ferius, vt satis amplum spatium ad consuegere sicq; tam balnei horam inter sit. Quicumque vero panē citra obsonium edere non possunt, his oliuas, aut palmulas, aut vuas, aut tale quiddam addemus, per experiētiā cognoscere, ac si scendo quid ex eis præstet, quum aliud alio ipsi nō bene melius sit iuxta naturæ proprietatem. Cæne concocterum ad vitiosorum in ventre humorum redundantiā tum facultatis concoctoriæ nempe pa debilitas, tum oris ventris infirmitas, plurimum conferunt. Quemadmodū etiam senium etc. suum mollicies & ad hæc caput ad eiusmodi

* Aëtius
aliter vi-
detur lege-
re, videli-
cet à cœna
modicū bi-
bant, po-
stridiè ve-
rò.
* In vete-
ri codice
sic legitur
is locus
atque ita
agere sicq;
in poste-
rum diæ-
tam cōsti-
tuere, ac si
ipsi nō be-
ne conco-
querent,
nempe pa-
nem modi-
cum etc.

di humorum vapores suscipiendos aptum, quemadmodum & in quibusdā oculi. Ego quidem igitur sæpe & in multis expertus sum hanc quam narraui, curandi viā ad capitis ex stomacho dolorē commodam. Archigenes verò quum simpliciter ad omnem capitis dolorem citra febrē, cibi parcitatem auxiliarem scribat, palam facit se nihil de eo qui ex bilioso humore oboritur scire. Quod sanè etiam amplius quis crediderit qui postremam eius dictionem legerit, quæ hoc modo habet. Archigenes. In his verò qui ex stomacho caput dolent, flatuoseque distenduntur, acetum in quo papaue- ris capita incocta sint affundito, aut spon- gias eo imbutas imponito. deinde polentā cum menta & aceto fronti pro cataplasma- te imponito. Aut pulegium cū iisdem. Aut solani succum cū rosaceo illinito. Sto- machum equidē os ventris appellat, quum & medici hanc partem ita appellare sint ad- fueti, qui etiam stomachica animi deliquia appellant, & quosdam stomachicos esse di- cunt à quopiam videlicet in eo loco obor- to affectu ita appellantes, velut etiā hepa- ticos ab hepate, & colicos à colo, & nephri- ticos à renibus, & splenicos à splene affe- ctos. Vnam autem ex stomacho affectionē dolorosam scripsit quæ caput occupet, eo-

rum quos ipse flatuose distentos vocavit, quam ex vinilargi potu magis oboriri
 * *δρυμῆς* scio. Qui enim propter * humores caput
χυμῶς. id dolent, mordacem dolorem, non disten-
 est propter dentem percipiunt. Fames igitur in disten-
 acres hu- sionibus commoda est, at non his qui mor-
 mores ve- daces humores in ore ventris habent. Quū
tus codex. itaque hic mordax humor fuerit amarus,
 pallida & flaua bilis appellatur, quæ ob na-
 turalem leuitatem ad ventris os sursum fer-
 tur, quum verò pituitosus, aut acidus, aut
 falsus fuerit, magis in totius ventris spatio
 continetur, quàm quod in ore ipsius firme-
 tur, optimum autem fuerit (quantum sanè
 nunc in his discere licet) in fundo ventris
 ipsum contineri, facile enim relicto ventre
 in intestinum delabitur. Pessima autem fit
 affectio vbi vitiosi humores in ventris tu-
 nicas ineluibiler fuerint imbibiti, Quo-
 rum optimum remedium est ex aloë phar-
 macum, quod aliqui picram, hoc est, amarū,
 aliqui hieram, id est, sacrum ex aloë appel-
 lant: inq; eius compositionem aloës drach-
 mas centum coniiciunt, & sex vnius cuiusq;
 reliquorum, quorum etiam sex numero exi-
 stunt, cinnamomum, spica nardi, xylobal-
 samum, mastiche chia, asarum, crocus. Præ-
 stantius autem fit pharmacum vbi minus
 de aloë additur. Visum nanque mihi est, ni-
 mi

miam eius copiam centum drachmas esse, ad proportionem reliquorum quibus hæc adduntur, quapropter etiam per nonaginta drachmas ipsum composui, & per octuaginta, Quin & per pauciorē aliquando crocum, propterea quod quidam ex eius usu capite lædantur, quod ipsum sæpe ex solo croci odore perpetimur. Quare optima eius fuerit compositio, quæ ex aloës drachmis nonaginta, & croci drach. quinque constat, hæc ego vtor. His verò qui neq; croci odorem citra molestiam ferunt, sed statim capite replentur, ex quatuor croci drachmis pharmacum compono. Cogor autem assidue hoc pharmacum præparare, propterea quod non solum his de quibus iam dixi, sed & suffusorum speciem patientibus, aut etiam alia symptomata ex stomachi affectione habentibus, id ipsum exhibeam, & prætereà his qui aluo adstricta laborant, & mulieribus, quæ non probè purgantur. In quibus maiorem efficaciam habet, ubi aloës drachmæ octuaginta, & croci sex fuerint commissæ, præstat autem & carpesium pro asaro conicere, quâquam etiam vtrisq; coniectis aliquando composuerim. Datur ad summum ex pharmaco hoc drachma vna, cum aquæ calidæ cyathis non pluribus quàm tribus. Minimum verò dimidiū eius
pr

præbetur. Datur & intra hos modos, quantitate iuxta ætatem, corporis magnitudinem, & anni tempus permutata.

*Quæ archigenes cōsequenter ad primam
dictionem scripsit, in quibus est
etiam Galeni censura.*

DE his quidem igitur qui caput ex stomacho dolent hæc suffecerint. Transendum itaque iam ad ea quæ Archigenes post primam dictionem deinceps scripsit, Faciam autem iuxta singula ipsorum cōsimilem expensionem qualem circa primam feci, connectendo ad ipsa propter rerum cōsequentiam etiam vltimam ipsius dictionem, Sed nunc à secunda initium faciam. Archigenis. Irrigationes autem siquidem à frigore aut hyeme patiantur, conueniunt, oleum tepidum. Et, Illitio narium, succus è baccis lauri expressus, aut oleum laurinū, aut vngentū Syriacū, aut cicinū, aut styracinum, aut gleucinum, aut tale aliquod aliud calfactorium. Vt igitur à postremo exordiar, opinor ipsum resinā quæ sua sponte emanat dicere, quæ plurima in Lacedæmone prouenit, & Capnelæon, hoc est, oleum fumosum Ciliciæ, & Amaracinum ac Styracinum in Cyzico, & quod in Perga apparatus irinum. His verò vngentis nares oblinere
ope

operæpretium ducit, quo per odorem ipso-
rum caput calefiat, quod ipsum inde eueni-
re manifestè apparet, adeò vt & idiotæ vul-
gò his vtantur, & maximè eis quæ facilitè
parari possunt. Parabilia autè sunt aliis alia,
quæ videlicet apud singulos redundant.
Et apud nos sanè in Asia agrestibus & ruri-
degentibus hominibus cedrino appellato
vti mos est, & si quando eius inopia sit pis-
selæo, quo nomine id appellant quod ex
oleo & liquida pice constat. Ammiscet autè
tum huic, tum cedrino, oleum aliqui plus,
aliqui minus, in quantum viriū ipforum ve-
hementiam exoluere velint. Vtuntur autè
omnibus quæ dixi & circa caput, & præser-
tim circa sinciput velut dixi. Illinūt & fron-
tem ex eis, & aurium meatus, quidam etiā
vestigia pedū, ac sedem. Cæterum quū Ar-
chigenes succum è baccis lauri expressum
dicit, quod simpliciter laurinum dicatur
ipsum nominare putandū est, velut id quod
oleum ammixtum habet, laurinū oleū ap-
pellatur. Syriacum verò vngentū, eū dice-
re Comageum existimo, quando quidem
id ipsum nobis ex Syria apportatur. Ar-
chigenis. Aestate verò aut vbi aliàs æstuo-
se distenduntur, per acetum & oleum, aut
aquam & rosaceum, Amplius verò & per
polygoni succum, aut portulacæ, aut sola-
ni,

ni, aut aliquo alio ex refrigerantibus irrigato, spongasque posca imbutas capiti imposito. In hoc sanè sermone videbitur fortè quibusdam negligentius legentibus, vnam simplicem affectionem Archigenes curare, verum non ita habet. Ex eo enim quod æstuosè dicit, calidam affectionem indicat: ex eo verò quod addit, distenduntur, affectionem quæ hoc modo à flatu ventoso affligitur ostendit: vt non solum secundum intemperiem mutata sit, sed etiam vaporosi flatus redundantia adsit. In principio itaque in eiusmodi vtriusque affectionibus, refrigerantium auxiliorum facultas apta est, quæ intemperiem calidam refrigeret, & ventosi flatus allationem repellat & retundat. Atque mea quidem opinione præstiterit diligentiores rei inquisitionem facere. Aliquando etenim ex corpore ventosus flatus affertur, quemadmodum in doloribus capitis ex stomacho relatum est. Aliquando verò in ipso capite generatur. Venter namque interdum ægrè solubili modo inflatur. Interdum verò etiam post ipsum sita intestina, quandoque quidem ieiunum, aut tenue intestinum, quandoque etiam colum. Nihil igitur mirum est, neque impossibile, eandem affectionem in quibusdam iuxta caput partibus obortam,

tam, ventosum flatum generare, cuius generationis in locis circa ventrem causam inuenimus, tantā caloris inopiam, vt ex cibis ac potibus vaporosum & ventosum flatum generet, propter infirmitatem verò comprehensiuæ facultatis, interna ita affectarum partium capacitas infletur & expleatur, vt propter expletionem quidem distendatur, propter tensionem verò dolore afficiatur. Inuentum equidem & hoc nobis in commentariis est, in quibus communes & generales dolorum causas considerabamus, quod ob dissolutionem continuitatis simularium partium, dolor oboriatur. Dissoluunt autem ipsam erodentia, dissecantia, distendentia, & vehementer calfacientia ac refrigerantia. Quapropter in doloribus circa caput, agros interrogare consueui, qualisnam eorum qualitas sit, Quidam enim velut erodantur corpora, doloris sensum perceptant. Quidam verò velut distendantur, aut grauentur, aut tundantur, aut solius vehementer inualescentis caliditatis aut frigiditatis. Siquidem enim velut erodantur aut pun-
gantur senserint, vel humorum vel eiusmodi flatus a credo, causa putanda est. Si verò
citra morsum distendantur, repletionem distensarum partiū, vel per ventosum flatum,
vel

vel per multi humoris influxum, causam putabimus. In quo genere & inflammatio & erysipelas existit. Inflammatio quidē ubi inflammata corporis pars multum sanguinem in se continuerit. Erysipelas verò ubi biliosum cōtinuerit humorem. Quod si ex utriusque redundantibus pars aliqua expleatur, aut inflāmatio erysipelata, aut erysipelas inflammatum oborietur. Et ne quis putet nos longum sermonem de vna particula iuxta vnum symptoma affecta facere. Communis enim omnium dolore affectarum ratio est, quam si quis diligenter in articulos digesserit, promptior ac expeditior ad auxiliorum inuentionem, in omni affecta parte fuerit. Artis etenim curandi coniectura in affectionum cognitione maximè consistit. Quæ ubi inuenta fuerint, curationem non coniecturaliter sed scientificè indicant, cum hoc quòd & cognoscere datur, quàm ægrè aliquæ affectiones medelis cedant, in quibus rationaliter iuxta indicationē remediis, utimur etiam si nihil efficere in principio appareāt: atque hoc est quod in aphorismo dictum est, in quo ait, Omnia secundum rationem facienti, si iuxta rationem non succedat, ad alia transeundum non est, sed perseuerandum in eo quod visum est à principio.

Ali

Aliquando enim adeò vehementer in angustis meatuum flatus vaporosus infarcitur, atque eo adhuc magis viscosus aut crassus humor, vt multo tempore opus sit ad curationē. Etenim quæ sic infarta sunt attenuare oportet, meatusque dilatare per quos excernantur, habita simul prouidentia nequid aliud, puta humor aut eiusmodi flatus, amplius influat: & ad hæc corroborandum est affectum membrum, vt neque ipsum ventosum flatum gignat. Qui igitur primi ad eiusmodi affectiones pharmaca composuerunt, meritò varia materia opus habuerunt: si quidem influentem substantiam siue humor, siue vapor fuerit, repellere necessarium existit: impactam verò concoquere & attenuare, eandemque ipsam discutere: atque nihilominus, imò magis circa affectam partem firmitatem inducere, ne videlicet quod influit suscipiat, attenuatum verò excernat, impactumque concoquat & attenuet. Verùm in mixtura pharmacorum hac facultate præditorum, alius alio feliciore coniectura vsus, alius minus, alius magis commodam fecit compositionem. Quapropter velut nostis, ad vos enim sodales loquar quibus maximè hæc scribuntur, Duo omnino vidistis mihi præparata pharmaca eundem

146 DE COMPOSIT. PHARMACO.
effectum promittentia, quandoque etiam
tria & quatuor, & ex horū mixtura in agrē
curabilibus affectionibus à me sæpe quod
oportuit, factum esse. Considero nanque
in quo eorum sit simplex pharmacum am-
plius calfaciens, aut frigefaciens, velut etiā
resiccans, aut humectans, aut tenuium par-
tium, aut crassarum, Deinde contemplans
quid effecerit quod agro iam fuit admotū,
secundum vsum aut per aliud quoddā, aut
per hoc ipsum facio. Sæpe quidem ad aliud
quod idem promittit transeo, aliquādo ve-
rò vtrique committo, ac medium quiddam
ex eis conficio. Talia autem omnia abunde-
à me non vniuersim tantum, sed & particu-
latim in medendi methodo relata sunt, nos-
seque oportet, quod & iam ante dixi, hanc
tractationem illam sequi, & cogor tamen
etiam nunc rursus meminisse, quo magis
ea quæ isthic tradidi assequamini. In præ-
dicta itaq; affectione, calore doloroso præ-
dominante vnā cum flatu ventoso, in prin-
cipio quidem repulsoria curatione vten-
dum est, quæ ex refrigerantium facultate
constat: quod vbi moderatè factum est, ex
mitigatoriis ac concoctoriis quippiam am-
miscere ad repulsoria oportet, Deinde etiā
discussoria addenda, ita vt paulatim repul-
soria pharmaca detrahamus, donec ad con-

tra

trariam mixturam perueniat pharmacum ei quàm à principio habuit, hoc est, vt plurimum quidem discussorium sit & attenuatorium, Minus verò concoctorium & mitigatorium, minimum autem repulforium. Portulacam quidem igitur refrigerantis & aquosæ substantiæ esse didicistis. Minus ea polygonum. In solano autem tantum ammixtum esse crassæ & terreæ, quantum adstrictionis. Acetum verò repulforiam simul & attenuatoriam, imò & discussoriam habet facultatem, vtpote in temperatura à tenuium partium frigiditate exuperatum, quemadmodum exacte serenus aquilonaris aër. Didicistis etiam rosacei facultatem, quod videlicet & repulforium quiddam habeat, habet autem & concoctorium & mitigatorium, & ad hæc etiam discussorium. Meritò igitur Archigenes in prædicta affectione eiusmodi pharmacis utitur, ipsum quidem per se solum acetum neque alibi exhibēs, neque hic, ob facultatis ipsius vehementiam, ammiscet autem ei vel rosaceum vel aquam. Transeamus autem iam ad sequentem Archigenis dictionem. Archigenis. Si verò augeat affectio, perfecta cibi abstinencia congrua est, Deinde venæ sectio è cubito, & alui euocatio per validum clysterem. De his auxiliis dictū à

me prius est, quando Apollonii dicta considerabam, vbi sanè in biliosis causis fami renunciauit, velut etiam venæ sectionem in pueris & senibus ac viribus debilitatis fieri prohibui: laudaui autem euacuationem per clysterem: non solùm propter euacuationē eorum quæ intestinis continentur, sed etiā ob reuulsionem eorum quæ ad caput feruntur: atque ob id probè in his quæ scripsit Archigenes non simpliciter dixit, Euacuatio alui per clysterem, sed addidit validum: multum enim in huiusmodi clysteri situm est, quantum ad reuulsionem attinet, vltra hoc quod nō solū ea quæ circa ventrem & Mesaræum sunt euacuat, sed etiam quæ circa hepatis sima harēt. Archigenes. Irrigationes autem, Ruta cum aceto & oleo trita. Memores affectionis ad quam auxilia scribere proposuit, sic iudicamus vnūquodque eorum quæ recensere cœpit. Affectionem itaque sic scripsit. Aestate verò aut vbi aliàs æstuosè distenduntur. Deinceps verò refrigerantis facultatis auxilia subiecit, & postea inquit. Si verò augeat affectio, perfecta cibi abstinentia, & venæ sectio, & clyster validus adhibeatur: & post hæc propositam conscripsit dictionem, in qua cum aceto & oleo tritam rutam adhibere iussit non apponens an viridem an
ari

aridam velit. Est enim non parua differentia, quum arida multo acrior & calidior, quàm viridis existat. Mihi sanè viridem cōfulere videtur, neque enim aceruatim à refrigerantibus ad contraria transgressus est. Acetum verò ad hoc quòd refrigerat & repellit, discussorium quid habere antea dictum est. Mitigatoria autem & laxatoria facultatis existens oleum meritò ipsis ammiscuit. Alia, Succus à lauri baccis expressus cum aceto & ruta, hac priore longe efficacior existit. Ad succum nanque à lauri baccis expressum fortiter calfacientem, rutam ammiscuit cum aceto, relicto oleo. Alia, Succus radicum iridis cum aceto. Hoc remedium nihil calfactorium habet, melius itaque fuerat ipsum primum in transitu ad præclariora auxilia positum esse. Alia, Salicis folia trita cum aqua. Hoc præscripto ex iride imbecillius est, atq; his quæ omnium primum scripta sunt simile, vt intempestiuè nunc ab eo sit relatum.

Alia, Serpyllum cum aceto & oleo tritum. De aceto & oleo prius dictum est: adiecit autem nunc eis serpyllum acris qualitatis pharmacum, & ob id etiam calfactoria facultatis. Negligenter verò etiam hic reliquit, an viride aut aridum velit: præstiterit autem fortassis viride intelligere.

Alia, Polygonum cum ruta oleo & aceto dilutum. Polygoni succo iuxta primam rationem ut refrigerante usus est, nā & reuera talis existit, Quare etiam ad inueteratos dolores iuxta primum transitum rationabiliter quis eo utetur, ruta ammixta. Animaduersione autem dignum est in singulis contrariæ facultatis pharmacorum mixturis, ut in principio parum ex præstantiore ammisceamus, iuxta secundum verò & tertium usum, copiam augeamus. Alia,

Amygdalæ amaræ delibratæ tritæ cum aceto & oleo irrigationis modo adhibitæ aut cerati crassitudine in linteolo fronti impetitæ. Et hoc ad primum transitum pertinet, didicimus enim discussoriam citra mordacitatem facultatem amygdalas amaras habere. Alia, Ruta sylvestris cum oleo & aceto eodem modo. Inordinatè rursus hoc valde forte pharmacum interposuit, in doloribus multum inueteratis meritò adhibendum. Alia, Populi albæ fructus cum aceto tritus. Discussoriæ facultatis est albæ populi fructus. In quibusdam autem exemplaribus non cum aceto, sed cum posca, scriptum reperitur. Alia, Ocymi semen cum aqua. Ocymi semen calfactoriæ & attenuatoriæ est facultatis, non tamen vehementer, cum aqua autem sola

folia inueterata affectione minime rationabiliter quis eo vtatur, melius enim erat oleum & acetum, velut in aliis dixit, etiam huic ammiscere. Alia, Facit & balsamum peucedanum, castorium, simul & singulatim vnumquodque cum oleo & aceto. Hoc pharmacum rursus vehemens est, maximè quum ipsum peucedanum solum adhibeatur, citra castorii ammixturem. Quid verò balsamum nunc vocet, nō habeo dicere, Num videlicet plantæ semen, aut succum quem opobalsamum vocant, aut ramulos ipsius xylobalsamum appellatos. Melius tamen mihi videtur opobalsamum accipere, quod tenuium partium & discalforiæ substantiæ existit, non tamen manifestè calentis. Alia, Lauri folia, & populi albæ, & viticis cum oleo & aceto. Et hoc pharmacum ex simplicibus facultatibus differentibus composuit. lauri enim folia calidissima, viticis verò modè refrigerantia sunt: in medio vtrorumq; populi folia existunt. Alia, Panacem cum oleo illinito. Nihil hic refrigerantium ammixtum est, & ob id valde inueteratis affectionibus & nihil amplius caliditatis habentibus vtile existit. Quapropter merito quis ipsum reprehenderit citra distinctionem pharmaca auxiliaria cōscribentem.

Panacem verò negligenter nunc ipsum dicere puto, panacis radicem, neque enim opo panacaputandum est ab ipso panacem dictum esse, Differt autem à radice hic non paruo caliditatis excessu. Alia, Viticem aut mentam, amygdalas amaras, iridem, æquali mensura cum aceto & rosaceo mixta adhibeto. Aliorum vires suprà relatæ sunt. Mentæ autem nunc primum mentionem fecit, pharmaci calfactoriæ facultatis. Alia, Aut mororum succo cum aceto ammixto rigato. Hoc pharmacum euidenter apparet refrigerantium medicamentorum generis ab ipso conscriptorum esse, quæ incipiente affectione conueniunt, minimeq; rectè nunc ad pharmaca auctis affectionibus comoda, ammiscuntur. Alia, Inueterata autem affectione pilis denudato, illitionibusq; & rigationibus predictis, crassius tamen apparatus vtitor. Alia, Resinam cum melle temporibus & fronti illine. Aut muscerdas cum aceto & rosaceo. Tertium hoc tempus est & oportunitas in capitis remediis adhibendis. Primum nanque erat incipiente affectione. Secundum verò vt ipse scripsit augescente. Tertium autem hic quum ait inueterata, quod ipsum vehementioribus auxiliis opus habet, quorum aliqua non rectè prioribus ammiscuit.

De

De his qui ob biliosum humorem caput dolent.

Signa in his similia sunt eis quæ ex ardore oboriuntur, accedit his maior morfus & faciei pallor, & aliquando oris amaritudo. Aetati autem vigoris, & temperaturis calidioribus, & vitæ curiosæ, & his qui flauam bilem congregant, hæc affectio præcipuè contingere solet. Itaque balnea temperata, & vnctiones, & potus dilutus eis exhibenda sunt, omnisque diætâ liquidior & boni succi constituenda. Euacuandus item biliosus humor per absinthii cremorem, aut per aloën, & per ipsam picram antidotum per se datam, aut modica addita scāmonia, vel per catapotia ex aloë confecta. Illinenda frons pastillo croceo aut Trigono appellato, aut aliquo alio his consimili.

De dolore capitis per consensum.

Si quidē vniuerso corpori caput per consensum coafficitur, illi prospiciendum, tum intemperiei, tum materiæ prædominanti instando, easque vrgendo. Et si quidem humorum multitudo & maximè circa venas fuerit, venam secabimus. Si verò qualitas magis inualuerit, purgatiuo pharmaco vtemur. Si verò vni alicui parti condoleat, velut hepati, aut ventri, aut stomacho, his ipsis auxiliabimur: calida quidē in ipsis sub-

k s

sistente intemperatura, panem ex vino diluto exhibendo, & sorbitiones ex alica, Et foris irrigationes moderatè refrigerantes & firmitatem addentes, velut antea dictum est. Si verò propter viscosos & crassos in stomacho contentos humores, caput doleant, etiã hos exturbabimus, acetum multum in potu præbendo, tum simplex, tum Iulianicum appellatum. Ex hyssopo etiam ac origano potionibus, & quæ his adhuc fortiores sunt magisque incidendi vi præditæ, utemur, & vomitu à raphanis, irrigationibusque ac cataplasmatibus calidioribus.


De capitis in febribus dolore.

IN doloribus capitis qui in principio cū febribus irruunt, vena secanda est post primã aut secundã remissionẽ, nisi quid impediatur, & præsertim in corporibus bonæ habitudinis & multo sanguine redundantibus. Animaduertendũ autẽ num ob vapores à ventre sublato, aut ob alui suppressionem capitis dolor contingat. Quod si serius post septimum tandẽ irruat diem, alio per clysterem qui aliquid operæpretii faciat præuacuata, cucurbitæ ad occiput siue ceruicem affigantur, caputq; irrigationibus ex oleo mitigetur, rosaceo quidem in calidioribus ac hora æstiva, & cum modico aceto. Chamamelino verò in frigidioribus
habi

habitudinibus ac hyeme, quinta aceti parte
 adiecta. Illinenda frons ex cyphi in frigidio
 ribus, ex crocomagmate in calidioribus.
 Cætero ad capitis dolores ob febris magni
 tudinem obortos, medelæ prescriptæ sunt
 in febrium tractatu. Porrò vitare oportet
 hæc, nō solūm in dolore capitis per consen
 sum stomachi oborto, sed omnibus etiam
 aliis circa caput obortis affectionibus. Sunt
 autem ea quæ sequuntur. Viticis semen, ab
 sinthii succus, lac in potu, glandes quercinæ
 in cibo, oliuæ nigræ, arbuti fructus mæ
 mecylon Græcis appellatus, eruum, quod
 ipsum etiam articulos dissoluit. Amplius
 autē offendunt myrrha, thus, hederæ cacu
 mina. Mentē etiam perturbant lentisci fru
 ctus, crocus, peucedanum, cyclaminus sicca
 cum vino potata, Styrax modicus quidem
 potatus tristitiam vultus discutit, multus
 verò somnos multum turbulentos inducit.

De Cephaleæ capitis dolore antiquo.

C A P V T II.



Ephalæa inueteratus & ægrè ce
 dens capitis dolor appellatur, qui
 ex facili occasione, maximas exa
 cerbationes habet, adeò vt neq;
 strepitus, neq; vocē vehementiorē, neq; lu
 mē splēdidū, neq; vini potū, neq; odoramē
 ta caput replētia tolerare possint, neq; item
 mo

motum, sed in quiete & tenebris ob dolorum magnitudinem decumbere velint, tanquam à malleo enim pertundi sibi videntur. Quidam enim velut contundantur aut distendantur ea quæ circa caput sunt sentiunt: non paucis verò vsque ad oculorū radices dolor progreditur. Habet autem hæc affectio aliquando quidem continuos dolores, aliquando verò exacerbationes & interual-
la siue ordinata, siue inordinata. Intermit-
tunt enim quandoq; eiusmodi exacerbationes, velut in comitiali morbo apprehen-
sis, interceditq; tēpus aliquod quod omni-
no accusari non potest. Manifestum igitur est hanc affectionem consimilem apti-
tudinem capitis vt facilè lædatur, velut in
cephalalgicis habere. Verūm ad maiorem
debilitatem deueniunt in hac affectæ capi-
tis partes, Et quidam ex eis cerebri inuolu-
cra dolitant, quidā verò membranam tan-
tum caluariam ambientem, dolores igitur
cum, grauitate humorum multitudinem si-
gnificant, cum mordacitate verò, aut hu-
morum aut vaporum acredinem, cum pulsu
autem inflammationem: cum tensione ve-
rò, si quidem citra grauitatē & pulsum fiat,
flatus tenuis & ventosi multitudinem de-
monstrant: cum pulsu verò, mēbranosi cor-
poris inflammationē. Si verò cū grauitate
disten

distētio fiat, humorum multitudinem intra membranulas contentam. Et dolores quidem in superficie hærentes, membranæ os caluæ ambientis affectionē significant: qui verò in profundo sunt, cerebri inuolucrorum. Quibuscunq; enim affectio intra caluariam est, his vsq; ad oculorū radices dolores procedunt, propterea quod oculorū tunica ex cerebri inuolucris habeant ortū. Si verò humor putrefactus calidior fiat, tum febris caput dolitant: febricitant autem omnino & qui ex inflammatione dolent. Si quidem igitur humorū aut vaporum multitudinem reppereris causam, si quidem propter totius corporis repletionem facta est, vniuerso corpore euacuato capitis dolorē sanabis. Si verò velut debile existens caput ad se sublato humores ac vapores susceperet, materiam reuellere oportet in totum corpus, atq; ita particulæ mederi. Per clysteres itaque reuulsio fit, & ligaturis extremitatum, & pluribus infernarum partium confriktionibus. Interdum etiā sanguinis excubito detractio. Quod si amplius sanguis redundare videatur, etiam ex naribus aperta vena, & quantum sufficere videtur sanguine euacuato. Deinde hieram dabimus exacutam, & postea apophlegmatismis pituitam detrahētib; & medicamētis quæ
nari

naribus induntur vtendum est, qualia sunt
 quæ ex elaterio & cyclamino cum lacte &
 porro apparantur. Caput autē curabis, quā-
 do quidē reuulforiis vti oportet, per reuul-
 forias irrigationes. Cæterū post totius cor-
 poris euacuationē, iam caput euacuantibus
 vteris, deinde his quæ firmitatem addere
 possunt admotis. Repellit igitur oleū om-
 phacinum, & rosaceū, per se & cum aceto, &
 ex papaueris capitibus, & oleæ teneris ger-
 minibus, & hederæ cacuminibus, ac menta-
 viridi apparatus. Afferantur autem remedia
 repida quidē, vbi frigidior & crudior fue-
 rit humorum multitudo, frigida verò vbi
 calidior & biliosior extiterit. Discutit autē
 oleum dulcissimū calidum, & magis inuete-
 ratum, itemq; sicyoniū. Si verò crassior sit
 humorū multitudo, spondyliū, aut serpil-
 lum, aut pulegii comā aut calaminthen, aut
 mentā oleo incoquendo, multitudinē eua-
 cuabis. Eandē hanc etiā firmitatem parti ad-
 dunt, quapropter vsq; ad perfectā curatio-
 nem eis vti conuenit. Omnium porro longe
 maximè discutit & perfectè corroborat,
 verbenaca recta maximè viridis, Imò &
 arida cum radicibus & simul cum serpyllo,
 oleo incocta. Coniicienda etiā ad ea croco-
 diliadis maximè iuxta aquas nascētis radix.
 Quin & ipsam per se verbenacam si oleo
 inco-

incoheris, caputq; inde rigaueris, omni capitis dolori antiquo ex frigiditate, aut ex transsis humoribus oborto medeberis. Maxime etiam profunt sub aquario vase nascentes aselli, Millepedæ appellati, si oleo concoquantur.

Archigenes de Apophlegmatismi.

Post hæc verò Apophlegmatismi quibus pituita à capite detrahitur, ex siapi aut hyssopo cū passo cocto, aut ex staphide syluestri cū pipere & melle trita, aut ex oleo ammixto melle, aut ex staphide syluestri per se vel cū melle trita, cōueniūt.

Galenus. Pharmacorū quæ pituitā à capite euacuant, & medicis pro more Apophlegmatismi appellantur, materiā postea refectam. Nūc autē tantū ostēdere cōmodū fuit, quòd hocce auxiliū pituita infestāte auxiliare est, quēadmodū sanē & ipsum nomē eius apud Græcos ostendit. Archigenes autem calidā & flatuosam affectionē se curaturum pollicitus est, nō frigidā & pituitosam. Archigenes. Iuuantur autē plurimū lauri, aut rutæ, aut panacis, aut papaueris capitum, aut baccarum lauri decocto perfusi.

Galenus. Fortibus calefacientibus pharmacis, non scio quomodo papaueris capita non instrenue refrigerantia annumerauerit, quū in sermonis cōtextu singulis dictis

ali

aliquem per se uti posse ostenderit, & fortasse etiam aliquando simul mixtis: non tamen manifestum fecerit, num quippiam ex papaveris capitibus ipsis adijciendum sit, quo videlicet aliorum pharmacorum vehementia minuatur & mitigetur: an & solis aliquando utendum sit, quod sanè incipiente & augescente affectione tēpestivius fieret. Inueterata enim affectione non solum non profunt, sed etiam nocentiora capita papaveris existunt. Archigenes. Commodum est & ex salibus fomentum. Galenus. Omnem rationem Archigenes hic confudit, quum fomenti mentionem faciat per pharmacum resiccans quidem non strenue, verum & calfactorium quiddam in se habens. Meminisse enim eum oportebat, quòd quum calidam affectionem curare assumpsisset, aut semper ab illa ipsa indicationem servaret, aut de transmutatione in diuersam speciem quippiam diceret, iuxta quam temporis progressu calore sedato, obturatio, aut intensio, aut tale quiddā accessisset, quod cōtraria curatione indigeat, & non ea quæ in principio fuit determinata. Archigenis. Post perfusiones verò aut fomenta inuantur si lini semen rosaceo infartum adhibeas, & lanas sordidas ex acetoraceo calidas circumponas ac obliges.

Gale

Galenus. Hoc mitigatiuum est auxiliũ, quum vehementer infestat dolor, vnà cum hoc quod & subiectæ cõmodet affectioni.

Quare vbi ad intensum capitis dolorẽ remedia scripsit, isthic prætiterat etiam de hoc fomento mentionem facere, Verũ pro præsenti tẽporis oportunitate, de qua nũc sermo instat, si quis fomētis aut cataplasma- tis vti velit, fomēta ex milio meliora fue- rint. Quẽadmodũ enim Hippo. ait, leue & lene miliũ existit. Sales verò ob grauitatẽ molesti sunt præsertim capiti admoti.

De cataplasmatibus in capitis dolore.

Archigenis.

Cataplasmatibus verò vtere ordeaceacru- da farina quæ iridem contusam habeat ammixtam. Aut rutæ semine eodẽ mo- do. Aut fœniculi radice similiter. Aut cruda ordeacea farina cum aceto mulso ap- parata. Aut polenta & pulegio mixtis.

Galenus, Et hæc cataplasmata ad se- cundam temporis oportunitatem pertinet, quam supra augeſcente capitis dolore con- stituit, nam & hunc mitigant, & affectio- nem iuuant. Archige. Aut Nilei phar- macum castorii & iridis decima parte am- mixta, cũ aceto & rosaceo imposito. Ni- lei quidem igitur pharmacum quod ad em- plastri formam paratum est, iam olim no-

bile & laudatum pharmacum est, & ob id
 omnibus notū. Promittit autem reliquiarū
 inflammationum in præcordiis inueterata-
 rum curationem. Verū eorū quæ ei ammi-
 scentur castorii videlicet & iridis Archige-
 nes obscurè mixtionem conscripsit. Incer-
 tum enim num alterius ipsorum decimam
 Niliaci malagmatis partem esse velit, an
 vtriusq;. Verū mihi præstabilius videtur
 vtriusq; decimam partem ammiscere. Opor-
 tet autem castorium atq; iridem probè tri-
 ta esse, & Nilei pharmaco diligenter emol-
 lito paulatim hæc ammisceri: manibus par-
 tim rosaceo, partim aceto madefactis. Aut
 nuces amaras decorticatas, & rutam, ac pa-
 rum ex iride, cum aceto & rosaceo commit-
 tito, & malagmatis forma imposito. Quū
 eiusmodi multa pharmaca circa secundum
 propositæ affectionis tempus Archigenes
 conscripserit, facultatis ipsorū expositionē
 in illis feci. Aut viticis seminis, perseæ vi-
 ridis foliorū & myrrhæ, æquales partes cū
 vngēto Aegyptio fronti cataplasmatismodo
 imposito. In sola Alexandria perseæ ar-
 borem vidi, & in nulla alia Romanis subdi-
 ta gente. Quidam Persion ipsam appellāt,
 aiuntq; in persis lethalem eius arboris fru-
 ctum esse, qui in Aegyptiorū regione inno-
 cuus existat. At verò Aegyptium vngen-
 tum,

tum, non solum sic, sed & Mēdesium nominatur, Quidam etiam Megaleum vocari aiunt, utroque cognomine à Megalo, qui ipsum composuit accepto: & ab illius quidem proprio nomine in denominatiuorum forma Megaleum, à patria verò ipsius Mēdesium appellari. Est autem laxatorium & sedat dolores. Aut sulphur, castoriū, baccas lauri, æquis portionibus cum cerato rosaceo infarta, temporibus & fronti imposito. Hoc pharmacum multum calfacit, & frigidas affectiones relaxare potest. Aut castoreum & peucedanum pari mensura. Consimilis est & huius pharmaci facultas cum præscripta. Quod si affectio perseveret, venę sectione à naso aut fronte, aut cucurbitis ad occiput affixis utitor. Sanguinis à locis affectis detractiones in affectionibus inueteratis cōuenire omnes ferè medici consentunt, Verùm cucurbitæ ad occiput affixæ, ex reuulsoriis auxiliis sunt, quum humores ad oculos, aut ad anteriore capitis partem ferri consuetos auertere conamur. Aut sternutatorio quopiam concutito, fasciolaq; collo circumposita spiritum cohibere iubeto. Utilitatē ex hoc auxilio indicauit, per verbi cōcutito adiectionem, Quod verò fasciolam collo circūdare iubet, ad vehementiorem affectionem

pertinet. Aut per nares purgato. Hoc præfatus deinceps ea quæ per nares purgāt recēset. De quibus ego sermonem faciam, velut etiā de Apophlegmatismis, vbi pharmacorum quæ capiti adhibentur tractationem absolvero. At verò in vehementer inueteratis sinapi (vt moris est) capiti adhibe & perure. In omnibus plurimum inueteratis affectionibus quum nihil profecerint reliqua auxilia, curationem Metasyncriticam à Methodicis appellatam, omnes ferè adhibere consueuerunt, prioribus medicis haud scio qua ratiocinatione primum ad eius vsum progressis. Ego verò quum intemperies quæpiam humida & rigida, aut per seipsam, in partibus affectis adest, aut propter eiusmodi humorum frigiditatem fuerit oborta, ex sinapi & thapsia ac similibus adhibeo pharma. Calidis verò & siccis non adhibeo. Cæterum hi qui affectiones cognoscere nō possunt, ad eiusmodi pharma velut ad sacram appellatā anchoram confugiunt, & ob id sæpe quod conuenit perficiunt, quod plerosque hominum eiusmodi affectiones propter malam & vitiatam diætā infestent.

Archigenes, De his qui ex ebrietate caput dolent.

IN his qui ebrietate caput dolent, iridem siccā & viticis folia ex aceto & rosaceo adh

adhibe. Aut apii comas coctas in vino impone. Aut pulegium ex vino eodem modo. Aut Mendesium vngentum per se, vel cum anserino adipe irrorat. Aut myrrham cum vino Mendefio impone.

Aut rutæ folia, baccas lauri, viticem, populi albæ fructum, æquali mensura trita, cum aceto & oleo tepefacta irrorat. Caterum Amethista quæ ab ebrietate præseruent, eiusmodi esse poterunt, Absinthium mane ieiunis bibendum præbe. Aut myrti florem & myrrham ac rutam trita ex aqua. De his qui ex ebrietate caput dolent satis dictum à me est quum ea quæ Apollonius ad hanc rem tradidit expèderem. At verò post hanc præscriptâ Archigenis dictionem, alia sequitur de his qui caput ex stomacho dolent, de qua iam dictum est.

*Eiusdem Archigenis amuleta quæ capiti
coronæ modo circumposita & alli-
gata, dolorem eius arcent.*

Q Vandoquidem verò & Amuleta ad dolorē capitis Archigenes scripsit, quæ quidem nullā medicam rationem habent, ea his qui talia per experiētiā cognouerunt, & secūdum mirabilem quandā contrarietatem homini incognitā efficacia esse dicunt relinquam. Quæ verò ab eo iuxta medicā rationem tradita sunt selecta refe-

ram tantum, iuxta illius ipsius dictionem, quemadmodum hactenus de pharmacis facere consueui. Polygoni duos ramulos coronæ modo imposito. Quod polygonum calidis & flatuosis capitis doloribus conveniat, ipse prius dixit, Nihil itaq; miri est in talibus sæpe ipsum iuuisse. Nam propter ardorem & ebrietatem dolores capitis assidue contingunt. At verò quod duos omnino ramulos esse oporteat, ab illis adiectum est qui polygoni utilitatem ex incognita contrarietate, & non ex ipsius temperamento procedere volunt. Aut cichorii quod Romani Intubum olus appellat, ægri capiti imposito, & maximè si ex ardore doleat,

* *Huic lo* re doleat]. Ego verò etiam apponam, *co hæc ad-* si ex ebrietate. Sic enim & rosaceæ coronæ *dēda sunt* iuuant. Eas igitur volenti itidem licebit *ex vetu-* adscribere, numerumq; quemcunq; tandem *sto cod.* velit addere, & ex totidem rosis nexam coronam capiti mederi asseuerare. Deinceps Callitricho coronare caput operæ pretium ducit, quod Trichomanes, inquit, quidam appellant. Ego verò eos qui de herbis scripserunt Adiantum magis appellare Callitrichum scio quàm Trichomanes. Deinde paulo post philanthropo herba coronari iubet, & palmulæ masculæ cortice summo

mo, & post hæc, in hæc verba scribit. Aut
aduersus solē ægrū expositū, donec dolor
quiescat finito. In Amuletorū catalogo
& hoc ab eo relatū est, quod quidem ex frī-
giditate dolens caput iuuare potest, si neq;
humoribus omnibus æqualiter redundet
homo, neque ex cruditate laboret, aut ali-
quē vitiatum humorem in ventre, maximē
circa * cavitatē eius habeat: verūm calidos * *Στόμα*
capitis dolores, ex quorum numero sunt & *habet cod.*
ex ardore ac ebrietate oborti, nō parū læ- *vet. id est*
det. Cōsimilia his deinceps scribēs ad cha- *os & sic*
mæmelum peruenit, cuius experiētiā habet *interpre-*
mus quod capitis dolorem iuuat, si quis eo *vet.*
velut ante dictum est queat vti. Appellat
autem Archigenes Anthemidem hanc her-
bam, quemadmodum alii multi, & ait florē
quidem ipsius tritum, olfactu prodesse, fo-
lia verò summe nocere. Liberat à capitis
dolore verbenaca herba, quam aliqui hie-
ram, id est, sacram vocant, tum coronæ mo-
do circumposita, tū illita ex rosaceo & ace-
to. Hoc auxilium oportebat eum non
nunc inter amuleta, sed prius inter medica-
menta referre, si quidem adeò ei confidit,
per longam experiētiā cognito & pro-
bato. Aut testudinis palustris, quā qui-
dam ammyda, hoc est, lutariā vocant, san-
guinem sincipiti instilla. Et hoc si quidem

verum est, inter pharmaca & cum discrimi-
ne referri conueniebat. Nisi sanè hoc vult
quòd omnem capitis dolorem iuuat, idque
omni temporis occasione. Ita enim & nos
contrarietatis testimonium ei præbebimus,
non efficaciam quam ex temperamento ha-
bet, Absoluto igitur de amuleti sermone,
deinceps hæc scribit.

*Archigenis de fissuris & contusionibus
in capite factis.*

DE vulneribus porrò in capite factis
deinceps dicitur. Parua autem fissura
facta, aliqui myrrham aceto tritam, aut aloë
cum linamentis indunt, glutinaturque; ita &
absque inflammatione mirabiliter adserua-
tur. Cæterum in contusionibus citra dispa-
rationem ac fissuram circa caput factis, po-
lenta imposita commoda est. Amplius verò
& Oesypum, hoc est, lanæ sordes, atque ipsæ
adeò lanæ sordibus sudoris succidæ, eodem
modo. Magis autem propriè similaginem
ex aqua pro cataplasmate impones. Aut
origanum cum polenta. Hæc vtilia iu-
dicata esse quid attinet referre? verum alte-
rius negotii atque operis sunt, nisi fortè quod
ob huiusmodi causam caput dolentibus apta
esse iudicavit ea adscripsisse putandus sit, ut
pote quæ obortas inflammationes curare, aut
easde prohibere possint. Atqui in aliquibus
exem

exemplaribus hæc in totum non habentur, velut in aliis etiam plura his in huncce modum. In mediocribus capitis vulneribus, aut quæ omnino legitimo medico non habent opus, In quibus quidem nuditas per se non adest pilos, rademus, fibulisq; impositis constringemus, ac glutinantibus experimento cognitis vtemur. Egregiæ glutinat vulneratam cerebri membranam, calaminthæ succus infusus, & farina milii arida inspersa, deinde butyro, & rosaceo, ac adipe suillo veteri mixtis ac tepelactis infusis. In quibus verò os denudatum est, diuisa membrana caluariam ambiente, os ipsum scalpamus & per futuræ adductionem, tanquam non sit denudatum curabimus. Si verò non permaneant futuræ, iuxta concarnationem velut etiam aliorum vulnerum curam faciemus. Referetur autem huiusmodi curationis ductus in proprio loco. Cæterùm in quibus vulneribus aut propter paruitatem, aut aliàs futuris vti non licet, linamentum conuulsum cum aceto & oleo imposito, aut cum myrti succo, aut lentisçi, aut rubi, aut conyzæ tenuia folia habentis, ad aliquem eorum modico ammixto melle ita vt linamentum ex his imbutum imponas, Et foliis alicuius ex prædictis pro cataplasmate vtitor. Aut spongiam nouā & ace-

to & oleo inbutam imposito, Aut lanā
 sordidam eodem modo. At verò ad ipsum
 vulnus brassicæ folia adponito, aut polen-
 tam aceto subactam per se imposito, aut cū
 brassicæ foliis tritis. Hæc quidem Archi-
 genes scripsit ad capitis dolorem, discrimi-
 nibus simul quibusdam additis, quæadmo-
 dum etiam Apollonius fecit. Asclepiades
 verò varia quidem pharmaca scripsit, sed
 eorum discrimina iuxta affectiones non ita
 multum apposuit, sed saltem in incipienti-
 bus & inueteratis, quanquam neque hoc in
 multis fecerit, sed in primo solum & postre-
 mis duobus. Postrema igitur credere quis
 possit inueteratis efficacia esse, utpote ex
 fortibus simplicibus pharmacis composita:
 primum verò ob id fortassis solum quis in
 vsum talem adsumpserit, quod papaueris
 succum non paucum ammixtum habet: hu-
 iusmodi autem didicimus, non propterea
 quod affectionibus profint, sed quod sensi-
 lem facultatem stupefaciant, dolores miti-
 gare solere. Quare etiam ea omnia de-
 incepta à me conscribentur.

*Quæ Asclepiades ad capitis dolorem in
 primo externorum scripsit.*

AD recentes capitis dolores irrigatio,
 qua vsus est Nicomedes, foliorū rutæ
 drach. 2. mentæ drach. 2. peucedani, drac. 4.
 iri

iridis drachm. 2. seminis ocymi drach. 8. seminis papaueris nigri drachm. 4. alii drach. 8. poscæ heminas duas, ad dimidium coquito, & expressum succum cum rosaceo conquassato, & caput assiduè ex eo irrigato.

Aliud quo vsus est Charicles. Amygdalarum amararum depuratarum drachm. 2. seminis viticis drachm. 2. radicis peucedani drachm. 2. mentæ viridis siue aridæ drachm. 2. ramulorum rutæ drach. 2. baccarum lauri depuratarum drachm. 2. serpylli drach. 2. sphondylii drach. 2. castorii drach. 2. rosarum viridium aut siccarum drach. 4. aceti heminas duas, rosacei quod satis est, apparato ac vtere vt dictum est.

Pastillus ad capitis dolorem quo vsus est

Antonius herbarius, qui multa artis experientia clarus fuit.

SVCCI peucedani drach. 6. succi papaueris drach. 4. * croci drach. 4. myrrhæ drac. * Anisi 4. scammonia drachm. 4. omnia trita cum drach. 4. aceto in pastillos redigito, eosq; in vmbra seminis resiccato, vsus autem tempore aceto dilu. hyoscyamæ ros fronti illinito, à tempore altero initio drach. 4. sumpto & vsque ad alterum tempus progressiendo, In febricitantibus ex aqua illi- *hac addit vet. cod.* nito. Quo Alexander vsus est sic habet.

Peucedani radicis aut succi drachm. 1. croci drachm. 1. myrrhæ drachm. 1. opii drachm.

vnam,

vnam aceto excipe ac redige in pastillos: vsu verò exigente, aceto dissolutos locis sensum doloris perceptantibus illinito.

Aliud Antigoni qui in castris exercitus insignis medicus fuit. Baccarum lauri siccarum purgatarū tritarum drachmas. 4. scammonia drachmas. 4. succi papaueris drachmas. 4. seminis apii drachmas. 8. croci drachmas. 8. myrrha drachmas. 4. omphacii drach. 4. serpylli drach. 8. aceti quod satis est, præpara ac vtere vt dictum est.

Ad inueteratum capitis dolorem Epithema, quo Charicles vsus est.

R Etrimetorum quæ ab expresso irino vngento supersunt, peucedani, castorii, singulorum partem vnā, baccarum lauri partes. 2. seminis viticis partes. 2. rosarum siccarum partes. 2. ramulorum rutæ partes. 4. aceto dissoluta cerato ex rosaceo apparato excipito, deinde linteolo impacta præasis capillis per omne caput imposito, & fasciola obligato, atque vsque in sequentem diem obligata custodito, rursusque imposito. Aliud valde bonum.

Amygdalarum amararum, floris viticis, peucedani radices, mentæ viridis, ramulorum rutæ, baccarum lauri, serpylli, sphondylii, castorii singulorum partē vnā. rosa-

farum partes duas, appara & uterevt dictum est. Post hæc præscripta pharmaca Archigenes & Apollonius, itemque Asclepiades, pharmaca conscripserunt, quorum aliqua per os, aliqua per nares caput purgant. Cæterùm quæ Archigenes tradidit hæc sunt iuxta illius ipsius dictionem.

Archigenis de Apophlegmatismis, & quæ naribus infunduntur.

Post hæc verò Apophlegmatismi ex sinapi aut hyssopo cum passo cocto, aut ex staphide syluestri cum pipere trita, aut ex melle oleo ammixto, aut ex staphide syluestri per se, & cum melle trita. Hæc quidem Archigenes inter remedia doloris capitis scripsit, Apollonius verò de his quæ ad dentium dolores, in primo parabilium tradidit, hæc verba scripsit. Quæ naribus infundantur in dentium dolore. Radicis betæ succum per se in nasum infundito, & dolores dentium soluet. Aliud, Cumini quantum tribus digitis apprehendi potest, & myrrhæ ad magnitudinem fabæ, medullæ cucumeris syluestris duplum, trita & lacte muliebri subacta in collyria redigito, eaque in vtranque narem indito, Deinde quandiu quis quinque stadia per currere possit adtrahere, & postea emungere iubeto.

to. Hoc pharmacum & ad aurium dolores facit. Asclepiades autem in primo exteriorum ita scripsit, de his quæ naribus induntur, & de sternutatoriis, & apoplegmatismis pituitam è capite detrahentibus. Errhina quæ naribus indita caput purgant, commodant etiam veteri lipitudine oculorum infestatis, faciunt & ad comitiali morbo apprehensos. Ducuntque multam humiditatem. Melanthii drachm. octo, salis ammoniaci drachmam vnam elaterii drach. vnam trita & quam tenuissime leuigata, sicyonio oleo, aut irino vngento, aut cyprino excipe quo ad cerati liquidi crassitudinem perducantur, & reconditis in cornea pyxide vtitor, sublitis inde naribus, atque ægris attrahere iussis. Aliud, Citra molestiam purgans, dolorēque euestigio sedans. Cyclamini siccae drach. octo, iridis siccae drachmas duas, nitri rubri drach. vnam. Ego elaterio vsus sum diligenter trito & per arundinem insufflato, ægro ipsum attrahere iussu, atque deinde deorsum pronuere, quo videlicet coactus liquor distillet. Post hæc verò Asclepiades in hæc verba scripsit. De sternutatoriis. Sternutatoria caput purgantia Heraclidæ Tarentini, Cumini æthiopici, piperis albi, struthii, castorii, singulorum æqu

æquales partes cōtusas & cribratas in ærea pyxide reponito. Vsu verò exigente, pyxidem concutito, & apertam naribus admo- ueto: aut cū digito adhibeto, aut etiam per arundinem insufflato. Aliud, Zingiberis drach. 2. struthii drach. 2. piperis albi drac. 1. cassiæ drachmam. 1. vtere vt dictum est.

Ad veterem capitis dolorem sternuta- toria Ptolomæi. Facit ad vertiginem & comitali affectos. Veratri albi drach. 4. Alii vnam habent, radicis cucumeris sylue- stris drach. vnam, struthii drach. vnam. ni- tri rubri drach. 1. castorii drach. 1. piperis albi drach. 1. Vtere vt dictum est. Aliud,

Veratri albi, radicis cucumeris syluestris, struthii, singulorum partes duas, castorii, acori, nitri rubri, cumini æthiopici, singu- lorum partem vnam euphorbii partem vnam, tritis vt dictum est vtere. At ve- rò post dictorum sternutatoriorum descri- ptionem Asclepiades in hūc modū scripsit. Quæ mansa caput purgent, & multam hu- miditatem ducāt. Piperis albi drach. 2. ori- gani drach. 2. staphidis syluestris drach. 2. cassiæ drach. 2. Excipe vuarum passarum exacinatarum, aut ficuum pinguium car- ne, & mandenda præbe. Mandentes ve- rò deorsum prouere oportet, & per in- terualla hiare, quo collectus humor destil- let.

let. Post verò etiam aqua calida in ore continenda, quæ etiam ubi multam perceperint mordacitatem eis exhibenda est. Aliud,

Staphidis sylvestris, pyrethri, piperis albi, hyssopi, cardamomi, singulorum æquales partes, polentæ duplum, aqua subigito ac utitor ut dictum est. Porro ex subscriptis pharmacis quibusdā præceptores meos usus scio, quibusdam amicos, aliqua etiam ipse in usum adsumpsi, ut ex multo usu fidem suam mihi probauerint. Sunt autem hæc, Foliorum cucumeris sylvestris succus naribus infunditur tum per se solus, tum betæ addito decocto aut succo. Aliud, Myrrham melle coctam naribus infundito.

Aliud, Aloës, nitri, melanthii, parem mensuram cum oleo veteri ad strigmentorum crassitudinem redacta. Aliud quod manditur. Nitri sex uncem, anisi trientem, staphidis sylvestris quadrantem, foliorum lauri viridium, & vux passæ exacinatæ pari mensura excipe, & ex hac mixtura pastillos trium drachmarum coge, & singulos usu expetente mandendos præbe. Aliud quod naribus inditur. Euphorbii drach. dimidiâ, thapsiæ drach. vnam. iridis drach. vnam mellis cocti sesquidrachmam, succi radicis betæ quantum sufficit. Ex hoc ad milii magnitudinem accipe, & aqua dilutum spe-

specilloq; exceptū naribus infunde. Aliud quod naribus infunditur. Succī cyclamini cyathos. . . succi foliorum hederæ cyathū. . . peucedani obolum vnum, elaterii obolum vnum. In vitreo vase recondito, vsu verò ex postulante lacte muliebri dissoluta naribus infundito. Aliud, Myrrhæ trientem, euphorbii * trientem, piperis albi gra- * Aliàs na. 2s. Myrrhā aqua prius dissoluito, vna- drach. 4. que ipsum euphorbium, deinde piper tritū addito, & adiecto olei gleucini sexunce vtitor. Aliud, Quod naribus infusum multam pituitam per os detrahit. Olei communis * sextarios duos, saponis libram * Aliàs vnam, resinæ frictæ sesquilibram, opopana- exagia cis vnciam vnam per anchusam colorato ac duo. vtitor, ore prius aqua expleto. Aliud quod in os illinitur. Saponem betæ succo dilutum iuxta palatum illinito, atq; itidē iuxta oris columellam. Idem etiam naribus infundi potest.

*Que Crito in primo de pharmacis scripsit
his verbis. Apophlegmatismi.*

STaphis syluestris per se & cum pulegio mansa. Aliud, Staphidis syluestris & origani vtriusque acetabulum, nitri drachma. 2. trita cochleariū mēsurā māducanda præbeto, donec os pituita repleatur, deinde

m

* Aliàs
drach. 4.

aperto ore effluere finito, Aliud, Origani*trientem, hyssopi drach. 4. staphidis sylvestris drach. 4. spumæ nitri drach. 2. sinapis drach. 2. pyrethri drach. 3. tritis vtere. Aliud, sinapis partem vnam, staphidis sylvestris partem vnam contusis vtere. hoc pharmaco multi vtuntur. Aliud, Hyssopo, thymo, origano, tum per se tum simul mixtis vtere. Aliud, Medullæ colocyinthidis in aceto ad multum tempus coctæ, aut etiam per longum tempus in vino maceratæ, liquorem in ore contineto.

Aliud, Allia cum erucæ semine & nitro.

Aliud, Staphidis sylvestris drachmas. 7. pyrethri drach. 4. hyssopi drach. 1. Contusa in orbiculares pastillos cogito, eosque drachmæ pondere formatos manducandos exhibeto.

Quæ pharmaca naribus indemula Crito ictericis seu arquato infestatis conscripsit.

PHarmacum quod naribus infunditur, & tum per nares, tum per os excernit, Ob id ipsum verò ne consterneris, si palatum calefaciat aut exasperet. Ex alto enim auocat ac transfert humores. Staphidis sylvestris drach. 1. melanthii drach. 3. Cum aceto trita ad formam strigmento liquidiorem redigito, & per dies quinque in nares

res infundito donec expurgetur æger. Id autem alternis diebus facito. Aliud, Hedere folia decem, lauri folia decem, cū oleo terendo ad strigmenti crassitudinem redigito, & naribus similiter instillato.

Aliud, Egregiè facit & elaterium insufflatum in ipsorum nares. Cæterum si quis hoc citra detrimentum facere velit, in calidæ solium ægrum immittet, atque ita toto corpore præter faciem in eo immerso, elaterium insufflabit, Large enim bilem per nares educit. Aliud, Elaterium ad magnitudinem erui, in lacte muliebri dilutum naribus infundito, atque ubi purgatio prodierit, in calidæ labrum demittito ac lauato, & per diætam reficito.

Quæ Aeneas per experientiam pituitam detrahentia tradidit.

QVorum experiētiā per Aeneæ vsum habeo, à quo etiā descriptiones accipi. Pharmacum quod naribus inditur atque pituitam detrahit. Saponis lib. * 6. adipis * Aliàs se. caprini lib. 1. ceræ lib. 3. picis aridæ trientē, *mis.* quidam verò * quadrantē habent, nitri tantumdem, lixiuii acris cyathos. 2. Vsum tem- drach. 3. pore aqua diluta per specillum infundito, attrahereq; iubeto. Caput verò irino prærigato, & post vsum aquam mulsam sæpe gargarissandā præbeto. Aliud, Euphorbiæ


drac. 6. lycii indici drach. 4. succo betæ excipe ac melle addito coge. Vſus tempore aqua aut lacte dilue. Aliud, Succu cyclamini cyath. 2. succi cacuminum hederæ cyath. 1. succi peucedani obolum. 1. elaterii obolum. 1. Vtere in balneo cum lacte muliebri. Aliud, Pyrethri, piperis, hyſſopi, ſtaphidis ſylueſtris parem meſuram in paſtillos drachmæ pondere cogito, quorum vnum manducandum præbeto, & poſt factam ab ipſo purgationem, ſale & melle curato. Sternutatorium, Piperis albi, veratri albi, caſtorii, euphorbii, ſtruthii, ſucci cyclamini aridi, æquali meſura, penna præirritatis inſufflato.

De vſu omnium fortium pharmacorum.

Quam vtendi rationem de prædictis pharmacis dixero, eam ad omnia alia quæcunque fortem vim habent transferre oportet. Non enim ſtatim à principio efficaciſſima adhibere conuenit, ſed à debilioribus auſpicari. Quin & ipſa fortia pharmaca mitigatoriorum ammiſtione lenita, moderata ſunt. Et ob id ego quædam ex eis muliebri lacte recēti & aqua diluo, & poſt hoc oleo dulci, deinde betæ ſucco, & anagallidis quæ ceruleum florem habet iridē ſucco, atque ita ſenſim in vſu eorum progredior, donec poſtremum etiam per opobalſamum
ta

taliam dissoluo. Ac primū quidem lacte am-
mixto adhibeo, quod vbi leuiter ferunt
ægri, etiam citra lactis adiectionem admo-
ueo. Porro parabili sæpe pharmaco vsus
sum, quod naribus infunditur Melanthio,
aliquando quidem aceto acri rigato ac pri-
die macerato, deinde sequenti rursus cum
aceto trito, & naribus infuso, aut ægro
ipsum absorbere in nares iussu. Aliquando
verò oleo veteri idem melanthium contri-
ui, atque ita vsus sum, quo modo etiam Ar-
chigenes eo vtitur in narium obturatione.
Eo verò quod cum aceto infunditur, Crito
vtitur ad arquati morbum.

*De hemicrania, hoc est, dimidiæ partis ca-
pitis affectione. C A P. III.*



Hemicrania affectio dolorosa cir-
ca dimidiã capitis partem, aliquã
do dexterã, aliquãdo sinistrã cõ-
tingit, quæ iuxta futurã secūdũ
longitudinem eius extensam terminatur, &
vt plurimum per circuitum exacerbat, in-
fluxu vaporum aut humorum siue multo-
rum, siue calidorum siue frigidorum, cau-
sam dolori suggerente. Quidam igitur
ipforum circa temporũ musculos vehemen-
ter dolitant, & pleraque sanè ipforum pars
hoc modo affligitur. Quidam verò dolo-
rem longe vltius progredientem habent.

Et, Quidam adeò vehementer dolent, ut neque manuum contactum facilè ferant, in quibus palā est pelliculā caluam ambientē esse affectam, & neque cutem ipsam omnino ab affectione immunē existere. Manifestum igitur est vaporum, aut humorum, aut utrorumq; influxū siue per venas, siue per arterias, siue per utrasque cōtingere: quum interdum ea sola quæ intra caluam continentur, hoc est, cerebrum eiusq; membranæ, quod in ipsis redundat foras protrudāt: interdum verò corpus infra caput positum vitiatos vapores aut humores sursum mittat. Quapropter ubi quis hemicraniā curare aggreditur, prius quali purgatione aut venæ sectione æger opus habeat, consideret. atq; ita deinde ad capitis auxilia progrediendo, tum per digitos suæ manus, tum per lintheum dimidiam frontis partem, & eam maximè quæ circa temporū musculū est, confricando excalfaciat, atque id ante irritationis tempus faciendū est. Post exacerbationem verò pharmacis hemicranicis à medicis appellatis vtendum, siquidē multa caliditas in doloribus percipiatur, his quæ refrigerans quippiam habent: citra verò hanc, his quæ multum excalfaciant. Vtrisque verò aliquid ex his quæ firmitatem ac robur addunt misceatur, quod ad-

strin

stringentem videlicet habeat facultatē. Demiror autem quod neque Apollonius, neque Archigenes, neque Asclepiades quicquam de hemicranicis pharmacis, quæ merito post doloris capitis totius pharmaca subiicienda erant, conscripserunt. Decebat enim ipsos, tametsi nihil priuatim in se habeant, propterea quod inter ea quæ totius capitis dolori destinata sunt, contineantur, id ipsum saltem annotare. Similiter autē & ab Hera & à Critone, vberior de hac affectione tractatio neglecta est. Cæterum per quæ pharmaca inueterato capitis dolori medentur, per eadem constat eos etiam hemicranicis affectionibus auxiliari. Heras itaque in medicamentario libro, statim à principio in hæc verba ad capitis dolorem pharmaca conscripsit.

Pharmaca ex libris Heræ ad capitis dolorem.

CROCOnagmatis partem. 1. gallæ partem. 1. trita ex vino fronti ac temporibus illinito. Pastillus, ad capitis dolorem egregie faciens, à tempore ad tempus bis aut ter illitus, Croci drach. 15. atramenti sutorii drach. 10. aluminis scissi drach. 13. myrrhæ drach. 3. opii drach. 3. omphacii drach. 3. chalcitidis drach. 3. gūmi drach. 15. tritis vini falerni austeri quod satis est affunde, & vt collyriū tere, indeq; in pastillos

omnia redige. Vsu verò expetente posca
aut aceto dilutis vtere. Malagma, ad ca-
pitis dolorem, Aeruginis rasilis drach. 4.
æris vsti drach. 2. squamæ stomomatis ferri
drach. 2. cimoliæ drachma. 4. chalcitidis.
drach. 4. punicis crudi drach. 4. terebinthi-
næ vnciam vnam. ceræ drach. 37. & dimi-
diam. olei veteris cyathos. 2. Aridis tenuis-
simè tritis, liquecibilia liquefacta affundè,
emolliac vtere. Quod si durius videatur
pharmacum, oleo amygdalino emollito.
Hæc quidem pharmaca Heras ad capitis
dolorem scripsit, Vtuntur autē eis quidam
etiam ad hemicranicos dolores, quemadmo-
dum etiam aliis medicamentis quæ prædi-
cti viri ad inueteratos capitis dolores de-
stinauerunt, Non tamen per omnem frontē
pharmacum extēdunt, sed per affectam so-
lū partem. Caterū ex præceptoribus
nostris quispiam hoc pharmacū ad inuete-
ratas hemicranias in vsu habebat. Piperis
albi drach. 2. crocomagmatis drach 2. eu-
phorbii drach. dimidiam vtere. Porro de
euphorbii facultate iam mihi relatum est,
quod citò exoluatur, Quare in eiusmodi
pharmaca non vetus conicere oportet. di-
ctum etiam recens albidius esse, quod verò
inueteratum est, flauioris aut pallidioris
coloris reddi. Verū si non valde vetus
fit

fit euphorbium, sed duorum aut trium annorum, duplū eius adiicies, hoc est, drach. i. Quemadmodum autem euphorbium recens coniiciendum est, Sic itidem stercoris columbini drachmæ dimidiū, ex columbis montanis quas in turribus nutriūt sibiipsis victum quærentes, non velut quæ in vrbi- bus intra domos nutriuntur. At verò & atramenti scriptorii æqua portio, hoc est, drachmæ dimidium ad columbinum ster- cus iniicitur, atque ad hanc rem nostrum pergamenum præstat, eo enim semper præ- ceptor noster utebatur. Aut igitur illud ipsum ex Pergamo atramentum iniicere oportet, aut aliquod aliud optimè præpara- tum: atque ita omnibus his mixtis & probè subactis, acetoque acerrimo imbutis ac di- lutis temporis musculus, & dimidiū fron- tis, & affecta capitis pars illinēda est. Aliud pharmacum. Quod non solū in hemi- crania, sed & in omni inueterata capitis af- fectione illinitur, in capitis quidem dolore per omnem frontem, In hemicrania verò per mediam capitis partem affectam. Cro- ci drachmas. 15. atramenti sutorii drach. 10. aluminis scissi drach. 13. myrrhæ drach. 3. * *Vetust.* opii drach. 3. omphacii drach. 3. * *cod. addit.* gummi drachmas. 15. Omnibus tritis vinum faler- *chalcitidis* num adiice, & rursus vt collyrium, tere de- drach. 3.


indeq; in pastillos redige, Vfus verò tēpore
 posca dilutas aut aceto illine. Aliud, ad
 easdem affectiones. Scammoniae dra-
 chmas. 6. croci drachmas. 2. comæ hederæ
 drach. 6. sulphuris viui drach. 4. seminis
 anisi drach. 8. seminis apii drach. 8. diligen-
 ter trita cum ocymi succo in pastillos cogi-
 to. Hoc pharmacum multo rosaceo dis-
 solutum capitibus letargicorum rigandis
 fit commodum. Aliud pharmacum. Non
 iisdem solū conueniens, sed & vertigino-
 sis auxiliare. Radicis peucedani drach. 4.
 iridis illyricæ drach. 2. æruginis drach. 1.
 acori drach. 1. sphondylii drach. 4. piperis
 nigri drach. 2. & dimidiam, castorii drach. 2.
 & dimidiam, serpylli drach. 4. & dimidiā,
 myrrhæ drachmas. 2. baccarum lauri nume-
 ro. 35. rutæ viridis drach. 8. mentæ viridis
 drach. 4. opii drachmam. 1. Aceto excipe &
 in pastillos redige. Vsu exigente aceto &
 rosaceo dilutos illine. Verū cerato ro-
 saceo exceptum hoc pharmacum vt Ma-
 lagma imponitur. Pastillus, Non so-
 lū Hemicrania laborantibus commodus,
 sed & coxendicum morbo affectis auxilia-
 ris. Thapsiæ drach. 3. euphorbii drach. 4.
 laseris siue succi Medici drach. 3. myrrhæ
 drach. 1. opopanacis drach. 1. Simul contu-
 sa in pastillos cogito, quos deinde vsus tem-
 pore

pore aceto tritos illinito. Hæc quidem composita sunt pharmaca. Sæpe verò & ex tempore ac improuiso pharmaca præparare coactus, simpliciter euphorbii illitione usus sum, modica cera compagis acquirendæ gratia adiecta. Sufficit autem in librâ olei siue Sabini, siue alterius ei propinqui, ceræ quadrantem iniicere, & euphorbii vnc. i. atque ex hoc dimidiam frontis partem illinere, vnâ cum temporis videlicet musculo. Cæterum in quibus suspensionem habueris, à calidis vaporibus aut humoribus, dimidiæ capitis partis fieri dolorem, in his ne admoueris hoc pharmacum. His verò qui ob frigidas causas infestantur, commodissimum adeò est, vt sæpe semel ante balneum illitum, quàm citissimè affectionem persanet, vt à balneo omnino sanus ægri euadant. Iuuat etiam hos si oleum tepidum in aurem instilletur, modico euphorbio ad oleum iniecto, Nimirum ad librâ olei vnâ euphorbii vncia dimidia, si validum euphorbium existat. Si verò non, etiam amplius iniicere conuenit. Verum in corporibus molli ac tenero sensu præditis, etiam si minus quàm dimidiam vnciam inieceris, melius res procedet.

FINIS SECUNDI LIBRI.

CAPITULA TER-
TII LIBRI.

- De aurium affectionibus, & ob quot cau-
sas aures dolore affligantur. Cap. I.*
De parotidibus. Cap. II.
De affectionibus narium. Cap. III.
*Heraclidæ ad eruptiones sanguinis è nari-
bus. Cap. IIII.*



CLAVDII GAL- LENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE

pharmacorum secundum locos,

Liber tertius Iano Cor-

nario medico, in-

terprete.

*

*De aurium affectionibus, & ob quot
causas aures dolore affligantur.*

CAPVT I.



VRIVM dolores alii-
qui ex frigiditate fiunt,
quos sanè in peregrinationi-
bus à frigidis ventis per-
flati habent. Aliqui verò
ex balneis frigidis, & qui-
busdam medicatis aquis obriuntur, in qui-
bus quidam ob delicias lavant, quanquam
sint qui & ob corporis commoditatem id
faciant. Fiunt & auris dolores ex inflamma-
tione, interdū quidem solius circa meatum
cutis, interdum verò in profundū progres-
sa, quando videlicet nervus auditorius, ad
in

inflammata affectionem peruenit. Qua verò ratione inflammatio, partes inflammata distendens, dolorē producit: iuxta eundem modum etiam flatus ventosus, transitū non habens dolorē excitat. At verò similis dolor est ex serosis & saniosis humoribus in corpore aurium generatis, ei qui ex mordacium humorum illapsu forinsecus factus, contingit.

De dolore auris ex frigidityte.

DOlores quidem igitur à sola frigidityte obortos calfacientia quàm celerime curant: atque in hunc vsum quosdā rurales homines magnas cepas exculpere vidi: deinde oleo eas explere, & in feruente cinere moderate calefacere, atque ita auribus infundere: quosdā verò nō cepas tantum, sed & allium in oleo feruefacere atque ita infundere vidi. Ego verò euphorbio omnino modico, ad multum vetus oleum ammixto vtor, velut etiam pipere exquisitissimè trito, Aurium enim dolores à frigidityte inductos eiusmodi calfacientia magnopere iuuant. Prodest etiam Amaracinū oleum eis infundi, & optimum nardum. Et quod apud Romanos foliatū itemq; quod Spicatum appellatur, prodest eis & Comagenum: atque si rutam quoq; oleo non adstringenti ampliusq; tenuium partium

in

incoxeris, velut est Sabinum, magnopere iaueris. Quum verò ex aqua medicata quippiam circa auditorium meatum continetur, oleum assiduè infundere conuenit, quo ipsum eluamus, deinde lana molli extergere, rursusque infundere. Magnificè autem eos mitigat oui candidum, quo etiā ad lippitudines vtimur, itemque lac muliebri. Manifestum verò est, quicquid adhibetur mediocriter calidum esse oportere. Plurimum iuuantur quoque ex adipe anserino, atque item vulpino.

De dolore auris ex inflammatione oborto.

Quod si inflammatio adsit, optimū ad eam pharmacum vngentum nardinū cum modico basilico appellato pharmaco infunditur, Idem etiam tetrapharmacum appellatur, Et Commagenum quoque aptū est, & ex adipibus pharmacum, cuius compositionem paulo pòst describam. Cogente verò dolore, necessarium est etiam his quæ sensum stupefaciunt vtī, quemadmodum etiam in his qui colum, aut renes, aut quancunque tandem partem affecti, vehementi dolore affliguntur, facere consueuimus. Miscetur autem opium muliebri lacti & oui candido, quæ ipsa & per se sepe aurium inflammationibus profuere. Miscetur & castorio opium, Verū multo ante
vsum.

vsum tempore, siue pari pondere, siue du-
 plo castorio ammisceatur, præparatum id
 esse conuenit: & miscetur quidem in vehe-
 mentissimis doloribus pari, in minoribus
 verò duplo: Liquor verò quo hæc diluun-
 tur ex musto sapa fit. multo enim magis
 quàm dulcia vina, dolorem hæc sedat. Sta-
 tim itaque in principio prædicta pharmaca
 diligenter trita cum sapa misceantur, casto-
 rium quidem diligenter prius tritum & le-
 uigatum, papaueris verò succus ipsa sapa
 dissolutus, atque ita hæc tria mixta probè
 leuigentur. Deinde verò vfu postulante
 rursus sapa diluantur, in eiusmodi compa-
 gem, vt per aurifusoria specilla ad lucernam
 tepesacta infundi possint. Verùm ego nul-
 lum pharmacum dolore vexatis infundo,
 neque etiam per lanam instillo, vtpote qui
 experientia edoctus sim, quòd præstat neq;
 omnino contingere doloris tempore audi-
 torium meatum: sed per auriculare specil-
 lum lana mollissima obuolutum dolore
 vexatos foueo, pharmacumq; ita moderato
 tēpore in aurifusorio specillo præparatum
 iniicio, vt interrogato per nos ægro, num
 tepidum ei videatur, & num calidius ipsum
 ferre possit, ad tantam caliditatem proce-
 dam, vt nihil amplius offendat, Tinctum
 itaque in hoc modo præparato pharmaco
 spe

specillum, ad principium meatus moderatè
 imposito, & in altum defluere ex eo phar-
 macum permittito, & postea iterũ iterũq;
 & sapius tingito idemq; facito, nullo tem-
 pore intermisso. Palàm est autem, quũ hoc
 fit etiam foris omnino aliquid effluxurum
 esse, expleto nimirum toto auditorio mea-
 tu: hoc igitur quantum possibile est mode-
 ratè excipe, nec aurem contingas. Post-
 quã verò probè foveris, meatum pharmaco
 expletum finito, & mollem lanam forinse-
 cus tum meatus osculo, tum vniversæ auri
 imposito: atque vbi rursus fomenta adhi-
 bere oportebit, incumbentem foris lanam
 leniter tollito: rursusque similiter foueto,
 quantum possibile fuerit diligenter cauēs,
 * ne aliquid aliud graue aurem contingat. * Vet. cod.
 Ad hoc verò præceptum maximè animum sic habet
 aduertat, utpote quod omnium potissimũ ne vel au-
 sit in aurium curatione. Fomenta verò auditorium
 fiant per ea quæ velut dictum est, dolorem meatum,
 sedant, Quale est optimum Nardinum vn. nec aliam
 gentium paucissimo in eo tetrapharmaco quampiã
 dissoluto, Deinde etiam Commagenum & auris par-
 susinum, & pretiosã diuitum muliercularũ ticulã at-
 vngenta, quæ ipsa spicata & foliata appel- tingas &
 lant. Sunt autem spissiora quàm vt infundi sic etiã le-
 queant. Quapropter per nardinum vngen- git inter-
 tum ea dissoluere oportet, & æstatis tem- pres vet.

pore, & si caloris sensus ægrum circa inflammatam aurem infestet, per rosaceum bonū: aut si hoc non adsit, amygdalinum. Memineris autem quod bonum semper rosaceum dico, in quo plurimæ rosæ maceratæ sunt: verum oleum in quo hæ macerantur omphacinum sit, ex crudis oliuis & necdū penitus maturis expressum, citra salis additionem præparatum. Imò neque etiam aliud quicquam ad rosas coniiciatur, quemadmodum illi faciunt qui spissamenta stymmata Græcis appellata addunt, quo videlicet per multum tempus ipsum rosaceū odoratum permaneat.

De dolore auris ex flatu ventoso, aut crassis & viscosis humoribus.

SI verò flatum ventosum, aut crassum aliquem & viscosum humorem, qui transitum non habeat, inclusum esse coniecero, etiam ex pharmacis ab obturatione liberantibus quippiam ammisce. Artificiosa enim coniectura causarum huiusmodi doloris tibi continget, si tum prægressa, tum præsentia percunctatus fueris, frigiditate enim antegressa flatus ventosus cōgregatur: gravitate verò capitis, cibisq; pituitosis & mali succi, frigidi & crassi humores. His enim si frigiditas accedat, dolores contingunt, eis nimirum quæ prius difflabantur propter
den

densitatem inclusis & retentis. In his igitur spuma nitri, & nitrum ipsum molle, eius modi; aphrolitrum, & oleum amygdalinum appellatum rationabiliter in auricularia pharmaca miscentur. Ex hoc genere album item ac nigrum veratrum est, & struthium, ac amygdalæ amaræ, & ex tribus aristolochiis quacunque fuerit ad manum, & iris illyrica, Iniicies autem & cinnamomum si habueris, aut cassiam illo nō præsente, tum eam quæ Zigeres, tum quæ Motodes appellatur. Item carpesium, quod plurimum in Sida Pamphylie nascitur, & ob id vilissimo pretio venditur. Quintus sanè quum cinamomi inopia esset, carpesium pro ipso iniecit duplo pondere, velut aliqui eius loco cassiam exhibere solent. Caterum aurium meatus ab obturatione liberant etiā quæ lapides in renibus atterunt, omniaque insuper tenuium partium citra mordacitatem, vt ne dolorem exacerbent. Ex quorū numero est etiam cucumeris sylvestris radix, itemq; bryoniæ & Ari, & dracunculi ac cetauræ & polii, & omnino omnium amarorum, Citra mordacitatem nanque & absque molestia expurgant hæc meatus, dissiciuntque & dissēcant obturata. Verum ob id multa eiusmodi exempla scribo, quamuis sanè omnia in libris de simplicium

pharmacorum facultatibus retulerim, quod videlicet omnibus terræ locis remediis vos abundare volo, ut ipsorum memoriam in promptu habeatis. Alia enim in aliis regionibus abundant, & meliora his quæ alibi nascuntur existunt. Alioqui sanè ex adipibus compositum pharmacum tibi sufficiet, & ex simplicibus quæcunque paulò antè recesiui doloris mitigatiua. Mirari porrò subit medicos qui citra distinctionem ad aurium dolores pharmaca quædam conscripserūt. Quæ etenim à frigiditate dolent, per calfacientia celerrimè curantur: si verò à mordaci acredine, aut à pulsatili inflammatione dolor fiat, maximum detrimentum continget, si eiusmodi pharmaca adhibeantur.

Atqui moderatæ inflammationes & nō pulsatiles, etiam per eiusmodi pharmaca curantur, Quale est acetum cum rosaceo tepescitum, utrisque diligenter simul commissis. Sic etiā Glaucium in cote medica cū aceto tritū, moderatis ex inflammatione doloribus prodest, præstat autem pastillū ex glaucio multæ sanè utilitatis pharmacum, prius præparatum habere, qui fit ex glaucio probè cum aqua pluuiali trito, deinde in pastillum redactō & exiccato. Si verò fragilius videatur glaucium quàm ut in pastillos formari possit, parum gummi ei addes. sufficit.

cit autem id duodecimam aut quintam & decimam glaucii partem esse. Quin & collyria ex glaucio eodem modo cum aceto trita, eis profunt auribus instillata, atque his nihil minus collyria ex croco. Hæc quidem igitur sunt doloris & inflammationis remedia. Cæterum de aliis affectionibus quæ in auribus oboriuntur, vbi pharmaca quæ per experientiam cognoui recēsuero, ita deinde ad ea quæ à prioribus medicis scripta sunt transibo.

De ulceribus aurium.

VLcera aurium recentia, tum glaucium solum cum aceto tritum, vt iam dictū est, curat, tum collyria ex eo omnia, & collyria ex croco, & ex rosis, medicis appellata, velut etiam quod Nilo inscribitur. Curat item ea Damocratis collyrium ex myrrha. Quæ verò pure manant citra dolorem, atque id moderatè patiuntur, per eadē curantur: verum quæ fortiter affliguntur, per eiusmodi qualis est pastillus Andronius, & pastillus Musæ cum sapa & modico aceto dilutus, In quibus componendis varietas rursus dicetur. Vbi verò & hæc à malo vincantur, Scoria siue recremento ferri ad plurimos dies in sole cum acerrimo aceto trita & leuigata, confidenter vtere. Etiā si præter rationē videatur, aurem acerrima

pharmaca sustinere posse, quam paulò antè dixi neque mollissimorum infusorū admotionem & allapsum citra molestiā sustinere, sed & hæc ipsa offendere ipsam videri.

De audiendi difficultate, & de sonitu aurium.

Restat itaque adhuc de audiendi difficultate, & de sono aurium disserere, quæ nihil cum doloribus & vlceribus commune habent. De quibus deinceps dicam, Vbi prius compositiones auriculares à celeberrimis medicis, magnifice laudatas recensuero, iuxta quam rationem eas composuerint tandem illi, Initio ab ea quam Heras scripsit sumpto.

Compositio auricularis, Hera.

Heras quidē igitur ita scripsit. Compositio auricularis ad omnem dolorem, omneq; vlcus, hac in febriete quodam vsus sum, & ob dolores delyrante, & feliciter successit. Myrrhæ drachm. 1. thuris drach. 3. alii 7. spumæ nitri drachm. 3. croci drach. 4. alii 1. succi papaueris drach. 3. galbani drach. 2. amygdalas amaras delibratas. 20. aceto excipito, Vfus verò tempore, si quidem dolor adsit, rosaceo diluta instillato: si verò audiendi difficultas adsit, aceto. Heras itaque vnum hoc pharmacum scribere contentus fuit, ad omnem dolorē,

ac

ac aurium exulcerationem remediũ. Ego
verò dolores per pharmacum ex adipibus
constans, & per nardinum vngentum terra
pharmaco amixto leniri dico, vnaque &
affectiones ipsas iuuari, velut etiam oti cã-
dido, & lacte muliebri: per papaueris verò
succum mitigari solum dolores: nihilque
iuuari affectiones: verum per accidens, non
primariò etiam affectiones inde opem sen-
tire quis dicere possit, Sedato enim dolo-
re, & somno consequente, Natura affectio-
nes dolorem efficientes concoquit. Cæ-
terum vlcera in auribus omnino cum glau-
cio ex aceto curauĩ, Quemadmodum etiã
quæ cum fluxione aut purulentia consistũt,
per pastillos, à mitioribus auspicatus, qua-
lis est polyidæ, & post eum Andronius, &
ab illo Bithynus appellatus, cui similis est
meus, hoc est, ex charta vsta constans, & ve-
lut ego iudico, eo etiam præstantior. Mini-
me, verò semper omnium vsu opus habe-
mus, sed sufficit omnino vnus, si quis ipso
vti norit, aliquando quidem per sapam di-
luto, si quidem mitius reddere pharmacum
velit, & rursus per vinum dulce, deinde per
acetum non acre, deinde etiam per acre, ac
postremò per longè acerrimum. Quapro-
pter quum per eiusmodi mixturam aliàs
aliter parabilem, huiuscemodi pharmaci

vehementiam exoluere possis, fortissimum
 tantum præparatum habere poteris. Verum
 mirari ritè, velut dixi, licet plerosq; medi-
 cos, qui citra discrimen omnigena aurium,
 doloris pharmaca conscripserunt, eaq; cõ-
 miscuerunt in vnum ordinem redacta quæ
 vel maximè contrarias habent vires. Quæ-
 admodum statim (à veteribus enim auspi-
 cari præstat.) Apollonius Herophili secta-
 tor, in parabilium pharmacorũ descriptio-
 ne, in principio quidem libri, capitis doloris
 remedia scribens, primum omnium ea quæ
 ex ardore oborto conueniunt, locauit, de-
 inde consequenter ea quæ dolori congruunt
 ex frigidityte. Deinde ea quæ ex ebrietate
 & meri potu oborto medetur, sic enim ipse
 appellauit. Quarto loco ea quæ plagæ aut
 casui dolores capitis inducentibus adhiben-
 da sunt subiecit. Et postremum iuxta illius
 præscriptum, ea quæ ad tēporum & totius
 capitis dolores citra manifestam causam
 obortos conducunt. Verum in aurium do-
 lore nullam omnino apposuit distinctionē,
 sed simpliciter. Ad aurium dolores titulo
 præscripto, deinceps pharmaca recenset, ali-
 qua calefacientia, aliqua refrigerantia, quæ-
 dam humectantia, quædam resiccantia, &
 iuxta secundas facultates ac qualitates, au-
 stera, acerbata, amara, acria, acida, salia, & ad
 hæc

hæc insuper alia discutientia, alia adstringē-
 tia, & cogentia, ac repellentia influxiones,
 alia extrahentia è profundo corporis. Alia
 ab obturationibus liberantia, alia repurgā-
 tia & extergentia, alia sensum stupefacien-
 tia. Siquidem igitur vna affectio dolorum
 est causa, rationabile est etiam vnā esse
 remediorum ipsius facultatē. Si verò mul-
 tæ, tantum remediorum numerum esse o-
 portet, quantus est efficientium causarum.
 Quum itaque Herophilus distinctiones in
 tantum, vt haud sciam si quis alius, laudet:
 ipseq; Apollonius capitis doloris pharmaca
 distinctæ scripserit: magis vtique miror,
 quòd circa aurium dolores ita indiscrimi-
 natim omnia tractauit. Et quintum insuper
 pharmacorū genus penitus indistinctū re-
 liquit, illud scilicet quod postremū ad capi-
 tis dolores citra manifestam causam obor-
 tos descripsit. Quanquā & huiusmodi capi-
 tis dolores necesse sit primum cōmunibus
 generibus causarum dolores efficientium
 subiectos esse, solutioni videlicet cōtinui-
 tatis, aut intemperiei, quemadmodum à no-
 bis est demonstratum, deinde etiam his
 quæ has ipsas operantur. Quæ omnia à me
 proprio huic rei & tractationi loco sunt
 determinata: nunc autem eorum quæ ad au-
 rium dolores pertinent solum mentionem

faciam: quum omnium postrema velut saepe in methodi medendi libris dictum est, hæc tractatio existat. Etenim curandi methodos illic tradens, vnum atque alterum particulare exemplum apposui, multitudine pharmacorum quæ ex multis componimus, in præsentem tractationem reiecta. Quare medendi methodum de simplicium pharmacorum facultate lib. x i. merito præcedunt: post hos verò x i i i i. de medendi methodo ritè consequuntur, his demum de compositione pharmacorum libri, quos nunc in manibus habemus succedunt.

*Quæ Apollonius ad aurium dolores
scripsit.*

QUod verò Apolloniū deliquisse dixi, in eo quod nō distinxerit in quali aurium dolore vnumquodq; eorum quæ describit pharmacorū vtile existat, ne falso virum reprehendisse coarguar, ex paucis exemplis demonstrabo. Quum enim præscripsisset vt dixi, ad aurium dolorem infundenda, inter eaq; scripsisset: Anserinum aut gallinaceū adipem liquefactum sensim instilla, Rursus deinceps scribit, Fel taurinū aut caprinū cum porri succo instilla. Adeps quidem igitur horum quæ dixit animalium maximè mitigat omnes affectiones dolores inducentes, simulque ipsarum aliquibus
mag

magnifice auxiliatur: fel verò ipsum cum porrò, tum ex inflammatione, tum ex acribus & mordacibus humoribus obortos dolores auget. Solos autem iuuant ob obturationem, aut frigiditatem inductos, siue ob nudam intemperiem frigiditatis solidæ partes dolore vexetur, siue propterea quod in eiusmodi affectionibus ventosi flatus, & frigidi humores generentur: excerni autem prohibeantur, propter continentis corporis condensationem, citra inflammationem factam. Vbi enim ab huiusmodi acribus & calidis pharmacis dolorum causæ fuerint exclusæ, curatio simul & doloris sedatio contingit. Gallinaceus itaque & anserinus adeps si quidem euacuatum corpus inuenerint, & humorem qui inflammata affectionem excitat, non amplius influentem, duabus rationibus tum mitigandi, tum curandi profuerint. Si verò influente adhuc causa adhibeantur, affectioni quidem nihil auxiliantur, leniunt tamen doloris accessionem siue symptoma, quemadmodum etiam si ob humorum acredinem mordacitas contingat. Verum fel cum porri succo nunquam in eiusmodi affectionibus quicquam commodum efficere potest. Quemadmodum neque piper, & tamen eo etiam medicum quendam vsum scio, in

mu

muliercula ex calidarū naturæ spōte aquarum usu, aurem dolente. Quum enim per omnia parabilium pharmacorum Apollonii libris fidem haberet, & iam ante feliciter saepe ex pipere remedio usus esset, etiā tunc sperauit se in auris dolore opitulaturum: verū adeo ab ipso exacerbata est muliercula, vt parū abesset quin seipsam strangularet. Scribit itaque Apollonius in hunc modum: Piper in vino feruefactum terito, & mediocri crassitudine instillato. Scribit autem consequenter post hoc etiam hæc: Lycio & papaueris succo, pari pondere late muliebri dilutis vtere. Et post hoc rursum aliud hoc scilicet: Castorii & papaueris succi par pondus in testa Attica aut, si haberi nequeat, Romana torrefacito, & trita passo diluta instillato. Pharmaca igitur ex papaueris succo omnia sensum stupefaciūt, & ob id sanè necessariò cogimur ipsis vti, vbi nullum aliud mitigatiuum opem tulit.

At verò ex pipere pharmacū alterius generis est, Quemadmodum etiam quod ex adipibus cōstat. Et velut id quod deinceps scriptum est hoc modo: Galbanum fusino vngento diluito, & mel acrosaceum amisceto, atque lanam sordidam auriculario specillo obuolutam in eis agitando imbuito, & tepesacta instillato. Discussorium est
citra

intra molestiam hoc pharmacū, inflamma-
 tionibus conducens in quas nihil amplius
 influit, probè etiam fecerit in his qui ex fri-
 giditate dolore vexantur. Cæterum quæ-
 ret fortassis aliquis quam ob causam, quū
 non solum Apollonius, sed alii etiā quidam
 celebres viri papaueris succū & castorium
 torrefacere iusserint, quo videlicet vehe-
 mentia virium ipsorum minueretur, ego ad
 priorem meum sermonem id apponere reli-
 qui, nimirum supra quum auris doloris cu-
 randi rationē scribebam. Huic ego respon-
 debo in hunc modum. Castorium qui-
 dem igitur neque omnino torreri operæ-
 retium existimo: neque enim tanquam
 sensus stupefactium ad papaueris succum
 immiscemus, sed ob contrariam omnino ra-
 tionem, ut videlicet vehementiam refrige-
 randi facultatis in eo obtundat. Quare qui
 papaueris quidem succum torreri iubent
 id rectè faciunt, In castorio verò omni-
 no absurdè id præcipiunt: ipsum enim per
 se cōcoctoriam agrè solubilem & in scir-
 thum induratarum affectionum vim habet.
 Sufficiens itaque papaueris succo lenitas * *Ad fidē*
 accedit, cum id quod ex istis compositum *vet. cod.*
 est, inueterascit:] torrefactus enim effica- *sic locus*
 ciam perdit. Si vero castorio mixtus ad *iste resti-*
 tempus aliquod inueterascet, manebit qui- *tutus est.*
 dem

dem adhuc in eo multa efficacia ipsius facultatis: malignitas verò ipsius obscuratur, ex qua etiam aliqui læduntur ut obscurius videant per multos omnino dies, & capitis grauitatem sentiant, & neque prob
** si bibatur addit hic vet. eod.* cōcoquant cibos * & ob hanc sanè eius malignitatem plerique medici ad torrefactionem confugerunt. Verùm quum rursus in torrefaciendo, efficacia ipsius pessundatur, id quod sæpe sum expertus, melius esse existimaui intostum quidē misceri, sed post tempus aliquod, inueterata iam cōpositione, in vsum adsumi. Hæc itaque extra rem dicta sunt, sed quæ tamen utilis existant. Caterùm ut ad id quod propositum erat reuertamur, non parum noxa inferunt. illi qui indefinitis pharmacorum descriptionibus fidem per omnia habent. Porro multi alii iuxta eundem modum in plerisque tum locis, tum affectionibus, indefinita pharmaca scripserūt, neque cognouerunt quantam vim habeat certa distinctio ad artis constitutionem: in quibus sanè nihil miror quod omnia indiscriminatim confuderunt, quemadmodum in Apollonio Herophili sectatore mihi accidit: utpote qui norit quod iubeat Herophilus, Medicum omnino anniti debere ut sciat, quæ & qualis, & quantā sit morbi causa, & ubi
 maxi

maximè ea dominetur, quo videlicet & curationem vnicuique conuenientem faciat. Magis verò adhuc Archigenem quis miretur, qui & ipse non pauca indefinite & indistincte scripsit, quum in aliis curationibus, tum in eis præsertim quæ ad aurium dolores destinauit. Vna enim tantum in ipsis distinctione vsus est, à vehemètia nimirum & mediocritate doloris, Atqui & ipsius totam tibi adscribam dictionem.

Quæ pharmaca Archigenes ad aurium dolores conscripsit.

IN priore de pharmacis secundum genus libro, Archigenes in hunc modum hæc verba scripsit. In aurium dolore, præcedente alia diætâ quam ad capitis dolorem ordinauimus, Si quidem moderatus fuerit, simplicia vngenta tepida instilla, velut crocinum, aut irinum, aut rosaceum, aut nucum amararum succum, aut cassiæ vngentum, aut simplicem nardum, aut fusi-
num, aut amygdalinum, aut rosarum, aut mali punici, aut papaueris succum cum oleo calido, aut porri semen tritum. Aut veratrum album cum rosaceo tritum, tepidum per strigilem infunde. Aut opii parum cum lacte muliebri. Aut opii succum eliquatum cum lacte eodem modo. At verò ubi
vehe

vehemens sit dolor, Aluus per clysterē valide subducatur, & sanguis à cubito detrahatur, & quæcunque similia adhibeantur. Indeque fomentum ex decocto lauri aut simili quopiam fiat, aut ex sulphure viuo in aquam insperso. Exprimantur autem vehementer spongiæ, auribusque apponantur, facillime enim ab humore frigescent: quapropter fomenta sicca longe commodiora eis existunt, ex sale videlicet aut milio, aut simpliciter lana conuoluta, aut tenuibus mappis. Aut rutam feruefacito, eiusque decoctum in angusti oris vasculum transfundito, lanaque os eius obturato, & auriculæ admoueto, quo vapor inde per lanam ad aurem penetrare possit. Quidam in po-

Vet. cod. sca & modico oleo rutam coquunt, atque *pro, & ha* ita liquorem in vasculum infundunt, ex eo que *bent vel.* fomentum parant. Post fomenta verò aurem concutito, & balsamum cum rosaceo dilutum infundito, aut aliquod ex prædictis vngentis tepidum. Aut aliquod aliud conueniens ad auris dolorem, ex his quæ mox describentur imposito. Aut papaueris calicem tenuem farina ammicta, & in aqua mulsa coctum. Aut papaueris calicem tenuem cum ordeacea farina in vino coctum, Aut fœnum græcum aqua mulsa coctum. Aut semen lini eodem modo. Summe auxiliatur

liatur spongia ocularis melle cocto atque adhuc calido imbuta, & imposita. Aut ceratum ex irino, styrace ad ipsum ammixto. Egregiè facit ad auriū dolorem aloë rosaceo permixta, & mellis crassitudine infusa.

Aut chalcitis vino diluta. Aut perdicii succus tepidus instillatus per se, & cum melle. Aut nitrum modica aqua diluito, ammixtoque oleo tepidum instillato. Aut aristolochiæ radicem cum oleo. Aut veratrum album cum rosaceo tritum tepidum per strigilem instillato. Probè facit opium in testa torrefactum, similiterq; castorium, pari pondere, cum rosaceo & passo ad mellis spissitudinem redacta, In quibus deinde post fomentum, specillum lana obuolutum intingitur & imponitur. Aut succum fœniculi cum aliquo ex prædictis vngentis in principio instilla. Aut anguis senectam cum calicibus papaueris coquito & infundo, aut cum quopiam ex prædictis vngentis. Aut garum hispanum calefactum per strigilem instillato. Facit & acopon fœtidum tepidum infusum. Aut papaueris succus rosaceo, & modico crocino dilutus. Omnibus tamen præstat Hiera aromatica cum quopiani ex vngentis. Egregiè facit & veratrum album tritum cum melle & rosaceo infusum, meatu per purpuræ la-

nam obturato. Præclarè facit & veratrum
**Vet.cod.* cum **irino* vngento. Facit & cedria cum
cum irino nardino vngento infusa. Seuerus autem
oleo vel Asellos in aquariis vasis nascentes: Mille-
ngueto. pedas Latini vocant, cum vngentis tritos
 vlceratis infundebat. Quidam verò frigi-
 dam aquam dolenti auriculæ infundunt, &
 confestim quidem longè magis dolitant,
 paulo pòst verò perfectè à dolore liberan-
 tur. Alii melius faciunt, & in alteram non
 dolentem aurem frigidam infundūt quem-
 admodum Lucius solet. Præclarè faciunt
 & aloe & crocinum cum vngento amyg-
 dalino infusa. Aut æs tritum cum aceto &
 aliquo vngento. Summè prodest Silphium
 cum rosaceo, si exulceratio adsit. Mirabi-
 liter confert in excellenti aurium dolore,
 porri succus, & capri a vrina, & rosaceum,
 cum modica myrrha infusa. Aut Sciuri
 adeps in strigili tepesfactus instillatus. Aut
 alumen scillum & mētæ succum cum passo
 instilla. Aut piper albū & salē, pari pon-
 dere, cum sapa, sinistra manu, ter aut quin-
 quies, aut septies infunde. Aut cochleā si-
 ue limacā aphricanā putridam cōpungito,
 & rosaceo impleto, & feruesfactū calidius
 per strigilem infundito. Quod si ex pla-
 ga, externa pars auriculæ doleat, ad micam
 thuris lac affundito, semelque atque iterum
 diff

diffundito, ac tertio macerari in eo finito, & agitatū infundito: statim enim dolorem sedat. Hæc quidem Archigenes valde indistincte scripsit, possit autem quispiā mente præditus, reuocatis in memoriā his quæ prius dixi, facile animo cōcipere quale tandem ex prædictis pharmacis, singulis relatis aurium doloribus cōueniat. Nimirum si memor sit facultatis eorū: de qua in simplicium pharmacorum libris mentionem feci. Verū ego iam ad auriculares cōpositiones ab Andromacho scriptas transibo.

Auriculares compositiones Andromachi

numero XXXIII.

Q Vatuor & viginti cōpositiones auriculares ex ordine Andromachus cōscripsit, quarum aliquibus distinctionem quandam, aliquibus nullam apposuit: Et prima quidem ex eis hoc modo scripta est. Compositio auricularis ex libris Galli qua vtor. Myrt hæ drach. vnā, falis drach. quatuor, thuris drach. tres, spumæ nitri drach. tres, croci drach. quatuor, succi papaueris drach. tres, amygdalas amaras 20. galbani drach. duas, aceti boni quantum satis est. Descriptio hæc ad Menemachum refertur. Multi vsus hanc compositionem auriculare Andromachus scripsit, multis simul affectionibus auris destinata.

Verum antea à me dictū quod huiusmodi compositiones nihil magnopere corrigūt, neque etiam error ex earum vsu nobis cōtingit. Quæ verò vni affectioni cōgruunt, illam ipsam optime curant, alias verò aliquando, vltra hoc quod nihil iuuant, amplius etiam exacerbant. Secundam deinceps cōpositionem post prædictam scripsit hanc. Compositio auricularis Aelii Galli ad inflammationem, & intensos dolores.

* *Aliàs* Galbani drach. * octo, cinnamomi drach. *duas.* duas, myrrhæ drach. octo, croci drac. octo, * *Aliàs* thuris drach. * tres, spumæ nitri drach. tres, *octo.* succi papaueris drach. tres, aceti vt mellis accipiat spissitudinem. Oportet autem nitro prius præpatare ne pingue quicquam adsit, deinde pharmacum ipsum infundere. Et hic rursus ab obturatione liberantia, & cōcoctoria, & laxatoria & discussoria pharmaca mixta sunt, quæ vehementes dolores sanare non possunt, & ob hoc ipsis papaueris succus ammixtus est. Tertiam auricularem huiusmodi conscripsit. Auricularis compositio Laodici regis, qua assidue vtor. Castorii drach. duas, succi papaueris drach. quatuor, opopanacis drach. duas, spumæ lycii drach. vnā, passo excipe, & tepēfactis vtere. Hæc euidenter intēsis doloribus conuenit, non tamen aliis affectionibus.

nibus. Ego verò quemadmodum dixi, in vnaquaque affectione proprio pharmaco vtor, semperque papaueris succum fugio, neque nisi vrgēte necessitate, ad eius vsum peruenio. Quartā deinceps auricularem sic scripsit. Alia ad inflammationem & purulentas ac veteres affectiones. Fabæ Aegyptiæ internæ amaræ, aluminis scissi, piperis albi, spumæ nitri, croci, opii, malicorii, myrrhæ, thuris, nardi, singulorū drach. duas, castorii drach. vnam, aceti & mellis quantū sufficit, Alii mellis drach. sex, coniungunt. In hac compositione, pharmaca alia discussoria, & resiccantia, & obturatione liberantia sunt, & quædam etiā concoctoria, velut myrrha & thus existunt. Alumen autem scissile fortiter adstringens pharmacum, ad resiccandum purulenta ammixtum est. Adiectum est & opium doloris sedandi gratia, oppositumq; est ei castorium velut antea dixi, Sed in eiusmodi affectionibus non solum vt oppositū, sed & vt concoctorium earum, & tanquam resiccatiuū merito iniicitur. Quintam deinde auricularem Andromachus scripsit his verbis. Alia Xenocratis qua sæpe vsus sum. Spumæ lycii drach, duas, myrrhæ drach. vnā, thuris * Croci drach. vnam, aluminis scissi obolos tres, obolos tres * spumæ nitri obolos duos, trita cum aceto vet. cod.

reponito. Vtere cum aceto. Et hæc multi
vſus eſt, nō tamē in dolore forti cōuenit, vt
quæ neq; opiū neque caſtoriū habeat, neq;
quippiam ex adipibus ſedantibus dolorem,
neq; galbanū. Sexta cōpoſitio auricularis
conſequenter hæc verborū ſerie ſcripta eſt.

Alia Prytanidis concordat cum Harpalī
compositione. Myrrhæ obolos. 3. nardi
obolos. 3. croci obolos. 3. æris vſti obolos. 5.
opii obolos. 2. caſtorii obolos. 4. aluminis
ſciſci drach. 1. & rotundi drach. 1. Excipe
paſſo vbi fluxus fuerit, cum dolor roſaceo.
Vbi verò vermiculi generentur, veratri ni-
gri drach. 2. ammifceto. Probè fecit quòd
in fine vſum eius adiecit, quem nos ſanè di-
xiſſemus, ſi ipſe adſcribere neglexiſſet. Se-
ptima ſimilis præſcripta, in hunc modū de-
ſcripta eſt. Alia Vgari compositioni con-
ſona. Veratri nigri obolos. 2. myrrhæ obo-
lum. 1. & dimidiū. opii obolos. 3. æris vſti,
obolos. 4. aluminis ſciſſi obolos. 2. caſtorii

* Nardi obolum. 1. croci obolos. 4. * cum paſſo vte-
obol. 4. ad re. Octaua præſcriptis omnino ſimilis eſt.
dunt hīc De nona verò hoc modo ipſe ſcripſit. Alia
vetuſti co qua vtor in doloris vexatione & ſonitu.
duces. Nitri drach. 1. myrrhæ drach. 1. roſacei cya-

thum. 1. aceti cyath. 1. ſimul tritis vtere.

Hoc pharmacum non ad dolorem in in-
flammatione conuenit, ſed ad eos dolores
qui

qui ex obturatione, & flatu frigidus ac vaporoso, similiterq; ex humore oboriuntur. Decimam deinde hoc modo scripsit. Ad aures purulentas Harpocratonis. Florum mali punici, malicorii, aristolochiae, chalcitidis, nisyos cyprii, gallae, squamæ aris, singulorum drach. i. myrrhae, thuris, vtriusque obolos. 3. atramenti sutorii assati, aluminis scissilis, vtriusque obolos. 3. cum passo pastillos formato ac vtitur. Quod si etiam ipse pharmaci promissionem non præscripsisset, facillimum tamen erat nobis eam animo assequi, memoria repetentibus ea quæ in principio præfatus sum. Est enim aurium purulentarum resiccantium hoc pharmacum, quod ipsum malum ex fluxione quam ex capite delabente contingit, ob quam etiam exulcerationes diuturnas accidere videmus. Undecimam auricularē sic scripsit. Auricularis compositio in multis consona. Croci drach. i. myrrhae drach. i. castorii drac. 2. aluminis scissi drac. 4. thuris drac. i. cum passo ad mellis crassitudinē redigito, deinde etiam sic dilutis vtitur. Et hæc moderatas affectiones sanat, quæ admodum etiam ea quæ hanc sequitur. Ceterum quæ deinceps post hanc ab Andromacho adscriptæ sunt auriculares compositiones, eas citra meam expositionem adscribam, quum ipsas per se co-

gnoscere possint, qui prædicta memoria tenent. Verum quarum ipse cum distinctione fecit descriptionem, earum nulla amplius nostra interpretatione opus habet. Deinceps igitur omnes describentur: ne videlicet amplius alicuius alterius auricularis compositionis, ab aliquo alio medico conscriptæ, mentionem facere opus habeam, In his enim varietas omnium ipsarum comprehensa est. Auricularis ut Solon dicitur. Myrrhæ drach. 4. aluminis scissi drach. 4. castorii drach. 2. thuris drach. 1. croci drach. 1. opii drach. 1. cum cretico aut vino mulso ad mellis crassitudinem redige. Auricularis compositio Antipatri ad doloris vexationes. Croci sextantem, alii unc. 1. myrrhæ unc. 1. salis ammoniaci unc. 1. aluminis scissi, ammoniaci thymiamatis, utriusque unciæ dimidium, fecis vngenti irini aut Syriaci sextantem, cum vino mulso aut cretico ad mellis tenuis spissitudinem redige ac utere. Auricularis alia valde commoda. Opopanacis drach. 2. succi papaveris drach. 4. spumæ lycii drachm. 4. castorii drach. 2. aluminis scissilis obolos. 3. croci obolos. 3. myrrhæ drach. 1. Vfus eius est cum lacte muliebri. Ad aures purulentas compositio Spendusæ. Felis porci castrati partes. 2. mellis Attici partem

tem. i. Vase vitreo simul indita inferuido cinere vsque ad dimidium calfacito, atque ita vtitor. Auricularis Harpocratis ad affectiones & dolores. Spicæ nardi drachma. 6. myrrhæ drach. 6. piperis drach. 6. spumæ nitri drach. 6. floris salis drach. 6. croci drach. 12. nuces amaras. 10. succi papaueris drach. 12. vini veteris quātum sufficit, stanneo vasi pharmacum infundito. Ad gravitatem auditus & sonitus. Veratri albi drach. i. castorii obolum. i. spumæ nitri sesquiobolum. cū aceto optimo vtere. Alia, ad sonitus pulchra. Struthii drach. i. croci cilici drac. i. castorii drac. i. veratri albi drac. 4. nitri drach. * i. redigito in pastil. * Aliàs. 3. los, & vsu expetēte vino dilutis vtere. Ad aures purulentas. Alumen vstū & myrrhā cum melle terito, & præclota auricula pharmacum lana exceptum imponito. Auricularis Chrysanthi Gratiani, ad inflammationes & exulcerationes. Blatas detrahtis pēnis. 12. vini veteris & mellis vtriusq; sex uncem, mali punici putamen vnum, succi porri sesquicyathum. In olla noua donec mali punici putamen flaccidum fiat coquito, deinde terito, & vngenti Syriaci vnc. vnā addi cito, picis liquidæ sesquiunciam, ceparum. 4. succum expressum, & contrita simul reponito: vsu verò expetente tepefa-

cta lana excepta indito. Auricularis compositio ad inflammata & purulenta. Nardi indicæ drach. 1. aluminis scissi drach. 2. opii drach. 4. malicorii drach. 4. croci drach. 3. myrrhæ drach. 4. thuris drach. 4. mellis attici drach. 4. spumæ nitri drach. 4. castorii drach. 2. amygdalarum amararum drach. 8. piperis albi grana. 30. aceti cyath. 1. urinae suis sylvestris tantum lē, fabæ Aegyptiæ viridis internæ amaræ drach. 4. trita simul in stanneo vase reponito. Vfus tēpore cum rosaceo instillato, & lanæ purpura infectæ tomētum indito. Auricularis ad desperata velut Zoilus ophthalmicus tradidit. Seminis hyoscyami obolos. 3. aluminis scissi oboli dimidium, myrrhæ drach. 1. castorii obolos. 3. succi papaveris obolos. 3. gallæ obolos. 3. croci obolos. 4. cinamoni obolos. 4. thuris obolos. 2. spumæ nitri obolos. 2. sandarachæ obol. 2. vini recentis cochlearia. 3. urinae suis feræ masculæ cochlearia tria, sanguinis conchylii obolos. 3. succi mādragoræ obol. 1. mellis Attici quātū sufficit. conchylio aurē obturato. Auricularis alia ad inflāmata & purulēta mirabilis. Rutæ obol. 3. myrrhæ obol. 3. bac. laur. decort. obol. 3. succi hyoscyami dra. 1. opii. drach. 1. croci drach. 1. Cum lacte muliebri vtēre & tepidum infunde. Auricularis compositio
val

valde bona & probata ex Apollonii libris.

Myrrhæ drach. 2. thuris drach. 2. nucum amararum drach. 1. spumæ nitri drach. 2. aluminis scissilis drach. 1. malicorii drach. vnâ, spicæ nardi drach. 2. aloës drach. 3. vini mulsi veteris cyath. 3. Arida trita vino mulso ammisce, & cocta in stanneo vase repone, vsu verò exigente tepido vtere.

*Compositiones auriculares ab Asclepiade
in primo externorum scriptæ.*

Auriculares compositiones ad dolores aurium recentes, quibus Niceratus vsus est, Inter eas optima hæc est, Asellorum domesticorum, Est autem animal multipes in aquariis vasis & sterquiliniis enascens, quod ad digitorum contactum in orbem se contrahit, horum tres aut quatuor in oleo feruefacito, & expressum oleum auribus infundito. Facit & cucurbitæ succus cum rosaceo, aut nardino mixtus & tepefactus. Et perdicii herbæ succus cum oleo coctus. Et centaureæ succus aqua multa dilutus. Et hyoscyami succus rosaceo mixtus. Facit & papaueris succi parum lacte muliebri dissolutum. Et serofus cruor qui à carnibus bubulis dum torrentur destillat. Has itaq; crudas recentes prunis imponere oportet, & crudas adhuc exprimere,
&

& expressum liquorem calidum infundere. Facit etiam nucum putrefactarum internarum liquor, aceto dilutus addito rosaceo. Facit & Aphricana limaca in propria testa, cum oleo nardino aut rosaceo feruefacta. Facit & suis quæ non peperit fel, pari melle Attico ammixtum. Aliud, Succipapaueris, castorii, vtriusque obolos. 2. passo diluito, & modico rosaceo adiecto tepida infundito. Aliud, Succipapaueris & succi peucedani æquales partes dissolutas infundito.

Ad inflammationes cum exulceratione Charixeni.

MYrrhæ, opij, castorij, singulorū æquales partes, passo dilutas tepidas infunde. Aliud, Hyoscyami succi, succi papaueris, myrrhæ, castorii, singulorum drach. 4. piperis drach. 1. passi protropi quantum satis est. Ad siccas non humentes ulcerationes. Optimè conuenit & in pello appositum Oesypi drach. 4. medullæ ceruinæ drach. 4. butyri. drach. 4. adipis anserini drach. 4. ceræ tyrrhenicæ drach. 4. terebinthinæ drach. 1. olei cicini cyath. 2. olei amygdalini cyath. 2. olei cyprini cyath. 2. pisselæi cyath. 1. Cõponito & vtitur quantum sufficit oleo nardino diluto, & ad mellis crassitudinem redacto. Aliud valde com

commodum & ad neruorum affectiones.

Olei cyprini cyath. 2. irini, rosacei, amygdalini, olei veteris singulorum cyath. 2. pissellæ cyath. 2. ceræ sextantem, terebinthinæ vnc. 1. adipis anserini vnc. vnam, composito & vtitor. Aliud ad abscessus in profundo, Antonii Musæ. Croci drachmas. 2. myrrhæ drach. 2. bdellii drach. 4. nucum amararum drach. 8. succi marrubii, hemina dimidium, passiprotopi, hemina dimidium. Liquores coquito, & amixtis reliquis reponito. Vtere in passo dissoluens quantum sufficit. Aliud, Croci, myrrhæ, castorii, centaureæ, singulorum drach. 2. spumæ natri drach. 1. amygdalarum amararum depuratarum drach. 8. succi helxines sesquiseptarium, passiprotopi sesquiseptarium. Composito ac vtitor vt dictum est. Aliud.

Ad inflammationes cōfluxu, quo usus est Cleon.

MYrrhæ, aloës, thuris, succi papaueris singulorum drach. 1. Misios crudi drach. 1. aceto excipe, & usu expetente passo diluta infunde. Aliud Arii Tarsensis Myrrhæ drach. 4. thuris drach. 4. Misios crudi drach. 2. lycii indici drach. 4. aceto excipe. Usus iam indicatus est. Quod si multus fluxus oboriatur subscriptis cōpositionibus vtendum est, croci, thuris, myrrhæ, opii, seminis viticis, singulorum drach. vnam.

vnam. lycii indici, florum mali punici, florum rosarum singulorum drach. 2. aceti heminam vnam. Viticis semen, mali punici flores, rosarum flores, in aceto coquito, & ubi dissoluta fuerint reliquis adiicito, & excepta reponito. Vfus tempore passo diluta infundito. Aliud ad purulentas aures cum dolore, quo vsus est Cimon. Castorii drach. 2. aluminis scissi, croci, myrrhæ, thuris singulorum drach. 1. passo aut vino myrtite excipe, ac vttere ad recēs malum cum vino mulso, ad inueteratum cū aceto. Aliud Claudii Dāmonici ad purulenta & inueteratas affectiones. Croci drach. 3. myrrhæ drach. 1. nuces amaras depuratas numero. 30. spumæ nitri, nardi feriacæ, aluminis scissi, singulorum drach. 1. thuris obolos. 3. Aceto acerrimo excipiuntur, & per acetum diluuntur. Ad fœtorem & nomen siue vlcus depascendo proserpens, compositio Hispanorum appellata. Gari nigri quod Romani Sociorum appellant, sexta. 1. aceti scillitici sextarium. 1. mellis Attici sesquiseptarium. Ad compagem coquito, & in vitreo vase repositis vtitor. In aliis descriptionibus sic legere est. Succu cucurbitæ sextarium. 1. composito, facit ad fœtorem cum inflammatione. Charixeni ad corruptiones & fœtores. Aluminis Me-
 li

lii drach. 8. atramenti sutorii drach. 8. aloës
drach. 8. crocomagmatis drach. 8. myrrhæ
drach. 8. vini myrtitæ sextarium dimidium.
Alumen & vinum ipsum coquito, atque vbi
in compagem coierint, reliqua aceto disso-
luta iniicito, & repositis vtitor. Ad car-
nium incrementum, quo vsus est Heracli-
des Tarentinus. Aeruginis rasæ drach. 8.
quam æris drach. 8. In alio exemplari
drach. 4. mellis heminæ dimidium. Arida
rita ac melle excepta donec rubefiant co-
quito, & ablatis vtitor. Aliud, Aeruginis
drac. 4. atramenti sutorii drach. 4. myrrhæ
drach. 4. succi marrubii cyath. 3. mellis quā-
tum sufficit, præpara vt dictū est. Chalce-
donia ad inueteratas affectiones. Veratri
albi drach. 4. croci drac. 4. myrrhæ drac. 4.
castorii drach. 4. thuris drach. 4. opii dra-
chmas. 4. atramenti sutorii drach. 16. pipe-
ris drach. 2. myrrham, opium, thus, casto-
rium, in aceto cui malicorium incoctum est,
vsque ad dissolutionem macerato, deinde
veratrum, crocum, piper, atramentum su-
torium, contusa iniicito, atque omnia simul
diligenter terito: quod vbi probè factum
fuerit, vini mulsi quantum satis est affundi-
to, vt ad diluti mellis crassitudinem redi-
gantur. Vsu verò expetēte tepesacta infun-
dito. Ex huius pharmaci vsu sæpe egregiè
mi

mihi succēssit, verū temporis progressu
omphacii drach. 1. ad hanc descriptionem
adieci.

*Aegyptia ad easdem affectiones etiam
si sint connatae.*

A Mygdalarum amararum depuratarū
drach. 2. fabarū ægyptiarum interio
ris partis amaræ, piperis albi, croci, myrrhæ,
opii, singulorum drach. 2. thuris drach. 2.
omphacii drach. 4. aluminis scisci drach. 4.
castorii drach. 2. atramenti sutorii drach. 4.
spumæ nitri drach. 2. Aceto in quo malico-
rium incoctum est excepta, ad limi crassi-
tudinem redigito. Vſus verò tēpore quan-
tum suffecerit ex pharmaco acceptum, ac
nardino vngento dissolutum infundito.

Ad sanguinis ex auribus eruptiones. He-
raclidæ Tarentini, facit vt ne in grumos
coëat. Marrubii succum* coquito & am-
mixto aceto infundito. Aut mali punici
in aceto cocti succum exprimito & infun-
dito. Aut polygoni succum cum modico
aceto. Aut acaciam, aut amurcam, aut ly-
cium cū aceto. Aliud Botryos sistit san-
guinis eruptiones. Succum rubi, & suc-
cum gallarum in aceto coctarū, simul mi-
xtos infundito.

Quæ

*Quæ pharmaca Archigenes post prius
scripta subiecerit.*

Pharmaca ad aurium dolores ab Archi-
gene scripta suprâ relata sunt. Nûc ve-
rò etiam ea quæ ad alias affectiones con-
scripsit apponam. Humentibus verò po-
lygoni succum cum pari rosarum succo in-
fundito. Aut crocum & myrrham cum
passo & rosaceo tepesacta infundito. Puru-
lenti autem prodest quidem polygonum
cum rosaceo infusum, Verùm egregiè con-
uenit eis vinum, in quo conizæ tenuia folia
habentis folia sint incocta, instillatum.

Quidam etiam thus ad vinum ammiscet,
Aut lycium rosaceo dilutū instillato. Aut
marrubii sylvestris semen cum aceto & ro-
saceo eodem modo. Aut cumini & croci
æquale pondus cum vino austero. Aut cro-
ci & myrrhæ vtriusque drachm. duas nuces
amaras decorticas numero XXXV. nu-
ces tritas cū mellis hemina dimidia, & porri
succo hemina dimidia commisceto, & reli-
qua item probè trita iisdem liquoribus di-
luito, ac simul deinde contrita instillato.

De auribus exulceratis.

Cæterum exulceratis auribus & cruen-
tis ac dolentibus, galbanum & opium
cum passo & rosaceo, mellis crassitudine
instilla, aut pro galbano peucedani succum

p

ammisce, & magis succedet. Aut spodiū
allatum cum rosaceo tritum infundito.

Aut lycium cum lacte muliebri. Magnificē
opitulatur etiam ipsum mel per se tepidum
infusum, præsertim si foetores simul ad sint.

Quidam asellos Millepedas appellatos,
qui in aquariis vasis reperiuntur, cum vo-
gento quopiam instillant, & eximie opem
sentiunt. Aut blattas domesticas cum ro-
saceo instillato. Probè facit ad omnem au-

*Vet. cod. ris affectionem, adest vulpinus * inuetera-
recens, tñ tus liquatus & instillatus. Aut sphōdyli
salitus. interiorē velut medullā cum melle & rosa-
ceo infunde. Aut elota diligēter & con-

*Hæc præ scalpta auricula porri aut marrubii succum
tereā re- cum melle infunde. Aut lixiuium figu-
periuntur larium cum melle feruefactum. Aut thus
in vet. cod. cum aceto in mali punici putamine ferue-
Aut crocū factum infunde. * Aut gallin tritam lin-
e alumē teolo illigatam in vino coquito, & ex hoc
scissum cū instillato, statim à dolore liberat.

vino mul

De vermibus aurium.

so in puta **P** Orrò in quibus vermes sunt, veratrum
mine ma- album cum melle immitte, aut ari-
li punici dum insuffla, aut rubi succum infunde.
pari modo Quod si verò auriculæ os corrosum sit,
feruefa. fissura retro aurem impacta, ipsum scalpito,
etum in- deinde vrito, ac citra molestiam cicatricem
funde. inducito.

De

De sonitu in auribus.

Sonitus quidam ex flatuoso spiritu generatur. Quidam ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem fiunt, quemadmodum in oculis imaginarię suffusiones, propter vapores ex ore ventris exhalantes. Ceterum neutrius affectionis certa cognitio in principio haberi potest, Non conuenit tamen citra artem, aut cognitionem, aut curationem auspicari. Dictum enim iam sæpe est atque etiam demonstratum, non unum coniecturalis spei genus esse: atque artificialem quandam coniecturam ex causis forinsecus laceffentibus, procatarticis à Græcis appellatis, facere licet, si quis ipsarum vires norit, quum alia affectio ex frigidityte, alia ex ardore fiat. Quemadmodum etiam ex prægressa plaga, aut tali vel tali morbo: velut & ex cruditate, aut largovini potu, aut violento & multò vomitu: aliquando & ob pharmacorum auricularium vsum, sonitus quidam fiunt. Quin & si vel paulatim congregetur, vel coaceruatim irruat sonitus, id ipsum quoque ad inuentionem affectionis conducit. Insuperque si per intervalla repetat, vel continenter hoc symptoma perseueret. Verum certa cognitio tempore contingit, post vsum pharmacorum artificiali coniectura exhibitorum. Si quidem igitur in febribus sonitus

fiant, minimè interturbandi sunt: vt plurimum enim statim sedantur. Si verò ob flatum ventosum, cui transitus interclusus sit, sonitus fieri suspicatus quispiam fuerit, & ob hanc rem dissecantibus & attenuatoriis ac discussoriis pharmacis admotis, nihil profecerit, simulq; apophlegmatismis vsus sit, & toto capiti prospexerit: huic merito in hanc suspensione inclinatus animus erit, sensus audiendi videlicet subtilitatem sonitus causam esse, præsertim si acuto audiendi sensu æger præditus appareat. In eiusmodi itaque quendam, qui prædictis pharmacis vsus erat, neque quicquam opis senserat, quum ego fortè incidissem, ex stupefacientibus sensum quippiam ammiscui, velut est mandragoræ succus, & papaueris succus, ex eisq; à sonitu symptomate liber euasit. Quæ igitur à prioribus medicis ad huiusmodi symptomata & accessoria mala conscriptæ sunt auriculares compositiones ex discussoriis & incidentibus pharmacis constant. Suprà itaque in Catalogo & enumeratione compositionum auricularium ab Andromacho descriptarum, ex eiusmodi materia composita quadam recensebantur, quas ipse ad sonitus conuenire scripsit. Nunc verò eas quas Archigenes ad hanc rem conscripsit recensebo.

Conte

Compositiones ab Archigene ad sonitus conscriptæ.

IN sonitibus repentinis acetum cum rosaceo instilla. Aut cuminum & oleum crassitudine mellis. Aut radicis cucumeris sylvestris succum. Aut ipsam radicem oleo incoctam. Si verò ad multum tempus perseverent, omnibus amaris & acerbis, attenuatoriisq; & discussoriis, quæ ad dolorẽ ex crassis humoribus obortum descripta sunt, vtaris, singulis in aceto coctis & admixto melle. Aut reclinato ægro, & nitro crudo trito in aurem insperso, acre acetum tepidum infunde, ac postquam feruere desierit, lana scalpendo exterge, & nucum amararum succum infunde, & lana obtura. Aut nitrum & myrrham probè vnita, cum rosaceo & aceto, ac atramento scriptorio crasso instilla, aut penna in eis immersa bis in die inde. Aut castorio ac nardino pari mensura cum aceto & rosaceo vtare. Aut aceto ac nitro melleq; mixtis collue. Cæterum quibus ob multam sensus subtilitatem sonitus oboriuntur, castorium & cucurbitæ semen cum aceto trita instilla. Ex morbo verò obortis sonitibus, vbi fomentum ex decoctione absynthii adhibueris, acetum & rosaceum instilla. Aut raphani succum cum osacæ, aut aloë optimam cum vino mul-

so dilutam. Si verò perdurent, veratrum nigrum aceto decoctum adhibe. Huiusmodi quidem Archigenes ad sonitus aurium conscripsit verum Apollonius in primo parabilium subscripta habet.

Quæ Apollonius ad sonitus & susurros sibilosq; ac inflationes aurium conscripsit.

* Ex cod.
vett.

A Cetum acre tepidum instilla. * Oleū & acetum tepidum instilla.] Mel Atticum calidū instilla. Laurinum oleum eodē modo. Porri succum cū lacte muliebri aut rosaceo infunde. Cucumeris sylvestris foliorum aut fructus succum per linteolū instilla. Cucurbitæ sylvestris medullam oleo dilutam infunde. Cuminum tritum cū medulla virulina instilla. Cucumeris sylvestris medullam oleo dilutam infunde. Glan- dem vnguetariam terito, & adipe anserino ac resina pari mensura ammixtis instillato. Semen lini tritum & vngento Arabico dilutum instilla. Misy terito & vngento rosaceo dilutum instillato. Rutam & cuminum pari mensura trita & aceto diluta, ammixto melle infunde. Hyssopum tritam & cedrino oleo dilutam instilla. Amygdalarum amararum oleum melle mixtum eodem modo. Quod si efficacius reddere velis hoc cum priore committito. * Folia sylvestris cucumeris succo expresso infunde.]

* Hæc ad
dit vet.
cod.

VI

Viticem & stellionis caput pari pondere trita ammixto oleo instilla. Nitrum & refinam & adipem anserinum, æquis partibus cum oleo ammixto dissoluta instilla. Cepas & allium & adipē anserinum pari mensura trita & excolata infunde. Et aqua collutis prius calida nitrum tritum insuffla.

Ad aures exulceratas & purulentas eiusdem.

PRimum quidem collutiones Apollonius scripsit. Secundum deinde locum infusilia habent. Tertium resiccatoria, & quartum quæ insufflantur, iuxta subscriptam ipsius dictionem. Aqua calida assidue colluc. Lenticulæ decocto eodem modo. Aqua mulsæ calida similiter. Hederæ cremore aut decocto cum vino utitor. Malicorii cremore aut decocto similiter cum vino. Gallæ plenæ decocto cū vino. Myrto in vino decocta elue. Vino cū modico alumine trito utere. Stæbes semine in vino cocto elue. Vrina & vino mixtis ac calfactis elue, Infusilia: picis serum infunde. * Nitrum vino dilutum infunde. Myr- * *Hæc re rhā tritā ex antiquo vino infunde.] Oleæ* *tu. cod.* folia exsuccato, & ammixto melle coquito ac utitor. Papaveris succum passio dilutū instilla. Ceparum succo cū melle utere. Rutæ sylvestris succum, cum vino & oleo rosaceo in mali punici putamine calfactis

* Hæc o- instilla, * Fel bouis vel suis in putamine
mnia vet. malipunici calefactum infunde. Fel capræ
ced. vel ouis, vel marinæ testudinis cum mulie-

bri lacte tepesfactum infunde.] Carda-
 momum tritum cum melle instilla. Peuce-
 dani succum rosaceo dilutū instilla. Aloë
 & crocomagma diluta instilla. Absin-
 thio cum melle trito vttere. Myrrham &
 resinam ac anserinum adipem cum oleo tri-
 ta infunde. Pinguitudinem caseo in figuli-
 num vas recens coacto superstantem tepe-
 factam instillato. Diphryges tritum cum
 melle instillato. Alumen scissum tritū cum
 passo & aceto, ad mellis crassitiem coquito,
 ac vtitor. Resiccatoria. Cedriam melle
 mixtam instilla. Piperis albi grana tri-
 vngento Aegyptio diluta, & in parua con-
 cha trita instilla. Crocum & cerusam pa-
 ri mensura trita, & rosaceo diluta infunde.

Melanthium & sulfur pari pondere te-
 rito & rosaceo diluito, & vngento irino,
 adipeq; anserino pari mensura additis rur-
 sus terito ac vtitor. Myrrham & sulfur
 æquis partibus, trita & oleo mixta instilla-
 to. Myrrham & putamen mali punici dul-
 cis, æquis partibus, trita ac melle diluta in-
 fundito. Animalcula ex arboribus, velu-
 ti rubri vermes, trita & oleo diluta instilla.

Animalculum quod Intestinum terræ ap-
 pel

pellatur, coctum & excolatum instilla.
 Resinam & melac oleum pari mensura mi-
 xta ac dissoluta instilla. Malum punicum
 dulce accipito, & execto eius vmbilico aci-
 nos eiicito, deinde passicyathum vnum in-
 fundito, & atramenti sutorii triti obolos
 duos infarcito, & ad mediocrem crassitu-
 dinem coquendo redigito, ac tepido uti-
 tor. Quæ insufflantur. Gallam tritam
 insuffla. Piper rotundum cum vino con-
 tritum insperge. Eodem etiam magis di-
 luto pro infusili vtendum est. Ompha-
 cium & gallam torrefactam æquis parti-
 bus trita insuffla. Cinerulam cipriam leui-
 gatam insuffla. Vtendum etiam deambu-
 lationibus, & ventris euacuationibus, & ci-
 borum subtractione, & purgatione aurium
 diligentiore. Ad aures humectas. Cæ-
 terum ad aures humore madidas, ita enim
 Apollonius appellat, subscripta pharmaca
 commoda existunt. Misy linteolo illi-
 gatum vrito, & cum ipso tritum insufflato.
 Galla vsta ac trita similiter vtitor. Spo-
 dio trito eodẽ modo. Alumen in testator
 reffectũ & affuso oleo tritũ insufflato. Cæ-
 terum eadem diligentia circa diætã vtitor.

Ad auditus grauitatem.

Porrò in subsurdis, siue grauiter & dif-
 ficulter audientibus, aut etiam surda-

P s

stris appellatis, utpote qui exiguas voces penitus non audiunt, magnas autē vix percipiunt, hoc ipsum symptoma valde suspectum habere oportet: paulatim enim auge- scens temporis progressu perfectam surdi- tatē inducit. Quapropter per hierā purgā- di sunt, & per catapotia ex colocynthide, pituita q̄; eis per apophlegmatismos detra- henda, ac caput resiccandū est, omni q̄; mo- do curandum ut robur ei addatur, quē ad- modum iam saepe est demonstratum. Vten- dum etiam attenuatoria diēta. Atque in ip- sam auriculam pharmaca coniicienda sunt, quæ crassos & viscosos humores findūt ac diducunt. Quorum sylua eiusmodi est.

*Quæ Apollonius in primo parabilium ad
auditus grauitatem pharmaca
conscripsit, in hac verba.*

AD auditus grauitatem repentinam, & ex dolore capitis obortā, Absinthiū cum aqua decoquito, & per stipulam fomē- tum inde facito, quo modo aliās per arun- dinem id fieri demonstrauius. Baccis lauri aut foliis eiusdem in aqua decoctis si- militer vtitor. Similiter etiā origano, atq; item hyssopo. Aqua quoque marina & ace- to eodem modo. Eisdem autem & in olla coctis vtendum est, fomentum verò per ollam quomodo fiat iam demonstratū est, Ace

Aceto albo & aqua pari mensura cum nitro trito feruefactis, ad plures dies eluito, atq; inde aqua simplici calida eluito, & sic ea qua ad hanc rem descripta sunt infundito.

* Marrubii succū & irinum vngentū mixta * *Πεδος* instillato. Fel tauri & capræ ac vngentum *cod. im-* rosaceum mixta instillato. Ceparum suc. *pressi ac* co & resina oleo dilutis æqualiter vtitor. *vetusti fe*

Oleo nucū & resina mixtis pariter vtitor. *re omnes*

Alumen aceto dilutum instillato. Myr- *habent id* rham & alumen pari pondere trita & aceto *est, porri,* diluta infundito. Adipem anserinum & fel *& sic vet.* bouis, ac laurinum pari mensura mixta in- *interpre* stillato. Hedera sylvestris baccharū suc- *legit.* cum per linteolum expressum instillato.

Veratrum nigrum aceto tritum, melleque multum cocto exceptum, in parua collyria ad formam glandis redigito, eaque meatui indito, ac per dies quinque finito. Senectam anguium aceto tritam instillato.

Eadē & cū felle bubulo, aut caprino, aut testudinis marinæ, aut callionymi picis diluta vtitor. Nasturcii quantū sufficit, & nitri parum, carne ficus reiectis granis excipito, indeque collyrium auditorio meatui cōgruū formato ac indito. Per tridnū autē ipsum eximito. Hoc multas sordes educit, & cōfestim leuius malum reddit. Cæterum reliqui corporis quoque cura habenda

da est. Deambulationibus itaque pro viribus multis utendum est, & capitis reliquorumque membrorum frictione. Insuper & apophlegmatismis & collusionibus quæ pituitam extrahere possunt. Cibis utendum est copia moderatis, & ex genere eorum quæ facillè exoluuntur & facillè concocta excernuntur. Plurimum autem auxiliatur in huiusmodi affectione constitutis, spongia tenuissimè contrita & conuoluta in orbem melleque imbuta & auriculæ indita. Idem remedium commodum est & ad carnem in auditorio meatu nascentem. Post hæc verò inquit, utendum esse ollæ fomento iam antea se indicato. Indicauit autem hoc ipse inter reliqua auditus præsidia, verum ego ipsum velut à me condemnatum reliqui, propterea quod ad elotionem quidem præstet in aurium dolore, utilitatem autem de se omnino nullam præbeat. Quapropter nunc ipsum apponam: verisimile est enim surda stros inde iuari, utpote qui contrariis præsidiis opus habeant his qui aurium doloribus vexantur. In doloribus enim affectæ partes exquisita quiete opus habent, Surda stri verò vehementi motu, & ferè dixerim transmutatione in contrariam ei quæ iam adest affectionem indigent.

Fo

Fomenta ad aurium dolorem ab Apollonio his verbis conscripta.

FOmentis porrò vtendum est per spon-
gias aqua calida imbutas ac sufficiēter
expressas. Itemque per cucurbitas affixas.
Amplius verò & per vaporem ex arundini-
bus perforatis allatum. Oportet autem
alterum arundinis extremum concavitati
auriculæ congruens esse, alterum verò in
ollam perforatum operculum habentem, &
vndique obturatā incumbere. Sit autem in
olla absinthium in aqua feruefactum, quo
vapor inde sublatus ad auditoriū meatum
perferatur. Similiter & per* fermentum in* *Tam*
veru assatum fomentum adhibendum est. *impres- si*
Vehemēter etiam subscriptus fomenti mo *quam ma*
dus conuenit. Vrinam tauri maximè, aut *u- scrip.*
certè bouis vetustissimam, in ollam nouam *cod. quos*
angusti oris infundito, & aceti tertiā *vrinæ legi habet*
partem, ac myrtum contusam ammisceto, *per adipē*
deinde testas pro ollæ magnitudine satis *gracè ve-*
multas, igni candefactas in ollam conicito, *no siati-*
posteaq; hominem inclinatum apposita ad
ollam aure, fomentum admittere iubeto.

Circum aurem verò fasciculum ex lana in
orbem circumponito, ne videlicet circum-
sitæ partes exurantur. Vtendum & farina
ordeacea ac triticea in vino cocta, itemque
vngento irino calido, gratia fomenti. Su-
per

pernae verò auriculæ imponendæ sunt lanæ molles ac puræ vino & oleo imbutæ, ordea cea itidem & triticea farina, aliquando quidem per se cocta, cum vino & vngento irino, aliquando verò columbino stercore, & aristolochia tenui, equis partibus amixtis. Confert autem & cibi abstinencia, & diæta tenuis, & alui euacuatio larga & memorabilis. Insuper & quies, ociū, capitis velamē, In potu aqua calida, aqua mulsa, ptisanæ succus cū melle, donec remiserint dolores.

Quæ Archigenes ad auditus grauitatem, ac surditatem his verbis conscripsit.

IN auditus grauitate succum corticis raphani cum rosaceo aut cyprino tepescitum instilla. Aut galbanū cum aceto & melle feruefactum. Quod si surditas succedat, Veratrum nigrum erui magnitudine in cocto melle indito, ac donec quod impedit erodat finito. Aut vbi absinthii decocto elueris, mel & oleum instillato.

Aut collyrio ex nitro, ficu, & sinapi immisso, per triduum id non extrahimus. Postea verò acutis vocibus assiduis & vicissim grauibus inclamamus, & per tubam sonitu immisso malum depellere conamur. Post hæc & asphodeli radices oleo veteri incoctas vtiliter infundimus, caprinaque vrina assidue

duè eluimus. Cæterùm surditate ex capitis dolore oborta, raphani succum cum rosa-
ceo infunde. Aut foliorum cucumeris syl-
uestris succum. Aut castorium cum bac-
cis lauri & aceto.*

*Eiusdem de corpusculis quæ auri-
bus illabuntur.*

* Aut ni-
grū vera-
trum albo

QUOD si aqua in aurem illabatur, Auxiliatur acetū, & cum altero pede affe-
ctæ auriculæ propinquo exilire, ali-
qualiter seipsum reclinando. hoc enim mo-
do faciliè excernitur. Quin & exuctio sim-
plex per os, aut etiam per stipulam, egregiè
aquā extrahit: quod ubi factum fuerit, con-
scalpta per lanam auricula, ex prædictis vn-
gentis aliquod instilla. Si verò calculus, aut
faba, aut cōsimile quippiam, in auditorium
meatū illapsū fuerit, eluito, aut lana circa
auricularium specillum obuoluta, & resina
tincta extrahito. Idē & per glutinosum ali-
quod pharmacū fieri potest. Quod si neque
sic sequatur, sternutatorio in nares iniecto,
os ac nares obturato: facta enim spiritus
conclusi extensione, id quod incidit effla-
tur: idque assiduè donec excidat facito. Si
enim intus māserit, aure inflammata cōuul-
siones inducet. Optime etiā confert ad eo-
rum quæ illapsa sunt eiectionem, cōcussio.

aceto ma-
defactum
erui ma-
gnitudine
melle com-
mixtū &
in glandis
las reda-
ctum im-
pone. hæc
habet vet.
cod. nos
hic appo-
suimus
quia idē
videtur
cum supe-
riori.

Si itaque puer fuerit, pede comprehensum
&

& in caput eleuatum, cum concussione vibrabis, Si verò perfectæ ætatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabulam secundum affectam aurem reclinatum, caput ad tabulam firmare iubeto, deinde leuata tabulæ circa caput parte, & deferri finito, idq; sæpe repetito. Mouebitur enim quod incidit, & ad expeditiores meatus partes progredietur, atque ita angusta & cōcaua specilli parte immissa scitè extrahito. Si verò faba aut consimile quippiā in aurem illapsum, in ea maneat, madefactumque & tumefactum, dolores inducat, impossibile quidem est ipsum integrum eximere. Quare per specilli cōcauum industriè partiri ac diuidere id ipsum oportet, atque ita particulatim extrahere, deinde saram aut vinum dulce calidum infundere, ac lenire meatū ex laniatione offensum. At verò si animal aliquod illapsum sit, scammoniā aceto dilutā, aut absinthii succū, aut peucedani succū, nitrūq; ac sulphur cū raphani succo instillato.

Apollonij de vsidem.

A Pollonius autē de iisdem sic scripsit, Ad pulices & vermiculos in auribus, reliquaque earum poro illapsa, acetum & oleum instilla. Aut capparidis succum instilla. Aut amygdalas amaras terito, & oleosum ab ipsis expressum instillato. Ve-

rat

ratrum album tritum inspergito. Aut Aristolochiam tritam inspergito. Aut calaminthæ succum infundito. Aut cinnabarim viridem instillato. Aut veratrum album cum vino infundito. Aut aluminis & seminis cucurbitæ sylvestris, siue medullæ eius, æquas partes tritas cum oleo cedrino instilla. Aut cepam tritam & * cæsy- * *Hyssopū* pum æquis partibus in vino diluito ac infun- *habēt græ* dito. Aut myrrham tritam, acetoque ac *ci cod. tam* melle pariter dilutam adhibe. Aut chal- *impres.* citidem crudam tritam ac melle dilutam *quam ma* infunde. In vniuersum verò eximendum *nuscrip.* est quicquid in meatum incidit hoc modo. & sic ha-

Per auriscalpium nimirū aut volsellam, *buit vet.* aut lanam mollem specillo obuolutam & *interpr.* resinatam, aut etiam quæ vncinum habeat tenuem appensum. * Ad aurium sordes.] * *Sic vet.*

Nitrum etiam assatum tritum auriculæ *cod.* inspergito, & acetum instillato, ac lana appositā per noctem finito. Sequenti verò die aqua & oleo calido eluito. Cæterum ad aquam in aurem acceptam, cepæ succum & adipem anserinum tepefactum instilla.

Aut mali punici nucleo carentis dulcis & acidi, succum in æreo vase donec duæ partes supersint coquito, indeque duas guttas instillato. Aut myrrham ex aceto & melle tritam infundito.

Auricularia pharmaca à Critone con-
scripta his verbis.

AD sonitus auriū à morbis. Absinthiū
 * Myrtum in aqua decoctum pro fomēto adhi-
 pro myr- be, & rosaceū cum melle instilla. Aut ra-
 rha habet phani corticis succū cum rosaceo instilla-
 hic vet. Aut aloē cum vino & melle. Aut thus
 cod. cum aceto & rosaceo in malicorio ad mel-
 * xupis, lis spissitudinē coquendo redactum. Aut
 id est abs- hyoscyami succum cum rosaceo tepidum.
 que habet Aut radicū calami viridis succum cum
 grec. cod. lacte. Aut rhamni succū cum celtica nar-
 * Tomen- do. Aut gallam nigram cum pari * myrrha
 tum lanæ ex melle. Aut lycium cum vino mulso in-
 conchylj stilla. Aut vulpis adipem. Ad dolores
 ait grec. auriū * cum humiditate & purulentia. Vini
 quod ne- veteris sesquiunciam, mellis corfici vnciam
 scio num vnā, nitri rubri vnciæ dimidiū. lycii indici
 sit de la- vnc. i. lycium cum vino & nitro tritū leui-
 na intelli gato, ac mel ammisceto, & in vitreo vase
 gendiū san reposita infundito, hyeme quidē bis in die,
 guine pur æstate verò sæpius, & * tomentū lanæ con-
 pure infe chylio infectæ indito. Ad aures purulētas.
 eta, vel po Alumen scissile terito, & affuso aceto ad
 tius de la liquidiorē strigmento cōpagem redactum
 na quæ in lana cōuoluta excipito, & resiccata lana, ex
 quibuslā ipsa in aurē indito, aut hoc ipsum phar-
 conchilys cum liquidum per lanam specillo obuolu-
 reperitur, tam in aurē demittito, eamque ex eo quo-
 tidie

ridie illinito. Expedit & modicum pas- *qua nunc*
 sum adfundere ne pharmacum exarescat. *etiā qui-*
dam in si-
milibus
 Archigenes ad aurium affectiones
 extra meatum.

CAeterum ad affectiones aurium extra *utuntur*
 meatum auditorium Archigenes hac cō- *affecti-*
 scripsit. Ad aures cōtusas, myrrhā, thuris, *bus.*
 mannā, terrā nigram, qua aliqui se tāquam
 sine gmate cōfricant: cum acri aceto probè
 vnita cerati crassitudine imposito, & ne-
 quaquā amplius irritato, Aut cerusam &
 apii semen pariter accepta cū melle obline.
 Quidā absinthiū pro cerusa scribūt. Aut
 sulphur viuū, myrrhā, & thus cum pice li-
 quida in splenio imposito. Aut glutinum
 fabrilē & asphaltum siue bitumen eodem
 modo. Quidam etiā mannā, hoc est, thu-
 ris micas ammiscent. Aut cephalico Ascle-
 piadeo emplastro vtere. Aut pastillis pu-
 dendis destinatis illine. Porro in quibus
 cōtusae sunt aures, intrinsecā expeditiorem
 cōcauitatē cartilagineā, figulina terra *ex- * *ἐμπλά-*
 pleto: & sequēti die vbi exaruerit, solanum *oas ait*
 cum cerusa illinito, vsquequo in integrum *vet. cod. i.*
 restituantur. Verum in auriū vulneribus *emplastri*
 & fissuris, cartilagine probè coaptata fibu- *modo ap-*
 las imposito, deinde inflammationē arcen- *ponito.*
 tibus & reliquo glutinatorio ductu vtitor.

At verò inflammata in aurium puerorum

pulpis foramina oleum, quod in ærea lucerna æruginem contraxerit, illinendo persanabis. Cæterum Asclepiades huiusmodi ad cõtusas & fractas aures compositione usus est. Paruas cochleas cū testis & rubrica tritas apponito. Aliud, Aloës partē. i. glutinis fabrilis cū aceto cocti partē. i. mixta imponito. Aliqui mannā siue micas thuris ammiscent. Epithemata ad contusas aures. Cotyledonis herbæ drach. octo, amygdalarū amararum depuratarū drach.

* Aliàs * duas, tragacanthi drach. duas, aceto dilue
quatuor. & visco quercino excepta, & linteolo infarta, impone. Aut ceræ drach. octo, galbani drach. 8. cachryos. 3. 8. nucū amararū. 3. 8. visci quercini. 3. 16. thuris. 3. 8. misyos assati. 3. 8. cōponito ac vtitor. Apollonius autem hoc modo, tum auriū inflāmationes in superficie cutis ex humorū impressione aut plaga obortas, tum tumores ac rubores curauit. Butyrum recens excolatū instilla.

Aut adipem anserinū colatū instilla, Aut adipem anserinū & lac muliebre mixta instilla. Aut glandis vnguētariæ succum & resinam liquidam tepidam affunde. Aut adipem bubulum ac anserinum æquis partibus liquefactos instilla. * Aut ocimi succum ac anserinum adipem æquis partibus misce & instilla.] Aliud quod illini potest.

Pa

Papaueris succum aqua dilutum, penna illinito. Aut crocum tritum & muliebri lacte dilutum illinito. Aut argenti spumam cum aqua & nardo tenui tritam illinito.

Aut cerusam coriandri aut polygoni aut solani succo dilutam illine. Cataplasmata, Absinthium tritum ex aqua pro cataplasmate impone. Aut *sesamum aqua tritum im-
 pone. Lentem ex aqua coctam & tritam cum melle
 impone. Aut mali punici dulcis putamina
 cocta & trita in vino: hoc valde commodum
 pharmacum existit. Aut myrrham & adipem
 anserinum, vel butyrum, vel resinam, & conchylii partem internam æquis partibus trita super aurem & propinqua tempora impone. Conuenit autem ad hæc ciborum abstinentia, alui euacuatio, insuper velamen capitis ac reliqui corporis, quiesque. Longe verò remota esse debent, ardor, frigiditas, balneum, vomitus, clamor, & omnis distentio.

Ad exulceratas ex plaga & fractas aures.


Panem calidum internum cum melle tritum impone. Myrrham cum vino veteri tritam illine. Cochlearum colla vnâ *cum
 testis terito, & dimidiam myrrhæ partem
 addito ac imposito. Absinthii & apii se-
 minis æquales partes tritas cum melle im-
 ponito. Picem circumline & sulphur tri-

* Alias
malico-
rium.

* Duo hæc
verba nō
habēt vet.
cod.

246 DE COMPOSIT. PHARMACORUM
tum aut thuris micas insperge. Verum ne
obliges ista, neque frequenter repetito epi-
thematum detractiones.

De Parotidibus. CAP. II.



Arotides è genere quidem sunt
inflammationũ, sunt autẽ glan-
dulis circa aures affectis: nõ ta-
men prima parte curationis par-
tium inflāmatũ in eis vtimur, in illis enim
vt plurimũ curatione reprimente ac repul-
soria à medicis appellata vti cõuenit, atque
id maximè quum neque malignũ sit, neque
multum quod influit, neque corpus humo-
ribus ex æquo redundet. Sic nanque spõgia
sola ex posca imposita incipientes inflāma-
tiones repressit, neque quicquam ex eo to-
tum corpus fuit offensus. Verum in pa-
rotidibus ipsum contrarium facimus, phar-
maca attractoria adhibentes, atque si hæc
nihil memorabile efficiant, etiã cucurbitam
affigentes, aut fomenta assidua adhibentes,
Annitimur enim vt affligēs humor ex pro-
fundo ad cutem adtrahatur, præsertim si in
capite affectio sit firmata, humoribus vide-
licet in ipso obfirmatis. Quin & quũ citra
capitis affectionẽ, in febribus acutis natura
superfluos humores ex vasis effundens, ad
regionem inter cutem & subiecta corpora
deponit, quãdo sanè & glandulæ ex effusis
hu

humoribus participant: melius utiq; etiam tunc videtur naturam adiuuare, per humorum ex loco in locū impetuosum illapsū, febres curantem. At verò quum vehemētī impetu fluxus illabitur, nihil nos curiosius agentes, omnia naturæ permittimus. Si enim siue cucurbitam, siue aliud pharmacū humores ex alto ad cutem adtrahens admo-uerimus, vehemens dolor hominem apprehendit, vnde & vigiliæ & febres inducuntur, ac vires exoluuntur. Mitigare itaque tunc & non humorū influxui opitulari cōuenit, per cataplasmatum maximè lenientium vsum, velut est quod ex frumenti, aut hordei, aut seminis lini farina, cū aqua mulsa, aut fœni græci, aut althææ, aut chamæmelorum decocto coquitur, & quacunque ad hoc quod moderatè humectā habent caliditatem, per quā mitigare dolores valent, etiam influentes humores concoquere possunt ac suppurare, quemadmodū de his in cataplasmatum tractatu sermonē fecimus. Quod si etiā sanguis redundare videatur, per venæ sectionem ipsum euacuabimus, præsertim si id vires permittant. Nunc verò ad pharmacorū compositionem progredientes, quam etiā à principio nos tractaturos, recepimus, qua ratione tum compositio ipsorum, tum vsum constet docebimus.

Si itaque tumor non discutiatur, suppurantibus pharmacis vtendum est, velut est frumenti farina cum caricarū decocto & oleo. Item quod ex polline, & quod ex fermento constat pharmacū. Si verò suppuratae fuerint parotides, tunc aut per sectionem pus elicere oportet, vlcusque velut in eiusmodi fieri moris est ac omnibus notū curare, aut sanè per pharmacum abscessum rumpere, Quale est Smilium appellatum, & quod ex aliis constat: aut tentare vt ipsum per medicamenta attractoria & tenuium partium vim habētia discutiamus, bis per diem iisdē ablatis, & fomentis admotis donec remiserint & laxati fuerint dolores. Quando verò iam plurimū puris fuerit discussum, tunc iam primū semel soluere ea medicamenta, & fomenta adhibere oportet: deinde verò neque ex re est id facere, sed ipsis pharmacis permittere, vt si quid reliquum in profundo hæreat, id ipsum discutiant. Quòd si durities adsit, ea ipsa quoque molliēda est, quare hoc tempore ex mixta pharmacorum facultate compositio parabitur, emollientibus videlicet ad attractoria ammixtis. postquam verò omnis purulētia fuerit euacuata, & adhuc durities aliqua relinquatur, emollientibus pharmacis vtēdum est, quorum syluæ siue materiæ itemq; cōpositionis

nis varietatem, in malagmatum sermone demonstravi. Manifestũ autẽ est, quod moderatas parotidas, in quibus neque humorũ multitudo redundans in particulas irruit, intantum vt vehementes dolores exciter, neque caliditas cum humore adest, facillẽ per hæc sanare possimus. Neque enim ad suppurationem festinant, neq; vehementem dolorem inducunt. Verũ licet etiã fomentis ex muria vti, & cataplasmata magis calefacientiaque & discutientia adhibere, & medicamẽta eandẽ facultatem propẽ attingẽtia. Quum verò pleriq; medici & parotidum pharmaca indistinctẽ conscripserint, Si quis prædictis in memoriam reuocatis ad eorum vsum accesserit, facillẽ intelliget quibus tandem ad singulas parotidas vtendũ sit. Verũ præexercitabo etiã ego vos ad hanc rẽ per exẽpla, quæ Archigenes in primo pharmacorũ secundũ genus his verbis scripsit. Archigenis ad parotidas. Parotidas dissoluere volẽtes, plantaginẽ cum sale tritam assiduẽ pro cataplasmate imponimus. Aut caprinum stercus ex aceto. Aut rumicis syluestris radices coctas in vino, aut ficum tritã cũ atramento sutorio. Aut ficum coctam, cum absinthio & vino tritis. Aut buccina marina, aut purpuras vstas, melle aut axungia exceptas imposito, &

confestim discutientur. Idem etiam ostreo
 rum testa vsta & cum melle imposita facit.
 Aut ceratum rosaceum siue cyprinum, ruta
 ammista, aut sulphure viuo addito, emolli-
 tum, aut cimolia cum aceto. Discutit ma-
 ximè ficus aqua marina aut mutia cocta, ac
 trita imposita. Idē facit & marrubium tri-
 tum cum sale, & lana butyro imbuta ac ini-
 posita, inchoantibus parotidibus opitula-
 tur. Quemadmodum huic postremo lo-
 co ab eo relato, rectè Archigenes discrimen
 apposuit, incipientes parotidas ē butyro
 opem sentire testatus: Sic conueniebat
 ipsum etiam circa alia medicamenta vten-
 di tempus adiciere, velut ego paulò ante fe-
 ci. Quin & circa hoc ipsum butyrum, non
 satis est ex solo parotidum principio face-
 re discrimen nisi apponatur num vehemen-
 ter aut molliter concitetur, & num dolen-
 ter velut cum pulsationibus & vigiliis in-
 festet, an cū moderato dolore. Deinde qui
 sit morbi status, Num magna omnino la-
 xitate opus habeat, an per minorem iudica-
 ri ac finiri possit: tali nanque suffecerit bu-
 tyrum, in corporibus præsertim mollibus
 eunuchorum, puerorum, & mulierum, &
 eorum qui teneram habent carnem. Si ve-
 rò cum vehementi dolore fiat, cataplasma-
 te dolorem sedante opus habet, simulque
 assi

assiduo fomento vel per solam aquam, vel
 etiam modico infecto ad eam sale. Quan-
 doquidem verò primum omnium pharma-
 cum conscripsit, plantaginem cum sale,
 ab illo sanè etiam nos rursus initium facie-
 mus, plantaginis naturam recordantes ex
 mixtis facultatibus, discussoriaque & re-
 pulsoria compositam esse. Ego verò nun-
 quam pharmacis ad parotidas destinatis
 repulsoria ammisceri operæpretium exi-
 stimo, præterquam si aliquando, rarò ta-
 men, ad multā discussoriorum copiam pa-
 rum quiddam ex eis addatur, atque id tum
 demum ubi citra vehementem dolorem
 parotides irruant. Quod verò deinceps
 scriptum est, Stercus caprinum ex aceto, in-
 ueteratæ ac induratæ, nullumque amplius
 memorabilem dolorem habentis paroti-
 dis pharmacum esse possit, velut etiam lie-
 nis in scirrhum indurati. Tertio deinde lo-
 co consequenter, Radices rumicis sylue-
 stris in vino cocta tradidit. Si sanè & qua-
 litatem & ætatem vini apposuisset, for-
 tassis & ego tentassem de eo iudicium fer-
 re. Quum verò non adiecerit, multumque
 differat acerbum, aut austerum, aut acre,
 aut dulce, aut recens, aut vetus, aut cras-
 sum, aut tenue, aut fulvum, aut album, aut
 nigrum vinum esse, ob id etiam ego nihil
 ha

habeo quod de hoc pharmaco dicam. At quum vobis hoc cognitum sit, quòd maiori discutiendi vi præditum sit vetus, præsertim si ex genere natura calidiorum sit, velut sunt in totum fulua, contraria verò huic secundum vires tum austerū, tum acerbum, huiusmodi quidē vinum vitare oportet, In fuluo verò & mediocriter vetusto, & tenuium partium, rumicis radices coque-
 ris, & in parotidibus citra vehemētem do-
 lorem abortis adhibebitis. Scribit deinceps, ficum tritam cum atramento sutorio. Discussoria quidem igitur & concocto-
 ria facultatis est ficus, præsertim arida: re-
 cens verò discutiendi quidem vim habet,
 verum concoquere non potest. Verū atra-
 mētū sutoriū nemo ignorat vtrasq; faculta-
 tes fortes cōplecti, repulsoiā nepe & discus-
 soiā: quapropter etiā vehemētia ei⁹ vitāda
 est. Cocta deinde fico nimirū arida, cū ab-
 finthio & vino tritis, vti iubet. His sanè etiā
 vos vtemini oportunè, ad medias magnitu-
 dine ac tempore inflammationes. Quem-
 admodum etiam buccinis & purpuris, &
 ostreis vstis, in durefcentibus ac vetustis.

* *Insul* - Est enim pharmacum quod omnis afflictio
sum ad- nis & mordacitatis expers est, non solum
dit. vete. si melle quis eorum cinerem imbuat, sed &
codi. multo magis si adipem vetustum* à fibris
 de

depuratum ammisceat, Citra omnem enim molestiam omnes inueteratas inflammationes discutit, etiam si ex influxionis materia sint obortæ. Deinceps cerato rosaceo vel cyprino cū ruta vti iubet, quod discussoriū quidem pharmacū est, verū nihil vehemens neque violentū in se habet. Paulò verò efficacior fit compositio, si sulphur viuum pro ruta ammisceamus. Quæ sequitur deinde cimolia cū aceto, neque fortē, neq; dolorosam, neque magnā protidem curare potest. Ficus verò aqua marina cocta, in inueteratis iam commoda fuerit, vtpote discussoria vi prædita, velut etiam si aquæ marinæ penuria, muria quis vtatur. Simile huic est, quemadmodum etiā ipse Archigenes dixit, Marrubium cū sale. Post hæc verò de butyro scripsit, cuius vt vltimi circa illius dictio nis ordinem, paulò ante mentionē feci, post quod rursus ad generosum pharmacum trāsit, Pyrethrum tritū fico excipi iubens. Deinde calce viua cum melle trita vti præcipit. Et post hoc, mustelæ sanguinis illinendi meminit. At verò talia tanquam curiosa & superuacanea, & quæ magnā rei medicamentariæ egestatē indicent, si per alia auxilia, citra sanguinis mustelæ adhibitionē, parotidas curare nequeat, neque in vsum adsumpsi, neque eorū experimentū habeo.

Sed

Sed neque ex amicis nostris quispiam alius
 vti tētauit, Verū cerebrum illinire quod-
 cunque tandē, mediocrium parotidum me-
 dela existit. Post hoc verò hæc verba scri-
 bit. Aceto feruenti perfundito, aut spongiā
 in acida muria imbutam imposito. Fosso-
 rum ac messorum fortassis ea fuerit mede-
 la, non hominum vrbanoꝝ. Deinceps
 acris mentionem facit pharmaci ex muste-
 la vsta, cuius cinerem cerato irino excipi
 iussit. Verū eiusmodi pharmaci, quan-
 do diu durant & in scirrhum indurantur
 vtendum est: pleraque enim ab eo scripta
 veterascentium & ægrè solubilium paro-
 tidum remedia existunt, quapropter etiam
 ipse ad pharmacum hoc adiecit, quòd etiam
 Strumas probè sanare possit. Post hoc ve-
 rò eiusmodi dictio inordinatè inserta est,
 tum assidua calidæ adpersio, tum assidua
 crudæ ordeaceæ farinae impositio. Quod
 ipsum siue quis per se legat, siue prioris di-
 ctionis finē, huius dictionis principium fa-
 ciat, vtrunq; male dictum est. Manifestum
 verò hoc erit vbi præcedentis dictionis fi-
 nem præposuerimus, vt totus sermo eius-
 modi fiat. Mirabiliter discutit & strumas,
 sæpe etiam parotidas, tum assidua calidæ
 adpersio, tum assidua crudæ ordeaceæ fa-
 rinae impositio.*perspicuè enim falsum est
 affir

* Ex vet.
 cod.

affirmare strumas ac parotidas mirabiliter
discuti tum iugi adspersione aquæ calidæ,
tum assidua appositione. Si verò de paroti-
dibus solū dicatur, certa distinctio aberit,
quæ doceat nos in quibus & qualibus paro-
tidibus aquæ calidæ adspersio, & assidua
crudæ ordeaceæ farinæ adhibitio conue-
niat. Non enim in omni, sed quā citissimè
velimus suppurari, hæc faciēda sunt, quem-
admodum in superiori sermone est indica-
tum. hoc itaq; vitiosè, vt dixi, interfertum
est. Caterū Archigenes ad consequentia
transgressus rursus pharmaca scribit, non
apponens quod induratis & inueteratis fa-
lutaria existant, quū nos ex materia ipserū,
ipsa talia esse cognoscimus. Adscribā autē
iam vobis ipsius Archigenis dictionem,
Quæ sic habet. Propriè verò lupinorum
amarorum farinā cum melle coctam, mo-
dica calce viua addita, pro cataplasmate
imponito. Egregiè discutit & hoc. Picis
brutiæ, mannæ siue micarū thuris æquales
partes, terebinthinæ, palmarū Syriacarum
non vetustarū pinguium carnis puræ, vtri-
usque duplum, galbani dimidium mannæ.
probè vnitis vtitor, Si verò dura sit resinā
adde & misce. Aut nitrū & rubricæ sinopi-
dis tertiā partē cū vngēto cyprino ad stri-
gmētitiā crassitudinē redacta, ac linteo lo-
in far

infarta imposito. Aut calcem viuam cum strigimentis eodē modo. Aut caricās, galbanum, nitrum pari mensura, sulphuris tertiā partem, terebinthinā, opopanacis vtriusq; parum quiddā: vnitis vtere. Aut calcem viuam cum aceto tritā impone. Quod si neq; per hęc discutiantur, adiuuabimus permutationē in suppurationē p̄ frequētia ex calida crudaq; ordeacea farina cataplasmata dein rursus discutiēdū per largā & frequētē decocti lauri aut baccarū eius perfusionē, aut sulphure vel cōsimili quopiā in aquā insperso siue nitro, siue columbino stercore in ea ammixto. Aut etiam cucurbita cū scarificatione affixa. Deinde ad chirurgiā perueniēdum est & crudi abscessus sectionem. Optimum enim in his vt quā celerrimē fluxio foras euellatur. Hęc quidē Archigenes scripsit. Sunt autē & multa emplastra quæ parotidas discutiunt, aliqua quidē iam inueteratas & induratas: aliqua verò eas in quibus sedato dolore, nulla amplius puris suspicio est, Quemadmodū etiā aliqua quæ iam suppuratas curare possunt: talia verò inter discussoria emplastra, singula cum viriū suarum professione conscripta sunt, velut etiā ea quæ simplices parotidas curant laxatoria appellata, omnibus nota sunt. Exēpla ipsorum sunt, Emplastrum Mnaseæ, & quod ex
suc

succis cōstat, & quod ex prīsana. His adhuc molliora sunt cerati forma, tum ex butyro, tum ex œsypo conflata, ostreis aut buccinis, aut purpuris vstis additis, adipeq; porcino salis expertè singulis quadrantis pondere Præstat & hoc. Butyri vnc. i. ceræ sextantem & vnciæ dimidium, ostreorum vstorum quàm tenuissimè tritorum sextantem, liquecibilia liquefacito, ostreaq; infarcito, ac vnitis vtitor cōfidenter. Efficacissimum hoc ad parotidas existit.

De affectionibus narium. CAP. III.

HX genere tumorum præter naturam, polypodes in naribus generantur. Ex genere verò vlcum ozænæ, Secundum genus autem excretionum præter naturam, Sanguinis eruptiones sunt in morbis acutis, iuxta rationem earū quas recentiores Medici priuatim Superexcretionem appellant. Nimirum in quibus natura adiudicatorium auxilium concitata, modum excessit. Primum itaque de ozænis sermonem faciam, quæ ex humorum acrimia & putrescibilium influxu generantur: ita vt si acres solū sint, ægrè curabilia vlcera producere consueverint, nō tamen graueolētia. Cæterū cura cōmunis ambobus his est, itemq; polypi, vt videlicet primū caput ficcetur & firmetur,

quum palàm sit ob vitiatorum humorum
 redundantia defluxum ex eo in nares pro-
 uenire. Quo modo verò caput totum corro-
 borare oporteat, quo nullum recrementum
 ex eo ad inferas partes delegetur, sæpè iam
 dictum est. Quum igitur per illa caput vali-
 dum reddideris, ad naris progredieris cura-
 tionem, Scopo in ozænis proposito, vt affe-
 cta pars per mixtæ facultatis pharmaca tum
 repellentia, tum discutiētia, resiccetur. Re-
 pellunt itaque tum austera, tum acerba, quæ
 communem adstringētium appellationem
 habent. Discutiunt autem calida & sicca fa-
 cultate prædita, quorum sylua talis est. Ar-
 chigenis pharmaca ad ozænas. Quum
 ozæna in naribus fuerit, calaminthæ succum
 infunde. Aut ipsam calaminthæ aridam
 per fistulam insuffla. Aut veratrum album
 cum seminis nasturtii chema quotidie insuf-

* Vel myrrha: post hoc verò caput perfunde. Oblin-
 e autem eos vel chalcitide, aut atramento su-
 nasturtii torio, aut psorico cum melle. Aut instillato
 cum melle in narem melle, & per sternutatorium facta
 hæc vet. concussione, tectoria vlceri obducta excu-
 cod. alijta cito, deinde præscriptum ex nasturtio & ve-
 men pro ratro pharmacum, per narē adtrahere quàm
 myrrha plurimum iubeto, & postea amurcam cum
 habet zin melle illinito. * Aut ranunculi succum cum
 giber. alumine liquido in narem infunde, ægrumq;
 resu

resupinatum donec ad os penetret attrahe-
re iube, atque id vsq; quo percuraueris idem
tidem repete. Si verò vetera sint vlcera,
etiam acetum vetus ammisce, aut sulphur
tritum. Acre item acetum in vasculum an-
gusti oris fusum, ad multum tempus ad re-
spirationem ipsorum appone, deinde Misy-
cyprium, & dimidium eius nardi indicæ, cū
vino chio ad mellis crassitudinem redige,
ex eoq; meatus obline, & per lanam obtu-
ra. Ad vlcera in naso. Vlcers in naso,
ex malorum punicorum succo in æreo vase
ad medietatem cocto perline. Aut malum
punicum dulce integrum in vino coctum
terito, & forinsecus imposito. Aut violam
albam ex aqua affricato. Aut rubi succum
& alumen Melium cum aqua diluta eodem
modo. Si verò vetus sit vlcus cum aceto di-
luito. Aut iridem & sandaracham cum mel-
le oblinito. Aut adipem vitulinum & resu-
nam illinito.

De polypo narium.

Polypus tumor est qui præter naturā in
naribus generatur, polypodis carni assi-
milis iuxta substantiæ proprietatem. Mani-
festum itaque est affectionem hanc ex cras-
sis & viscosis humoribus generari, atque
ob id mixta materia medicamentaria o-
pus habet, vt videlicet partim adstringat,

partim fecet & attenuet, partim etiam discuti-
 at & cōdenset. Archigenis ad polypo-
 das. In polypode nasturtii tenuis chemā,
 siue drachmam dimidiam, cum veratri albi
 obolis duobus, nare adtrahere iube. Vbi
 verò exciderit linamentis cum anthera siue
 florido emplastro ex melle vtere, aut lycio
 eodem modo. Asclepiadæ ad Ozænas &
 polypos. Asclepiades in quinto exteriorū
 sic scripsit. Aridum ad Ozænas, Alumi-

* Aliàs 2. nis scissi drach. * 4. myrrhæ drach. 4. san-
 * Aliàs darachæ drach. 4. gallæ drach. 1. * atramēti
 eris vsti. futorii vsti drach. 1. tritis vtere, naribus prius
 vino odorato elotis, & pharmaco per spe-
 cilli extremum siue nucleum admoto.

Aliud, Seminisericæ drachm. 8. myrrhæ
 drachm. 8. nitri rubri drachm. 8. malicorii
 drachm. 8. feminis tamaricis drachm. vnam,
 crocomagmatis drachm. 2. tritis vtere.

Aliud, Soreos ægyptii friabilis drachm.
 2. chalcitidis vstæ drachm. 2. feminis tama-
 ricis drachm. 2. croci drachm. vnā myrrhæ
 drach. 1. tritis vtere. Aliud, Chalciti-
 dis vstæ drachm. 2. atramenti futorii assati
 drach. 2. Mifyos drach. 2. amoni drachm. 1.
 myrrhæ drachm. 4. croci drach. 1. tritis vte-
 re. Alia compositio quæ flauescens appel-
 latur. Aluminis scissi drachm. 8. chalcitidis
 crudæ drachm. 6. sandarachæ drach. 3.

put

putaminis malipnnici drachm. 2. atramenti
 futorii vsti drachm. 2. misyos assati drach.
 2. tritis vtere. Alia, Atramenti futorii
 vsti drach. 4. diphrygis drach. 2. calcis viuae
 drachm. 2. sandarachæ drach. 2. Arida ad-
 moue, aut linamentum tortum aqua made-
 factum ac pharmaco imbutum inde. A-
 liud, Misyos assati drach. 2. mannæ thu-
 ris drach. 2. chalcitidis assatæ drach. 2. squa-
 mæ æris sesqui drachmam, æruginis drach.
 vnam arida adhibe.

*Lamponis ad Oxænas, ægilopas, polypodas
 & multa alia.*

A Doxænas & ægylopas ac polipodas,
 & quæcunque velis citra sectionē ac
 vstionem submouere. Dirimit etiam ossa
 corrupta, facit & ad vlcera serpentia ac pu-
 trida inspersa, & ad sordida vlcera linamē-
 to excepta ac indita cum melle. Scobis æris
 rubri vnc. vnam salis ammoniaci sextantē,
 ammoniaci thymiamatis sextantem, alumi-
 nis rotundi quadrantem, aceti acerrimi he-
 minas sex. Arida terito, & affuso aceto, o-
 mnia in vas æris rubri transferto, in eoq; ad
 solē sub caniculæ ardore cum æris rubri ra-
 dio agitato donec pharmacū exarescat, de-
 inde in mortariū translatū diligēter terito,
 & in fictili recondito. Vsu verò exigente,
 aquam absorbendam dato, deinde etiam in

ore continendam, pharmacum verò per fistulam insufflato. Scribonii largi facit ad omnia extuberantia. Misyos vsti, chalcitidis vstæ, atramenti futorii vsti, foreos, squamæ æris, singulorum drachm. 8. Arida admovento. Oportet autem præcedenti die quiescere, deinde sequenti pharmacum post cibum indere, Illinendæ etiam nares antea cum bitumine aut liquida pice, aut myrrha stacte. Philoxeni chirurgi ad polypodas, ozanas, omnem excrescentem carnem, hæmorrhoidas, & quibuscunque crustam inducere velis. Aëris vsti, auripigmæti torrefacti misyos assati, singulo. drach. duas, diphrygis drach. tres, chalcitidis vstæ, atramenti futorii vsti, squamæ æris, singulorū drach. quatuor, tritis vtere. Cæterum post pharmacorum adhibitionem, etiam sternutatoris vtimur, quo videlicet tectoria vlceri obducta excutiamus, quæ tribus aut quatuor diebus ferè excidere consueuerūt. Vbi verò exciderint adipe anserino ac butyro cū rosaceo cerato curantur. Verum Asclepiades in primo pharmacorum exteriorum sic scripsit. Asclepiadæ ad ozanas, quo vsus est Meges. Seminis ericæ drachm. quatuor, myrrhæ drach. quatuor nitri rubri drach. quatuor. putaminis mali punici drac. quatuor, croci, drach. duas, costi drac. duas, tri

trita insufflato. Aliud, Aluminis scissi drach. 4. myrrhæ drach. 4. sandarachæ drach. 2. rhois rubri drach. 2. salis fossilis drach. 2. costi drach. 2. croci drach. 2. trita insufflato. Ante curam verò nares vino odorato & optimo melle eluere conamur. Ad narium polypos quo vsus est Antipater. Aeris vsti drach. 4. minii sinopici drachm. r. trita per arundinem insufflato, Quin & per specilli nucleum admovento. Aliud Antonii Musæ. Atramenti sutorii partem vnā, sandarachæ partē vnā, trita insuffla. Aliud Charixenis post chirurgiā. Cornu cerui vsti drach. 4. squamæ aris rubri drach. 4. auripigmenti drachm. vnam, trita insuffla. Aliud, Bryoniæ radicis vstæ drach. 4. atramenti sutorii drach. 4. spumæ nitri drach. 4. elaterii drach. 4. trita insuffla. Ad vlcera in naribus. Recremēti plūbi, vini veteris, olei myrtei, singulo. æquales partes, plūbi recrementū vt quā leuissimū fiat terito, & adfuso vino rursus leuigato, deinde myrteū addito, omniaq; simul misceto ac conquassato, & in figulinū vas coniecta prunis imposito, assidueq; agitato, atque vbi strigmetosum redditū fuerit pharmacū sublaturū in pyxide plūbea seruato. Aliud, Plūbi vsti & loti drach. 8. vini & rosacei quātū sufficit, olei myrtei quod satis est, apparato

& vtitor vt dictum est. Aliud, Spumæ argenti drach. 6. cerusæ drach. 8. malicorii drach. 4. aluminis scissilis drac. 4. vini aminæ quantum sufficit, olei myrtei quod satis est. Arida tusa & cribrata in mortarium cōiecta cum vino ad strigmentitiam crassitudinē redigito, postea verò myrteo oleo affuso conquassato, & ablatis in pyxide plūbea reconditis vt dictum est vtitor. Sint autem myrtei heminæ quatuor, vini cyathi quatuor. Diogenis pharmacum accommodatum. Adipis anserini drachm. 4. æsypi sesquidrachmam, medullæ ceruinæ drac. 2. ceræ Tyrrenicæ drach. 8. plumbi vsti & loti drach. 4. stibii vsti & loti drach. 8. ladani drach. 2. adipis vitulini drach. 2. terebinthinæ drach. 4. cerusæ drach. 2. spumæ argenti drach. 1. rosacei quantum sufficit. Liquida cum aridis committito & repositis vtitor. Vsu autem expetente quantum satis fuerit tollito, & rosaceo dilutum naribus sublinito. Ex primo de parabilibus Apollonii. Ad effectiones in naribus. Ad narium exulcerationes, & putredines ac fœtores, mali punici nucleo carentis dulcis itemque acidi succū, in æreo vase donec duæ partes supersint coquito, ac vtitor quā penitissimè illinēdo. Facit & malum punicum dulce cū vino coctū & tritū & forinsecus impostum,

tum, atque intro illitum. Ad excrescentem carnem & polypum. Diphryges tritum admoueto, & linamento nares disparato. Aliud, Veratrum terito, eiq; origani par pondus tritum addito, ac naribus bis in die insufflato. Aliud, Veratrum nigrum cum pari sandarachâ terito, & ammixto oleo, lana excipito, eoq; narem expleto. Aliud, Florem æris, & æruginē, ac silphii succum pari mensura oleo ammixto terito, & vngenti crassitudine ad dies quinque naribus sublinito: deinde per volfellam eximito. Aliud, Auripigmentū & calcem trita cum specillo largè adhibeto. Vbi verò intumuerit & eleuatus fuerit polypus, veratro nigro arido trito moderatè vtitor. Vt plurimum enim in diebus septem nasus vacuus redditur. Deinde diphrygis cū melle vsu expurgato. Aliud,

Auripigmentum & calcem ac veratrum album trita cum specillo admoueto. Ad ea quæ naribus illabuntur, Quæ naribus illabuntur, auriscalpio aut volfella extrahito, aut sternutatorio admoto, os adprehendito, atque alteram narem comprimito, si quidem nō in vtraq; nare adfectio existat. Hæc quidem Apollonius quibus ipse vsus est tradidit. Verū vt ego vsus sum, & in polypis ac ozænis nariū, probatissima re-

peri subscripta. Ac primum quidē quod ex malis punicis constat pharmacum. Sint autem pari numero ac magnitudine ex tribus eorum differentiis accepta. Aliqua enim ex his sunt austera, aliqua dulcia, & quædam acida. Contundenda itaque sunt recentia & matura, atque integra diligēter confringēda, quo succus ex eis exprimi possit, quem in vase stanneo depositum adseruare oportet, modicē coctum si quidem liquidior quā oporteat videatur. Quod verò ab eo reliquum est solidum & crassum, rursus diligenter contundendum est, ut à contusione rursus in pila atteri ac leuigari possit, indeq; collyriorum formæ effingi, quæ congruam ad ægri nares proportionē habeant. Induntur enim hæc in naris quam polypus obsedit meatū, quo citra mordacitatem & consensum, qualem acria pharmaca excitare solent, per longiorem moram ipsum expurgent. Quod si humectior & mollior tibi appareat polypus, plus ex austeris malis punicis coniicies: si durior, ex acidis. Quandoquidem verò perpetuò tolerare collyrium molestum est, ab eius usu interquiescere conuenit, atque eo tempore quo ipsum non indis, per expressum succum ægrū curare, & sanè oris diducto rictu hiant, etiam circa illas partes iuxta quas nasus
ad

ad palatum perforatus est, liquidum ipsum
 expressum pharmacum illinere, vel cū pen-
 na, vel cum lana specillo duos nucleos siue
 cuspides habenti obuoluta. Cæterum ex
 aridis pharmacis diphryge, citra mordaci-
 tatem aliquando per multum tempus con-
 sumptum polypum noui, probatur etiam in
 ipsis prædictum collyrium ex malis punicis
 effectum, si vbi exaruerit probè contunda-
 tur, cribreturq; ac leuigetur, indeq; insuf-
 fletur, aut etiam per specilli nucleum inde-
 tur. Omnia autem hæc assiduè facere oportet,
 vt nunquam ab affecta parte pharmaci
 absit, quum facilè ab humiditate eluatur.
 Quemadmodum igitur in lippientibus, sic
 & in his semper si possibile est, pharmacum
 adhibere oportet: abluatur enim facilè, vt
 dixi, ab influente humiditate. Porrò quū
 eunuchus quidam nullius pharmaci ferre
 posset adhibitionem, sed ab omnibus irri-
 taretur, ros aridis contusis ac probè tritis
 atque inditis, mirum quàm viderim homi-
 nem magnopere citra omnem mordacita-
 tem adiutum. Quare in corporibus molli-
 bus & humidis, aut quibus ægrè vlcera ipsa
 sanescunt, rursus eodem pharmaco vsus
 sum, contigitque ex duobus alterum, aut
 vt nihil noceret, aut omnino citra mole-
 stiam opus suum perficeret. Pleraque enim

eorū quæ polypodas exterunt, eos exacer-
bant vbi à scopo aberrant. Cæterum vl-
cera in narium meatibus semper per pastil-
los curavi, androniū videlicet, & passionis,
& polyidæ, & bythinum, & per eum quem
ego cōposui, his ipsis aliquando vino dulci
dissolutis, aliquādo austero, & quandoque
moderatæ ætatis, quandoque veteri. Inter-
dum etiam aceto dilui vel vinoso, vel sim-
pliciter acido, vel etiam acri valdè & vetu-
sto, Iuxta prædictas indicationes, vsu phar-
macorum secundum symptomata affectio-
num reperto. In diuite verò quopiam qui
odoratum pharmacum sibi adhiberi expe-
tebat in ozænæ curatione, hedychroi vsū
excogitavi, ipsumque vino falerno veteri
dissolui, & mirum quā breui affectio ipsa
est curata. Relata est hedychroi compo-
sitio circa theriaces antidoti descriptionē.

*Heraclidæ ad eruptiones sanguinis è naribus,
ad Antiochidem. CAP. IIII.*

Sufficienter quidem de sangui-
nis eruptionibus in curandi Me-
thodi libris dictum est, verū
nunc quæ ex sylua vsu cognita
cōstant, & à prædecessoribus nostris appro-
bata sunt referentur. Vbi grumos sangui-
nis eduxeris, lanā specillo obuoluito, eamq;
in lycio aqua diluto imbuito, & sanguine
manan

manantē locū illinito. Aut linamentum longum lycio imbutum indito, deinde forinsecus cum digitis apprehensum nasum cōprimito, donec constiterit sanguis. Aut chalcitidem mediocriter leuigato, & linamentum ex ellychnio contortum in frigidam aquam demittito, deinde in chalcitide obuoluto. Aut linamentum priapi siue pudendi forma naribus indito. Aut linamento rasili vtitor quā penitissimē intruso. Præstat autem digitū ad palatum immittere, ne eò linamentum rasile deferatur. Aut thus cōfringito, & polygoni aut seminis porri succo diluito, in eoque linamentū rasile, aut ex ellychnio obuolutum indito. Aut mentam tritam indito. Aut spongiā siccam immittito. Aut spongiā in acre & feruidum acetū coniectam *impo *Locum nito & sanguine manantem narem specillo hunc ex forinsecus, donec impellatur, aprimito.] vct. exena

Præstat autē spongiæ principium filo per plari in acum transmitti, quo facilè extrahi possit, hunc mo- extrahito autē quum opus suum perfecisse dum resti existimaueris. Si verò inarescat spōgia, in- tuimus, tusque agglutinetur, per auricularē clysterem frigidam aquā immittito, ac infundendo humectato, atque ita extrahito. Vtere etiam cōpositionibus vulnerariis & sanguinem sistētibz quæ describētur. Accom- ma,

modatum est & frontem spongiis refrigerare, itemq; capitis partes sublimes facere. Brachia autem & manuum iuncturas, scœmoræque & inguina, atque genua cōstringere, in his qui mœsto ac deiecto sunt animo, quemadmodum in venarum sectionibus facere moris est, iubendi que sunt ut ea membra moueant, manus quidem confricando, pedes verò ambulando. Expletis enim sanguine quæ in eis sunt venis, nares sanguine manare cessant. In potu amplius exhibenda sunt ea quæ ad sanguinis reiectionem conscribentur. Aures quoque contentæ per linteola ac ceram obturentur, & in ore aqua pluuialis frigida contineatur. Quod si quid ex sanguine deglutitum esse videatur, etiam id ipsum ubi multa eius sit copia, per euacuatium educito. In ventre enim & intestinis in grumos coactum, incensionem facit. Pharmaca Asclepiadæ in quinto externorum ad sanguinis narium eruptiones scripta. Quæ Marcellæ inscribit. Platani pilulas collectas in umbra exsiccatas, & desiccatas super pannum asperum in discum diffundito, easque aspera ipsius panni siue tunicæ parte cōfricando, aut in panno ex pilis siue setis composito obuoluito: ac semen quidem pilularum abiecit, tomenta verò collecta in testaceum vas nouum reponito,

Vsu

Vsu autem expetente, ea ipsa lanuginosa tomenta in harundinem cuius geniculi recisi sunt indito, & qua parte excavata est harundo, naribus imposito ac insufflato, cōpendio hoc vincit sanguinis eruptionē.

Aliud, Atramentū sutorium diligenter tritum reponito. Vsu verò postulante, rasuram quampiam linteolorū in pharmacū immersam indito. Aliud, Spōgiam cruda pice imbutam exurito, & linamento torto exceptā indito. Aliud, Putaminis oui partem vnam, gallæ omphacitidis partem vnam, trita linamento torto aqua aut aceto madefacto excipito, & indito. Frontem verò & nasum gypso aut luto figulino integito. Aures autē contente obturare iubeto. Quidam spongiam aphricanam aceto acerrimo incoquunt, deinde exprimunt, eamque in ignito lapide frequenter obuoluunt, atque ita suffitum & vaporem excitant, quem naribus attrahere iubent.

Quæ Andromachus scripsit. Ad sanguinis quidem ex naribus eruptiones nihil priuatim Andromachus scripsit, Verū inter ea quæ sanguinē cohibent, pleraque etiam hæmorrhagias narium sistunt, quapropter etiā ego adscribā eiusmodi pharmaca quomodo ab ipso descripta sunt. Compositio ischæmos, id est, sanguinē sistens, qua vtor.

Chal

Chalcitis, misyos, mannæ thuris, singu-
lorum drach. quatuor, tritis vtitor. Flaua
qua vtor. Chalcitidis drach. centū, atra-
menti futorii drach. 50. misyos assati drac-
hmas 25. æris vsti drach. 12. & dimidiam, tri-
tis vtere. Ischæmos magna. Misyos cy-
prii drach. septem, atramenti futorii drach.
septem, corticis pini drach. quatuor, squa-
mæ æris drach. quatuor, mannæ siue mica-
rum thuris drach. quatuor. Alii drach. quin-
decim habent, æris vsti drachmas quindecim,
chalcitis drach. quindecim, calcis viuæ
drach. octodecim, alii quadraginta, gypsi
torrefacti drach. quatuor, alii octo,

tritis vtere. Ischæmos Aphro-

dæ. Chalcitidis drach.

sex, mannæ thuris

drach. duas, re-

sinæ te-

rebinthinæ frictæ drach.

quatuor, alii tres

accipiunt tri-

tis vti-

tor.

*

FINIS TERTII LIBRI.

CA

CAPITA QUAR-
TI LIBRI.

*Doctrina affectionum quæ in oculis sunt,
inter quas etiam de pharmacis acri-
monia carentibus, & emplasticis &
de alijs omnibus.* Cap. I.

De lippitudine siue ophthalmia. Cap. II.

De Vlceribus oculorum. Cap. III.


De ocularum pharmacorum viribus.

Cap. IIII.

*De aridis medicamentis oculis conducen-
tibus.* Cap. V.

*Arida pharmaca ad oculos ab Ascle-
piade conscripta.* Cap. VI.

*Remedia ad affectos oculos ab Archigene
in primo pharmacorum secundum ge-
nus conscripta.* Cap. VII.




CLAVDII GA-
LENI PERGAMENI
DE COMPOSITIONE
pharmacorum secundum locos,
Liber quartus, Iano Cor-
nario medico, in-
terprete.

*

*Doctrina affectionum quæ in oculis fiunt, inter
quas etiam de pharmacis acrimonia caren-
tibus, & emplasticis, & de alijs omnibus.*

CAPVT I.



NON equidem alia est com-
ponendi, alia vtendi Me-
thodus in his pharmacis,
Ipsa enim cõpositio velut
ad vsum relata conficitur,
ita vt hi qui pharmaca cõ-
ponunt scopũ habeãt vtilitatẽ ex vso ipso-
rum emergentẽ. Verũm quemadmodum in
aliis, sic etiã in his affectionibus quidã inde-
finitẽ pharmacorum vsus scripserũt. Verbi
gratia, Ad dolorem accõmodatum est hoc
phar

pharmacum, nō apponentes affectionem ex qua dolor sit obortus. Quidā verò etiam affectiones adscripserūt, alii quidem magis iuxta experiētiā: alii autē magis secūdum rationē. Iuxta experiētiā quidem magis, quicumque ex cōspicuis circa oculos signis discrimen fecerunt. Secūdum rationē verò magis qui ex obscurē apparētibus, aut neq; in totū apparentibus idem fecerūt. Cōspicuē itaque apparet fluxus multus & modicus, mordacitas & lenitas, ruborq; plus aut minus, velut itidem venæ paucæ & multo sanguine plenæ: & inflātionis tumor mīnor aut maior, Quemadmodum etiam colores præter naturam variegati, & oculorum sordes siue lemæ plures aut pauciores, aut minores aut maiores progredientes.

Apparent item nobis manifestē asperitates in palpebris oculorum. Quid verò attinet dicere, quòd & vlcera & pustulæ, tum secundum locos, tum magnitudine, non parvam differentiam habent, itemq; quæcūque eius generis alia existūt, Quin iuxta alium sanè modum, ex eorum quæ conspicuē apparent numero, sunt etiam ipsi adeò dolores, Nihil enim interest siue nobis siue ægris appareant, Etenim quod dolent, & quomodo dolent manifestū est. quod enim cum compressione, aut tensione, aut obtu-

ratione, aut corrosione, aut quibusdam pulsationibus dolent, nobis apertè indicatur.

Caterùm eiusmodi discrimina non apparent (velut aliqui scribunt) ad fluxum qui ab his quæ intra cranium sunt, aut ad fluxum qui ab his quæ extra cranium sunt, aut etiam per Iouè ad eum qui ex arteriis, aut ex venis affertur: & quum quidam dicant distensionem aut obturationem in profundo oculorum esse, humoribus videlicet crassis, aut viscosis, aut multis impactis, nullum ex his symptoma ægros grauat, velut vehemens dolor circa quodcunque tandem mēbrum, non sanè circa oculos solos, adeò vt mortem aliqui vltro elegerint, melius fore rati hanc semel obire, quàm totos dies dolores perferre. Ego verò cum in aliis quibusdam, tum duodecimo de curandis morbis Methodi, in vniuersum manifestè scripsi, tum de differentia affectionum in quibus vehementer dolent, tum quæ causa vniuscuiusq; ipsarum existat. Scripsi item in decimo tertio eiusdem operis omnia, quæ necesse est medicum de oculorum affectionibus nosse, & quæ ad ipsarum curationes requiruntur. Referā nihilominus tamen & nunc breuibus capitibus tantum repetitis eorum, quæ ad præsentem tractationē vtilia sunt, hoc est eorum quæ cum materiæ medicæ doct

doctrina cohærent, Nam & liquores, & succi, & semina, & fructus, & plantarum particulæ ocularibus compositionibus induntur, veluti etiam non pauca ex his quæ Metallica appellantur, aliqua quidem extremè austera & acerbata atque acria, aliqua verò his moderatiora, & tamen fortia, Quemadmodum item aliqua omnis mordacitatis expertia ac lenissima per lotionem reddita.

De pharmacis mordacitatis expertibus ac lenibus.

Pompholyx igitur lota nulli pharmacorum mordacitatis expertiū inferior est, atq; ob id ea vtimur ad tenues & acres fluxiones, capite videlicet prius simulque vniuerso corpore euacuato. At verò manifestum est quod per venæ sectionem ac purgationem totū corpus euacuemus: per apophlegmatismos verò caput à pituita vindicamus. Potest enim pompholyx lota, quemadmodum etiā spodium, atq; amyliū, simul & moderatè humores resiccare, simulque ne per tuniculas euacuetur ea quæ in magnis ipsorum venis superflua humiditas continetur, prohibere. Quare si quis prius quàm caput ab humoribus ad oculos defluentibus expurget, obturantibus pharmacis vtatur, vehementem dolorem ex distensis tunicis efficiet, & ex multitudine

influentium humorū, aliquando rupturam aut erosionem ipsorū inducet. Eiusdem generis cum prædictis pharmacis, subtenuis ouorū liquor existit, ex redundanti potens humiditates abluere, & exasperata oblinere: Verū obturādi meatus vim cum illis æqualiter non habet, sicut neque vim resiccandi. Atqui fœni græci succus quod ad viscositatem attinet, similis est albo ouorum liquori, discussoriam autem habet facultatem, & moderate calfactoriam, atque ob id multos dolores mitigare consuevit.

De liquoribus acris.

PRædictorum pharmacorū sylue secundum genus maximè contraria acrium liquorum materia est, veluti liquoris cyrenaici & Medici, & sagapeni, & euphorbii, atque simpliciter loquendo, omnium vehementer calfacientium citra exasperationem: atque hæc ipsa sylua non solum in liquoribus, sed & in succis, & seminibus, & floribus, & plantarum fructibus cōtinetur.

De extergentibus siue repurgantibus.

Tertio consequenter post prædictas, fortis facultas est extergentium pharmacorum qualis squamæ aris est, & chalcitidis vstæ, & aris vsti, itemque floris eius, & misyos, ac soreos, itemque stibii.

De

De erodentibus.

HIs adhuc aliud genus adiacet erodentium videlicet, quale est auripigmentum & sandaracha, & Asiae petrae flos, participat & misy paululum eiusmodi facultate.

De astringentibus.

Est & aliud genus pharmacorum quod in oculares compositiones iniicitur, eorum videlicet quae natura astringunt. Quae igitur mediocriter hanc vim habent, influxiones repellunt. Quae verò vehementer, ampliorem dolorem infligunt, tunicas exasperando, quam iuvent influxionum impetum repellendo. Miscetur autem aliquando vtiliter ex eis parum quid in compositiones oculorum aciem exacuentes, utpote quae oculorum substantiam cogant & adstringant. Verum quae mediocriter adstringunt lippitudinibus commodissima existunt: conferunt autem & reliquis ferè omnibus affectionibus ulcerum, pustularum & fluxionum. Sunt verò eiusmodi. Folia rosarum & flores & succus, ericaeque fructus, & nardi spica, ampliusque & malabathri folium, & crocus, & lycium, & quae hypocisthis appellatur. Porro vehementiorem his adstringendi vim Acacia habet & omphacium, quae & ipsa in succorum genere numerantur. Item balauustum, & cytini.

& gallæ omphacitides ex genere eorum sunt quæ multum adstringunt.

De concoquentibus.

INflammationes itemq; alias affectiones concoquunt hæc, myrrha, crocus, castorium, & thus, & fœnigræci cocti succus, quæ etiã discussoria vi prædita sunt, & præsertim, ex eis myrrha. Atq; hæc quidem est ocularium medicamentorum sylua, & quicunq; sanè naturali intelligentia præstant, ratiocinationeq; exercitati sunt, nihil amplius opus habent mea instructione, potentes nimirum ipsi ad singulas oculorũ affectiones aptum cõponere pharmacũ. Quandoquidem verò pauci tales existũt, & multorum vtilitatis potio rem rationẽ habere conuenit, præstabilius mihi visum est compositionis ipsorum rationẽ integrẽ recẽserẽ, vbi repetiuero prius perspicacitatis gratia, communem in genere vim singulorum quorum mentionẽ feci pharmacorũ, Quæ vniuersum quidem in quinto de simplicium pharmacorum tractatione, commentario à me relata est, & per cõsequentes sex libros particulatim vsque ad extremũ. Vtar autem appellationibus facultatum in pharmacis, iisdem quas in prædicta tractatione posui, velut exempli clarioris gratia. Quædam substantia terrestri dico, citra refrigerationem

nem manifestam aut caliditatem, in medio quodammodo vtriusq; cōsistentia: atque ex his aliqua quidem parū quid ex frigidityte aut caliditate cōplectuntur: aliqua verò in totum nullā eiusmodi facultatē ex se ostendunt. Totum autē hoc genus pharmacorū emplasticum, hoc est, meatus obducens & obturans appellauī, contrariam vim habens his quæ ab obturatione liberantia, Ecphrastica sunt appellata, qualis est Samius Aster magis tenuium partiū existens quā quæ simpliciter Samia terra appellatur. Et pompholyx lota, velut etiam cinis eius lotus, & cadmia vsta ac lota. Videtur autem mihi parum quid exterforium in ipsa cadmia inesse, siue post vstionem, siue citra eam laeueretur. Pompholygi verò & spodio parū quid adstringens inest, Quemadmodum etiam plumbo, post vstionē & lotionem, Nam & hoc pharmacum omnis acrimoniæ expers est, parum quid adstringens habēs. Neque refert siue masculino siue muliebri genere pompholygem dicere velis. Eodem modo etiam amylū habet, quod & ipsum lotū exquisitē, mordacitatis expers est, & medium, vt neque adstrictionē neque acredinem habeat, hoc est, neque frigidityte neq; caliditate participet. Quin & cerusa lota proximē ad facultatem vsti ac loti plumbi acce-

* In hunc dit* manifestum iam signum adstrictionis
modū ex indicās, quum penitus qualitatis omnis ex-
vet. codi. pertes sint, quantum ex gustu ac odore ap-
hunc locū paret, amilum & samius aster. Vniuersum
restitui - igitur huiusmodi pharmacorum genus, siue
mus. modicam in gustu aut odore qualitatem ex-
 hibeat, siue penitus nullam ostendat, confi-
 militer ut purissima aqua, Qualitatis ex-
 pers nominatur, & per solam terrestrem sub-
 stantiam moderatē à natura resiccat. Qua-
 propter etiā longiori tēpore cōmoditatē
 ex se proficiscentē sensui perceptibilem fa-
 ciunt, utpote quæ per primos dies nihil iu-
 uisse putentur. Adhibentur tamē à medicis
 tanquā acrimoniæ expertia, circa a grē
 curabiles affectiones, in quibus vlcus est si-
 ue solūm, siue cū erosione corniformis tu-
 nicæ, & prolapsu vniformis appellatæ, se-
 rosis humoribus longē mordacissimis af-
 fluentibus, In his enim nullum aliud phar-
 macum conuenire potest, utpote quum ad-
 stringentia cohibeant effluentes humores,
 atque per hoc dolorem ex mordacitate
 ipsorum obortū intendunt, Acria verò af-
 fectionē simul adaugeant, siue in solis ocu-
 lis affectio sit, in eiusmodi malum habitum
 partibus perductis, ut quod influit corrup-
 pant: siue etiam ipsum quod influit vitiatū
 sit, aut propter solū caput, aut etiā ob totū
 cor

corpus tale existens, Vnde etiã affectã partem quoad curationem apta fiat præparamus, tum totius corporis purgationibus, tum reuulsionibus primũ quidem ad internam corporis partem, deinde etiam ad occiput, & capitis cutem. Vtimur etiã sectionibus arteriarum, quãdoq; retro caput portetas circa aures arterias incidentes. Excindimus quoq; partem arteriarũ in temporibus, tantum vt curemus in tunicis oculorũ factam affectionẽ, ob quã etiã bonus sanguis per venas ad ipsas tunicas delatus corrumpitur. Ad has igitur affectiones solas conuenire videtur prædictorũ medicamentorum genus, citra mordacitatem resiccans in affecta parte vitiatos humores, quæ vt dictum est id quod influit corrumpit. Adstringentium enim facultas neq; resiccat talem affectionem, cohibetq; mordaciũ humorũ serosorum effluxus, Calidorũ verò & acriũ facultas non solũ nihil iuuat, sed etiã simul auget mordaciũ humorum qualitãtẽ. At verò relaxantiũ & discussoriorũ pharmacorũ vis euacuare quidẽ potest quod generatur, Verũ vlceratũ neq; renutrire aut ad cicatricem perducere potest, neq; quod procidit retrudere. Quemadmodũ etiã neq; cõcoquentiũ facultas id præstare potest, etiã si cõcoquere affectiones nõ parũ cõmodũ

com

completatur. Ex eorum verò genere sunt
 crocus, myrrha, & thus, quemadmodum dixi.
 Quid porrò dicere refert, de his pharma-
 cis, quæ acidas aut amaras habent vires,
 quòd mordacia & exacerbatiua eiusmodi
 affectionum existant? Verum his adhuc am-
 pliorem malicia prædita sunt, quæ nitrosam,
 aut falsam, aut austeram vim habent. Reli-
 quum igitur est genus id quod vlcera cum
 acri fluxione curare potest, eorum videlicet
 quæ paulò antè mordacitatis expertia phar-
 maca dixi, quæ longiori tempore affectæ
 partis vitiatum humorē consumunt. Appel-
 lantur talia à Medicis collyria libiana &
 cygni, Ob colorem quidē album qualē etiā
 cygni habent, præualente in ipsis amylo, &
 terra Samia ac cerusa Rhodiaca, Nam &
 aliàs optima hæc est, & colore albidior ac
 leuior, magisque tenuium partiū quàm quæ
 in alio quopiam loco cōficiantur. Cæterum
 in quibus alia pharmaca prædominantur,
 colorem iuxta sui ipsorū substantiam effi-
 ciunt, veluti si quis albo colori modicum
 cæruleum ammisceret. Hæc ipsa verò colly-
 ria quidam in cotibus terunt, boni succi la-
 ctis ex nutricum vberibus instillato, vt ob-
 ductoriam meatuum vim quæ in ipsis ouis
 est eritent, quum in lacte serosa quædā ex-
 terforia vis contineatur, cuius vsus con-
 gru

gruense est ad propositā curationem. Relatum enim in tertio curandi Methodi est, Quod vlcera explenda, citra acrimoniam extergentibus medicamentis opus habeāt. Quod si huiusmodi lac haberi nequeat, per fœni graci decoctum collyria terere præstiterit, utpote quod exterforiā quandam vim habet, qua ova ipsa in totum carent.

De aspritudinibus palpebrarum.

QUum ægrè curabiles prædictæ affectiones existant, adhuc molestius se extendunt, ubi accesserint aspritudines palpebrarum, à quibus etiam in lippitudinibus oculorum tunicæ concisæ, dolore affliguntur. verum in illis audemus ad inflammationi propria pharmaca, miscere parum quid de extergentibus, velut est collyrium ex vino aspritudinibus accommodatum, quo primū ea quæ ad palpebras delata sunt, deprimantur, ubi verò inflammatio reliquit, ea quæ aspritudines repurgare possunt adhibemus. In his verò qui vlcus habent cum mordaci fluxione, impossibile est eiusmodi uti pharmaco: corniformis enim tunica amplius erodetur, & vniformis magis procider, & vehemens dolor hominē apprehendet, augebiturque malignitas fluxionis. In huiusmodi itaque affectionum complexu Medici ad consilii inopiam redacti, solum reme

medium velut in desperatis repererunt, ut extensis atque versis palpebris, ipsa citra pharmacorum usum repurgent & abstergant, Aliqui quidem specilli concauo superficiem deradentes, deinde molli spongia id quod defluit excipientes, & de cætero palpebrarum aspritudinē moderatiorem reddentes. Aliqui verò etiā marinorū quorundam animalium coria in superficie aspera, in eiusmodi usum congruè adsumunt. Quidam ex præceptoribus meis etiam ex pumice collyrium fecit, cū eoq; extentis ac versis palpebris aspritudines deradebat. Manifestum est autē pumicem exquisitè leuigatam esse oportere, atque vbi id factum fuerit cum tragacantha aut gummi in collyrium formari. Cæterū vbi temporis progressu per prædicta collyria fluxio fuerit sedata, audemus iam ea quæ palpebras extergunt adhibere, parum tamē quidpiam ex eis in principio ammiscendo, quod vbi homo perpeti posse videbitur, paulatim copiam augebimus. Postquam verò fluxus fuerit resiccatus & palpebræ moderatè habuerint, caua vlcera collyrio ex thure explere oportet, ita ut in principio paxillum ex collyrio ex vino ei amisceamus, & paulatim eius copiam extendamus, ut ne palpebræ amplius tunicas oculorum infestent,

stent, & vlcera munda reddita exactè impleantur, & ad cicatricem perducantur. De his itaque sufficienter dictū est. Transeundi enim iam tempus ad reliquas oculorum tum affectiones, tum pharmacorum ad easdem compositiones.

De lippitudine siue ophthalmia.

C A P V T I I.


LXordium autem à frequētissima oculorum affectione sumam, quā propriè ophthalmiam, hoc est, lippitudinem appellant. Est autē velut didicistis, inflammatio tunicæ os capitis & caluariam ambientis, neque refert si pelliculam quis, aut quocunq; tandē nomine appellare velit. Vocant & membranā agnatam, propterea quod aliis quæ oculum ipsum constituunt tunicis, forinsecus agnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumfita ossa, & ob id omnia quæ circumcirca oculos sita sunt vsque ad malas quandoque in vehementi lippitudine simul attolluntur. In propatulo itaque est, omnia pharmaca huiusmodi affectionem curantia, sub communem omnium inflammatorum curationem cadere, assumereque necessariò quippiam pro partis ipsius natura, quæ excellentem molliciem & ad hoc vt lædatur aptitudinem, super
om

omnem totius corporis cutē nacta est, propter sensus subtilitatem, & substantiæ raritatem. Adhibenda sunt autem pharmaca repulsoria non exasperantia, hoc est, nō vehementem sortita adstrictionē, sed quæ tum propria sua substantia sunt moderatiora, tum lenitiui liquoris amixtione adhuc magis talia fiant, Lenitiuos autem liquores dixi oui candidum, & fœni græci decoctum, & ad hæc amplius ipsum lac: in quo prouidum esse conuenit, vt iuuenulæ simulque boni succi fœminæ existat, vberibus ipsius in cotem in qua collyrium teritur expressis, quo calidum adhuc oculis infundatur. Cæterum hoc in vehementi dolore afflictis, aut propter inflammationis magnitudinem, aut ob influentiū humorū acritudinem, facere cogimur. Vt plurimum verò albus oui liquor cum accommodatis pharmacis, lippitudines curare sufficit, per collyria videlicet Monohemera, hoc est, vnius diei, appellata. Adeò enim hæc nō parum sæpè magnas inflammationes mitigauerunt, vt in vespertinā quidem homo balneo vteretur, Insequenti verò die nardino collyrio ad instaurationem & corroborationem inungeretur. Admiscere autē ei circa primam inunctionem, minimū quiddam acrium & sistentiū medicamentorū oportet,

&

& circa secundam paulò amplius quiddam
 priore. Sufficiunt enim hæ duæ pharmaci
 adhibitiones, & de ābulatiuncula aliqua nō
 multa ante balneū. Porrò collyria Mono-
 hemera appellata, quæ dā priuatim feculēta
 dicta, multam in se habent Acaciam. Quæ-
 dam siue omnino modicam, siue neq; in to-
 tum habent, complectuntur autem alia qui-
 dam æris squamam, alia verò æs vltum mo-
 dicum, additis multis aliis quæ mediocriter
 adstringunt, & concoquunt, & discutiunt.
 Talia autem sunt, crocus, myrrha, lyciū in-
 dicum castorium etiam & thus citra adstri-
 ctionem concoquunt simulq; discutiūt. In
 quibus igitur adstringentia prædominan-
 tur, plurimum oui liquorem, & modicissi-
 mum pharmacum esse oportet, præsertim si
 quid ex metallicis pharmacum in se cōple-
 ctatur. In quibus verò crocus, & myrrha, ca-
 storiumq; ac thus, & lyciū præualent, paulò
 crassiore pharmaco vtendum est. Fomentū
 prætereā omnino adhibendum est ipsis per
 spongiā, siquidē mediocris sit dolor, semel
 aut bis in die. Si verò vehementior dolor
 vrgeat, præstat ter aut quater, & sæpius vti,
 in longis præsertim æstiuis diebus. Fiat au-
 tem fomentum per meliloti & fœni graci
 decoctum. De lippitudine itaque satis dictū
 est, deinceps de vlceribus dicam.

De vlceribus oculorum. CAP. III.




Vlcera oculorum eandem secundum genus curationem requirunt, quam alia vlcera, eam videlicet quam per longū in tertio & quarto curatiuæ Methodi recensui, verūm ob partis naturam quā lenissima adhibēda sunt, ex quorum numero id quod ex pompholyge lota constat esse dixi. Ammiscentur eis etiam succi quidam nō solum omnino mordacitatis expertes, sed qui etiā vehementiss. dolores mitigare possunt, velut est mandragoræ succus. Quidam etiam polygoni succum ammiscuerunt: quemadmodum alii ipsorum etiam ouorum candidum. Manifestum verò est, quòd vbi iam propemodum instat tēpus præparandi pharmacum, tum demum huiusmodi ammiscetur, propterea quod facile acescant. Eodem tempore etiam rosarū additur succus. Cæterū sylua medicamentorum quæ propriè ad oculorum vlcera pertinet, itidem scopū habet, vt vlcus mundum seruetur, Vtpote partium natura ipsum explente & ad cicatricem perducente, quemadmodum in aliis vlceribus est prædictum. Si itaque inflammatio adhuc circa oculum existat, aut quispiam etiam dolor, collyria ex thure, & metallicis lotis, & succis mordacitatis expertibus

bus adhibetur: vbi verò sordida reddita ex eorum vsu vlcera fuerint, de repurgantibus quippiam ammiscere oportet, Quale est paccianum ex vino croceum, quo vtimur, minimum quid ex eo prædictis pharmacis addentes. Habet autem hoc plurimum in se crocum, vnde etiam croceum appellatur. Habet etiam ex repurgantibus metallicis aliqua, quapropter etiam aspritudines extirpat non paruas modò, sed magnas quas sycoseis Græci à granorum ficus similitudine appellant, Attenuat item pterygia, hoc est, oculorum vngues. De his itaque medicamentis paulo post dicetur. At verò vlcera quæ per erosionem tunicæ corniformis sūt, vt etiam ex vniiformi quid pronuat, manifestum est quòd tum propter se ipsa, tum ob prolapsionem, repellentibus & adstringentibus pharmacis opus habent. Conandum est autem vt ex ipsis eligamus quæ nullam aspritudinem faciunt. Verùm his contraria pharmaca, hoc est, discussoria pustulæ expetunt, & pus quod intra corniformem est generatum. Recentia igitur & adhuc inflammata, pharmacis ex myrrha, thure, & croco sedantur, Vetustiora autem ex discussoriis, quoque quid deposcunt, quemadmodum item induratae inflammationes tunicarum. In his enim & per

acres liquores hæc ipsa pharmaca in collyriorum formam redacta proficiunt, & quæ pruatim à Medicis inunctiles liquidæ compositiones appellantur, quales etiam in his qui suffusionis principium sentiunt, apparant. In pterygiis verò & sycofi repurgantia, ut dixi, pharmaca adhibentur, partim in collyriorum formam reducta, partim arida citra alicuius figuræ inductionem, in quibus aliqui etiam ex erodentibus pharmacis aliquid addiderunt. His vicina sunt quæ scabras in palpebris affectiones persanant, atque ob id psorica appellantur. Fortissima verò omniū sunt quæ antiquos callos consumunt, & quæ pterygia dicta curant, ex repurgantibus & erodentibus medicamentis conflata.

De ocularium pharmacorum viribus.

CAPVT IIII.



Orrò quum iam omnium ferè in oculis affectionum, pharmacorumq; eorundem secundum genus expositionem fecerim, relataq; sint à me pharmaca secundū genus mordacitatis expertia, qualia ex lotis metallicis componi dixi: melius forè mihi videtur si etiam aliorum ocularium pharmacorū vires exponā. Ex hoc enim existimo ad componendum promptiores futuros, & de iam
com

compositis feliciter iudicatu-
 ros, eos qui in
 ipsis fuerint exercitati. Quum igitur mor-
 dacitatis maximè expertia sint pharmaca
 quæ dixi: Sintq; acrimoniæ omnis expertes
 tres liquores, quorum primus fœni græci
 decoctum erat, alter lac, tertius tenuis ouo-
 rum liquor: In hoc genere esse existiman-
 dum est, tum gummi, tum tragacanthæ: &
 nisi prædicta tria copiaq; & vsu prompta &
 expedita essent, possimus parum gūmi aut
 tragacanthæ in multa aqua maceratum in
 eundem vsu velut illa assumere: ita vt per
 ipsa in medica cote collyria tereremus, &
 per sola etiā infusa serosos in affectis oculis
 generatos humores elueremus. Sed tamen
 etiam nunc ipsis circa omnia ferè collyria
 vtimur, paucissimis enim demptis, omnia
 postquā trita sunt, moderatè his ipsis phar-
 macis madefacta excipiuntur. Vnum sanè
 hoc genus ocularium pharmacorum nume-
 retur, in tribus liquoribus, tragacanthaq; ac
 gummi, & lotis metallicis cōtentum. Alte-
 rum verò genus eorum est quæ modicā ha-
 bent mordacitatem, propterea quod quædā
 eis ammixta sunt quæ parum adstringunt
 & extergent. Qualia pharmaca sunt rosæ
 & thus, rosæ quidem paucā habentibus ad-
 strictionem, thure verò modicā vim exter-
 gendi. Et quum thus mediocriter calida vi

præditum existat, eam ob rem habet quid
 concoctorium & quod dolorem sedat. Ex
 eodem genere cū ipso, quantum ad conco-
 ctionem & discussionem attinet, censendus
 est crocus & myrrha, quæ inter se in eo dif-
 ferunt quod crocus moderatè adstringat,
 myrrha verò citra adstrictionem non inge-
 nerosè discutiat & resiccet humiditates.
 Suntq; sanè hæc viribus præstātiora thure,
 & ob id etiā maiorem discutiendi vim ha-
 bent: verū extersoria vi carentia, ad vlcerū
 curationem thure inferiora existūt. Huius
 generis medicamentorū, cōcoctorii inquā
 & discussorii, Lyciū quoq; est & castoriū,
 neque obscurum esse puto, Indicum Lyciū
 à me dici, nō hoc quod apud nostros popu-
 los prouenit, proximè verò ad horum fa-
 cultatem accedit sarcocolla dicta, quæ con-
 coctorium & discussoriū est medicamentū,
 atque ipsa adhuc magis galbanū prædictas
 vires habet. Meliloti verò decoctū ad con-
 coctoriam facultatem adsumpsit etiā quid
 adstrictorium, eiusdē ferè generis cū croco
 existens. Inicitur etiam in oculares compo-
 sitiones lapis Hematites appellatus, humo-
 res resiccandi vim habēs, velut & Cadmia.
 Mitius autem pharmacum lapis ipse quàm
 Cadmia existit, vtpote ex humida substan-
 tia, nō terrestri, velut Cadmia, generationē
 ad

adeptus. Hanc enim eius naturā indicat solutio, quæ fit in medica cote, quum per attritionem cum liquore quopiam in succum resoluatur. Quin & quum solus per se citra liquoris alicuius affusionem teritur, non in terrea fragmenta dissoluitur velut Cadmia, sed in æqualium partium & cohærens corpus. Consimilis ei est & lapis Schistus appellatus, sed fortio rem facultatem habet. Quod verò stipium appellatur, illotū quidem fortem ex se ostendat adstringendi facultatem: lotū verò exoluitur, vt propè ad mordacitatis expertium vim accedat. Vehementem autem extersoriam facultatē æs vstū habet, itēq; squama eius & flos, Neq; minus efficax, sed minus mordacitatis expertus chalcitis vsta est. Quod si lauētur talia pharmaca, extersoria quidē adhuc manent, tanto autē efficacia imbecilliora, quantum mordacitatis magis expertia sūt. Huius generis sunt etiā Misy & Aerugo, fortissima pharmaca his quæ sycosi & callis cōueniūt ammixta, Quidam verò ipsis etiā gallas iecerunt, vehementer adstringens pharmacum: quemadmodū aliqui chalcanthū neutro genere appellatum, atq; etiam vt aliqui vsurpant chalcanthus, tum masculino tum muliebri genere, quod ad adstringendum vnā cum acredine vehementissimum inter

hæc omnia pharmacum existit. Manifestum est autem quod multò moderatius redditur vstum & lotum, ad hanc syluam pertinet etiã stomomatis squama. At thuris cortex adstringit quidem & ipse non ingenerosè, verùm prædictis omnibus longè inferior est. Atqui & Misy ipsum tum ad easdè affectiones, tum amplius ad scabras palpebras quidem in collyria miscuerunt. Quandoquidem verò & Mannæ quidem mentionem fecerunt, & videtur aliquibus nihil à thure trito ac levigato differre, Cognosse operæpretium est, quòd Mannam propriè appellant id quod excussum est à thure circa magna onera cõfractò, Auferũtur enim simul ab ipso fragmenta quædã parua corticis Thuris, quare à thure differt tale pharmacum in hoc quod parum quid adstrictorium adsumpsit. Quæcunque igitur ex adstringentibus multam terream compagem habent, aspritudines & sycoseis ac callos consumunt. Cæterùm quæ ex succorũ genere sunt, velut omphacium & hypocisthis, eluuntur facilè in sublitionibus diffuentia simul cum lachrymis. Ex hoc genere est & glaucium & acacia. Citra mordacitatẽ verò ex terget cerui cornu vstum, velut etiam caprarum. Dictum est autem & thus ex talium genere esse, verùm hoc velut dictum est,

est, omnino exigua participat extergendi facultate, doloris sedatium & concoctorium existens. Cornua verò prædictorum animalium extergendi quidem vim habet, sed neque dolorem sedant, neque concoctoria facultate prædita sunt, frigidi nimirum & sicci temperamenti existentia. Habet autem & quod Armenium vocatur, extergendi vim, quemadmodum & atramentum Indicum appellatum, & ob id sanè vlceribus inflammatione carentibus citra molestiam adhibetur. Mixtæ verò quodammodo facultatis est aloë, veluti etiam rosa. Habet enim quid in se amarum, quod extergendi à natura aptitudinem habet: inest autem ei etiam quid astringitorium, vt committat & ad cicatricem vlcera perducatur.

Quæ ad scabras affectiones conueniunt.

EX pharmacorum ad scabras in palpebris affectiones conuenientium numero, sunt sales ammoniaci, & lapis Aſius tum ipse, tum flos ipsius, & quod psoricum appellatur, non simplex, neque spontæ naturæ productum, sed præparationis modum quendam habens, quem etiam Dioscorides conscripsit, & alii ferè omnes, qui de Medica materia commentati sunt. Ammiscetur his & misy vstum, & sandaracha, & quod à veteribus Græcis Arrhenicum, nostro verò

quo Arsenicum appellatur. Ex medicamentis verò aromaticis casia, & malabathri folium, quin & amomum & cinamomum quidam ocularibus compositionibus ammiscuerunt, quum discussoriam quidem vim habeat cinamomum, reliqua verò etiam adstringendi facultate participant. In communiporrò de omnibus repurgantibus sine extergentibus & rhypticis à Græcis appellatis, medicamentis id nosse oportet, tum eis quæ moderata sunt, tum his quæ sycoseis & callos cōsumunt, quod hæc omnia etiam ad cicatrices crassas conueniant, Attenuant enim ipsarum crassitudinem, & substantiam superficiei deradunt ac remouent.

Quæ induratis auxiliantur.

Compositiones quæ ad induratas oculorum tunicas conueniunt, ex succis constant & ammoniaco thymiamate, quemadmodum etiam antea dixi, Miscentur autem eis moderatiora quædam, quæ viribus eorum tamen non oblucentur, myrrha videlicet & thus, & galbanum, aliaque consimilia.


Quæ suffusis conueniant.

Ad suffusos verò quidam Medici liquida pharmaca cōposuerunt. Ac prima ferè omnium compositionum est quæ ex
fœ

fœniculi succo, & hyænæ felle, ac melle Attico cōstat: quidā verò etiā caprinū fel addiderūt. Verū postea alius aliud fel ammiscuit, alius galli, alius viperæ, alius testudinis mariinæ, alius callionymi piscis. Nunc verò in pretio est pharmacū ex felle scarorū. Quēadmodū & quod ex myrrha stacte cōstat. Promissiones itaque omniū horū pharmacorū magnæ sunt. Verū effectus aliquādo nullus, aliquādo valdè exiguus.

De Aridis medicamentis oculis conducentibus.

CAP. V.



EX præscripta materiæ medicæ sylua cōposita sunt à Medicis pharmaca arida, quæ priuatim ab ipsis arida collyria appellantur, Quorū aliqua quidem callos & Sycofeis cōsumunt, excreſcētē item iuxta nasi angulum carnem, encanthida appellantā, & pterygia quæ etiā vnges dicuntur. Aliqua verò scabris palpebris cōueniunt, & ad palpebrarum defluuia quæ Milphæ appellantur cōducunt: verū aliā ab acribus collyriis facultatē habent, vnde etiam à quibusdam medicis Apodacrytica, id est, delachrymatia & repulſoria appellantur, velut etiā ipsa collyria. * Ex his autē pleraque etiam * *Visa sunt dici sunt dicuntur* obtusè cernētibus, siue per ætatē, siue crassitudine, aut frigiditatē humorū in oculis, *vel. cern.* aut

aut etiā flatus caliginosi redundantiam id cōtingat, non parū profunt. Aliqua deinde ex aridis pharmacis affectionē in oculis cōgregari prohibent, impediendo videlicet influxiones humorū, ex quibus oculi lædi cōsueuerunt. Præstantissimū verò horum apparuit, & experientia iudicatum est quod ego composui, & ob id apud multos in vsu est, ac ferè per omnes gentes, quibus impèrant Romani. Ac primū sanè ipsius compositionem scribam, quum præstantius putem esse, nullis omnino affectionibus corripì, quàm eas quæ iam præoccuparunt optimè sanare. Quādo verò etiā Asclepiades plurimamq; & optimā tum aridorū, tum liquidorum collyriorū conscripsit syluā, ab aridis primū initio factō: & ego sanè mihi rectè facturus videor, si cōsimili scribēdi ordine utar. Quare vbi meū aridū adscripsero, deinceps omnia quæ Asclepiades habet in primo externorū quem Marcellæ inscribit, iuxta ipsius ordinē subiungam. Et post hæc cataplasmata oculis accōmoda, agglutinatoriaq; & inunctilia pharmaca ab Asclepiade descripta adiiciam. Præstabilius enim mihi videtur & istorū ordinē in scribendo seruare, atq; ita ad collyria ac liquida pharmaca transire, omnibus appositis, velut Asclepiades ipse recensuit, illius ipsius verbis.

Phar


*Pharmacum Aridum ad tuendam oculorum
valitudinem à me compositum.*

VTilissimū sanis oculis præseruatium
ego cōposui pharmacū, quod omnes
iam in vsu habent. Vritur lapis phrygius in
minutas partes cōfractus, vt maior tamē sit
nuce quæ pontica à quibusdam vocatur, ab
aliis nux parua. Modus vrendi idem qui in
aliis est, lapide in ollulā nouā cōiecto, dein-
deq; ollula forinsecus luto obturata, oper-
culum perforatum vel in solo vertice, vel
quod melius est, etiā circa alias plures par-
tes imponimus, quo per ipsa foramina fuli-
ginosæ & fumosæ eorū quæ vruntur exha-
lationes facilius efferātur. Postquā verò
totus lapis ignitus factus fuerit, tunc sanè
ollulam in purū quoddā vasculū euacuare
oportet, butyrūq; infundere nō vetustum,
& circunagitare vsti lapidis partes, donec
omnes extinguantur, atq; tunc cessare, & sic
rursus easdē in ollulam cōiectas vrere, rur-
susq; prunis cādefactis ab igne ollulam im-
ponēdo, vt nihil firmosum in se habeāt: ven-
tilatione etiā easdē excitare conuenit, quo
citius vstio perficiatur. Deinde quum iam
igniti facti fuerint lapides, & nulla amplius
fuligo effertur, rursus eosdē eximere oport-
et, & vino phalerno extinguere, aut aliquo
fuluo & odorato, velut est Timolites, Ar-
uifi

uisumq; & Lesbium. Deinde rursus in ollulam cōiectos, tertio vrere, & postquā ignitus fuerit lapis, rursus extinguere melle Attico nō multo. Reddetur enim pharmacum nō aridum, sed viscositate aliqua præditum. Caterum pluribus diebus trita & præleuigata in promptu habere oportet, ita vt in tenuissimū puluerem redacta sint, subscripta. æris vsti vnciam vnam, quod est drach. octo, piperis albi tantundē, folii malabathri tantundem, stibii hemioliū quod est drach. 12. his ammisce lapidis vsti lib. 1. Et postquam omnia probè fuerint leuigata, & reponere medicamentum velis, adice opobalsami Syriaci sesquiunciam quod totum drach. 12. facit. Sit verò opobalsamum tenue & pellucenti compage, non crassum quemadmodum solet in vasis circa fundum considerare ac spissari: quod enim ita crassum est, ariditatem pharmaci impediet. Porro vsus ipsius ad solas palpebras cōpetit cum specillo inducti, citra tunicarū ipsius oculi contactum. Vt plurimum itaque sufficit circa solam infernam palpebram specillum inducere. Nihil verò vetat etiam supernam palpebram similiter illinere, vbi præsertim pharmaco opus fuerit, hoc est, vbi iam manifestè perturbationem quandam perceperit oculus: non tamen expectare conuenit donec

donec id fiat. Verum præoccupare oportet circa primū affectionis sensum, in omni tempore diei, etiam si quis biberit & cœnauerit. Et planè frequēs eius competit vsus, cum cautione, vt dixi, ne tunicæ oculorum eo contingantur. Oportet autem & eum cui inducitur pharmacum palpebras exteras & extentas exhibere, & quum inungitur nequaquam cum ipsis nictare. Hoc sanè pharmacum à me compositum est, non permittens eum qui ipso rectè vtatur oculorum lippitudine apprehendi. Deinceps verò quæ ad affectiones commoda sunt medicamenta conscribam, initio ab his quæ Asclepiades scripsit facto.

Arida pharmaca ad oculos ab Asclepiade conscripta. CAP. VI.



IN primo libro pharmacorū externorum quæ Marcellæ inscribit, in hunc modum hæc verba scribuntur, Aridum ex psorice Heraclidæ, ad circūnosos oculorū angulos. Spodii cyprii, drach. quatuor, omphacii aridi drach. 2. nardi obol. 3. piperis fricti grana 15. tritis vttere. Psoricū Aelii, Cadmiæ drach. 4. æris vsti drach. 2. cum aceto in sole terito & resiccato, rursumque leuigatis & repositis vtitor. Aliud, Cadmiæ drach. vnā, æris vsti drach. 1. nardi indicæ drach. 1.
pipe

piperis fricti obollos duos, tritis vtere vt pharmino vehementer cōmodo. Aliud, Chalcitidis partes duas, cadmiæ partē vnā, tusa & cribrata terito in sole, adiecto vino sufficienti, deinde resiccato, & lenigatis repositis vtitor. Ex libris Philoxeni aridū Achariston. Cadmiæ drach. duas, chalcitidis drach. octo, aloës obolos duos, æuginis obolos duos, piperis grana decē florum rosarū drach. vnā, tritis vtitor. Eiusdem ad lippitudinē siccam & sycosin, putrescentia, & excrecentē carnē. Cadmiæ drach. decē, chalcitidis drach. octo, piperis grana quindecim, nardicelticæ drach. vnā. Cadmiam & chalcitidem cum vino terito, atq; vbi exaruerint nardū & piper iniicito, ac in puluillum redactis vtitor. Aliud, Cadmiæ drach. viginti, chalcitidis drach. quadraginta, nardi indicæ drach. duas, myrrhæ torrefactæ drach. duas, piperis grana trigintaquinque, cum aceto acerrimo apparato.

Capitonis ad lippitudines ficas, & oculos humectos, ac angulos circūrosos & palpebras ficosas. Cadmiā cypriā ad polentæ magnitudinem cōfringimus, deinde Attrico melle subactā in vasculū fictile cōiicimus, huc vsq; ore obturato, ac luto circūlito, foramen iuxta medium oris facimus, quo id quod assatur inde trāspiret. Ipsum verò va-
scu

sculum intra prunas erectum statuētes succensis prunis vrimus, atque vbi exignitum fuerit, exhalationū per foramen elatarum animaduersionē habemus, quæ si nigriores efferantur amplius vrimus. Quū verò albidiores apparuerint, assationē sufficientem factā putamus, ablatoq; vasculo & dempto operculo, cadmiam vino Italico extinguimus, & in pilam translatam terimus, resiccataq; ad pharmaci cōfectionē reponimus, Quæ hoc modo habet, Cadmiæ drach. octo, æris vsti drach. octo, stibii drach. octo, tritis & ablati vtere, cum specilli extremo palpebris mane & vespere ex eo sublitis.

Aliud, Cadmiæ vstæ velut prædictum est drach. octo, æris vsti drach. octo, stibii drach. quatuor, armenii drach. duas, tritis & repositis vtitor. Nos cadmiā & reliqua adipe viperæ excepta assauimus, deinde vino extinctis ac tritis vsti sumus. Pharmaca ex lapide Hæmatite ad scabras palpebras accommodata, Capitonis ophthalmici. Cadmiæ cypriæ drach. vigintiquatuor, lapidis hæmatitæ drach. sex, in alio exēplari drach. sexdecim, æris vsti drach. vigintiquatuor, arida ad polentæ magnitudinē contunduntur, melleque excepta velut prædictum est assantur ac vino extinguntur, deinde resiccata leuigantur. Vsus demonstratus est.


Aliud. Cadmiæ drach. viginti, aris vſſi drach. decē, lapidis hæmatitæ drach. decē, tomentorū purpuræ ſæconicæ drach. octo, melle excepta & vſta cōponito vt dictū eſt.

Sofandri ad palpebrarū deſluvia, & inueteratas affectiones, facit & ad excreſcētem iuxta naſi angulum carnē. Cadmiæ, ſtibii, chalcitidis crudæ, miſyos peregrini, ſingulorum drach. octo, cōtuſa & melle excepta velut dictum eſt aſſato, deinde vino extincta tritaque & reſiccata reponito, vtitor.

Aliud, Chalcitidis crudæ cadmiæ, ſtibii, miſyos peregrini, ſingulorum drach. octo, nardi indicæ drachm. duas, croci torrefacti drach. duas, piperis drach. vnā. Metallica melle ſubiguntur ac vruntur vt dictum eſt, deinde vino extinguntur & teruntur, adijciturque his nardus & croccus torrefactus, itemq; piper. poſtea vero ſimul leuigatis ac repositis vtimur. Pharmacū calliblepharon exornandis palpebris accōmodatū. Facit & ad inueteratas lippitudines. Stibii vſti ac vino extincti drach. ſexdecim, plūbi vſti & loti drach. octo, fuliginis thuris, ſpicæ nardi, myrrhæ torrefactæ, croci, ſquamæ aris, ſingulorū drach. vnā. Omnibus tritis ac repositis vtitor. Aliud ex croco, Croci vnc. i. glaucii vnc. i. ſarcocollæ vnc. i. ego etiā opii vnc. i. adieci. Aliud Severianū,
Cad.

Cadmia vsta & lota sextantē, salis ammoniaci, * piperis albi vtriusque sextantē. folii * Alias scilicet ammoniaci vnam. drach. duas, probè tritis vtitor. Aliud pueris maximè cōmodū. Stibii drach. sexdecim plumbi drach. 8. squamæ æris drach. 1. croci drach. 1. florū rosarū drach. 1. myrrhæ drach. 1. nardi indicæ, thuris masculi, piperis albi, singulorū drach. 1. palmularū ossicula decem, omnia in figulinū vas coniecta diligenter assato, Deinde in pilam translatis ac tritis opobalsami cochlearia duo adiicito, conquassato reficcato, & vtitor. Aridum Philoxeni ad pruriginosos ac circumrosos angulos, Facit & ad obtusum visum, Cadmiæ drach. 4. salis ammoniaci drach. duas, piperis albi drach. 1. tritis vtire. Ego hæc ita adparo. Cadmiæ drach. 8. croci drach. 2. piperis albi drach. vnam, salis ammoniaci drach. 2. nardi indicæ drach. 1. tritis vtitor. *Liquida oculares compositiones ad ficosas eminentias, ac omnem extuberantiam carnis, facit & ad carnem circa nasi angulum excrecentem, & ad incipientem tippitudinem.*

C A P. VII.



Compositio qua vsus est Philippus in Cæsaria, Misyos assati drach. octo, myrrhæ drach. quatuor, cadmiæ drach. octo, croci drach. duas salis ammoniaci drach. duas,

nardi indicæ, piperis albi vtriusque drach. .i. mellis Attici cyathum vnũ. Aliud, Misyos assati drach. sex, atramēti sutorii drach. quatuor, myrrhæ drach. quatuor, æris vsti drach. .i. mellis attici cyath. .i. Panchrestos Erasistrati. Ad aspretudines ac omnes lipituidines, auresq; purulentas, & ad vlcera ægrè recipientia cicatricē, & ad nomas, hoc est, vlcera serpentia oris. Aeris vsti drach.

* Aliàs. .i. * duas, myrrhæ drach. vnā, piperis obolos duos, misyos assati drach. vnā croci obolos tres, vini chii heminā vnā, passi cretici heminæ dimidium, Arida terito affuso vino, atque vbi imbibitũ fuerit vinum, affunde etiam passum, & conuassata in æreum vasculum transferto, ac ad lentum ignem coquito, deinde in pyxidem æream reponito.

Ad callos & omnē eminentiam. Aeris vsti drach. duas, misyos vsti drach. vnā, myrrhæ drach. vnā, croci drach. vnā, omphacii drach. vnā, vini chii cyathos duos, mellis attici librā dimidiā, vtitor. Philoxeni liquida visum exacuens, cicatrices & callos exterit. Ammoniacy thymiamatis drach. quatuor, æruginis drach. duas, vino diluta & contrita melle attico excipito.

Aliud, Ammoniacy thymiamatis drach. duodecim, æruginis drachm. sex, myrrhæ drach. duas, cōponito vt dictũ est. Aliud

Phæ

Phædri Rhinion, id est limula. Ammoni-
 niaci thymiamatis drach. quatuor, æruginis
 drach. vnā, alcyonii torrefacti drach. vnā,
 floris lapidis Afii obolos tres, cōponito ac
 vtitor vt dictum est. Aliud, Ammoni-
 niaci thymiamatis drach. 8. æruginis drach. 8.
 floris lapidis Afii drach. duas, obolos duos,
 alcyonii drach. 1. obolos duos, * opii sesqui- * Vet. cod.
 drachmā, myrrhæ sesquidrachmā, cōponito huic loco
 ac vtitor vt dictū est. Aegyptia ad callos addit stru
 & albugines, aufert etiam pelliculas cōfe- thy drac.
 stim. Aeruginis Corinthiæ drac. 6. ammo- vnā, obo-
 niaci thymiamatis drach. 6. obolos 4. salis los duos,
 fossilis drachm. 4. medullæ colocynthidis salis am-
 drach. * quatuor, fellis taurini drach. 2. nitri moniaci
 sesquidrachmā, piperis albi grana 40. mel. drach. 1.
 lis attici cyathos sex, cōponito vt dictū est, obol. duos.
 & in pyxide ilicea reposito vtitor. Alia * Tres, obo-
 Aegyptia ad callos & albugines, ac inuete- los qua-
 ratas affectiones. Aeruginis drach. 6. am- tuor, sic
 moniaci thymiamatis drach. 6. medullæ co- vet. cod.
 locynthidis drach. 3. fellis taurini drach. 2.
 nitri nigri drach. duas, excipe mellis attici
 cyathis sex, & vtere. Cōpositio exacuens
 visum, faciēs & ad glaucedinem. Antonii
 Musæ. Fellis perdicis syluestris partē vnā.
 In alio exēplari, succi herbæ perdicii, Aliqui
 succi cētauræ partes 3. mellis attici tātun-
 dem. Aliud, Fellis gallinæ veteris partem

vnam, succi centaureæ partem vnā: mellis
attici partes tres, facit ad glaucedines. Cō-
positio Largi exacuens vīlū. Succī fœ-
niculi radicis partem vnā, mellis tantun-
dem. Reponito in pyxidē æream ac vti-
tor. Aliud, Succī radicis fœniculi partē
vnā, succi chelidonæ tantundem. mellis
attici tantundem. Aelii Galli ad suffusio-
nes. Fellis testitudinis marinæ drach. 8.
mellis attici tantundem. fellis taurini dra-
chmas. 2. croci drach. 2. opobalsami drac. 2.
contusis vtere. Casii ad suffusiones. Fel
taurinum in æream pyxidē euacuatum
per dies decem finito, deinde myrrhæ, cro-
ci, vtriusque drach. 2. opopanacis drach. 2.
opobalsami drach. 2. piperis grana. 12. mel-
lis attici duplum omnium accipito, omniaq;
cum felle misceto, & in æreo vase coquito.
deinde in ærea pyxide repositis vtor.
Liquida Basilis, hoc est regina, hanc repa-
ratricem appellamus. Omphacii drach. 2.
myrrhæ drach. 2. fellis aquilæ drach. 2. opo-
balsami drach. 2. lachrymæ oleæ drach. 2.
ammoniāci thymiamatis drach. 1. fellis hyæ-
næ drach. 1. excipe melle. * Aliud, Ompha-
cii drach. 2. myrrhæ drach. vnā, salis am-
moniāci drach. 1. croci drach. 1. opobalsa-
mi drac. 1. lachrymæ oliuæ drach. 1. ammo-
niāci thymiamatis drach. 1. Fellis hyænæ
dra

* Hæc ex
veteri co-
dice.

drach. 8. excipe melle attico.] Antonii
 Musæ. Fellis hyanæ drach. 1. fellis vrsi
 drach. 2. opobalsami drach. 2. salis fossilis
 drach. 1. croci drach. vñ. myrrhæ. drach. 1.
 mellis attici cyathos. 2. succi fœniculi cya-
 thos. 2. Philoxeni, Fellis hyanæ sesqui dra-
 chmam adipis viperæ sesquidrachmam, cro-
 ci drach. 1. omphacii drach. 1. myrrhæ dra-
 chmæ dimidium, opobalsami drach. 1. mel-
 lis attici drach. 8. Tincturæ albuginum.
 Gallam tritam ac lenigatam in prompto
 repositam seruato, vsu verò expetente cum
 specilli nucleo calfacto adhibeto, deinde
 attramentum sutorium aqua dilutum ad-
 moueto. Aliud, Malicorium tritum
 adhibeto, indeque atramentum sutorium
 aqua dilutum admoueto. Aliud, Misyos,
 atramenti sutorij, gallarum omphacina-
 rum, singulorum æquales partes contu-
 sas & cribratas reponito. Vfus verò tem-
 pore aridum adhibeto. Aliud aluminis scis-
 filis, malicorii, mellis, acaciæ fructus, singu-
 lorum æquales partes contundito adhibe-
 to. Ad glaucos oculos quo pupillæ nigræ
 reddantur. Malicorii dulcis succum in-
 fundito, deinde post temporis interstitium
 hyoscyami florem cū vino aut hyoscyami
 succo tritum instillato. Verūm hæc oportu-
 no tēpore colligere & reponere cōuenit.

Aliud, Acaciæ fructum & gallarum parum, quid diligenter trita fremii succo excipito & ad mellis crassitudinem redigito, Deinde expressum per linteolum liquorem reseruato ac vtitor vt dictum est. Ad pilos pungentes in palpebris enascentes, Trichiasin appellant Græci Antonii Musæ. Fel aui- culæ quæ cinædus appellatur, & aconiti di- midium eius, mixta reponito. Vsu verò exigente, euulso pilo locum ex pharmaco illinito. Aliud, Fel piscis pagri, & aconiti dimidiū, cum squama ferri lota, adipe subi- gito, atque his amygdalini olei parum adii- cito, & sanguinis vespertilionis quantum suffecerit, Deinde mixtis & repositis vti- tor vt dictum est. Agglutinatoria pilo- rum. Heraclidæ Tarentini. Cera dra- chmas. i. picis drach. i. lithocollæ drach. i. simul liquefacta reponito. Vsu verò postu- lante, specilli summum candefacito, & quod ex pharmaco dissoluto adhæserit adhibe- to, eoque pilos agglutinato. Aliud, Re- sinæ siccæ, picis siccæ vtriusque drach. i. sul- phuris viui drach. i. bituminis drach. vnam. ceræ drach. 2. liquefactis vtitor. Ad par- uos instar hordei oblongos circa pilos pal- pebrarum abscessus, Crithas & Posthias Græci appellant. Antonii Musæ. Galba- ni partem vnam cum modico nitro mixtam

im

imponito. Aliud, ceram & misyos crudi parum ammisceto. Faciunt & ficus aridæ in vino mulso coctæ & tritæ, modico simul galbano contrito. Facit & farina hordeacea in vino mulso cocta ac trita, itidem modico galbano simul contrito. Dionysii Milesii ad pilos palpebrarum pungentes. Leporem marinum in figulino nouo vrito, & cinerem tritum ricinorum sanguine excipito & reposito in cornea pyxide vtitor, euulsis antea pilis. Aliud, Salamandræ vstæ cinerē, terrestrium herinaccorum felle excipito, ac vtitor vt dictum est. Quidam castorio vsi sunt cum melle mixto, Aut castorio & hirundinis vstæ cinere, Aut cicutæ semen tritum ac Thunnæ sanguine exceptum, præeuulsis pilis illeuerunt. At crithas & chalazia, hoc est, instar grandinis in palpebris tubercula. Sagapeno cū aceto trito vtitor. Aliud ad Aegylopas. Succi illecebræ, succi solani, vtriusque libræ dimidium. thuris drach. 8. mastiches quadrantem. galbani libram dimidiam. Succos cum thure coquito, atque vbi dissolutum fuerit galbanum iniicito: mastichen enim improbamus. Aliud, Thuris drach. 8. ladanani drach. 4. aluminis scissilis drach. 4. myrrhæ drach. 8. ceræ drach. 4. spumæ niri drach. 4. coaguli leporis drach. 4. Con-

314 DE COMPOS. PHARMACO.
tunditur hoc pharmacum & cum vngenti
serini fece mollitur.

*Cataplasmata in eodem libro primo ex-
ternorum ab Asclepiade ad oculos
descripta, itemq; agglutinato
ria, & inunctilia.*

Cataplasmata lippientium, ad doloris
vexationes ac maximas Epiphoras,
quibus vsus est Heraclides Tarētinus. Ro-
sarum viridium aut siccarum drach. 4. cro-
ci drach. 1. opii drach. vnam excipe melilo-
ti decocto aut passo. Aliud Rosarum, vio-
larum albarum, meliloti, capitum papaue-
ris, singulorum drach. 2. croci drach. vnam.
opii drach. vnam. myrrhæ drachmam vnā.
oui assati vitellum, tritis & passo subactis
vtere vt dictum est. Illitiones ad dolores,
quibus vsus est * Glaucus. Aloes, lycii indi-
ci, rosarum viridiū, croci, opii, myrrhæ, sin-
gulorum æquales partes vino subactas in
pastillos formato, eosq; in vmbra ficcato.
Vsu verò exigente passo dilutos oculis illi-
nito, itemq; fronti ac temporibus. Philo-
xeni ad fluxionem multam & dolores. Fo-
liorum rosarum recentium drach. 2. seminis
hyoscyami drach. 8. thuris drach. 3. myrrhæ
drach. 4. farina polentarū acetabulum, oui
assati vnius luteū, succi mādragoræ drac. 4.
croci drach. 2. opii. drach. 4. vini austeri
quan

* Gallus
in cod. ve-
tusto.

quantum sufficit. In pastillos redigito ac
 vtitor veluti dictum est. Illitio Anthera
 eadem hora iuuans. Croci drach. 4. thuris
 drach. 2. cinnabaris drach. 4. gummi drach. 2.
 vino excipito. Vfus tempore terito & ad
 solidum redigito, & modicū mellis adiici-
 to. Aliud Lychnium inscriptum. Croci
 drach. 1. thuris drach. 2. opii drach. 2. gum-
 mi drach. 2. cinnabaris drach. 2. aqua pluua
 excipito. Alii habent, croci rosas specie re-
 ferentis drach. 4. cinnabaris drach. 2. myr-
 rhæ, opii, vtriusque drach. 2. aqua pluuiali
 excipito. Illitiones mordaces quæ euesti-
 gio fluxionem cohibent, faciūt & ad lippi-
 tudinem scabram ac aridam. Aeris vsti, dra-
 chmas. 4. croci drach. 4. piperis albi drach. 2.
 opii drach. 2. gummi drach. 4. cum aqua
 pluua forinfecus illinuntur, Relidit hoc
 pharmacum maximas Epiphoras. Cæterū
 cauere oportet ne quid ex eo in oculū præ-
 terlabatur. Aliud phloginum, hoc est
 flammeum inscriptum. Aeris vsti & loti
 drach. 12. croci drach. 6. piperis albi drach. 4.
 myrrhæ drach. 3. opii drach. 3. gummi dra-
 chmas. 12. vino Aminæo excipito. Agglu-
 tinatoria quæ fluxiones cohibent. Polli-
 nis partem vnā, myrrhæ partem vnā,
 mannæ thuris partem vnā, cādido oui ex-
 cipe, deinde in linteolum impacta impone
 tem

temporibus ac fronti. Aliud, Seminis
 hyocyami drach. 2. opii drach. 1. croci dra-
 chmā. 1. pollinis drach. 4. ouorum assatorū
 vitellos duos, castorii drach. 1. omnibus si-
 mul coactis vtitor. Collyrium ad Epipho-
 ran, & dolores, ac fluxionem multam quo
 Moschio familiaris vsus est. Glaucii dra-
 chmas. 16. sarcocollæ drach. 8. croci drac. 4.
 gummi drach. 2. tragacanthæ drach. 2. succi
 mandragoræ drach. 2. opii drach. 1. aqua
 pluuiali excipito ac vtitor cum ouo. He-
 ronis ophthalmici psittacus, ad dolores &
 fluxum largum, euestigio somnum inducit.
 Glaucii drach. 16. croci drach. 8. sarcocollæ
 drach. 8. opii. drach. 4. succi mandragoræ
 drach. 2. tragacanthæ drach. 8. aqua pluui-
 ali excipe. Ad prædictas affectiones Nea-
 politæ. Glaucii drach. 48. sarcocollæ dra-
 chmas. 24. croci drach. 24. lapidis hæmati-
 tæ drach. 12. opii drach. *19. succi mandra-
 goræ drach. 8. gummi drach. 16. tragacan-
 thes drach. 12. excipe aqua pluuiali. Sergii
 ophthalmici Babylonii. Glaucii drach. 24.
 sarcocollæ drach. 16. croci drach. 12. opii
 drach. 4. lapidis hæmatitæ drach. 6. gummi
 drach. 12. excipito aqua pluuiali. Illinito
 per vnum atque alterum diem, atque vbi
 affectio non solvatur ad insequentes illi-
 tiones transimus. Aliud diasmyrnum
 Glau

*Vet.cod.
 habet. 12.

Glaucidianum inscriptum. Glaucii drachmas. 48. sarcocollæ drach. 48. croci drachmas. 24. opii drach. 6. myrrhæ drach. 6. hæmatitæ drach. 6. tragacanthæ drach. 48. aqua pluuiæ excipe ac vtere cū ovo. Diamyrnum ex hæmatite. Glaucii drach. 64. sarcocollæ drach. 32. croci drach. 12. opii drach. 8. myrrhæ drach. 6. hæmatitæ drachmas. * 16. tragacanthæ drachmas. 48. gummi drach. 16. In alio exemplari drach. 48. cod. 6. Excipiuntur aqua pluuiæ, vsus eius est cū ovo. Phosphorus ad doloris vexationē, omnemque inflammationem & intensas Epiphoras. Glaucii drach. 24. sarcocollæ drach. 8. croci, opii, vtriusque drachmas. 8. myrrhæ drach. 8. misyos vsti, drach. 8. gummi drach. * 19. excipe aqua pluuiæ, vtere cū 12. ovo. Euchrum excellentis & mirabilis efficacix. Glaucii drach. 20. sarcocollæ drach. 7. croci drach. 7. myrrhæ drach. 7. opii drach. 7. misyos vsti drach. 7. gummi drach. 12. excipe aqua pluuiæ, vtere cum ovo. Pharmacum ex succis, dolorem sedans, facit ad omnem doloris vexationem, somnum euestigio inducit. Glaucii drachmas. 48. sarcocollæ, tragacanthæ vtriusque drach. 16. croci drach. 8. opii drach. 4. succi rosarum drachmas. 4. lycii indici drach. 4. hyoscyami drach. 4. succi mandragoræ dra

*Vet.cod. drachmas. 4. *gummi drach. 8. Excipiuntur meliloti decocto: componuntur autem succi cicu- hoc modo, Meliloti libram vnā, & aquæ tædrac. 4. pluuiialis heminas. 12. ad tertias coquito, & excolato liquore ad pharmaci compositionem vtitor. Aliud, Glaucii drachmas. 48. sarcocollæ drach. 24. croci drachmas. 24. opii drach. 12. lycii indici drachmas. 12. succi hyoscyami drachmas. 12. succi cicutæ drach. 12. rosatum viridium resectis extremitatibus drach. 48. gum-

* In gra. mi drachmas. * 28. aqua pluuiali excipe, cod. 19. vtire cum ouo. Pharmacum Phæon, id est fuscum inscriptum, accommodatum ad doloris molestias. Cadmiæ drach. 12. aut. 16. æris vsti drachmas. 6. myrrhæ drachmas. 3. opii drachmas. 3. acaciæ drach. 7. excipito aqua pluuiā velut demonstratum est. Aliud Phæon. Ad omnem fluxum & omnem lippitudinem. In alio pædicon, id est puerile legitur. Aëris vsti drach. 12. cadmiæ drach. 32. gummi drachmas. 32. acaciæ drach. 32. myrrhæ drachmas. 4. opii drachmas. 4. aqua pluuiā excipe. Aliud ex libris Philoxeni. Spodii cyprii, drachmas. 12. æris vsti & loti. 3. drach. 3. opii, myrrhæ, vtriusque drachmas. 3. acaciæ, gummi, vtriusque drach. 7. aqua pluuiali excepta cum ouo in vsum

VC

veniunt, vt dictum est. Pharmacum Bery-
tium inscriptum, quo vsus est straton Be-
rytius ad maximas epiphoras, euestigio
auxiliatur. Aeris vsti & loti drach. sex-
decim, acaciæ drach. sexdecim, spodii pom-
pholygis drach. sexdecim, opii drach. sex-
decim, gummi drach. sexdecim, croci dra-
chmas. 12. myrrhæ drach. duas, aqua plu-
uiali excipe, vtere cum ouo. Oportet hoc
assiduè infundere. Aliud ad easdem affe-
ctiones. Spodii pompholygis drach. sex-
decim, opii drach. 12. myrrhæ drach. duode-
cim, gummi drach. sexdecim, æris vsti &
loti drach. sexdecim, aqua excipito pluvia-
li, ac vtitur cum ouo. Pharmacum Achari-
stium inscriptum, ad maximas epiphoras hu-
ius solius vsu Medici Aegyptii feliciter
medicatur, in agrestioribus præsertim cor-
poribus. Cadmiæ drach. 16. acaciæ dra-
chmas. 8. æris vsti & loti drach. 8. opii dra-
chmas. 4. fructus ericæ drach. 4. myrrhæ
drach. 4. gummi drach. 16. aqua excipito, ac
vtitur cum lacte muliebri. Téperatura me-
dia est, vbi verò circa oculos affectio sit, ab
hoc collyrio abstinere oportet. Quo ipse
vsus sum sic habet. Cadmiæ drac. 16. fructus
ericæ drach. 2. æris vsti & loti drac. 4. opii
drach. 2. myrrhæ drac. 1. acaciæ drac. 6. gum-
mi drac. 8. aqua excipito, vsus indicatus est.

Aliud,

Aliud, Cadmiæ drach. 6. fructus ericæ
 * Hæc ad drach. 4. opii drach. 6. * æris vsti & loti dra-
 dit. vetu. chmas. 4. gummi drach. 20. composito ac
 cod. thuris vtitor vt dictum est. Nectarium Marci,
 drach. 2. facit ad incipientem lippitudinem, facit ad
 myrrhæ illationem fluxus tenuis, ad chemoseis, cu-
 drac. 8. la mores, pellicularum eminentias, & ferè ad
 pidis scis- omnem lippitudinem facit, & ad palpebras
 filis dra- crassas. Oportet autem præ omnibus fomē
 chmas. 2. tum adhibere, deinde ipsum infundere, in
 acaciæ principio quidem fluxionis cum aquoso oui
 drach. 8. liquore: vbi verò successerit hæc curatio,
 paulatim hanc temperaturam extendere &
 augere oportet. Cæterum ad palpebras
 asperas collyrio cum aqua vtimur, apud
 alios Sphragis appellatur. Aëris vsti & lo-
 * Acaciæ ti drach. 4. cadmiæ drach. 4. * croci drach. 2.
 drach. 3. opii drach. 2. gummi drach. 6. aqua excipe
 vet. cod. ac vtere vt indicatum est. Sergii ophthal-
 mici Monohemerum inscriptum, hoc est
 vna die efficaciam suam commonstrans.
 Cadmiæ vstæ & lotæ drach. 4. spodii pom-
 pholygis loti drach. 4. æris vsti & loti dra-
 chmas. 4. croci drach. 2. opii drach. 7. acaciæ
 drach. 6. gummi drach. 6. aqua pluuiali ex-
 cipe, ac vtere cum ouo. Temperatura est
 aquosa. Postquam lachrymæ prolectæ fue-
 rint, candidum oui infundere oportet, &
 rursus sublinere. Vbi verò morsus con-
 se

sequeretur, fomentum adhibendum est, rursumq; oui candidum infundendum: postea verò collyrio nigro inscripto illinito.

Sphragis Neapolitæ. Cadmiæ drach. octo, æris vsti & loti drachm. octo, acaciæ drach. octo, spodii cyprii drachm. quatuor, croci drach. quatuor, opii drach. quatuor gummi drach. duodecim, aqua excipe, vsus indicatus est. Paccii Sphragis. Cadmiæ vstæ & lacte caprino siue muliebri extinctæ ac lotæ, & in vmbra siccata drach. 10. æris vsti & loti drach. 10. acaciæ drach. 10. opii drach. 6. croci drach. 6. gummi drach. 15. aqua pluuiali excipito. Zoili Sphragis cū Paccii concordat. Philotæ Aphroditarium inscriptum. Cadmiæ lotæ drachm. 24. acaciæ drach. 36. æris vsti & loti drachm. 12. croci drach. 12. opii drachm. 12. spodii cyprii loti drach. 12. gummi drach. 48. excipe aqua pluuiali, ac vttere cum ouo assiduè infundēdo. Post curationē verò lauare iubeto, hoc assiduè vsus sum in maximis epiphoris. Aliud Neapolitæ. Facit ad maximas epiphoras, maximè in his oculis qui ægrè rigantur & subalbicant, circa inflammationes, vt simile quidam chemosi appareat. Hoc nos vti sumus, post illitiōes ægris lauare iussis. Lapidis schisti drachm. 8. thuris drach. 7. æris vsti & loti drachm. 8. opii drach. 8. myrrhæ

drac. quatuor, gummi drac. octo, excipe vino ac vtere cum ouo. Temperamentum est aquosum. Sæpe verò hoc infundere oportet, & post interuallum ab illitione lauari iubere. Fuscum Olympionico inscriptum. Facit ad maximos dolores, facit & ad chemoseis & omnino ex accommodatis simis collyriis est: nã statim liberat. Cadmiæ vstæ & lotæ drac. octo, acaciæ drac. 8. stibii vsti & loti drac. 8. aloës indicæ drach. octo, croci drac. quatuor, myrrhæ drach. 4. opii drac. quatuor, gummi drac. octo, aqua excipe ac vtere cum ouo. Temperamentum est crassum. Ego etiã pompholygis ac thuris vtriusque drac. quatuor, adieci. Aliud Zosimo inscriptum odorum. Facit ad dolores & recentes affectiones. Cadmiæ vstæ & lotæ vino Italico, hoc est extinctæ, drac. octo, aloës drac. octo, stibii drac. octo, aris vsti & loti drac. octo, aut duas, croci drach. duas, myrrhæ drachmam vnam, nardi indicæ drachmam vnam, opii drachmam vnam, acaciæ drachm. * 19. gummi drac. duodecim, aqua pluuiali excipe. Hermiæ ophthalmici Lutron, id est balneum appellatũ. Ad maximos dolores eadem die ad summum auxilians, facit & ad inueteratas lippitudines. Aloës drac. octo. aris vsti & loti drac. sexdecim, opii drac. sexdecim, myrrhæ

* Aliàs
12.

rhæ drachm. 12. croci drachm. octo, cadmiæ
 drac. quatuor, thuris drac. tres, gūmi drach.
 sexdecim, vino Mendefio excipe, ac vtere
 cum ouo. Temperatura est aquosa. Opor-
 tet hoc per interualla trium aut quatuor
 horarum infundere, & vsque ad mali depul-
 sionem sinere, atque tunc lauari iubere.

Theodotion Phlacianū, Harpocratium in-
 scriptum. Ad maximas epiphoras & dolo-
 res, liberat citra venæ sectionem. Succī
 acaciæ drac. 24. cadmiæ drac. octo, aris vsti
 & loti drac. octo, stibii drac. 16. aloës drac.
 quatuor, croci drac. tres, myrrhæ drac. tres,
 lycii indici drac. duas, castorii drach. 1. opii
 drach. duas, gummi drach. 24. aqua pluuiali
 excipe, ac vtere cum ouo. Temperatura est
 crassior. Hoc collyriū tumorem palpebris
 inducit. Scylacium pharimacum accom-
 modatum eadem die curans, Euestigio sol-
 uit inflammationes. Stibii drac. 40. aca-
 ciæ drach. 40. cadmiæ drach. sexdecim, aris
 vsti & loti drac. quatuordecim, cerusæ drac.
 octo, myrrhæ drach. quatuor, nardi indicæ
 drach. 4. croci drach. 2. lycii indici drach. 4.
 castorii drac. 2. aloës drach. duas, opii drac.
 duas, chalcitidis assæ drachm. duas, gummi
 drachmas * duas, excipe rosarum decocto * *Vet. cod.*
 ac vtere cum ouo. Téperatura est crassior. *habet*
 Neapolitæ Phanion, id est lāpas seu facula. drac. 40.

* Aliàs.
20.

Ad maximas epiphoras & doloris molestias, facit & ad affectiones. Cadmiæ lotæ drach. 8. acaciæ drachm. * 8. æris vsti & loti drachm. 6. stibii loti drachm. 20. cerusæ drach. 6. myrrhæ drach. 2. aloës drachm. 2. nardi celticæ sesquidrachmam, opii sesquidrachmam, croci drachmam vnam, castorii drachm. dimidium, gummi drach. 20. aqua pluuiæ excipe, vtere illinendo. Aliud Phnion Serapiacum inscriptum. Acaciæ drach. 40. stibii drach. 40. cadmiæ drach. 16. æris vsti & loti drach. 12. aloës drach. 3. myrrhæ drach. 4. cerusæ drachm. 12. opii drachm. 2. croci drach. duas, castorii drach. 2. nardi indicæ sesquidrachmam, gummi drachm. 25. aqua pluuiæ excepta illinito. Malabathrinum nostrum, Facit ad doloris vexationes, & ad affectiones in declinatione. Cadmiæ drach. sexdecim acaciæ drach. 40. æris vsti & loti drach. quatuordecim, opii drach. duas lycii indicæ drach. duas, myrrhæ drach. quatuor, malabathri drach. duas, nardi indicæ drach. duas, castorii drach. duas, croci drach. duas, aloës drach. duas, cerusæ drach. octo, stibii loti drach. octo, gummi drach. quadraginta, aqua excipe & vtere cum ouo. in principio affectionum, & in declinatione facta ab illatione pharmaci panchrestii appellati, descriptum hoc inter mordacia col.

collyria habetur. Aliud Philadelphium inscriptum. Facit ad declinationes inflammationum, & vlcera fordida, & pustularum eruptiones, euestigio auxiliatur. Stibii vsti & loti drach. viginti, plumbi vsti & loti drach. decem, cadmiæ drachm. octo, æris vsti & loti drach. tres, aloës drac. quatuor, cerusæ drach. tres, lycii indici drach. duas, & semis, myrrhæ drachmas duas, & semis nardi indicæ drach. duas, croci drach. duas, castorii drach. vnam, opii drac. vnam gummi drachm. octo, aquam & ad exceptionem candidum ouorum decem. Collyrium album, ad epiphoras & affectiones inscribitur Trypherum, id est delicatum. Cadmiæ lotæ drach. sexdecim, cerusæ drachm. octo, amyli drac. quatuor, gummi drac. quatuor, tragacanthæ drach. quatuor, opii drachm. duas, excipe aqua pluuiæ. Vsus est cū ouo.

Collyriū ex terra Samia Terennū inscriptum, ad epiphoras & affectiones. Cadmiæ lotæ drac. duodecim, cerusæ drach. 12. terræ Samiæ drac. duodecim, opii drac. vnā, gummi drac. quatuor, aqua excipe ac vtere cum ouo. Aliud dolorem sedans, ad fluxū omnis generis, vlcera, dolores, papulas & tubercula, prolapsus, chemoseis, & omni-genas affectiones. Cerusæ drac. dēto, terræ Samiæ drachm. octo, spodii pompholygis

drach. duodecim, tragacanthæ drac. duas, opii, drachm. 2. gummi drachm. quatuor, aqua pluuiæ excipe ac vtere cum ouo. Aliud Diocleum inscriptum, ad doloris molestias, & epiphoras, ad suppuratos oculos, pustulas, vlcera. Hoc pharmacū delicatius existit. Tragacanthæ drac. octo, gummi drac. quatuor, amyli drach. quatuor, spodii pompholygis drac. sexdecim, cerusæ drac. octo, opii torrefacti drac. duas, aqua pluuiæ excepta admoue cum ouo. Pharmacum ex thure. Accommodatum ad fluxiones & chemoseis. Cadmiæ * drac. viginti, thuris drac. 20. cerusæ drac. quadraginta, opii drac. sex, gummi drac. sex, aqua pluuiæ excipito. Cæterum nos sic apparauimus.

* Sic ve-
tu. cod.

Cadmiæ drac. decem, pompholygis drach. decem, thuris drach. decem, cerusæ drach. quadraginta, opii drac. sex, gūmi drac. sex, aqua pluuiæ excepta admoue cum ouo.

Aliud Trypheron, id est delicatum inscriptum. Ad inustiones epicaumata Græcis dictas, pustulas, chemoseis, maximè in his qui nullam mordacitatem perferre possunt. Cadmiæ lotæ drac. 8. amyli drach. 8. thuris drac. 8. cerusæ drac. 48. opii drach. sex, gūmi drac. 16. aqua pluuiæ excipe, vsus indicatus est. Cygnus inscriptus Reginae, ad maximos dolores & affectiones.

Cad

Cadmia drac. 16. cerusæ lotæ drac. 8. amy-
li drac. 2. tragacanthæ drachm. duas, acaciæ
drac. duas, opii drac. 2. gummi drach. 12. ex-
cipe aqua pluuiali, & ad excipiendum adii-
ce ouorum crudorum recentiu candida 4.

Aërianum Diomedii inscriptum, colly-
rium accommodatum ad epiphoras, & ve-
teres affectiones itemque recentes. Spo-
dii pompholygis drach. octo, cerusæ drach.

* 20. æruginis drac. quatuor myrrhæ drac. * Cod. ve
14. thuris drac. tres, opii drach. tres, gummi tu. habent
drac. octo, excipe aqua pluuiali ac vtere cū drach. 8.
ouo.

Cygnus ex terra Samia. Ad vlcera
omnis generis, ad epiphoras, dolores circū
circa molestantes, suppuratosque oculos.

Spodii loti drac. 16. cerusæ lotæ drachm. 8.
terræ Samiæ drac. quatuor, amyli drac. qua-
tuor, acaciæ drac. 4. opii drac. quatuor, gū-
mi drac. 4. tragacanthæ drac. duas, aqua plu-
uiali excipe ac vtere cū ouo. Aliud Dio-
nysio inscriptum. Cerusæ drac. 38. æru-
ginis vermiculata drac. 16. succi papaueris
drac. octo, gummi drachm. quatuor, excipe
aqua pluuiā, ac vtere cum lacte. Aërianū
pharmacum nostrum, ad veteres ac recen-
tes affectiones accommodatum. Cerusæ
drac. viginti quatuor cadmiæ vstæ & lotæ
drach. decem stibii vti & loti drach. decem
thuris drac. decē squamæ æris drac. 5. opii

328 DE COMPOSIT. PHARMACO.

drac. tres, myrrhæ drac. tres, gūmi drac. 12.
excipe aqua pluuiali, ac vtere cum ouo.

Collyrium Gennadii. Cerusæ drach. 18.
stibii drach. 12. myrrhæ drachm. 12. squamæ
æris drach. 12. opii drac. sex. gummi drach.
24. excipe aqua pluuiali. Collyrium ex
terra Samia, Paccii ophthalmici, ad affectio
nes intensas. Cadmiæ drachm. 16. cerusæ
drac. 16. terræ samiæ drach. quatuor, opii,
drach. 2. thuris drac. duas, stibii drac. quin
que gummi drach. quinque, excipe aqua, ac
vtere cum ouo. Therinum, id est æstiuū
inscriptum. Cadmiæ vstæ & lotæ drach.

* Vet. ta. * 20. terræ samiæ drac. 20. cerusæ drac. 20.
men cod. acaciæ drach. 2. squamæ æris vstæ & lotæ
habet drach. * 12. corticis thuris drach. 2. traga
drac. 8. ex canthi drach. 5. gummi drach. 16. aqua plu
quo etiā uiali excipe, vtere cum ouo. Collyrium
addita sit Hygidion appellatum. Cadmiæ drach.
terra sa- 8. myrrhæ drac. 8. acaciæ drac. 6. opii drac.
mia & ce 2. æris vsti & loti drach. 2. gummi drach. 6.
rusa. fructus ericæ drac. vnam, aqua pluuiali ex
* Vet. cod. cipito. Aster anicetus, hoc est inexupera
drach. 2. bilis. Ad doloris vexationes, pustulas, sta
phylomata, vlcera sordida & serpentia. Fa
cit & ad inueteratas affectiones, & cicatri
ces exterit. Cadmiæ vstæ & lotæ drach.
16. cerusæ lotæ drach. 16. amyli drach. duo
decim, stibii vsti drachm. duodecim, spodii
dra

drach.8. plumbi vsti ac loti drach.8. terræ
 Samiæ drach.8. myrrhæ drach.2. opii drac.
 2. tragacanthæ drac.8. excipe aqua pluui-
 ali. Libianum, Ad pustulas, inuisiones, ru-
 pturas concauitates, oculos purulētos, che-
 moseis, staphylomata. Facit & ad circum
 molestantem dolorem, & affectiones, & ci-
 catrices exierit. Cadmiæ vstæ & lotæ
 drac.16. cerusæ lotæ drach.16. stibii vsti &
 loti drac. * 16. plumbi vsti & loti drach.8. * *Alias*
 amyli drach.12. ipodii pompholygis drach. 12.
 8. myrrhæ drach.8. terræ asteris drachm.8.
 tragacanthæ drach.8. opii drach. duas, aqua
 fit pluuialis & ad exceptionem ouorum al-
 bumina decem. Aliud Libianum. Pom-
 pholygis drach. octo, cadmiæ vstæ & lotæ
 drac.16. stibii vsti & loti drac.12. cerusæ lo-
 tæ drach.16. amyli drach.12. terræ Samiæ
 drach.8. plumbi vsti & loti drac.8. myrrhæ
 drac. duas, opii drac. duas, tragacanthæ drac.
 2. excipe aqua pluuiali. Collyrium ex cor-
 nu ceruino. Ad vlcera, pustulas, cicatrices
 exierit. Cornu ceruini vsti & loti drach.
 4. thuris drac.4. plumbi vsti & loti drac.4.
 squamæ æris lotæ drach.2. opii drac. vnam,
 gummi drach. quatuor, excipe aqua pluui-
 ali. Aliud ex cornu ceruino, Neapolitæ. Plū-
 bi vsti & loti drach. sexdecim, cornu cerui
 vsti & loti drac. sexdecim, thuris drac. octo,

acaciæ drachm. octo, spodii cyprii drach. 8.
 amyli drach. quatuor, opii drach. 2. squamæ
 æris drac. 2. croci drac. 8. myrrhæ drach. 4.
 tragacanthæ drach. 1. gummi drach. octo,
 hyoscyami cremore excipito. Viride ad af-
 fectiones. Spodii cyprii drach. 16. amyli
 drach. 16. croci drach. 8. stibii drach. 8. opii
 drach. 4. gummi drac. 4. excipe aqua pluua
 liac vtere cum ouo. Aliud viride Zoili
 ophthalmici. Spodii cyprii drac. 8. croci
 drach. 8. amyli drach. 8. opii drach. 2. stibii
 drach. 8. gummi drac. quatuor. Anagallidis
 succo excipito. Aliud, Alia exemplaria
 ita habent Zoili viride. Cadmiæ vstæ ac
 lotæ & vino Italico extinctæ drachm. octo,
 croci drachm. quatuor, stibii vsti & lacte
 * Aliàs 2. extincti drac. quatuor amyli drac. * vnam,
 gummi drach. duas, excipito succo anagal-
 lidis quæ cæruleum habet florem. Ex
 libris Scribonii Largi Psittacinum inscri-
 ptum. Ad doloris molestias, pustulas, inu-
 siones, cicatrices resolutas, prolapsus, con-
 fusiones, & ubi multus sanguis æstate suf-
 funditur. Commodat etiam ad alias affe-
 ctiones, & præsertim in oculis molli sensu
 præditis, in quibus tenuis lachryma pro-
 fluit. Compositio hoc modo habet. Cad-
 miæ drac. octo, croci drac. octo, stibii drac.
 octo, amyli recentis drachmas octo, opii
 drac.

drach. quatuor, gummi drac. quatuor, aqua pluuiali excipito, vtitor cum ouo. Nau-
 cratitæ pharmacum affectionibus accōmo-
 datum. Cadmiæ drach. 12. croci drac. 12.
 opii drach. sex, squamæ stomomatis purga-
 tæ drach. quinque, squamæ æris drach. sex,
 succi rosarum drach. 16. plumbi vsti & loti
 drach. quinque, myrrhæ drac. 3. nardi drac.
 duas, acaciæ drach. 2. gummi drach. 12. exci-
 pito aqua pluuiali. Antæi viride. Cad-
 miæ drach. 48. myrrhæ drac. 24. croci drac.
 quadraginta octo, opii drac. 24. plumbi vsti
 & loti drach. 8. squamæ æris drach. 6. nardi
 indicæ drac. 6. acaciæ drac. 6. gūmi dra. 24.
 aqua pluuiali excipito. Pharmacum ex Gal-
 bano quo vsus est Nicetes. Ad dolores &
 lippitudines. Cadmiæ drac. 8. spodii cy-
 prii drach. 8. æris vsti & loti drach. 8. opii
 drach. octo, myrrhæ drachm. octo, galbani
 drach. octo, aqua excipito, hoc pharmacum
 ex valdè approbatis est, recipitque amplius
 gummi item drach. octo. Alia exemplaria
 spondium non habent. Aliud, Cadmiæ
 drach. 16. æris vsti & loti drach. 8. myrrhæ
 galbani singulorum drach. 8. opii drach. 8.
 atramenti futorii drach. sex, gummi drach.
 sex, aqua pluuiali excipito. Collyriū dia-
 rodon Nili ex rosis, velut Andreas tradit,
 Ad doloris molestias, fluxum vberē, ac re-
 nuem,

nuem, pustulas, prolapsus. Foliorum rosarum resectis extremitatibus drac. 4. croci, drach. 2. opii obol. 1. nardi indicæ obol. 1. gummi drac. 3. alii drach. 1. habent aqua pluua excipe, ac vtere cum ouo, temperatura dissoluta est. Aliud ex rosis Nili, quo vsus est Gallio ophthalmicus, Rosarū drac. 4. croci drach. 2. acaciæ drach. 1. opii obol. 1. nardi indicæ obol. 1. gummi drach. 3. aqua pluua excipe, vtere cū ouo tēperatura est diluta. Aliud ex rosis horæū appellatū ad easdem affectiones. Rosarū resectis vnguibus drach. 24. croci drachm. 12. amyli drac. 6. balaustii drac. quatuor, opii drac. 4. tragacanthæ drach. 8. hyoscyami foliorum succo excipe. Aliud, Rosarum drach. octo, croci drach. quatuor, æris vsti & loti drac. 1. gummi drach. 1. aqua pluua excipe, ac vtere, cū ouo. Aliud diarodon ex rosis Terentii constans ex pompholyge. Rosarum recētium drac. duodecim, spodii cyprii drac. quatuor, croci drac. 4. opii drac. 4. nardi drac. 4. gummi drac. quatuor, excipito aqua pluuiali. Aliud diarodon. Rosarum recentium drac. duas, croci drac. sex, spodii cyprii drac. duas, amyli drach. duas, acaciæ drachmam vnā, nardi indicæ drachmam vnam, gummi drac. duas, tragacanthę drachmas duas, excipito aqua pluuiali.

Dia

Diarodon Euelpidion diasmyrnum appellatum. Rosarū drach. 100. croci drach. 50. opii drach. 8. myrrhæ sesquidrach. gummi drach. 50. vino odoro excipe, ac vtere cum ouo. Aliud diarhodon. Rosarū drach. 100. croci drach. 50. opii drach. 8. myrrhæ drach. 8. gummi drach. 50. vino odorato excipe ac vtere cum ouo. Ego hoc apparavi pro foliis rosarum, florum earundem drach. 100. iniiciens, atque feliciter successit. Diarhodō ex rosarum 72. drach. Magnum appellatum. Hoc vsus est Lucius præceptor ad doloris molestias, pustulas, inustiones, staphylomata, prolapsus, ad oculos purulentos, ad fluxiones antiquas, inueteratas lippitudines & affectiones agrè cedentes.

Rosarum viridium: resectis vnguibus drach. 72. cadmiæ vstæ ac lotæ drachm. 24. croci drach. 60. opiū drach. tres, stibii drach. tres. Alii drachm. sex, æruginis drach. duas. Alii tres, squamæ aris drach. duas, nardi indicæ drachm. duas, myrrhæ drach. sex. Alii quatuor, gummi drach. 24. excipito aqua pluuiali. Aliud ex drach. 72. Rosarum drach. 72. cadmiæ vstæ & lotæ drach. 24. croci drach. 6. Alii octo, opii drach. 3. stibii drach. 3. myrrhæ drach. 3. squamæ aris, drach. duas, æruginis drach. 2. nardi drachm. 1. aliū duas, gūmi drach. 24. excipe aqua pluuiali,

ac

ac vtere cum lacte. Pharmacū ex violis
albis, accommodatum ad Epiphoras & affe-
ctiones. Acaciæ drach. 48. succi violarū
albarum drach. 48. spodii cyprii drach. 24.
croci drach. 24. myrrhæ drach. quatuor, opii
drach. 4. alii sex, succi hyoscyami drach. 4.

* *Aliās* aris vsti & loti drach. 4. gummi drach. * 4.

40. excipe vino falerno. Collyrium quo vsus
est Florus in Antonia Drusi matre, quæ pa-
rum abfuit vt ab aliis medicis excæcetur.

Acaciæ drach. 48. rosarū siccarū drach. 48.
melilotorum, drach. 48. spodii cyprii dra-

* *Aliās* chmas 24. malorū mandragoræ drach. * 2.

12. croci drach. 24. opii. 3. 6. feminis hyoscyami
acetabula duo, alii. 3. 24. myrrhæ. 3. qua-
tuor, aris vsti & loti drach. quatuor, gūmi
3. 40. vini falerni, aquæ pluuialis, vtriūque
heminas tres. Vinum & aquā misceto, eisq;
rosas, melilotū, semen hyoscyami, mandra-
goræ mala, aut si hæc non adsint, corticem
iniicito, & ad dies tres, aut quinque, mace-
rari finito, deinde expresso liquore ad phar-
maci cōpositionem vtitor, probatissimum
hoc existit. Melinū delicatum, Com-
modum his qui nullam penitus pharmaco-
rum mordacitatē perferre possunt, facit ad
pustulas, prolapsus, fluxum acrē & vberem,
inustionesque & ad recentes affectiones.

Cadmia vsta ac lacte extincta drach. 16.

ceru

cerusæ lotæ drach. 8. croci drach. quatuor,
opii, drach. 1. tragacanthæ drach. 2. aqua plu-
uiali excipito ac vritor cum ouo. Aliud
ad inuisiones, pustulas, prolapsus, dolores.

Cerusæ drach. 24. amyli drach. 12. cadmiæ
lotæ drach. decē, thuris drach. decem, croci
drach. 8. opii drach. 8. gummi drach. decē,
tragacanthæ drach. duas, excipe aqua plu-
uiali & vtere cum ouo. Diarhodō ineul-
pabile. Cadmiæ vstæ & lotæ drach. 24.
cerusæ drach. 12. opii drach. sex, florū rosa-
rum drach. sex, croci drach. sex, lapidis schisti
drach. * 12. gummi drach. decē, excipe aqua * Aliàs, 2.
pluuia, ac vtere ad vlcera sordida cū lacte,
ad munda cum ouo. Aliud, Cadmiæ vstæ
& lotæ drach. 24. cerusæ drach. 12. lapidis
schisti drach. quatuor, florū rosarū drach. 6.
croci drach. 6. opii drach. 6. gummi drach. 6.
excipe aqua pluuiali, ac vtere ad sordida
vlcera cum lacte, ad repurgata cum ouo.

Croceū pædicon, id est puerile inscriptū
ex pompholyge. Ad epiphoras & molestias
doloris, & ad affectiones ex plagis. Spodii
pompholygis drach. 16. croci drach. 16. opii
drach. 16. tragacanthæ drach. octo, excipe
aqua pluuia adhibitis simul albuminibus
ouorū quatuor. Collyrium Gaii ophthal-
mici. Spodii cyprii drach. quatuor, amyli
recentis, drach. 12. croci drach. duas, myrrhæ
dra

drach. vnā, succi mandragoræ drach. vnā,
gūmi drach. 4. excipe aqua pluuiali, ac vt
re cum ouo. Arimeti Lysiponion, hoc est,
soluens dolorem. Atramenti sutorii crudi
drach. 40. pompholygis crudæ drach. 40.
cerusæ drach. 24. opii drac. duas, croci drac.
quatuor. Crocus in aquam cōiicitur ac ma-
ceratur, & ex cremore hoc collyrium appa-
ratur. Quod verò reliquum est ex croco
teritur, reliquisq; ammiscetur, additis item
gūmi drac. 32. Diomedis Lysiponion ad
dolores. Atramenti sutorii crudi drac. 32.
cerusæ drac. 31. spodii pōpholygis drac. 16.
croci drach. 16. thuris drach. octo, myrrhæ
drach. duas, gummi drach. 16. Aqua pluui-
ali excipito, ac vtitor cum ouo: præclarum
est hoc collyrium. Zoili pharmacum fa-
ciens ad lippitudines antiquas, myocepha-
los, staphylomata, & fluxiones antiquas.
Cadmia drach. octo, aris vsti drach. octo,
cerusæ drachm. quatuor, aloës sesquidrach.
foliorum croci, chalcitidis assæ, atramenti
sutorii, opii, lycii, singulorum drach. vnā,
myrrhæ drach. duas, acaciæ drach. 20. spi-
cæ nardi sesquidrach. gummi drach. 20. ca-
storii drach. quatuor, stibii vsti drach. octo,
excipe aqua pluuiali. Asclepiadeū Paccii.
Ad doloris vexationes, fluxum tenuem
& multum, inustionem, pustulas, pellicula-
rum.

rum eminentias, aspretudines, inueteratas affectiones, & eos qui à multis illitionibus læsi sunt, confestim opitulatur. Compositio sic habet, Cadmiæ drach. * duodecim, * Aliàs æris vsti drach. 12. croci drach. 12. squamæ 42. æris drach. 12. myrrhæ drach. quatuor, nardi indicæ drach. quatuor, rosarum siccarum drach. quatuor, opii drach. quatuor, lapidis hæmatitæ drach. quatuor, piperis albi grana 24. gummi drach. 12. vini chii quantum sufficit, vtere cum ouo. Aliud exemplar habet rosarum drach. tres, piperis grana 25.

Pharmacũ accõmodum Nectariũ inscriptum. Cadmiæ drachm. 12. squamæ æris cypriæ lotæ drach. 12. croci drach. 12. opii drach. quatuor, æris vsti & loti drach. 12. myrrhæ drach. quatuor, lapidis hæmatitæ drach. quatuor, rosarũ siccarũ drach. 4. spicæ nardi drach. quatuor, misyos asisi drach. quatuor, cassiæ fistulæ drach. quatuor, piperis albi grana 25. gũmi drach. 12. vino exceptis vtere. Antigonĩ Croceũ Leontariũ, hoc est, leunculus appellatum, propterea quòd Leonis imago ei imprimeretur. Facit ad Epiphoras, molestiã doloris, inueteratas affectiones. Est & aspretudinibus cõmodũ. cicatrices & callos exterit: maximè verò pueris cõmodũ est. Spodii cyprii drach. 48. croci drach. 24. myrrhæ drach. 12. lapidis

y

hæmatitæ drach. 8. opii drach. 12. piperis albi
grana 36. gummi drachm. 80. vino falerno
excipito. Aliud, Spodii cyprii drach. 80.
croci drach. 40. myrrhæ drach. viginti, opii
drach. 20. lapidis hæmatitæ drach. 12. piperis
grana 60. gummi drach. 80. vini falerni
quantū sufficit. Ex libris Scribonii Lar-
gi, Asclepios Machaonis. Ad veteres affe-
ctiones, & oculos suppuratos. Spodii pom-
pholygis drach. 32. æris vsti drach. 32. croci
ficuli drach. 16. myrrhæ drach. 6. lapidis hæ-
matitæ drach. 10. nardi indicæ drach. 6. opii
drach. 6. piperis grana 40. gummi drach. 40.
vino chio excipito. In libro de Athenippis
Asclepiis, opii drach. octo, habentur. Eue-
meri ad dolores & affectiones. Aeris vsti
& loti drach. 32. spodii pōpholygis drach. 16.
croci drach. 16. myrrhæ drach. octo, lapidis
hæmatitæ vsti & loti drach. 8. spicæ nardi
drach. quatuor, misyos vsti drach. * quatuor,
* Alias octo. opii torrefacti drach. quatuor, gūmi drach.
sexdecim, vini Italici quod satis est. Dia-
fmyrnum odorum Synerotis, pharmacum
accōmodatum ad inueteratas affectiones.
Facit & ad Rhœadas, hoc est, angulos an-
trosos, & Aegilopas. Cadmiæ lotæ drach.
vigintiocto, lapidis hæmatitæ vsti & loti
drach. vigintiquinque spodii cyprii drach.
viginti quatuor, myrrhæ drachm. 48. croci
dra

drach. quatuor opii hispani drac. octo, pipe-
ris albi grana 30. gummi drac. sex, vino Ita-
lico excipito. Vtitor cum ouo in recētibz
affectionibus. Téperatura aquosa est. Ali-
qui croci drac. 12. iniiciūt. Hæmatitium
Synerotis aspretudinibus cōmodum. Fa-
cit ad veteres affectiones, ad ficosā, & ad
omnem extuberantiā si cum odore Syne-
rotis cōmisceatur. Aeris vsti & loti drach.
viginti quatuor, lapidis hæmatitæ drach.
* vnā, croci drach. 4. opii drach. 4. gummi * Aliās. 4.
drach. 12. Excipe aceto acerrimo. Aliud,
Aeris vsti drach. 48. croci drach. 24. opii
drach. 4. gummi Thebaici drach. 24. pom-
pholygis drach. 18. myrrhæ drach. 18. salis
ammoniaci drac. duodecim, lapidis hæma-
titæ drach. * vnā, æruginis drac. quatuor; * Vet. cod.
vino excipito. Hieracis ad aspretudines, *habent*
Misyos vsti drach. octo, croci drac. octo, *drach. 4.*
opii drach. 8. lapidis hæmatitæ loti drac. 8.
æris vsti & loti drach. 12. myrrhæ drach. 12.
gummi drach. 12. * vino acerrimo excipito. * ὀξύς & πικρὸς
Apollonii Phoenix collyrium Hieracium *μυτὰ τὸ*
ad aspretudines. Per hoc catulo egregiè id est, *ace-*
medicatus est. Facit & ad palpebrarum de- *to acerr-*
fluia & inueteratas affectiones. Lapidis *no habet*
hæmatitæ vsti & loti drach. 32. æris vsti & *hic omnes*
loti drach. 16. æruginis rasilis drach. 19. opii *cod. gra.*
drachm. octo. Alii sex, cadmiæ botryitidis

drach. 4. chalcitidis assatæ drach. 4. gummi
drach. 16. Excipe aqua pluuiali. Phoenix
Apollonii aliter, velut Arius Asclepiadeus
inscripsit, in libro quo propria pharmaca
coaceruauit. Lapidis hæmatitæ drach. 24.
lapidis schisti vsti & loti drach. 24. cadmiæ
drach. 12. æris vsti drach. 12. opii drach. octo,
chalcitidis assatæ drach. 4. alii drach. 8. In
alio exemplari etiā æruginis drach. 12. gum
mi drach. 16. excipe aqua pluuiali. Aliud
collyrium ad aspretudines, Chalcitidis
vstæ drach. 12. misyos vsti & loti drach. 8.
croci, opii, vtriusque drach. sex, lapidis hæ
matitæ drach. octo, gummi drach. 12. acer
rimo aceto excipito. Collyriū ad aspre
tudes sphæriū hoc est orbiculare appella
tum, cicatrices & callos exterit: Facit & ad
inueteratas affectiones. Aeris vsti & loti
drach. 24. spodii pompholygis drach. 16. myr
rhæ drach. 16. salis ammoniaci drach. 12. la
pidis hæmatitæ drach. 4. opii drach. 4. pipe
ris grana 12. alii 16. gūmi drach. 8. vino exci
pito ac vtitor. Eumeri cicatrices & cal
los exterit, facit & ad inueteratas affeçtio
nes. Cadmiæ drach. 60. croci drach. 50. spi
cæ nardi drach. 20. squamæ æris torrefactæ
& lotæ drachm. 50. myrrhæ drach. 50. opii
drach. 30. æris vsti, drach. 60. misyos crudi
drach. 50. gūmi drach. 70. excipe vino chio.
Aliud

Aliud Pyrami, Cicatrices & callos exte-
rens, deprimit omnē extuberantiā. Cad-
miæ cypriæ drach. quadraginta, lapidis hæ-
matitæ drach. 40. æris vsti drach. 40. mi-
syos vsti drach. viginti, croci drach. vigin-
ti, ammoniaci thymiamatis drac. 20. squa-
mæ æris vstæ & lotæ drach. 20. opii drach.
viginti, gummi lib. 1. cum acerrimo aceto
vtere. Aliud Eueimeri, ad easdem affectio-
nes. Aeris vsti & loti drac. 24. spodii pom-
pholygis drach. 12. myrrhæ drach. 8. salis
ammoniaci drac. 12. lapidis hæmatitæ drac.
quatuor, piperis drach. 12. gummi drach. 8.
vini chii quod satis est. Lynceus, ad affe-
ctiones callosas, exacuit visum, cicatrices &
callos exterit. Cadmiæ drac. 12. æris vsti &
loti drach. 12. ammoniaci thymiamatis dra-
chmas 12. myrrhæ drach. 16. lapidis hæma-
titæ drach. 6. opii drach. 6. aloës drach. 4.
fellis taurini drac. 4. galbani drach. 4. æru-
ginis drach. 1. opopanacis drach. 4. salis am-
moniaci drach. 2. gummi drach. 6. alii duas,
aqua pluuiali excipito. Collyriū Rinema,
hoc est, lima inscriptū. Facit ad callosas affe-
ctiones, cicatrices exterit, facit & ad suffu-
siones. Cadmiæ drac. 48. ammoniaci thy-
miamatis drach. 48. æris vsti, drach. 48. opii
drach. 15. æruginis cyprii drach. 16. aloës
drach. 16. myrrhæ drach. 16. lapidis hæma-

titæ, drach. 24. galbani drach. 16. opopana-
cis drach. 18. fellis taurini drach. 8. salis am-
moniaci drach. quatuor, gummi drach. 60.
aqua pluuiali excipe. Temperatura aquosa
est. Collyrium Harmatium, id est, currus
inscriptum. Quo usus est Ptolemæus rex ex-
ter sua facultate præditum. Exterit cicatri-
ces, acuit visum, est & aspretudinibus com-
modum. Aeris vsti & loti drach. 8. ammo-
niaci thymiamatis drach. 8. lapidis hæma-
titæ drach. 8. corticis thuris drach. 8. gumi
drach. 8. excipe aqua pluuiali, ac vtere cum
aqua. Alia exemplaria etiã æruginis drach. 2.
habent. Collyrium oxydercicum, hoc est
visum exacuens, ex hæmatitæ, cicatrices &
callos exterit. Ammoniaci thymiamatis
drach. 24. æris vsti & loti drach. 24. lapidis
hæmatitæ drachmas 24. gummi drach. 24.
æruginis drach. octo, excipe aqua pluuiali.

Collyrium Artemonium inscriptum, quo
Bassus sodalis meus usus est. Facit ad flu-
xiones antiquas, & aspretudines palpebra-
rum, & ad humore putrescentes & erosos
angulos, ad oculos humectos, & membra-
narum extuberantias, cicatrices, & callos ex-
terit. Et quod maximum in eo est, post illi-
tiones, oculos imperturbatos conseruat.

Stibii drach. quatuor, æris vsti drach. 2.
cerusæ drach. duas, croci drach. 1. myrrhæ
drach.

drach. i. corticis thuris drach. i. æruginis
 vermiculatæ drach. i. gallarum omphacina-
 rum drach. vnam, piperis albi drach. vnam,
 gummi drach. * vnam, vino excipe, vtere * *Aliàs. 4.*
 cum aqua. Aliud pharmacum accommo-
 datum. Cadmiæ drach. 8. stibii. drach. 8.
 cerusæ drach. octo, æris vsti drach. 4. cor-
 ticis thuris drach. 2. croci drach. 2. myrrhæ
 drach. duas, æruginis vermiculatæ drach. 2.
 gallarum omphacinarum drach. 2. piperis
 albi drachmā vnam gummi drachmas. 4.
 excipe vino. Collyrium Indicum Aëria-
 num inscriptum, præ occupat ac præripit
 omnes lippitudines. Facit ad obtusum
 visum & scabras affectiones, ad erosos
 angulos, cicatrices exterit. Et quod maxi-
 mum est, post illitionem oculos impertur-
 batos conseruat. Cerusæ Rhodiacæ dra-
 chmas. 48. cadmiæ cypriæ drach. 24. atra-
 menti indici drac. octo, opii drach. octo, pi-
 peris albi drach. octo, aut. 6. opobalsami
 drach. octo, aut. 6. gummi drach. 16. cinamo-
 mi drach. 2. Alii. 12. drach. aqua pluuiā ex-
 cipito. Hermophilicollyrium Thalasse-
 rum, accommodatum ad suffusiones, & ad
 omnem hebetudinem visus, facit & ad inci-
 pientem suffusionem. Estq; odoratissimum
 pharmacū. Cadmiæ drac. 16. atramēti indici
 drac. 16. piperis albi drac. 8. æruginis drac. 4.

succi Medici drach. 4. opobalsami drach. 4.
gummi drach. 12. aqua excipe, vtere cum
aqua. Temperatura diuersa est iuxta affe-
ctiones. Pomponii Bassi. Facit ad inci-
pientem suffusionem. Cadmiæ drach. 27.
atramenti indici drach. 16. piperis albi dra-

*Vet. cod. chmas. 12. *succi Cyrenaici drac. 5. opobal-
sami drach. 6. spicæ nardi drach. 6. sagape-
etiam pi- ni drach. 5. opopanacis drach. 5. opii drac. 4.
peris longi Euphorbii drach. 1. cinamomi drach. vnam
drach. 13. gummi drachmas. 30. fœniculi succo exci-

pito. Indicum basilicon, id est, regium in-
scriptum. Facit ad incipientem suffusio-
nem, & omnem visus habetudinem, cic-
trices exterit. Cadmiæ vstæ & lotæ li-
bram vnam & trientem, atramenti indici
drach. 6. cerusæ trientem piperis albi se-
xuncem, fel hyænæ integrum quanticunq;
ponderis, fel scarorum decem, fel perdicum
quatuor, succi papaueris vnciam. 1. opobal-
sami sextantem, opopanacis sextantem, sa-
gapeni sextantem, gummi libram vnam, ex-
cipe succo fœniculi aut herbæ Heracleæ
appellatæ. Enstaeton, id est instillatitium
Pacci vt Themison. Cadmiæ drach. 64.
misysos drach. 32. atramenti sutorii dra-
chmas. 32. stibii drach. 32. piperis albi dra-
chmas. 32. opii drach. 16. æruginis drach. 16.
opobalsami drach. 16. gummi drac. 64. ex-

ci

cipe aqua pluuiali. Collyrium Chelido-
nium inscriptum. Cadmiæ drach. 48. sti-
bii drach. 12. misyos drach. 8. * piperis dra- * Vet. cod.
chmas. 36. atramenti sutorii drach. 6. opii habent pi
drach. 5. opobalsami drach. 4. gummi dra- peris albi
chmas. 24. excipe aqua pluuiali. Hiera- drach. 6.
cium, Ad obtusum visum, & scabras affectio non autē.
nes. Cerusæ drach. 16. cadmiæ drach. 8. 36. et post
* Aeruginis drach. 2. piperis albi drach. 2. opium ad
omphacii drach. 2. Iopii drach. 2. gummi dunt æru
drach. 6. excipe aqua pluuiali ac vtere cum ginis dra-
aqua. Aliud, Cicatrices & callos exte- chmas 6.
rit. Cadmiæ drach. 16. cerusæ drach. 8. pi. * Hæc ex
peris albi drach. 4. æruginis drach. 2. opo- vet. cod.
balsami drach. 2. omphacii drach. 2. gummi.
drach. 4. excipe aqua pluuiali. Collyriū
fuluum panchrestum, ab omnimoda vtili-
tate inscriptum, accommodatum ad sca-
bros & circunrosos angulos, ac intensos
pruritus, & palpebras ficosas. Cadmiæ
drach. 80. chalcitidis vstæ drach. 40. piperis
albi drac. 40. gummi drac. 40. aqua pluui-
ali excipito. In alio exemplari æqualis o-
mnium apponderatio habetur. Aliud,
Cadmiæ drac. octuaginta, chalcitidis vstæ
drac. quadraginta, piperis albi drach. qua-
draginta, croci drach. 12. myrrhæ drac. 12.
gummi drac. 40. aquæ pluuialis quòd satis
est. Tryphonis orbiculare Sphæricum

y s

dictum. Cadmiæ drach. 48. squamæ æris
drach. 32. æris vsti & loti drac. 32. piperis
albi drac. 32. opii drac. 8. myrrhæ drac. 8.
opobalsami drac. 4. gummi drac. 32. exci-
pe aqua pluuiali. Collyrium Galli oxy-
dercicum. Cadmiæ. drach. 48. chalciti-
dis vstæ drach. 24. piperis albi drac. 6. squa-
mæ æris drac. 8. opii drac. 6. omphacii dra-
chmas. 4. myrrhæ drac. duas, opobalsami
drac. 4. gummi drac. duodecim, piperis albi
grana decem, aquæ pluuialis quantum suf-
ficit. Collyrium aromaticum appella-
tum. Aeris vsti & loti drac. 16. æruginis
drac. 4. myrrhæ drac. 4. opii drac. 4. piperis
albi drac. quatuor, nardi drac. duas, croci
drac. 4. opobalsami drac. * 4. gummi dra-
chmas. 4. aqua pluuiali excipito. Hera-
clidæ aromaticum croceum ex hæmatite.

* Aliàs. 2.

Aeris vsti & loti drac. 48. cadmiæ dra-
chmas, 24. croci drach. 24. lapidis hæmati-
te drac. 24. opii drac. duodecim, * piperis
albi drac. duodecim, gummi drach. 24. vi-
no falerno excipito. Croceum Asclepium
oxydercicum. Aeris vsti drac. 48. cro-
ci drac. duodecim, omphacii drac. quatuor,
opii drac. duodecim, myrrhæ drac. 2. opo-
balsami drac. 4. gummi drac. duodecim pi-
peris albi grana decem, aquæ pluuialis quā-
tum satis est. Collyrium Isochryson, hoc

est

* Aliàs ad
dit hic
myrrhæ
drach. 12.

est auro compar, ad corrosos angulos, scabras affectiones, inueteratas lippitudines, aspretudines, ficosas eminentias, cicatrices & callos exterit. Cadmiæ drac. 6. lapidis hæmatitæ drac. 16. myrrhæ drac. 16. * opii * *Sic vet. cod.* drac. 16. J croci drac. 24. piperis longi drachmas. 12. piperis albi drac. 24. gummi drachmas. 64. vini Italici quantū satis est. Collyrium Cinnabariū, celebris ophthalmici Stoli Britannici. Ad corrosos angulos, lippitudines ad malum habitū perductas, intensos pruritus, & inueteratas affectiones. Psorici drac. 24. cadmiæ drac. 24. croci drac. 16. piperis drach. 16. cinnabaris drach. 16. opii drac. 12. gummi drac. 24. aquæ pluuiæ quod satis est. Aliud, Psorici drach. 24. piperis drach. 24. cadmiæ drach. 24. croci drachmas. 24. sandarachæ drach. octo, opii drach. octo, cinnabaris drach. octo, gummi drach. octo, aqua pluuiali excipito. Melinum atarachum à perturbationibus amolliendis appellatum. Facit ad omnem oculorum hebetudinem, & ad affectiones antiquas, cicatrices & callos exterit. Cadmiæ drach. 24. omphacii drac. 12. salis ammoniaci drach. 4. ammoniaci thymiamatis drach. duodecim, opii drach. octo, gummi drach. 24. cerusæ drachmas. 24. croci drachmas. 16. piperis albi drachmas. 24. aquæ

aquæ pluuiialis quantum sufficit. Lucii præceptoris Melinum, ad scabros & corrosos angulos, intensos pruritus, oculos humectos, ad omnem visus hebetudinem, cicatrices & callos ex terit. Cerusæ drac. 24. croci drac. 24. ammoniaci thymiamatis drachmas. 6. salis ammoniaci drac. 6. nardi indicæ drac. 6. opii drac. 6. myrrhæ drach. 6. omphacii drac. 6. gummi drac. 24. excipe aqua pluuiæ. Aliud collyrium Proteus cui nullum conferri potest. Facit ad incipientem suffusionem, & ad omnem visus obtusitatē, cicatrices & callos ex terit. Cadmiæ drach. * 20. chalcitidis crudæ drach. 40. cerusæ drach. 40. piperis albi drachmas 30. succi cyrenaici drac. 20. croci drach. 16. opij drac. 12. sagapeni drach. 12. lachrymæ oleæ drac. 12. auripigmenti drac. 8. myrrhæ drachmas. 12. gummi drach. 20. opopanax drac. 20. opobalsami drac. 12. Apparato cum aqua pluuiali ac utitur cum aqua. Hygieni collyrium aureum. Ad corrosos angulos & scabras affectiones. Sandarachæ drac. 24. piperis albi grana. 12. myrrhæ drachmas. 6. croci. drac. 6. gummi drac. 12. cum aqua pluuiali apparato. Aliter aureum collyrium. Sandarachæ drac. 16. croci drac. 16. piperis drac. 16. myrrhæ drac. 4. gummi drac. 12. vsus ostensus est. Aliter,
San

* Aliàs
40.


Sandarachæ drac. 24. piperis albi drac. 12.
 myrrhæ drac. 6. croci drac. 6. gummi dra-
 chmas. 12. aqua pluuiali excipito. Eueme-
 ripforicum. Facit ad corrosos angulos, &
 scabras cicatrices ac callos exterit. Facit &
 ad inueteratas affectiones, & lippitudines
 ad malum habitum perductas, itemque ad
 aspretudines. Psorici drac. 24. croci dra-
 chmas. 12. opii, cerusæ, vtriusque drac. 4. pi-
 peris albi drac. 4. omphacii drac. 4. gummi
 drac. 4. vino falerno excipito. Basilidion,
 hoc est regineum psoricum. Psorici dra-
 chmas. 48. croci drac. 24. opii drac. 8. floris
 lapidis asii drach. 8. cerusæ drach. 8. pipe-
 ris drac. 6. opobalsami drach. 4. omphacii
 drac. 4. gummi drac. 16. vino falerno exci-
 pe. Panchrestum Athenipion. Psori-
 ci drac. 64. croci drac. 16. chalcitidis vstæ
 drac. 16. sandarachæ drac. 20. myrrhæ dra-
 chmas. 8. piperis albi drac. 16. casciæ fistulæ
 drac. 8. foliorum malabathri drac. 4. opii
 drac. * 16. omphacii drac. 4. misyos vsti dra-
 chmas. 2. gummi drac. 24. excipe aqua plu-
 uiali. Ptolemæi familiaris pharmacum.
 accommodatum ad scabros & corrosos
 angulos, intensos pruritus, defluuia palpe-
 brarum, hebetem visum. Psorici drac. 40.
 sandarachæ drac. 30. chalcitidis vstæ dra-
 chmas. 24. croci drac. 24. myrrhæ drac. 12.
 opii

* Aliàs. ●

14. * *Aliàs.* drac. * 4. piperis albi drach. 7. omphacii drachmas. 6. misyos vsti drac. 3. foliorum malabathri drac. 1. gummi drac. 36. aquæ pluuiæ quantum sufficit. Collyrium Malabathri oxydercicum. facit ad corrosos angulos. Stibii drach. 24. acaciæ drac. 24. piperis albi drac. 24. nardi indicæ drac. 12. opii drac. 6. croci drac. 6. omphacii drac. 6. myrrhæ drac. 6. gummi drac. 36. aqua pluuiali excipito. Aliud, Stibii vsti & loti drac. 45. acaciæ drac. 46. nardi celticæ drachm. 6. myrrhæ drac. 8. croci drac. 8. omphacii drac. 6. opii drac. 6. cadmiæ drac. 36. gummi drach. 32. aquæ pluuialis quod satis est.

*Remedia ad affectos oculos ab Archigene
in primo pharmacorum secundum
genus conscripta.*

CAPVT VIII.



IN fluxionibus circa oculos in principio conuenit cibi ac potus parcitas, aqua potus, & maximè omnium rei Venereæ abstinencia. Alius ipsa subducatur, & facies assiduè primum multa frigida, deinde etiam aceto aminixto proluatur. Quidam atramentum sutorium aqua dilutum proluendum exhibent. Fugiant odores acres, & pulueres, fu-

numa

mumque, & tum solis tum lucernarū splen-
 dorem. ad noctem lanas puras ex vino, aut
 sordidas ex aqua frigida imponant, maneque
 velut dictum est se proluant. Quod si au-
 gescat fluxio, accedatque dolor, venæ se-
 ctio congrua est, & perfecta cibi abstin-
 tia ac sitis, nisi exurantur, & malum inde
 aurescat, Conuenit & solutio ventris va-
 lida, siue per purgatorium conueniens me-
 dicamentum, siue per clysteres robustos,
 Post hæc verò circa frontem imposita assi-
 duè, Vitis folia viridia auxiliantur. Aut
 myrti, aut lentisci, aut rubi succus, aut bras-
 sicæ aut vitis folia cū flore farinæ polentæ.
 Aut cupressus, sampsuchus, ocymū, lisy-
 mbrium, ænanthæ, crocus hortensis, itemque
 agrestis, portulaca, mali punici sativi flores,
 cytini appellati, vitex, folia recentia mali
 cotoneæ, singula cum vino & floræ farinæ
 polentæ. Super ipsos verò oculos lana pura
 oui candido madefacta imponatur, aut oui
 assi luteum. Aut melilotum in passio coctū.
 Aut asphodeli radix cum vino & flore fari-
 næ polentæ. Aut iris contusa cum vino &
 flore farinæ polentæ. Aut mali punici suc-
 cus cum flore farinæ polentæ. Aut ipsum
 malum in vino maris experte coctum.
 Aut iuniperi baccæ tritæ cum vino & flo-
 re farinæ polentæ fronti imponantur,

aut etiam super ipsos oculos adhibeantur. Ad hæc verò eryngii & fœniculi sylvestris radix trita ex aqua, & cicutæ semen eodem modo apparatus, opitulantur. Caseus item mollis & nuper salsus cum apii foliis cataplasmatibus modo impositus. Aut papaver sylvestre passo coctum ac tritum impositum. Similiter & melilotum passo coctum, modico croco & papaveris succo ammixtis. Panis item ex vino, rosaceo ammixto mirabiliter auxiliatur. Aut tribulum recentem per se imposito: imo & polenta ammixta egregiè opitulatur. Et ut summatim dicam omnia ex adstringentium genere & repulsoria in principiis profunt, velut est cicuta, & psyllium, apium, solanum, lentes palustres, serpyllum, samfucus, folia vitis, coriandrum, portulaca, semperuium, folia papaveris, urtica, Quæ singula ex vino trita imponantur: psyllium verò ex aqua, eodemque modo palustris lenticula.

Ad fluxionem calidam.

BRassicam tritam cum polentæ flore ex aqua imposito. Aut ocymi folia eodem modo. Aut rutæ folia cum adipe anserino, aut samfuci folia. Aut halicacabum trita. Cæterum largum fluxum sistunt papaveris capita, & hyoscyamus cum polentæ flore ex vino. Oportet autem fomentum prius adhi

adhibere, atq; ita imponere. Postquàm verò status & vigor præterierit, & quum non amplius opportunum est adstringētibus vti, non incommodum fuerit, tum oculorum, tum capitis fomenta adhibere. Magnificè verò auxiliatur, inflammationesq; soluit, & si qua distentio adsit eam laxat, linteolum molle butyro madefactum ac oculis superpositum.

De chemosi, hoc est vtriusque palpebræ distortionē ex inflammatione oborta.

IN quibus verò chemosis fortis cōtingit, Oui luteū cum muscæ carne terito, atq; vbi ad cerati formam deducta fuerint, linteolo excepta impone, confestim sedant.

Oblitiones oculorum.

PAnis purus vsus acacia & hederæ cum aqua permixtus. Verum ad doloris vexationes rosas virides aut aridas passo maceratas terito, & ammixto oui alesi vitello, ac croco sufficienti, cum passo vtitor. Aut crudam hordeaceam vel triticeam farinam passo coctā adhibeto. Si verò maior dolor fuerit papaueris folia recentia ammisceto, aut corticem papaueris capitum. Aut hyoscyami folia drach. quatuor pondere cum oui vitello. Aut sisymbrium aqua coctū terito sufficienti affuso vino, & imposito.

Aut papaueris albi capita passo cocta ac

trita imposito. Aut opii recentis coma
itemq; pulegii recentis similiter vtor. Aut
peponis aut cucumeris carne. Aut oui assi
luteum cum modico croco ac vino tritum
imposito. Cæterùm dolentes ex inflam-
matione oculos cum panace & pulegio vi-
no subactis integito. Præclarè facit & pi-
ni cortex & polëta cum vino. Aut hyoscia-
mi folia & opiũ trita imposito. Aut papa-
ueris cortices terito, rosisque ac meliloto
myrrhaque ammixtis, albumine oui dilui-
to, atq; ita imposito. Aut aloë ac opiũ cū
aqua diluta linteoloq; excepta imposito,
vitando ne quid in oculum præterlabatur.
Cæterùm in his qui dolore vexantur crocũ
bonũ cum lacte instillato. Verùm ad vehe-
mentes doloris molestias, Coriãdri succus
cum muliebri lacte * oculis instillatus, Si-
militerq; papaueris succus torrefactus, au-
xiliatur. Folia item platani trita cum farina
polentæ flore oculis superne imposita. Ca-
taplasmata verò in fluxionibus cõueniunt,
Cupressus viridis cum vino, aut paliuri fo-
lia, * Aut portulaca trita cū adipe anserino
& croco. Aut iris sicca cum melle. Aut mi-
cas thuris & myrrham cum vino cãdido la-
na excepta fronti imposito. Aut apiũ cū
polëta, aut seselis flores vino maceratos im-
posito. Aut papaueris folia recëtia adglu-
tin

* Angulis
oculorum
dicit vet.
cod.

* Aut spi-
nae folia
addit hic
vet.cod.

tinato. Quod si vigiliæ instent, Mandragoræ radicem & succum, papaueris folia, & polentam æquis partibus in massam cogito, eamq; odorandam exhibeto, & obdormiscent. Porro in magnis fluxionibus pullegii recentis semen, & maximè succum, cū aceto ad malagmatis formam redigito, ac sincipiti imposito, lanis superne additis, ac leni vinculo constrictis, Aliqui etiam papauer recens ei ammiscēt, aut opii minimū quid, aut rosas, aut melilotum coctū. Aut amylo ex vino cū oui candido oculos ipsos integito. Præclarè faciunt ad fluxionem vberē, tenuē, ac vetustā, itēq; vlcera, pompholygis drach. 4. opii torrefacti *obolos. 3. gummi drach. 4. aqua pluuiali aut fontana excepta. Agglutinatoriū ad fluxionem.

similaginem & mannæ thuris dimidium eius, cum oui albumine ad emplastri formā redigito, & in principio fronti in linteolo imposito. Aut oui tenuis vitellum cum thure. Aut cochleam cum testa sua & oui candido ad strigmentitiam formam redactam in splenio à tempore altero ad alterū extendendo imposito. Sua sponte decedit, vbi restiterit fluxus. Aut Moschi malagma, aut barbarum emplastrum, aut viride, aut aliquod aliud eorum quæ aceto constant, splenio inditum fronti imposito.

*Vet. cod.
habet
drach. 3.
et obolos
tres.

Ad haemalopas & hypospagmata, id est cruentatos oculos, & sugillatos.

AD plagas oculis illatas, & ad oborientes ex eis cruentas suffusiones, statim in principio tum ad inflammationem, tum ad dolorem compescendum, facit columbinus sanguis instillatus, & praesertim is qui ex teneris pennis exprimitur. Candidum etiam oui eodem modo in oculum instillatum, atque amplius pura lana exceptum & superne impositum. Prodest etiam oui alsi luteum cum vino impositum, aut melilotum coctum cum vino eodem modo. Insuper & folia rosarum ac flos per se & cum vino trita, itemque cum flore farinae polentae. Aut brassicae folia in cataplasmate. Vbi vero diutius cruentatio perstiterit, cum thure & bitumine aequis portionibus acceptis ac mixtis oculum suffuto. Aut hyssopi comam tritam lineo panniculo illigatam in feruentem aquam demittito, oculoque admoueto. Sequitur enim cruor, adeo ut ex linteolo compresso exprimi queat. Aut nitrum & terram Aethiopicam, ac myrrham pari pondere cum aqua illinito. Aut foliorum oleae viridum succum sublinito. Aut ammiu & hyssopum cum lacte bubulo terito, agitato, ac sublinito. Aut semen lini tritum cum butyro per linteolum exprimito ac sublinito. Caput vero frigida perfundito.

C^u

Curatio tumorum.

AD tumores ex plaga circa oculos obortos, valde cōuenit fomētū per mollem spongiā assiduē factū, Ita vt spongia noua postea aceto diluto madefacta imponatur. Cōuenit insuper sinapi vetustum ex aqua tritū, assiduē circumpositū & ablatū. Similiter & nasturtium, si post eorum ablationem loci assiduē calida aqua foueantur.

Ad oculos scabros.

AD oculos propter solem aut omnino puluerem scabros atq; aridos factos, aqua multa æstate quidem frigida, hyeme verò calida affusa commodat. Conuenit & spongiæ calida, aut lentis decocto, imbutæ fomentum. Ipsis verò oculorum angulis rubi, lentisci, myrti, rosarum succum, vnumquemque per se cum aqua adhibeto.

Aut rosas aridas tritas cum vino, aut earum florem. Aut vinum maris expers ac oleum vetus maximè vbi dormire voluerint admoueto. Conducit præterea his vt à salis, acribus, ampliusque acidis omnibus abstineant. Porro ad inueteratas & callosas circa palpebras affectiones, amurcam coctā cum oleo tritam illinito.

Ad eos qui crassas, callosas, ac rubras, glabrasq; & pilis nudatas genas habent, pilos grecis dictos.

IN his qui crassas callosas, ac rubras, & glabras palpebras siue genas habet, quæ pilis exutæ sunt, egregiè facit, ac pilos producit hoc medicamentum. Acaciæ drachm. duas, atramenti librarîi aridi, aut si fieri potest memphitici drach. quinque succi porri heminas quatuor. Vini maris expertis heminas quatuor. Coquito donec strigmentitiâ formam induant, & repositis in pyxide, vti-
tor. Aut muscerdas & caprarû stercora vsta pari mensura, cineris calami græci duplum, cum melle artico illinito. Hoc verò etiam palpebrarum defluuia emendat. Aeruginis tritæ partem vnam, ammoniaci thymiamatis tantundem, trita adhibeto, facit idem & egregiè ad scabros oculos. Aut cadmiam tritam melle subactam in ollula vrito ac asfato, deinde æris vsti tantundem ammisce-
to, ac tritis vti-
tor.

*Ad pilos inutiles & pungentes in palpebris
enascetes, Trichiasin hoc malum
græci appellant.*

Pilos inutiliter in palpebris supernascentes euellito, & sanguinem cimicum illinito, & nō enascetur. Papias Laodicensis Autolyçi medicus multa in his tentabat, euellebat primùm ipsos pilos, deinde locum diligenter cum dropace irritabat, & cū chamaeleone albo trito viridium ranarum san-
gui

guine permixto. (Sunt autem ranæ quæ in arundinibus degunt) illinebat. Neq; enim postea enascitur. Potes & euulsis prius pilis cedriam cum Tellinarum cinere mixtam ac tritam illinere. Ad eandẽ quoque rẽ aui- culæ Cinedi appellatæ felle vtitor. Aut pa- gri marini piscis itidẽ felle. Aut ricini à cane fœmina adẽpti sanguine. Egregiè facit hoc, Fellis & sanguinis herinacei terrestris pa- res partes, fellis chamaeleonis tantundem, castorii parum. Ad formam squamularum piscium reducito, & pilis radicitus euulsis vtitor, squamulam vnã oris saliuã matuti- na dilutam illinendo, locumq; ad dimidium horæ obligando. Dolitãt equidem ex me- dicamẽti huius vsu, sed pili amplius nõ ena- scuntur. Aut felle hyænæ fœminæ mox ab euulsione illinito. Aut tellinarũ tenuissi- mum puluerẽ oblinito. Aut euulsis pilis, ci- cutæ folium, & cedriam æqualibus partibus cū vespertilionis sanguine illine, illitumq; donec exarescat tene. Si enim hoc oculum contingat, eius humorem corrumpit. Aut ab euulsione, capræ fel cū brassicæ succo illini- to. Aut capni siue fumaricæ herbæ succo pal- pebræ alam siue summitatẽ illinito: deinde pilos euellito rursusq; illinito. Testatus est & Hermias spumam aquæ post dropacum adhibitionem illitam summè conducere.

De staphylomatis siue vuis, & albuginibus.

Staphylomata tolles cantharidū succo illito. Albugines verò citò sanat nitrū cum oleo veteri diligenter tritum & illitū. Aut lacertæ stercus illine & tolles. Aut Nycticoracis ouum illine, & tinges ipsas. Aut croci, piperis, æquales partes cū felis felle in collyria formato ac illinito. Aut sepia testam tritam melle subigito ac vrito, & leuigato postea pharmaco hoc sublinito.

Curatio obfuscationis visus & suffusionis.

Obfuscationē omnē aut etiā incipientē suffusionē p̄sanat, * omne fel cū mar-
 * *γυνὸς.* rubii succo ac melle Attico. Aut myrrhæ &
id est vul turis fel piperis partes æquales cū melle. Aut solanū
turis fel nigrū illine. facit & Cyprus in ærea pyxide
habet hīc reposita. Aut fœniculi succū, & fel taurinū
cod. vet. liquidū paribus partibus, mellis attici duplū illinito. Aut croci & piperis æquas portiones felle taurino excipito, atq; in collyria redigito, ac illinito. Aut populi nigrae succum cum duplo mellis Attici illinito.

De humorum suffusionibus.

Fellis testudinis marinae partem vnam, mellis Attici quadruplum illinito. Fel ipsum etiam per se sufficit cum aqua illitū.

Ad Pterygia.

In pterygiis oculorū atramenti sutorii, salis ammoniaci, æquales partes, gummi
 di

dimidium, cū aceto in collyria formato ac illinito. Aut populi nigræ succum, cum duplo mellis attriti mixtum ac tritum illinito.

*Ad glaucos oculos & Nyctalopas,
hoc est lusciosos.*

Solani succus instillatus glaucos oculos denigrat. In lusciosis verò hepar hircinū assato, ipsumq; inter assandū destillantem cruorē illinito, Atq; id quidē de illinēdo dictū sit, ipsum verò hepar edendū præbeto. Auxiliatur & colūbinus sanguis illitus, & fel capræ. Aut hepar caprinū coquito, eosq; obuelatos in ollam intendere iubeto, quo elatū inde vaporem oculis susceptū ēt. Ipsum verò hepar assiduē edendum dato, Ex hoc enim cito auxilium sentient. Aut elaterii obolum, seminis portulacæ drach. vnā, cum melle inunge. Aut sterco Asini recēs ex succato ac illinito. Vescatur æger beta, vulturis iecore assato, eiusq; felle illinatur.

Ad Crithas instar hordei oblongos circa palpebrarum pilos abscessus, qui item posthiæ Græcis appellantur.

Abscessus circa palpebrarum cilia crithas ab hordei similitudine Græcis appellatas, ceræ albæ fomento discuties. Aut muscæ caput auellito, ac reliquo corpore abscessum ipsum confricato.

FINIS LIBRI QVARTI.

CAPITA QVIN-
TI LIBRI.

*De sugillatione sub oculis, hypopion Graci
dicunt.* Cap. I.

De Aegylope. Cap. II.

De Varis. Cap. III.

De ficosis tumoribus. Cap. IIII.

De lichenosis in mento tumoribus. Cap. V.

De menti eruptionibus. Cap. VI.

De furunculis. Cap. VII.

De dentium affectionibus. Cap. VIII.

De gingivarum curatione. Cap. IX.

CLAVDII GAL- LENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE

pharmacorum secundum locos,

Liber quintus, Iano Cor-

nario medico, in-

terprete.

*

De sugillatione sub oculis hypopion Gra-
ci dicunt. CAPVT I.



QUOD hypopion sub oculis fiat, nomen ipsum indicat. Idem enim est velut si quis hypophthalmium dicat, quod ipsum sub oculis sonat. Est autem ex genere effusionū, ecchymomatū appellatarum, Appellant ita Hippocra. & alii multi Medici circa cutē affectionē, quā tenuibus in ipsa venis contusis, sanguis per fissuras effunditur, nō vno loco acervatim ac statim ita excretus in grumos cōiens, sed postquā per persultationem, hoc est diapedesin, ut ipsi appellant, effusio ipsa facta est, cōtingit sa-

nd

nè aliquando ubi ita coërit, temporis progressu liuescere & denigrari, paruis nimirum grumulis ex disperso in multas cutis partes sanguine coactis, Quare meritò ad eius curationem statim festinant medici priusquam denigrescat, scopum medendi habentes ut sanguis discutiatur, quum sciant id quod in grumos coërit ex sanguine, ægerimè discuti posse. Quum verò tunica venarum ex quibus sanguis exilit rupatur, parum quiddam ex adstringentibus ad discutiendum ammiscetur. Si enim ex sola simplici facultate discussoria pharmacum à principio adhibeatur, non solum quod effusum est discutiet, Sed & per fissuras aliquid attrahet ex sanguine in contusis venis contento. Postquam verò in suam naturam redierint venulae, ad discussoria pharmaca citra adstringentium amixtionem opportunè trāsimus. Quemadmodum autem in aliis affectibus plerique medicorum indistinctè auxilia conscripserunt, Ita etiam in his citra eas quas iam recensui distinctiones, simpliciter Sugillatorum remedia perdidērunt. Porro si vos eorum quae in libris de simplicium pharmacorum facultate didicistis, memores fueritis, facile discernere poteritis, Quasnam sugillationes sola discussione digerere oporteat absque adstrictione, & in quibus ammiscere conveniat quippeam ex modicè adstringen-

gen

gentibus. Quin & ex ipsis discussoriis imbecilliora primū adhibenda esse manifestū est: fortiora verò inueteratis & denigratis admouenda. Exempli itaque loco primū ea quibus ipse vtor indicabo, Inde ad ea quæ probati medici tradiderūt progressurus. Appellatur autē collyriū Nili ex rosis diarhodō, multis iam annis præclarū & celebratū, cuius cōpositionē proximo libro tradidi, hoc ipsum in oculariorum coticula ex aqua cōtero, atq; sugillationi illino, fertulæ cāpanæ ac fœni græci decocto prius pro fomēto admoto, deinde etiā collyrio ex eo decocto dissoluto: postea etiā ex ipsius solius fœni græci decocto. Quod si reliquæ quæpiā affectionis resistent, in fœni græci decocto collyria ex myrrha, diasmyrna appellata, soluo ac illino. Conducit autē bis in die pharmacū hoc illinere, simulq; fomētum decoctorū calidorū per mollem spongiā prius admouere, ita vt primū ex ambobus fœno græco & meliloto decoctum fiat, inueterato autem malo, ex solo fœno græco. Hic curandi modus vt plurimum perfectē sugillata persanat, paucis omnino subterfugientibus eumq; respuentibus, in quibus collyriū ex sandice cōmodum est, & ex pharmacis ad sugillata à medicis descriptis ea quæ generosē discutiēdi vim habent.

bent. Initium autē faciā ab eis quæ Archigenes in primo pharmacorū secundum genus cōscripsit, præpositurus quidem ipsius verba: postea verò si quid ab eo ad distinctionem pertinēs relictum est, appositurus.

*Archigenis pharmaca ad sugillata,
iuxta ipsius dictionem.*

Sugillata euestigiò sanat raphanus impositus, auferes autē ipsum postquā morderi incœperit. Rectè fecit in eo quod adscripsit, tollēdum esse vbi morderi cœperit: si enim diutius maneat, venulas cōtusas cōmordendo, oscula ipsarū aperiet, quapropter & à principio eo vtendum non est. Vbi verò inueteratæ fuerint sugillationes & iam denigratæ, etiā si quis longiori tempore incumbere ipsum sinat, magis iuuabit.

Facit & caseus recens salsus impositus.

Ipsè quidem caseus vim obstruēdi meatus habet, verūm recens salsus & nondum inueteratus, mixtam facultatem habet, obstruendi meatus ex seipso, discussoriā verò & aliquāliter adstringentem ex sale, quare nihil absurdi est eo etiam in principio vti.

Aut ceratum cum absinthio vel raphani succo subactum. Aut hyssopi coma leuigata eodē modo. Siue cum absinthii coma trita, siue cum succo ceratum subactum adhibeas, eandem vim demonstrabit, Verūm
ad

ad tactũ mollius reddetur pharmacũ si succus cũ cerato cõmittatur. At verò raphani succus, aut hyssopũ cerato addita, efficacius reddũt pharmacũ, quàm vt à principio statim adhiberi cõueniat, nisi iã planè liuida aut nigra facta sit sugillatio, q; etiã ipse deinceps dicet. Sũmè facit ad recetia & liuida sugillata, Spõgia muria tincta & assidnè imposita ac ablata: postea verò fomētũ assiduũ ex calida aqua prodest. Quẽadmodum raphano in principio vti minimè tutũ est, ob eã quam dixi causam, Sic etiã muria: quapropter etiã post eius vsum, calidæ fomētũ pbat, quo videlicet acrimonia ex muria inducta cõpescatur. Neq; verò in omnibus sugillatis fomēto ex muria vti cõsultuit, sed in his quę statim linescũt. Modico itaq; tempore in his muria vtendũ est, in quibus verò cruētus, aut subflauus, aut sub pallidus est color, fugere muriam oportet. Cataplasmate autẽ vtere faba fresca contrita, absinthio, hyssopo, origano, raphani cortice, vua passã exacinata, vnoquoque per se cum melle, aut aceto, aut aqua. Imperfectè primum hæc remedia cõscripsit, quũ nõ apponat ad sermonem, coctisne an crudis vti iubeat faba fresca, & absinthio, & hyssopo. Videtur autẽ crudorũ vsum præcipere. Porro ad finẽ vbi dicit, cum melle, aut aceto, aut aqua,

aqua, singulis prædictis vtendum esse, neque
 tum quidẽ coctis addidit. Quin & eo ipso
 sermone tria inæqualia medicamenta tra-
 dens, minimè rectè mihi videtur, cum hoc
 *Vet. cod. vel illo vtendũ esse præcipere. Aqua *enim
 addit cali acrimoniæ omnis expertissima est, non in
 da. cute tantum, sed ipsis etiã vlceribus. Mel
 verò vlceribus mordax est, cutem autẽ non
 offendit; Acetum verò vtrisque mordax
 existit. Neq; verò raphani cortex vux pas-
 sæ viribus par est, Sicut neque absinthium,
 ac hyssopum & origanum. Fortia enim hæc
 sunt & discussoria vi prædita. Moderata
 autẽ est vua passa & omnis acrimoniæ ex-
 pers. Et bulbus albus cum ouo & melle.

Bulbum flauum vt acriorem in principio
 statim adhibere recusat. Scimus autẽ mel
 discussoriæ facultatis esse, quapropter ouũ
 ipsis ammiscere videtur, quod mitigandi
 facultate multum præstat. Cyclaminus
 per se, & cum vua passa. Neque hic mo-
 dicum est quod interest inter cyclaminum
 & vuam passam. Quare haud scio qua ra-
 tione per se cyclamino vtatur, & ammixta
 vua passa vehementissimum enim pharma-
 cum per se est, at verò cum vua passa tãtum
 auferat eius facultatis, quãta fuerit ammi-
 xtæ vux passæ moles. Aut nitrũ cum hyssopo
 & vua passa, melle exceptum. Hic
 fer

sermo priore rectior est, in quo etiã solius cyclamini vsum permittebat. Nam si etiam nunc hyssopum ipsum per se adhibere consulisset, non apponendo inueteratis sugillationibus id cõuenire, similiter utiq; deliquisset. Myrtũ cum sale & aqua. Dictũ etiam antea à me est, quod ex discussoriis medicamētis in principio prãstãtiora sunt, quæ modicã adstringendi vim cõplectuntur, Qualia sunt rosã, & melilotum, & crocus. Non tamen ex eiusmodi pharmacorũ numero est myrtus, vtpote vehemēter adstringens, quapropter ego nũquam ipsa vti audeã, prãsertim si iam liuidus sit color sugillationũ. Sinapi cum adipe ouillo. Inueteratis & nigrefactis sugillationibus solum, hoc medicamentũ cõuenerit, & maxime si non omnino modicum sit sinapi adipi ammixtum. Myricæ folia & fructus trita cum aqua, per se & simul mixta. Et hoc pharmacum non solum discussoriã, sed & contractoriam quandam vim habet, quare inueteratis & nigrefactis sugillationibus non cõducit. Facit & spõgia, & linteolũ, aceto ac melle imbuta, & apposita. Hoc remediũ in principio adhibitum, non valdè acri aceto opus habet: in progressu autem temporis liquefacta aut denigrata sugillatione, nihil profuerit absq; acerrimo aceto

A

præparatū. Aut fabam fresam cōmandu-
catā imposito cum melle. Quin & fabæ
lomentum, etiā citra manducationem, cum
melle subactum liuida discutit. Ex māduca-
tione autem summè discussorium redditur,
nimirum viribus à salua adsumptis. Oui
vitellum eodem modo. Si mel ad oui vi-
tellum miscuerimus, velut ante dixi de fa-
ba fresca, simile faciemus prædicto medica-
mento, tum in apparatu, tum in facultate.

Aut porci pulmonem calidum imposito.
Hoc remedium nō tolerarit vir mūdiciem
amās. Aut myricæ decocto prolue. Non
ita longè ante de myricæ facultate dictum
est. Aut cardamomum cum myrrha im-
pone. Discussorium quidem pharmacum
est myrrha, verū acre cardamomū. Hæc
fanè sufficere videntur mihi ex Archigenis
scriptis exempli gratia prolata, ostensio si-
mul modo examinandi pharmaca, Qualia
scilicet in principio conueniant, antequam
liuida aut nigra sugillatio fiat, & qualia li-
uidis, aut iam nigrefactis, & inueteratis sint
adhibēda. Quare quæ cōsequantur apud
eum deinceps, ea sola per se adscribā, ipsius
Archigenis verbis. Aut cerusæ & spumæ
argenti æquales partes cum melle terito, &
ammixta faba fresca ad cerati formā reduci-
to, ac vtitor. Aut anguium senectam cum
aqua

aqua marina tritā illine. Aut cuminū lin-
 teo illigatum in feruenti aqua tinctum pro
 fomēto adhibe. Aut sinapi cum cerato im-
 pone. Aut fœniculū tritū impone. Aut
 thus & thapsiā æquis portionibus cum rosa
 ceo cerato. Aut mentā & argenti spumā
 pari pōdere impone. Aut hordeaceā farinā
 cum aceto mulso coctam. Aut fabā vino
 maceratā donec dissoluatur, tritam spleniū
 modo impone. Aut cicer eruinū vocatū
 eodem modo. Aut furnorū fuliginē cum
 pari cerusa ex vino odorato illine. Aut
 thapsiā & eruinæ farinæ tertiā partē eodē
 modo. Aut salsam thunni carnē, omota-
 richon Græci vocant, exprimito: deinde in
 vino odorato tritā imposito. Cæterū
 ad vetustiores sugillationes Smilacis fru-
 ctus cū vua nigra tritus facit. Aut thapsiæ
 radix tusa, & succo eius adipe excepto, ac
 assiduè apposito. In quibusdā exēplaribus
 non vetustiores cōparatiuè scriptū est, sed
 vetustissimas superlatiuè. Dictū est porrò
 à me statim in principio, quod in eiusmodi
 sugillationibus, pharmacis forti discussoria
 vi præditi vti oporteat, qualia sunt sanè ab
 eo his verbis descripta, & quædam item ex
 superioribus velut est indicatū. Atque hæc
 quidē Archigenes pdidit. Verū Apollonius
 diligentius & cum pluribus distinctionibus

in primo parabiliū in hunc modū scripsit.

*Pharmaca ab Apollonio conscripta, ad
sugillata recentia ac liuida.*

SPongiam in aqua marina feruente tin-
ctam assiduè locis pro fomēto adhibe-
to. Aut spōgia in acri muria tincta similiter
foueto. Idem facit si feruēti aceto, & vino
imbuatur. Imponēdum est & spleniū melle
& aceto madefactum, aut lana, aut sponsia.

Cataplasmate autē vtēre, Absinthio trito

* Hec ex cum melle * aut hyssopo trito cum melle, 1
vet. cod. faba fresa eodē modo. Origano similiter.
raphani cortice cum melle, Bulbis tritis per

* Hec ex se, aut cum melle & oui vitello. * Lini semi-
vet. cod. ne, & salibus, & oui vitello, Silphio trito cū
oleo & vino, Sampsucho trito cum melle,
Myrto & sale tritis cum aceto, fœniculo tri-
to cum cerato, hyssopo & nitro cum melle
& aceto, calce viua cum cerato, Sinapi trito
cum adipe vitulino, aut cum cerato.

Ad sugillata inueterata.

Ari radicē rasam ac melle subactā in lin-
teolum illitā imposito, vtēre etiā discusso-
riis facultatibus & cōpositionibus, quæ ex
descriptionibus cōmentariorū apparantur.

Ad sugillata cum tumore.

Spongiā aceto imbutā imposito, & præ-
monstratis fomētis frequētius vtitor, cata-
plasmatis loco farinā hordeaceā ex aceto
mul

mulso coctam imponito, donec locus sugillatus humilior reddatur: de cætero verò subscriptis cataplasmatibus vtitor.

Ad sugillata cum inflammatione.

Aqua calida fove, & pro cataplasmate lenticulam coctam tritam cum melle impone. Aut cochleam ægyptiā cōtusam impone. Vbi verò inflammatio remiserit, tunc iam etiam aliis pharmacis vttere.

Ad sugillata cum pertusione.

In ipsam quidem pertusionis fissuram ex medicamentis quæ cruentis vulneribus conueniunt inde: circumfitis verò partibus cataplasma ex medicamentis ad sugillata citra pertusionem cōscriptis impone. Præstabat fortassis hic iam sermonē de sugillatis desinere, Verū quum ea quæ ex consentiente experimēto iudicata sunt, aliis stabiliora existant, visum est mihi etiam ea quæ Crito in tertio de Ornatu scripsit apponere, quæ sanè iuxta illius dictionē ita habent.

*Quæ Crito ad sugillata recentia
medicamenta scripsit.*

Cicutam tritam ex aqua impone. Absinthium tritum ex aqua, & in linteolum infarctum imponito: quod si tenera sit cutis, parum mellis adicito. Hyssopū ciliciū ex aqua tritum, & in linteolum ligatum, in globulos cogito: cumq; his inferuētē aquā

tingentis sensim foueto. Bryoniae radicem tritam cum melle imposito, aut rosaceo cerato exceptam adhibeto. Muriam acrem facito, spongiisque in ea madefactis foueto. Et post hæc raphani corticem tritum cum melle, & linteolo infarctum imposito.

Aut sinapi tritum cerato exceptum, & modico adipe vitulino addito, in linteum infarctum imposito. Et de his quidem intantum. Quod si inueteratae sint sugillationes, aut etiam appellati liuores, subscriptis compositionibus vtendum est.

Ad liuores & sugillationes profundas.

Tordylii partes duas, terræ samsiæ partē vnā, aceto excipito, modicūq; mellis simul cōquassato. Animaduertere autē oportet diligenter ne cutis exulceretur. Medicamentū deterēs sugillata, Aristarchi. Hyssopi cilicii drac. 1. radice thapsiæ tantundē. thuris integri nō secti tantundē, ceræ tyrrhenicæ drac. 2. resinæ terebinthinæ drac. 1. arida cum liquecibilibus cōmittito, deinde linteolo infarcta imposito, animaduersione habita ne locus exulceretur, & ob hoc sanè frequenter tollere oportet. Aliud,

Radice thapsiæ drac. 12. aut succi drac. 6. thuris infecti drac. 8. veratri albi drac. 2. absinthii drac. 1. cerati rosacei dra. 16. mollita repone, ac linteolo infarctis ytere. Oportet etiam

etiam hoc assiduè amouere. Aliud, Vitis albæ obol. 3. struthii tantundē. glandis Aegyptiæ tantundē. pulmonis caprini vsti tantundē. radicis asparagi tantundē. bdelii tantundē. succi thapsiæ tantundē. aceto multo exceptis vtitor Aliud seminis vitis albæ drach. 3. radicis struthii tantundē nitri rubri tantundem. succi raphani tantūdem. hyssopi Cilicii tantundē. farinæ fabarum tantundem. glandis vngentariæ drach. 40. myricæ drach. 40. pulmonis caprini vsti drach. 40. bulborum rubrorū drach. 40. radicis thapsiæ drach. 40. thuris drac. 12. excipe cerato rosaceo, ac vtere vt dictum est.

Medicamentum ab Hera conscriptum ad sugillata.

A Vfert, vt inquit Heras, tribus horis: quod si inflammatio fiat, cataplasma ex viridi caseo probat, & fomentū ex pane. Succu cicutæ obolos. 2. croci drach. 2. myrrhæ drach. 1. acaciæ drach. 1. opii drach. 2. succi thapsiæ drac. 1. gummi drac. 1. cū aqua cogito. Hoc equidem Heras scripsit. Ego verò nucē per ætatē iam oleosam factā expertus sum aliquādo ad cruētatos facientē. Oportet autē ipsam nucē diligenter terere, atq; ita imponere homini supinè reclinato, quo ad horas duas & tres pharmacū adhæreat: vbi enim sic fecerit, etiam si postea

furgat, ad multum tempus adhæret, oportetq; priore delapso aliud statim imponere.

Eiusdem Heræ ad ægilopas.

MAluæ folia cū sale & melle trita im-
ponito, destruit hoc ac extirpat ægi-
lopa. Alicam etiā in aceto coctam incipien-
ti ægilopi imponito. Aut myrti recentissi-
mas baccaꝝ cataplasmatibus modo adhibe, ubi
videlicet fluxio infestauerit. Similiter fa-
cit & lemnia terra si illinatur.

De Aegilope.

C A P. I I.

Inter nasi os & magnum iuxta
oculum angulū, paruum quoddā
abscessui simile tuberculum ori-
ri solet, & rumpitur sanè sæpè in
angulum, ut ægrè curabile reddatur, nisi
maturè occurratur. Mederi igitur oportet
ipsi cum discussoriis medicamentis quæ ci-
tra mordacitatem efficacia sunt. Coaffici-
tur enim oculus ab acribus, atq; ita etiā af-
fectæ partis inflammatio augetur. Verū affe-
ctio ipsa non ob id solū ægrè curabilis est,
sed & propterea quod quum multa liquida
pharmaca in experimentū adsumi possint,
ea non tolerat locus ipse, necessariò enim
ex eis in oculum quid influit. Neq; verò ad-
hærere eiusmodi queant citra obligationē
quæ totum oculū cōplectatur, quam impos-
sibile est tot diebus aliquem perferre posse
quot

quot ad mali curationē requiruntur. Ob hanc igitur causam Apollonius nulla phar-
maca ad Aegilopas scripsit, Archigenes ve-
rò paucis enumeratis, deinceps ad curatio-
nem ipsorum per chirurgiam progreditur,
quanquā res ipsa nō manuariæ operæ, sed
pharmacis secundum genus sit subiecta.
Itaque totam ipsius dictionem adscribam
hoc modo habentem.

*Quæ Archigenes ad Aegilopas scripsit, in
primo pharmacorum secundum genus.*

AEgilopas qui circa oculorum angu-
los oriuntur eruo cum melle integri-
mus, aut cinere vitis cum aceto subactō.
Probè facit & thus cum columbino sterco-
re recenti impositum. Aut succum herbæ
ægilopis, auenam nostri dicūt, cū melle illi-
ne. Cæterum in nondū perforatis staphidē
syluestrem, & ammoniacū thymiamā cum
melle veluti splenium impone. Aut alumen
scissile cum terebinthina splenii forma im-
pone. Aut lanæ tomentū sanguine marini
leporis tinctum inde. Aut melanteriā tritā
adhibe. Quod si neq; sic sanentur, diuiso
angulo, & cum tenui perforato terebello
continuis foraminibus incussis disparato,
capitale emplastrū adhibeto, discedēt enim
squamæ, & sanabuntur. Aut oīse denudato
cauterium admoue, & sic squamulæ disce-

A 5


dunt ac sanantur. Quidā diidentes angulū
olsi qua parte perforatū est angustū in fun-
dibulum adinouēt, ac plumbum liquefactū
infundentes vrunt, atq; hoc modo optimē
sanant. Hæc quidem Archigenes scripsit.

Que Asclepiades ad Aegilopis conscripsit.

Porrò Asclepiades in primo exteriorū
hæc prodidit. Succī illecebræ libram
dimidiam. succi solani lib. dimidiam. thuris
drach. 8. mastiches drach. 3. galbani libræ
dimidium. succos cū thure coquito, & vbi
dissolutum fuerit, galbanum iniicito: ma-
stichen verò improbamus. Aliud, Thu-
ris drach. 8. myrrhæ drach. 8. ladani drac. 4.
ceræ drach. 4. aluminis scissi, coaguli lepo-
ris, vtriusque drach. 3. spumæ nitri drach. 4.
pharmacum contundito & emollito cum
irini vngenti fece.

De Varis.


C A P. I I I.



Vmor paruus & durus in faciei
cute oritur Varus latinis, Græ-
cis Ionthos appellatus, à crasso
videlicet succo cōgregatus, de-
monstransq; sui ipsius curationem rationa-
biliter per pharmaca emollientia & discuf-
soria futurā, Etenim duricies ipsius emol-
lientibus, Tumor verò præter naturā di-
scutientibus opus habet, Quum igitur iam
sæpè tum in superioribus libris, tum in de-
sim

simplicium pharmacorum facultate commentariis, prædictæ sint mihi materiæ tum discussoriorum, tum emollientium medicamentorum, Cõpositio sanè ipsorũ particularis per experienciã iudicata, utilis erit ad rectum relatorũ vsum, quæ videlicet paulo post referentur, vbi saltem prius determinauero, Quæ similes sint Varis affectiones, & aliqua parte ab ipsis differentes.

De ficosis tumoribus. C A P. I I I I.



Na quædam hæc affectio est ex his quæ in mento enascuntur, differens à Varis in eo quod non solùm crassus sit qui hos tumores efficiat humor, sed & serosa tenuitate participet, ob quam etiã citò exulcerantur, si nõ vt debet curètur, & ob id magis resiccantibus pharmacis quàm Vari opus habent.


De lichenosis in mento tumoribus. C A P. V.



T hæc affectio ex mixto quopiã generatur humore, serosis nimirum ac tenuibus & acris succis cum crassis permixtis, quapropter etiã facilè in pforam ac leprã trãsit, indiget quæ etiam ipsa pharmacis fortiter resiccantibus. Postquam verò in pforam aut lepram transierit, vltra hoc quòd resiccantibus indiget pharmacis, etiam repurgantia & extensoria expostulat.


De

De menti eruptionibus. C A P. VI.



Hoc eruptionum, siue ut Græci dicunt exanthematum, nomen quidam in communi vsurpāt, de affectionibus videlicet vlcerosis & asperis in mento sua sponte prouenientibus, quemadmodū etiam Archigenes facit. Indiget autem & hæc ipsa affectio resiccantibus medicamentis.

De furunculis. C A P. VII.



Furunculi Dothienes Græcis dictis ex similibus humoribus veluti Vari generantur, per vniuersum corpus duplices existentes, Aliqui quidē (ut ita dixerim) Varosi, duri, & ægrè concoctiles. Aliqui verò inflammati, in quibus aliquando etiam febres consistunt, & tumor in magnitudinem excrescit, & in pus transmutatur. Vnde curatio ipsorum ut plurimum eadem quæ inflammationis existit.

Ex Critone Ad Varos.

Crito in tertio de ornatu hæc verba scripsit. Ad Varos in facie, Mellis atticici cyathum, vnū siue drach. 12. aceti accerri mi tantundem misceto diligēter eoq; Varos illinito cum digito affricando. Aliud, Spumæ argenti chemam siue drach. 3. terebinthinæ puræ, fabæ Aegyptiæ magnitudinem

dinem, addito olei albi parũ, atq; vbi prius faciem deterferis, ex medicamẽto hoc parũ digito excipe, deinde ambabus manibus terendo varos obline hoc pharmacum etiã à rugis liberam & mundam faciem cõseruat.

Aliud, Amygdalas amaras aceto dilutas ac probè tritas faciei obline. Aliud,

Alumen scissum probè leuigatum terebinthina excipe, & emollitum impone.

Aliud, Costum Indicũ tustum & tenuissimò cribro cretum felle caprino excipe, ac ad cerati crassitudinem redactũ Varis circa vesperam illine, Manẽ verò vbi surrexerit lacte ægrum faciẽ proluere iube. Inuenteratis porrò Varis subscriptis compositionibus vtendum est.

Ad Varos callosos.

SAponis gallici drach. 4. ammoniaci thymiamatis drach. 1. thuris drach. 1. aqua dissoluito, & cerati spissitudinẽ facito, eoq; illinito, & post horæ interstitiũ calida abluere iubeto. Aliud, Nitri rubri, hyssopi, pulegii, salis fossilis, æquales partes tundito & per tenuissimũ cribrum cribrato, exceptisq; cerato rosaceo vtitor. Aliud, Seminis ocymi, nitri rubri, pulegii viridis, aluminis scissi, colti indici, singulorũ æquales partes tusas & cribratas, adipe anserino seu gallinaceo excipe, vt cerati fiat crassitu
do,

do, ex eo verò in linteolū infarcito & im-
ponito donec penitus persanescant. Aliud,

Salis assati, pulegii, hyssopi, ammoniaci
thymiamatis, Rhois coriarii, singulorum
par pondus rosaceo cerato exceptum do-
nec persanentur imposito.

*Ad affectiones eminentiores, & in facie
pruritus, ac principium elephantiasis.*

Gummi albi, spumæ nitri, thuris, sulphu-
ris viui, singulorū æquales partes ace-
to dilutas ac probè tritas in pastillos redi-
ge, eosq; in umbra ex sicca, vsu verò exper-
te aceto dilutos illine, atque vbi resiccati
fuerint, subscripta cōpositione deterge. Sa-
ponis gallici librā. i. ammoniaci thymiana-
tis tantundē. thuris quadrātē, mastiches qua-
drātē, spumæ nitri quadrātē. Saponē & am-
moniacū in vas fictile cōiecta, & aquæ sex-
tariis duobus affusis coquito, atq; vbi disso-
luta fuerint, arida cōtusa & cribrata adici-
to, deinde in mortarium translata ac probè
cōquassata, vase vitreō reponito, Vsu verò
postulāte faciē ex eo sme gmate inquinato,
& post modicū temporis spaciū larga aqua
molliter perfricādo abluito. Vtēdū est hoc
sine gmate per omnē Varorum curationem.

Ad ficosas menti papularum eruptiones.

CRito in tertio de ornatu in hūc modū
de eis scripsit. Ad ficosas in mēto eru-
ptio

ptiones, velut Lucius præceptor tradit.
 Spumæ argenti, misyos crudi, æquas partes
 tritas insperge. Aliud, Thuris drac. 2. spu-
 mæ argenti drac. 4. salis fossilis drac. 8. san-
 darachæ drac. 2. trita insperge.* Aliud, Ce- * Hæc ex
 rusæ drac. 4. misyos crudi drac. 4. salis fossi vet. codi-
 lis drac. 2. sandarachæ drac. 2. trita insperge.] addita
 Aliud, Atramēti sutorii drac. 2. sulphuris vi sunt.
 ui drac. 2. æruginis drac. 1. nitri rubri drac. 2.
 trita insperge. Aliud, Elaterii drach. 4. sali
 fossilis drach. 4. atramenti sutorii drach. 2.
 mixta insperge, & cum specilli humecti ex-
 tremo admoue, quo videlicet pharmacum
 ipsum adhæreat. Cæterum post pharmaci
 impositionem, semine lini ex aqua trito
 vtendum est. Porro vbi humidiora fuerint
 vlcera, vt ab ipsis aqua pura velut à fonte
 defluat, subscriptis compositionibus vten-
 dum erit. Pastillus ad ficosas menti pa-
 pulas, Vfus est eo Artemidorus, repri-
 mit omnes tumores, qui accidunt his qui-
 bus cicatrix malè inducta est, veluti in his
 qui futura vñ sunt contingit. Compositio
 hæc est. Squamæ æris drach. 4. atramen-
 ti sutorii drach. 2. aluminis scissi drach. 2.
 glutini fabrilis perlucidi drac. 2. Arida tun-
 duntur & cribrantur, Glutinum verò aceto
 maceratur, & tritis affunditur, rursusq; leui-
 gatur, & formatur pastilli, quos vñ tēpore

ace

aceto dilutos illinimus. Hoc medicamentū etiam fistularū callos extirpat. Alius Magni Clinici. Aluminis scissi, æruginis corinthiæ, rubricæ sinopidis, chalcitidis, glutinis fabrilis, singulorum æquas portiones, componito ac utitor ut dictum est. Alius, Arii Asclepiadei. Milti siue rubricæ sinopidis, æruginis corinthiæ, aluminis scissi, gallæ omphacitidis, malicorii, æquas singulorum partes, gummi duplū, aceto excipito ac utere ut dictum est. Alius Apollonii, ut Charixenus tradit. Squamæ aris, miſſos assati, auripigmenti, singulorum drachmas. 2. diphrygis drach. 4. aris vsti drachmas. 4. chalcitidis vstæ drach. 4. glutinis fabrilis drach. 4. aceto diluito, & pastillos formato, quibus velut superioribus utitor.

Andronis pharmacum accommodatum.

Atramenti sutorii drach. 2. myrrhæ drachmas. 2. thuris drach. 4. aluminis scissi drachmas. 4. malicorii drach. 8. gallarum drachmas. 8. aristolochiæ drach. 8. Vino austero exceptis ut prædictis utere.

Critonis, ad lichenas in mento.

Consequenter verò Crito ad lichenas menti scripsit hoc modo. Ad menti lichenas quæ iniucundissima est affectio, Nam & pruriginem inducit, & affectarum partium circuntēſionem, & periculum non
mo

modicum: proserpit enim aliquando per totam faciem, oculosq; cōtingit & feruē extremæ fœditatis causa existit, quapropter diligentiore cura vtendum est, inspiciendo tum irritatiōes, tum interualla & remissiones. Ita vt etiam ab inueteratis recentes disparemus. In quibus conueniet vti resiccantibus medicamentis. Quum verò in pforam aut lepram transierint, supra resiccantia etiā exterforiorum & repurgantium erit vsus, & postea sanè subscriptarum item compositionum.

*Crispi amici ad recentes in mento, siue alia
faciei parte lichenas.*

Tritici grana multa in incudem imposito, deinde laminam aris igni candelatam tritico superponito, & resolutum ab eo liquorem calidum adhuc auferto, ac super lichenas linito. Hoc solo multos curatos scimus. Aliud, Maluæ agrestis semen tenerum adhuc colligito, mundato ac tundito, succumq; reponito, atque eo assiduè illinito. Aliud, Portulacæ succum assiduè illinito. Aliud, Oleæ æthiopicæ lachrymam cum aqua terito, & modico adiecto styrace misceto, & imposito. Aliud, Vlini lachrymam aqua dissolutā imposito. Quod si inueterati sint lichenes, sequētes cōpositiones adhibēdę sunt, Albuci

B.

radicem aceto coctā & tritam illinito. Viticis folia trita cum aceto imposito. Caparis folia trita cum aceto imposito. Rumi-
cis hortensis radicis corticem ex aceto tri-
tam, loco prius cum nitro preparato im-
posito. Chamæleonis radicem aceto coctam
& tritam imposito. Cæterum quum ad li-
chenum curationem multa & varia medica-
mina existāt, particulatim de singulis trāsi-
gamus initio à pastillis sumpto. Pastilli li-
chenici. Glutinis fabrilis drach. 4. alii duas
habēt, sulphuris viui drach. 2. chamæleonis
drach. 4. thuris drach. 2. aceti hemina dimi-
dium. Glutinum aceto dissoluitur, dein-
de aridis adiicitur. Vfus tempore quantum
satis est aceto dissoluo calidumq; impono.
In aliis exemplaribus singulorum par pon-
dus continetur. Alius, Chamæleonis,
sulphuris viui, vtriusq; drach. 4. lachrymæ
oleæ æthiopicæ drach. duas, thuris drach.
1. aceti quantum satis est. Alius, Alcyo-
nii drach. duas, chamæleonis nigri drachm.
quatuor, pyrethri drach. duas, sulphuris vi-
ui drach. 4. thuris drach. 4. glutini drach. 4. ace-
ti acerrimi heminas. 4. Alius, Lachrymæ
oleæ æthiopicæ drach. 4. sulphuris viui drach.
4. alcionii drach. 8. spumæ nitri drach. 8. alicæ
aceto coctæ drach. 8. aceti quod satis est.
Alius, Alcyonii vsti drach. 2. chamæleonis
nig

nigri drac. 4. radice albuginis drac. 4. sulphuris viui drac. 2. thuris drac. 2. pirethri drac. 2. spumæ nitri drac. 2. glutinis drac. 4. Aceti quod satis est. Porro extenta iam affectione & callosa reddita sequentibus vtendum est medicamentis. Humida ad impetiginosos affectus. Misys peregrini, thuris, myrrhæ, aluminis scissi, singulorum drach. 8. aloës, sulphuris viui, vtriusque drach. 4. Excipe passio vt strigmentitiam spissitudinem accipiant, & bis aut ter indie præfrictis illine: forinsecus autem conseruandi pharmaci gratia, vesicæ pelliculam, aut ouitellam, aut viridia folia quantum satis est impone. Aliud, Misys drach. 4. acaciæ drac. 2. squamæ aris drach. 4. sulphuris viui drac. sex, chalcitidis drac. octo. gummi drac. 8. aceti quod satis est, In quo vbi gummi dissolueris, reliquaque ammiscueris, amurcam iniice, & probè cōquassata reconde, ac vt utere vt dictū est. Aliud, Sulphuris viui, thuris, myrrhæ atramenti sutorii, misys crudi, singulorum drac. 2. gummi drach. 4. aceto & cedrino oleo quod satis est dissoluito, eodemque vttere modo. Ex scriptis Zeuxidis, Aliud, Chalcitidis crudæ, misys crudi, myrrhæ Minnæ, sulphuris viui, singulorum æquales partes, gummi duplum aceto dissolutum, Excipe

oleo cedrino. Verum cedrinū prius coque-
re oportet vsque ad mellis crassitudinem.

Aliud Diodori, Lachrymæ oleæ æthio-
picæ drac. 20. gummi drach. 40. atramenti
futorii drac. 16. sulphuris viui drac. 10. thu-
ris drac. decē. æruginis drac. decem, acaciæ
drac. decē, Myrrhæ Minnææ drac. 10. ace-
ti quod satis est. Et vbi dissoluta fuerint
singula, ac leuissima reddita excipe amur-
ca condensata, & repositis vttere. Anneſtan-
tur porrò & aliæ compositiones. Illitio
cocta ad lichenas inueteratos, quæ citra vl-
cerationem perſanat. Atramenti futorii,
fœni græci moliti, cardamomi, singu. drac.
duas, melantii ſesquidrachmā foliorum ca-
prifici ſesquidrachmā, aceti accerrimi quod
satis est, leuigata ad mellis ſpiſſitudinem re-
ducito, deinde coquito, & poſtquam nigrū
factum fuerit & condensatum pharmacum
tollito, illinito, inſuperq; lichenas abluito.

Heraclidæ Tarentini illitio lichenica.
Sanat circa vlcerationem. Polentarum
drach. 8. glutini drach. ſex, atramenti futorii
drach. 4. chalcitidis drach. 4. sulphuris viui
drac. 4. ſpumę nitri drac. 6. alcyonii drac. 4.
myrrhæ Minnææ drach. duas, aceti hemi-
nas tres. Dionifii condiscipuli, Sanat ci-
tra vlcerationem. Farinæ hordeaceæ ſexta-
rium vnum, atramenti futorii vnciā vnam

cor

corticum radicum rumicis syluestris sextarium vnum, sulphuris viui vnc. vnam myrrhæ sesquunciam, gummi vnc. vnā, aceti heminas sex. Rumicis radicem coquito, & vbi dissoluta fuerit extractam terito, Hordeaceam verò farinā in residuum liquorē coniectam coquito, atq; vbi rectè habuerit reliqua iniicito, & ablatis vtitor. Illitio, Socrationis cocta. Farinæ alicæ sextar. sex, sulphuris viui drac. sexdecim, misyos peregrini drac. 16. cimoliæ drach. 16. chalcitidis drac. 16. spumæ nitri drac. 8. alcyonii drac. 8. aluminis scissi drac. 8. radicis albuci drac. 8. myrrhæ dra. 8. thuris drach. 8. lachrymæ oleæ drac. 8. ammoniaci thymiamatis drac. octo, aceti heminas tres. Alcyonium & albucum in aceto coquito, vbi verò ad dimidias redactum, fuerit percolato, & in colamento ammoniacum, myrrham, thus, oleæ lachrymam, dissoluito, deinde terito, aridaque iniicito, Alicam verò in residuo liquore coquito, & dissolutam reliquis aduicito, simulq; terito ac vtitor. In aliis collectaneis sic habet. Sulphuris viui, misyos peregrini, chalcitidis singulo. drachmas. sexdecim, nitri, aluminis scissi, alcyonii, radicis albuci, thuris, lachrymæ oleæ, terræ cimoliæ, ammoniaci thymiamatis, singulorum drachm. octo, aceti heminam vnam. Alia

valdè efficax. Aceti acerrimi sextarios sex,
 farinae hordei sextarios 2. mannae sextariū
 *Vet. cod. vnū, radicis rumicis agrestis drac. *5. vera-
 habent tri albi drac. decem, alcyonii drac. 16. carda
 drac. 20. momi drac. vnā, terrae cimoliae drach. octo,
 glutinis drac. 16. spumae nitri drac. 16. hali-
 cacabi virgultorum viridium manipulum,
 Composito. Quandoquidem verò mul-
 ti pharmacorum quæ illinuntur compo-
 sitiones recusant, amantq; magis emplastro-
 rum impositiones, vtpote quæ neque sudo-
 ribus obortis diffluunt, neque resiccata cu-
 tem circuntendunt, merito etiam ipsorum
 præparaciones subiungimus.

*Emplastra lichenica quæ citra exulcera-
 tionem liberant.*

CEræ, picis coctæ thuris, terebinthinæ,
 sulphuris viui singulorum libræ dimi-
 diū. Liquida cum aridis cōmittito. Aliud,
 Thuris drac. 8. aluminis drac. 8. atramēti
 futorii drac. 8. sulphuris viui drach. 4. gluti-
 nis drac. 4. radicis chameleonis drac. 4. ce-
 ræ drach. 8. picis crudæ heminas 2. Picem &
 glutinum coquito, atq; vbi cōdensata fue-
 rint ceram iniicito, aridisq; affundito, ac
 repositis vtitor. Aliud, Facit ad liche-
 nas eleuatos, adeò vt reprimat ea quæ resi-
 dua putantur. Mannæ thuris, picis vtriusq;
 drachm. octo, bituminis drachm. octo, ceræ
 drac

drac. octo, resinæ pinus drac. octo, sulphuris viui drac. octo, olei cyprini parum. Coquito vt dictum est, & sublati vtitor in linteolum aut pelliculam tenuē infartis. Aliud citra vlcerationem remouet. Picis brutiæ liquidæ *sextar. vnū mannæ lib. i. sul. *Aliàs phuris viui lib. i. farinæ lupinorū lib. i. pro lib. consuetudine composito, deinde galbani sextantem adiucito. Est hoc ex valde probatis. Alia exemplaria farinam nō habent, neque galbanum. Emplastrum lichenicum Philotæ, citra vlcerationē sanat. Exhibitū est à Philota sodali per versus scriptū. Chalcitidis crudæ, chrysocollæ, misyos assati, squamæ æris, diphrygis, salis ammoniaci, terræ eretriæ, singulorū drach. 4. sulphuris viui drac. 12. atramenti sutorii floris lapidis asii, æris vsti, singulo drac. 6. soreos drac. 6. aluminis liquidi drac. 4. Hæc omnia terito, deinde aceti heminis. 12. affusis, per dies. 5. sub caniculæ ortum soli exposita itidem probè terito, donec pharmacū redditū fuerit aridum. Porrò in alio mortario thuris vnc. vna, myrrhæ sextās, aloës vnc. i. ladani quadrans, opopanax quadrans, aceto dissoluta ad strigmentitiā crassitudinē præparantur, atque vbi rectè habuerint, ad ea quæ in sole leuigata sunt adiiciantur, rursusque terantur, addaturque aristolochiæ rotundæ

& longe, vtriusque tusæ & tenuicribo excussæ drach. vna. Postquàm verò iam trita emplastri formã acceperint, liquecibilia prius liquefacta & frigefacta iniicito. Sunt aut̃ hæc. Ceræ drac. 110. terebinthinæ drac. 20. galbani drac. 9. olei hemin. vna & probè emollitis ac repositis vtitor. Hoc pharmacum duplicem aspectum vidētibus exhibet. Cæterùm si affectio pertinacius perseueret, & pharmacorũ impositionem respuat, excoriatoriis appellatis remediis vtendum erit promptè enim superficiem auellunt.

De excoriatoriis Lichenum.

EXcoriatorium Lichenum, quo Pamphilus Romæ vsus plurima designauit, quum in vrbe Mëtagra appellatus morbus inualesceret. Squamæ æris drac. 6. auripigmenti drach. quatuor, sandarachæ drac. quatuor, æris vsti sesquidrach. veratri albi sesquidrachmā, ventriũ cantharidũ sesquidrachm. Singula per se terito, deinde simul mixta, cedria excipito, & ad strigmenti densitudinem reducta pyxide æris cyprii reponito. Vsu autem expetente, nitro & aceto modico perfriētis lichenibus, pharmacum hoc cū spathula illine, ac affrica: deinde interiecto spacio derade, rursusq; pharmacũ impone: deinde vbi bis vel ter hoc feceris, quo facilè deradi possit, rursus imponere

ten

tenta, illitis locis cum vesicæ bubulæ aut alterius cuiusdam animalis pelliculis intactis, Hæc enim pharmacū ne defluat cōseruat, & alias leuis est: post pelliculæ autē impositionem fasciola leuiter obligatū finito. Præstiterit quidem per noctē adhærere. aut saltem ad aliquot horas, vsque quo bullas excitet saniem complectentes crassam & glutinosam. Deinde verò lauare præcipimus, & in balneo morari: nam & hoc ad hanc curationem auxiliatur. Sit autem calidius balneum. Quo si quid vti prohibeat fomentum aquæ multæ calidæ adhibendum est, quo deterso, panis ex aqua mulsa subactus cataplasmatibus modo imponatur. Porro vbi sordida iam facta fuerint vlcera, spleniū ex emplastro viridi imposito, modica parte de excoriatorio adiecta. Cæterum sanie exclusa & nulla crustula vlceri incubente, splenium album imposito, atque hac curandi ratione donec cicatrix penitus inducatur vti-
tor, singulis diebus fomentum adhibens, & nouum splenium imponēs. Post cicatricem plenè inductam, si qua suspicio reliqua sit, eodem curationis ductu vtendum est. Antequam verò excoriatoria imponantur, circūsitæ & vicinas licheni partes Pharmacum aliquo inflammationem arcente in splenio excepto, integere ac tueri oportet: Nimi-

rum lichene sua extrema linea semper parum quiddam ex sanis corporibus affricante & inuadente. Hec communis Mentagræ curatio est. Aliud excoriatorium Axiorii. Squamæ aris drach. sex, atramenti futorii drach. quatuor, cantharidū sesquidrach. veratri albi sesquidrach. sandarachæ drach. 1. Excipe cedria. Aliud Apii phasci. Ad mentagras quod citra cicatricis vestigiū sanat, facit & ad alopecias inueteratas, Cæterum alopecias in sole aut ad ignē illinito, & bulla excitata eam acu perpungito, ac humore excluso cum ceratis curationem perficito.

Post inductam enim cicatricem enascuntur pili, atq; hæc quidē in alopeciis. In lichenibus verò velut prædictū est utitur, pharmacum ipsum hoc modo habet. Sandarachæ drac. 2. auripigmenti drach. 2. squamæ aris drac. 2. veratri nigri drac. 1. elaterii drach. 1. ventrium cātharidū drac. 1. Excipe cedria.

Aliud, Cantharidum drach. 1. & dimidiam, veratri albi tantundem, auripigmenti drach. 2. squamæ aris tantundem, atramenti futorii drach. 1. scammoniæ drac. 2. Excipe cedria. Aliud, Auripigmenti vsti drach. 2. Squamæ aris cyprii drac. sex, chrysocolle drach. 1. atramenti futori drac. vnam, veratri nigri drach. vnā, aluminis scissi drach. 1. succi thapsiæ drach. 1. scammonii drac. vnā,
can

cantharidum drac. j. cedriæ quod satis est.

Emplastra viridia lichenica. Post exco-
riatoriorũ vsum emplastra viridia & alba
imponere oportet, quare rationabile est &
illorũ præparationes adscribere. Empla-
strum viride Pamphili. Hoc vsus est Pam-
philus in mentagra post rupturã bullarum.

Ceræ lib. i. æruginis rasæ * sex uncæ, resi- * *Alias*
næ frictæ lib. 2. olei cyath. 4. aceti acerrimi *quadrans*
quantũ sufficit. Aeruginẽ cum aceto in sole tem.

terere oportet, liquecibilia autẽ liquantur
& refrigerantur, ac frigefacta liquidis adii-
ciuntur. Viride Demosthenis. Ceræ

lib. 2. resinæ frictæ lib. i. æruginis rasæ triẽ-
tem * olei æstate cyath. 4. hyeme cyathos * *Vet. cod.*
sex, aceti quãtũ sufficit. Viride Herophili. *addũt hic*

Aeruginis drach. 2. mannæ drach. 4. adipis *mãne triẽ*
vitulini drac. 12. galbani. 3. 3. ceræ dra. 80. tem.

resinæ drac. 20. aceti quod satis est. Try-
phonis antiqui emplastrũ Euchrun à bono
colore dictum. Aeris vsti trientẽ, aluminis
rotundi sextantẽ, æruginis rasæ sextantem
salis ammoniaci sextantẽ, mannæ sextantẽ,
ceræ lib. 2. resinæ frictæ lib. 2. olei dextan-
tem, aceti quod satis est. Antonini empla-
strũ, Hoc Timocrates post lichenas exco-
riatos imponit. Ceræ drach. 100. colopho-
niæ drac. 200. squamæ cypriæ drac. 12. alu-
minis rotundi drach. 12. æruginis drach. 12.

man

mannæ drach. 12. galbani drach. 12. olei heminam vnam, aceti quod satis est. Annendæ his etiã emplastrorum alborũ præparationes: nam his post viridia vtendum est, mūdīs iam factis ab excoriatione vlceribus. Etenim cura habenda est vt citra calum cicatrix inducatur, atq; ea gratia eiusmodi pharmaca in vsum veniūt, quæ multã ad tactum lenitatẽ inducūt. Emplastrum album Aquosum appellatũ. Hoc Magnus circulator vsus est post lichenas excoriatos.

Spumæ argēti lib. 1. ceræ tyrthenicæ lib. vnã, olei sextariũ. 1. cerusæ lib. 1. aquæ sextarium. 7. spumã argenti, cerusam, & aquam terito, atque vbi leuigata reddita fuerint, paulatim oleum adstillato, assidueq; terito: & postquã vnita fuerint, in vas fictile translata igni imposito, assidueq; agitato, & absorpta iam aqua cerã iniicito, qua dissoluta in mortariũ transferto, & emollitis repositis vtitor. Emplastrũ Pancratia starũ siue athletarũ Trypherũ, id est delicatũ appellatũ. Facit ambustis item, vt citra cicatricis vestigiũ sanctur. Spumæ argēti drac. 25. cerusæ drach. 25. plumbaginis lotæ drac. 25. ceræ drach. 26. terebinthinæ drach. 16. olei heminã vnã, atquæ tantundem, cõponito vt dictum est. Megetis chirurgi. Cerusæ lib. 1. ceræ lib. 1. terebinthinæ vnci. 1. spumæ arg

argenti lib.1.olei libr.3.aquæ sextarios.2.
cōponito. Diophanti ad ambusta & inter-
trigines. Cōseruat faciē rosaceo dissolutū.

Spumæ argenti* torrefactæ drach.2.me. * Aliàs lo-
dullæ ceruinæ drach.16.cerusæ torrefactæ, sicut
drach.12.ceræ drach.8.terebithinæ drach.8. & cerusæ
thuris drachm.8.olei heminas quatuor pro lota nō tor-
more cōponito. Manna emplastrū, me-refactæ ha-
dicamentū accōmodatū. Spumæ argenti bent vet.
drach.100.cerusæ drach.100.ceræ drach.50.cod.
terebinthinæ drach.25.mānæ drach.16.alu-
minis scissi drach.40.olei heminas.2.& dimi-
diam, cōponito & reposito vtitor. Affrictis
porrō & extrictis lichenibus à quocunque
tandem medicamento, præsertim verò ab
excoriatoriis, subscriptis vtendum est.

*Compositio Menecratis quæ pro-
teus excoriatorium ap-
pellatur.*


Picis brutiæ pellucidæ siccæ & electæ
drach.2.& dimidiā, resinæ pinus pellu-
cidæ lib.1.& quadrantē, certæ ponticæ tan-
tundem, galbani quadrantē, aceti heminam,
vnā, liquefcebilia ad splendidum ignem do-
nec nō inquinent coquito, deinde galbanū
adiicito, atque vbi dissolutū fuerit, ab igne
ablatis, acetū paulatim instillato assidueq;
moueto animaduersione habita ne ebul-
liat, & in sumpto iam aceto, pharmacum in
ma

magnum mortariū transferto ac diligenter terito, donec ad melinum colorem reducatur, deinde in pelliculam albā inspissatam repositum seruato. Vsu verò exigente, in pelliculas quantum ad integendos affectos locos satis est infarctum imponito, & tertio quoque die soluito, nonnunquam vsque in diem duodecimū imponito, ita vt quatuor fiant solutiones. Hoc pharmacum squamas discedere facit, & corpora attenuat, ac solida facit ad cōueniētes excoriationes. Quæ Archigenes in secundo pharmacorū secundum genus pharmaca scripsit, ad papularū in mento eruptiones, & ad ficosas eminentias. Papularum in mento eruptiones, ex myrti baccis malicorio, argēti spuma, æris flore, paribus partibus exceptis, cum vino obline. In ficosis verò menti papulis, mentagris appellatis, & ab aliquibus lichenibus agrestibus siue feris, faciunt quidem robustiora ex his quæ ad lichenas relata sunt. Amplius autē & quæ ad psoras & lepras describentur. Mirabiliter verò hæc cōpositio cōuenit. Atramenti sutori drach. 1. veratri nigri drach. 1. auripigmenti drach. 1. ventriū cantharidū drach. 2. Quidam etiam obol. 3. insuper addūt, tritis vtitor cū oleo, aut cedria, aut rosaceo, praefricō prius loco: sunt enim bullæ, quibus per specilli cuspī

spidē ruptis, rursus affricato, quo penetrare
pharmacum possit & mordere: deinde post
horam fomento adhibito, ceratū rosaceum
imponito. Hoc vsque quo ad cicatricē per-
ueniat facit. Quod si primum nō exuperet,
iterū iterumq; illinito. Facit & ad lepras &
leucas alopeciasque & p̄soras excellenter.
*Heraclida Tarentini, ex libris ad Antiochidem,
ad capitis & menti ficosos tumores, atque
etiam alijs partibus eminen-
tia vlcuscula.*

Elaterii & salis pares partes misceto ac
vtitor, Superne verò lini semen crudum, ex
aqua imponito, aut ficus paruas tritas. Eo-
dem etiam ad tubercula vtendum est.

De dentium affectionibus. CAP. VIII.



DX dentiū affectionibus, aliquæ
sanè omnibus euidēter apparēt,
Quemadmodum quum perfo-
rati sunt, aut denigrati, aut de-
triti, aut neque frigida ferūt, neque calida:
sed ex vtrisque, aut altero solo dolore eis
cōtingit. Quædam verò non manifestè ap-
parent in ipsīs affectiones, veluti quum ipse
æger se sentire dicit circa corpus dentis do-
lorem in profundo obortū. Quidam enim
contradicunt asserentes, quum os sit dens,
eum citra dolorē affici, veluti quū aliquan-
do prominentiores per limulam deterere
cogi

cogimur, aut etiā ob aliam quampiam causam, de quibus paulo pōst mētionē faciam. Nunc enim citra rationalem & naturalem demōstrationem, testimoniū his perhibere volo, qui ipsum dentē dolere aiunt. Etenim quum ego aliquādo dolerem, diligentē super meipso animadversionem habui, utpote qui iam audieram de hac dubitatione, percipique manifestē non dolentem modō, sed etiā pulsantem dentē quemadmodum carnosæ partes inflammatione vexatæ consueverunt. Quare mirū mihi videbatur quod & hæc affectio quam phlegmonem siue inflammationem appellamus, in dente oriri posset, qui lapideam & durā substantiā habet. At qui quum etiā alio tempore dentem dolerem, manifestē sensū non ipsius dentis, sed gingivarū dolorem eum esse, inflammatis videlicet ipsis ut etiā citra coartationem dolerent, quin & ob vicinitatē dentium natura durorū, aucto dolore ob coartationē. Quapropter vtriusque doloris sensum expertus, alium quidem in gingivæ, alium in ipsius dentis substantia esse clarē scio, & id asserentibus testimoniū præbeo, Quòd ipsi aliquando dentes dolent. At verò & nervi, qui ad radicem dentis enatus & substratus est, dolorē aliquando fieri, nervo imaginationem cōfusam & indiscriminatā apud plerisque.

rosque exhibēte, tanquam ipse dens doleat, cōsentaneū rationi est: nam & huius rei manifestum periculum in meipso feci, & sanē remanet adhuc parua doloris portio, exempto dente, in nerui inflammatione, quū dolor nerui leuior tātū reddatur, ex eo quòd cōcretio nō amplius tēdatur ad ossiculum tensionē operante, & quòd liber factus respirationē quandam habeat, eumq; remedia quæ adhibentur cōtingere possint, Neque enim per cōtactum, neq; per distributionē, possibile fuerit inflammatū neruū curare, vtrinq; à dentium locellis coarctatū, & ab anteriori parte ab ipso dente. Si verò liquidi per omnem suam substantiā facti appareant dentes, nihil mirum est ipsos quid inflammationi simile pati, Cui rei ex eo quis amplius fidem habeat, quòd ex nutrimento ferè per omnē animantis ætatē incrementū accipiant. Id quod euidenter sæpenumero apparet in his dentibus qui exemptis oppositi sunt, utpote qui semper augescūt. Quātum verò augescūt, tantum in ciborū mansu deteruntur. Quum verò impossibile sit incrementum accipere citra nutrimentum, omnino duabus affectionibus & his cōtrariis obnoxii erūt, inopiæ videlicet & reduntantiæ alimenti quod eis suppeditatur. Inopia igitur aridiores & macriore salimen-

C

tumq; non sentiētes, & ob id tenuiores eos reddit, Redundantia verò cōsimilem in eis affectionem excitare potest, qualis est circa carnosas partes inflāmatio. Eius igitur curatio fiet iuxta eundem scopum quē habent propositū qui inflāmationes curāt, qui sanē est vt redundantia euacuetur, partim discutiendo, partim eam repellendo. Cæterū tenuitatis dentiū ob alimenti inopiā remedium nullum est: laxari enim tunc & moveri ipsos necessariū est, cōpage ipsorū laxiore facta, quum non solum ipsi dentes, sed & locelli eos cōplectentes sint attenuati. Hac itaque affectio senibus accedit citius aut serius, velut etiā magis aut minus, Quæ verò proportionē ad inflammationem habet, magis iuuenes corripit. Auxiliari tamē etiam senibus oportet, auxilio gingiuis exhibito: ita autem appellantur carnes quæ dentes cōprehendūt, vbi primum ē locellis emergunt. Ipsas itaque adstringentibus medicamentis robustiores, & magis circa dentem adstrictas facere oportet, tanquam quæ & ipsæ aliquid ad hoc faciant vt stabiles & ægrè mobiles sint dentes, quod ipsum aliàs ob exactam cōpagis ipsorū cōglutinationē cōtingit. At verò foramina dentiū ex humorum acrium & erodentiū influxu perficiuntur, velut vlcera in cute citra externam cau

causam, Verùm in cute id assiduè & multis,
 In ossibus rarò contingit, quanto videlicet
 minus quàm cutis noxæ exposita sunt ob
 duritiã naturalem. Manifestũ igitur quod
 erosorum corporũ medela erit per resicca-
 tionẽ vitiati influentis humoris, qui si pau-
 cus fuerit, localibus auxiliis ex resiccantibus
 pharmacis contingere medela potest: eorũ
 verò materiam paulo pòst dicemus, Si verò
 multus influens humor fuerit, vniuersi capi-
 tis ratio ac prouidentia habenda est, atque
 si ipsum quandoque propter totum corpus
 affectum sit, etiã reliqui corporis cura ha-
 benda erit. Porrò erosos dentes qui id mali
 præ mollicie perpeSSI sunt reddere oportet
 duriores & affectioni minus obnoxios, atq;
 id per austera & acerba medicamenta. Cæ-
 terũ liuidos redditos per resiccantia cu-
 rare oportet, vt qui ex humorum vitiato-
 rum influxu id patiantur, Simili igitur cu-
 ratione indigent cum perforatis.

De gingivarum curatione.

C A P. I X.



Inguis ex inflammatione dolen-
 tibus optimum pharmacum est
 oleum lentiscinum caliditate tem-
 peratum ore retentum, Sit autem
 recens, nam vetustius tanto recentiore pe-
 ius est, quanto ætate antecellit. Imponatur

C 2

aiutē vasculum in quo calefit lentiscinum, in alud maius vas quod aquā calidam multā cōplectatur. Maximopere itaq; inflammationi gingivarū hoc cōducit. Nec verò minus etiā si iuxta aliam quandam partē, tum pelliculæ linguā ambientis tum succingentis totū os, aliquis dolor ob inflammationē oriatur, dolorē sedat lentiscinum. Repellit enim citra molestiā & absq; asperitate, quā pleraq; austerorum habent, discutitq; citra mordacitatē, cuius rei inflāmatis præcipuus vsus existit. Quidam verò medici cōmuni errore inducti inflammata lædunt: quare ea re semel perpēsa de cætero vitare oportet. Existimant enim, si adstringentia solum id quod influit repellēdo, inflāmatis prosunt, atq; aliquādo etiā quid ex contento circa inflāmatā partē, ad venas mēbrū ipsum nutriētes exprimēdo. Verisimile ob id esse id quod amplius adstringit amplius prodesse. Eodē modo etiā id quod magis digerēdo discutit, magis auxiliari opinātur, quā ea quæ moderatē idē præstant, nō animaduertentes quòd alterutrū ipsorū intensum inflāmatis dolorosum existit. A vehemēter adstringentibus enim partes simile quiddā cōtusioni perpetiuntur, nimirū quū substantia ipsarū violenter cōdensetur. Ab acribus verò erosioni quid simile cōtingit. Meritò
igi

igitur moderatū in vtraq; facultate immor-
deratis præfertur. Hæc igitur sufficienter
mihi præfatus videor. Caterū de affectio-
nibus circa dolores deinceps narrabo. In
dolore dentiū citra gingiuarū inflāmati-
onem, aliquādo in ipso proprio dentiū, velu-
ti dixi, corpore, aliquādo verò in nervo do-
lorē fieri cōtingit. Vehementissimis igitur
opus est medicamentis, siue quis repellere,
siue discutere velit doloris causam, siue hu-
mor sit, siue flatus ventosus. Et propterea
sane pleraq; ipsorū ex acerrimo aceto præ-
parantur. Adscribam autem ex ordine quæ
aliorum relatione nobis tradita sunt, initio
ab his quæ Archigenes tradidit sumpto.

*Que Archigenes ad dentium dolo-
res conscripsit.*

Dolentes dentes colluant acri aceto
calido cum galla. Aut halicacabi ra-
dice cum aceto & galla. Aut pinguibus te-
dis in aceto feruefactis. Aut myrti ramu-
lis cum pice in aceto tepefactis. Aut hyo-
scyami semine & foliis cū aceto. Aut ce-
dria, vel propoli, vel nardo, vel solano, aut
succo eius, vel cappari, vel alliis, vel myrti
ramulis siue in aceto, siue vini fece calida
feruefactis. Aut polii foliis vel ipsa herba,
vel agrestis cucumeris radice, vel marru-
bio singulis cū aceto, pipere, & nitro. Aut

radice chamaeleonis eodem modo. Aut hyssopo vel staphide syluestri, vel ruta cum vino. Aut pulegio cum aceto mulso. Aut platanipilulas, vel rosas aridas, in vino albo ad tertias coquito, & vinum in fictili seruato, eoque assidue dentes colluito. Eodem modo vttere pētaphylli siue quinquifolii, quæ ab aliquibus eupatorium dicitur, radice cocta ex vino, aut pulegii largè cocti decocto. Aut cornu cerui in posca coctū colluito. Aut brassicæ cauliculos tres, & foreos drach. 2. in aceti sextario vno ad tertias coquito, & colluito. Egregiè verò facere fertur ranæ in aqua & aceto probè coctæ decoctum, diutius ore retentū. Mirificè facit dens caninus vstus & tritus deinde cū aceto coctus & ore retentus. Aut malicorio & galla aceto incoctis vtitor. Aut squilla ex aceto calido. Aut squillæ medullam in minutas partes dissectam, & in feruēs acetum iniectā, in vase fictili cōdito ac inueterari finito, vase in asinino stercore ad dies. 30. defosso, & vtitor. Aut asinino lacte colluito. Hoc & eos qui mobiles sunt corroborat. Aut halicabi corticis, & tedæ aceto feruefactæ decocto largè incocto colluito. Aut cornu cerui in aceto & garo incoctum colluito. Aut idem ex aceto colluito. Aut tithymalli radicem in vino ad dimidias coctam

Etiam colluito. Aut hyoscyami radicē aceto mulso coctam colluito. Aut tedarum ramenta, malicorium, alumen rotundum, siue scissum, in aceto ad tertias, coquito, ac tepidum colluito. Aut helxines radicē in aceto ad tertias coctam in ore detineto, atq; ubi os salina refertum fuerit, eo aperto effluere finito. Aut alium & harundinē alexandrinam acerrimo aceto feruefacta colluito. Aut hyssopum, aut thymum, aut origanum, per se & simul aceto cocta colluito. Aut pyrethrum cum hyssopo, & colocinthidis medulla, similiter in aceto coquito, liquoremq; ex eis longo tēporis spacio in ore cōtineto. Aut colocynthidem vino calido macerato, & diutius ore teneto. Multam enim pituitam ducit & dolorē leuat. Aut alliorū & erucæ seminis, ac nitri decocto collue. Aut ranunculum in vino coquito & præmundato prius dente colluito. Aut sycamini, hoc est mori arboris lac in vinum infunde, simulq; lanas succidas in ipsum exprime, tepefac, & per lanas sordidas molæ infunde, Extrahit pituitā & dolorē tollit. In his omnibus Archigenes catalogum fecit pharmacorum incidendi, discutiendi ac calefaciendi vi præditorum, rarò aliquid ex acerbis admiscens, quale est ipsa galla. Porò quum semel tantū solanum poluerit, mi-

ratus sum cur id ammisceri velit, quum nulla ratione iuuare possit præterquam ea iuxta quam colica pharmaca prosunt, stupefaciendo videlicet doloris sensum. Quid igitur amplius parabilium Apollonii relationem faciã, quum parũ absit quin omnia cõprehenderit Archigenes? Quando quidem verò Apollonius ipse quibusdã à se traditis testimonium præbet, tanquam euestigio sedantibus dentium dolores, Visum etiã mihi est illa ipsa adscribere secundũ ipsius Apollonii verba, quæ hoc modo habent.

Apollonij, euestigio dolores dentium sedat.

ALliorũ nucleos. s. thuris masculi obolos. 3. myrti ramulos longitudinis duorum palmorũ duos, ex his folia decerpta per se terito, similiter & allium & thus, deinde simul omnia in nouã ollam coniicito, & aceti heminam vnã superfundito, ac coquito spatula ex teda agitando donec ad dimidias redigatur, atque ita tepido vti-
tor. Oportet autem liquorem hunc in dolente parte ad multum tempus tenere donec liquor ipse consumatur. Commodum est & ante hoc balsami succum colluere, aut corticem imponere super dolentem dẽtem. Qui si non adsit, panacis succo contuso, inde defluentem liquorem instillare.

Post

Post prædicta Archigenes remedia perfo-
ratorum dentium cum dolore &
absq; dolore conscripsit, in
hæc verba.

Oblitionibus porrò & epithematis eius
modi vtitor. Sori ægyptium resi-
na terebinthina exceptum obline, idem-
que cauernæ inde. Aut compositionem ex
duobus piperi generibus inde, nardino aut
rosaceo dissolutam & maximè amygdali-
no. Quin & in aurem eiusdem partis in-
stilla: summè facit. Aut sulphur viuum ly-
cio exceptum in cauernam inde, aut præ-
mundato denti obline. * Aut gallam tritā ^{*Hæc ex}
lycio aut terebinthina excipe & dente præ ^{vet. cod.}
mundato obline. Aut pulegii comam tritā ^{addita}
denti indito. Cæterum in maximis dentiū ^{sunt.}
doloribus summè facit hoc. Anguis sene-
ctam exurito, & cum oleo ad mellis solidi
spissitudinem redigito, ac dentem præpur-
gatum ex eo integito, omniaque circumlita
oblinito, itemque cauernis indito. Aut sene-
ctam anguis non vltam dentibus apprimi-
to, & excidēt. Aut vermes terrenos tostos
cauernæ præmundatæ insperge. Aut ara-
neorum oua vngueto nardino diluta inde.
Aut melanthium torrefactū cum oleo obli-
ne, atq; vbi parumper concluso ore tenuerit,
pituitam collectam reiicere iube. Aut

C 5

piper vel canchry, hoc est rosmarini semen
 opio exceptum in cauernā inde. Porro vbi
 veluti inflammatione correpti fuerint, ni-
 trum rubrum & ossium perfiorum nucleum
 vnita resina excipe, & dentem ex eis intege,
 ac donec deciderint sine, in cauernam verò
 piper, spumam nitri, & galbanum cū melle
 inde. Aut strigmenta cū pipere eodē modo.
 Aut pyrethrum cum myrrha. Aut succum
 cyrenaicum & piper æquali pondere cum
 galbano. Aut melanthium, & alii dimidiū
 eius, ac modicum salis simul trita obline,
 dolorem tollit. Aut blattæ pistrinariæ
 auulso capite adipem cum rosaceo calefa-
 ctum & in aurem instilla, & in cauernam in-
 de. Aut gallam tritam cum cedria adhibe.
 Aut in aurem denti vicinā oleum sesaminū
 in quo vermes terreni cocti sunt instilla,
 Verū in ipso dolente dente hyoscyamū cō-
 terant. Aut hederæ albæ cacumina quinque
 cum rosaceo terito, & in mali punici puta-
 mine tepesacta, bis aut ter in die in aurē vi-
 cinam instillato, Quin & ipse fructus cū vi-
 uo tritus, denti illitus iuuat. Cæterū his re-
 latis Archigenes etiam hæc subdit. Summè
 facit cruentatis gingiuis, Alumen liquidum
 duplo aloës pondere addito admotū. Aut
 alumen scissum & myrtum tenuissimè tri-
 ta affricato: Vbi verò restrictæ fuerint mel-
 le

le ipsas illinito. Aut nucleorum ossium siue
 macherarũ persiorũ partes. 2. myrrhæ par-
 tem. . præmundato denti indito. A dolore
 asserit. At verò quassatis & dolentibus den-
 tibus cauterium ignitũ admovento. Apo-
 phlegmatismi pituitã extrahētes. Post præ-
 dicta verò Archigenes ita scripsit. Apo-
 phlegmatismi optimi sunt in dentium dolo-
 re. Staphis agrestis per se & cum pulegio
 manducata. Aut quod intra gallã est nigrũ
 dolenti dente cõterat, sinatq; pituitã efflue-
 re. In oppositam autẽ aurẽ duos hederæ co-
 rymbos cum rosaceo tritos instilla. Aut
 myricæ fructus drac. i. spumæ nitri drac. i.
 aluminis parum, aliorũ nucleos. 3. myrti fo-
 lia pauca, cum aceto ad dimidias coque, spa-
 thula ex teda agitando, idq; decoctum col-
 luendũ ac ore cõtinendũ præbeto. Deinde
 hiantē ore pituitam effluere permittito, &
 post hoc rosaceo ore colluto, ptisanam sor-
 bendã exhibeto. Si verò ex colluendo ali-
 qua circa os vlcerata fuerint croco & rosa-
 rum succo inungito. De fomētis. Fomēta
 ad dentiũ dolorẽ faciunt, forinsecus ex sale
 torrefacto, & milio in sacculos cõiectis, aut
 per sordidos panniculos probè calfactos,
 Quin & Epithemata cõducũt citra aquam
 apparatus, velut sunt quæ ex hordeacea fa-
 rina fiunt, siue ex semine lini. Ipsius ve-
 rò

rò dolentis dentis fomentū hoc' modo adhibeatur. Origani aridi ramulum in feruens oleum tinctum dolenti denti supernè affricato. Aut ricini cauliculum eodem modo. Aut staphidem agrestem stilo cuiuspiam acuto infixam, eodem modo. Aut cera dolenti denti imposita, specilli extremum calidis. assiduè adhibe. Aut opopanacem & peucedani succum vnita linteolo illigato, & in feruenti oleo liquefacito, Quum verò incœperit feruere pharmacum, denti imposito & cum specillo apprimito. Vtere mane & vesp̄ri, & simul fomentum forinsecus & intrinsecus velut dixi, ante cibum adhibe, similiterque post cibum, multo spatio temporis interposito vtere. Caterū species fomenti & hæc est. Dentem valde bene præpurgato, & agro contacto ac hiare iussu, hyoiscyami semina suffito. Quod si ad nullum prædictorum malum ipsum cedat, & dolor vehementer perseueret, tenui rebello dentem perforato, ac dictis remediis vtitor: hoc enim modo magis prodesse consueuerunt. Si verò neque sic profeceris & videatur dens tollendus esse, Citra dolorem tollere possis valde cōuenienti pharmacum hoc. Pyrethrum acerrimo aceto addies. 40. condito, terito, & reponito, Vsu verò exigente, reliquis cera obturatis & pro

probè munitis, ipsum dolentem præmūdatum hoc pharmaco integito, deinde hora interposita digitis extrahito, aut scalpello exigito. Aut Soricum acerrimo aceto ad multos dies imposito, & excidet. Aut plum baginem tritam cerato exceptam imposito. Educunt fortiter tithymalli succus & soricum galbano imposita.

*De his quæ Apollonius scripsit in
primo parabilium.*

PRimum quidem eorū caput, sunt colutiones dentium doloribus conferentes, quæ nihil amplius habent his quæ Archigenes tradidit. Secundo loco refert quæ ad erosos dolentes dentes imponantur & indantur. Tertium locum obtinent fomenta & vstiones. Quartum suffitiones ad dentium dolores. Quinto habentur commaturationes & purgationes. Sexto gargarisationes. Septimo postremum capite ea scripsit quæ in dolore dentium auribus infunduntur, quorum nullius mentionem facere volui quum si quis ea expetat ex libro illius petere possit, qui non adeo difficulter parabilis existit. Ego sanè his quæ Archigenes prodidit contentus fui. Quum verò Apollonius quæ naribus infunduntur consequenter tradat, visum est mihi etiam ea ipsa apponenda esse.

Quæ

Quæ in dolore dentium naribus infundantur, Ex appollonio in primo parahitum.

Radicis betæ succum per se in nasum instillato, & solues dētium dolorem. Cuius quantum tribus digitis apprehendi potest, & myrrhæ magnitudinem fabæ, & duplum interioris cucumeris terito, & lacte muliebri mixta in collyria redigito, eaque in vtrumque narem indito, atque ita attrahere iubeto, donec quis quinque stadia percurrere possit, deinde pharmacum emungat. Idem ad aurium dolorem facit.

Ne erosi dentes vacillent, neque fœtorem faciant.

Veratrum nigrum erui magnitudine melle cocto exceptum cauernis inde. Ad dentes denigratos. Testam Calainam assatam ac tritam dētibus affricato. Hoc etiam gingiuas corroborat. Aliud, Sal fossile melle subactum in testula torreto, terito ac modica myrrha ammixta similiter affricato. Aliud, Pulegii partē. r. salis tantundem, melle subacta, in eodē donec in carbonem transierint torreto, ac trita dentibus affricato. Aliud. Caricas exurito ac terito, modicaque nardo ac melle ammixto vtor. Hoc & gingiuas com-
primit. Aliud, Polentā accerrimo aceto subactam exurito, ac tritam dentibus af-
fri

fricato. Hoc & gingivas fortificat. Aliud.

Alabastritæ vsti drach. 8. pumicis vsti drach. 4. salis torrefacti drach. 3. tritis eodem vtere modo. Ab horum vfu collutione vtendum est, vino odorato in quo ad multum tempus iris sicca fuit macerata.

Quæ Asclepiades in. 1. externorum ad dentes scripsit. Heracida Tarentini ad. motos dentes.

VTendum est spodio cyprio, vt per id gingiuarum comprimantur, itemq; verbasci radicibus coctis: postea ablutio fiat ex aqua myrti, aut rubi, aut lauri: deinde spodio rursus adinoto, quies præcipiatur.

Aliud, Veratri nigri manipulū, radicis mandragoræ drachm. 4. radicis hyoscyami drach. 4. in vas fictile conuicito, & vini chii aut coi quā optimi heminas tres superfundito, ac ad prunas luculentas ad dimidias coquito, indeque liquorē excolatū ore retinendū præbeto. Aridum ad motos dentes. Terebinthi fructuum torrefactorum drachm. 8. aluminis scisci vsti drachm. * 8. balauſtii drach. 2. gallarum drach. vnam, croci drach. 1. myrrhæ drach. vnam, tritis vtitor. * *Aliud. 2.*

Aliud, Cornu cerui vsti drach. 8. Rhois rubri drach. 4. omphacii drachm. 2. balauſtii drach. 4. corticis pinus drach. vnam, myrrhæ. Min

* Aliàs. I. Minnæ drach. i. tritis vtere. Collutio
 * Cod. re- ad molarium dolores. Radices smyrni
 tu. addit cum aceto mulso coquito, & excolatum li-
 myrrhæ quorem ore tenendum exhibeto. Aliud,
 drac. i. cui Rumicis agrestis radicem & platani pil-
 quæ sequū lulas ex aceto mulso coquito, atque vt di-
 tur consen- ctum est exhibeto. Commanducationes
 tire viden ad molarium dolores. Canchryos drach-
 tur, nam mas. 2. origani drac. * 2. piperis albi dra. i.
 sic habet * vuæ p. sse albæ, aut alterius quàm pin-
 vet. code. guissimæ sextarii dimidium. Vuam passam
 vuā pas- diligenter tundito, reliqua verò origanum
 sam dili- videlicet & canchry, & piper probè tri-
 gēter tun- ta adicito, misceto, ac instar malagmatis
 dito myr- emolito. Vfus verò tempore nucis pōticæ
 rham mel magnitudinem cōmanducandam præbeto.
 le dissolui Postquàm verò collecta pituita fuerit,
 to deinde ægrum hiare ac prouere oportebit, quo li-
 arida tun quor facilè profluat. Quo factò, vinum col-
 sa tenui luere iubeto. Aliud, Vuæ passæ pinguis
 cribro cer- exacinatæ sextarium dimidium piperis albi
 nilo, ac acetabulum, grani cnidii drach. 2. spicæ nar-
 vuæ passæ di drach. 2. cassiæ drac. i. pyrethri drach. 2.
 & myr- myrrhæ drach. i. apparato ac vtror vt di-
 rhæ adijci ctum est. Ad corrosos dentes præserua-
 to, misceto tium. Per huius vsum conseruaueros
 & c. impf. dentes absque dolore. Zingiber cum aceto
 verò hoc lo mulso coquito ac probè terito, inde que in
 co mancus cauernam indito, forisq; dentem ex eo in-
 est. regi

regito. Aliud. Hederæ lachrymā gal-
bano misceto, aut tithymalli, siue ficus syl-
uestris succo dissoluito, ac vtitur vt dictū
est. Aliud dolorem tollens ad dolentes
& erosos dentes. Conducit itidem tussi.
Succi papaueris drac. duas, piperis albi tussi
& cribrati drach. vnā, myrrhæ drac. duas.
styracis drac. duas, galbani drach. vnā, passī
quod satis est his excipiendis, contundito
simul & catapotia formato, denti q; circum-
ponito, & cauernæ indito. Aliud, Suc-
ci hyosciami drac. duas, myrrhæ drac. duas,
opii drac. duas, galbani drach. duas, styracis
drac. 2. zingiberis drac. 2. piperis drac. 1. suc-
ci syriaci tantundē: passī quod satis est, præ-
parato ac vtitur vt dictum est.

*Molare emplastrum bonum, quod in mul-
tis miraculo fuit.*

L Achrymæ oleæ drac. 1. myrrhæ drac. 2.
veratri nitri drac. vnā, seminis * balsa- * Vet. cod.
mi drac. vnā, styracis drac. vnā, piperis drac. habet opo-
vnā, hyoscyami drach. vnā, succi papaueris balsami
drac. vnā, castorii obolis 4. galbani drac. 6. drach. 1.
succī cyrenaici drac. vnā. succi carpasī drac.
vnā, panacis drac. vnā, sagapeni obol. 4. py-
rethri obol. 4. staphidis syluestris drach. 2.
cedriæ quod satis est quo emplastri formā
acquirat. Aliud, Sulphuris viui drach.
quatuor, bituminis drachm. duas, amurcæ

D.

olei drac. quatuor, picis liquidæ drac. octo,
 * Piperis cedriæ drac. duodecim, * piperis drac. qua-
 longi ha- tuor, opii drac. quatuor, staphidis syluestris
 bet cod. drac. vnam, veratri nigri drac. vnam, grani
 vet. & cnidii drach. vnam, opopanax drach. vnâ,
 præterea picis aridæ lib. i. Arida aceto excipito, dein-
 pyrethri de liquida affundito, ac ablatis vtitor, ex
 drach. 4. pharmaco hoc molaris dens est integēdus.

*Ad tollendos dentes vt citra dolorem
 excutiantur.*

PYrethrum in acetum coniectū ad dies
 3. aut 4. finito, deinde terito & dolenti
 denti imposito, vicinis dentibus optimè
 præmunitis, & dolente diligenter præmun-
 dato, ita vt per 2. aut 3. dies dentem ex hoc
 pharmaco integas: ita enim citra dolorē ex-
 cutietur. Aliud, Cucumeris syluestris
 radices eodem modo vt pyrethrum præpa-
 rato, ac vtitor identidem vt dictum est.

De mobilibus dentibus ac prominentibus.

RElatum à me etiam ante est, quod ob
 senilem ætatem aliqui dentes refic-
 cati mobiles fiunt, modicum omnino au-
 xilium ex adstringentibus pharmacis qui-
 bus gingiuarum coartantur ferentes, referetur
 autem & nunc quod aliqui ex plaga mobi-
 les fiunt. Quidam verò etiam citra plagam,
 in quibus coniecturam facio, Neruum qui
 ad radices ipsorum adnatus & substratus
 est,

est, per multam humiditatem rigatum, laxatum esse, & ob hoc resiccantibus medicamentis ad curationem opus esse. Postquam autem motos dentium reliquis prominentiores factos videbam, & maximè quum & plaga id essent perpessi, visum est mihi eos lima atterendos esse in tantum quantum super reliquos prominent, ne scilicet oppositos sibi offendant tū in loquendo, tum in manducando, atque sanè reperi experimentum mihi fauens ac testimonium præbens. Ferream itaque limulam quo celerius opus succederet feci, Multę enim aggressiones dentem mobilem faciunt, cui quiete & minimo motu opus erat, si saltem stabiliri debeat. Quandoque igitur eminentiæ inæquales apparent in dentibus, & iuxta aliquas tantum partes lima opus habent, Aliquando verò æquales sunt extremitates, & æquali similiter lima indigent.

Oportet autem gingivis linteolum molle vsque ad radices dentium circundare, deinde cum digitis sinistrę manus leniter amplecti, simulque tutè & citra compressionem, ne concutiatui cui limam adhibemus, atq; ita chirurgiã aggredi. Quòd si dolorẽ percipiat in admotione limulę, & quòd affecta pars digitis vehementius contingatur, quiescere quidẽ ab opere statim conuenit,

D 2

Vbi verò ex pharmacis quæ post referentur, interea aliquid exhibuerimus, rursus vt dictum est aggredi, iterumque modicè cessare, donec extremitates circa dentes, deterrantur, atque id non prima tantum die bis & ter, sed etiam sequenti faciendum est, ac imperandum ægro vt neque loquatur, neque durum aliquem cibum accipiat. Vtatur autem alimento succoptisana, & sorbitione ex alica, & pane madido, atque aliis ad hunc modum mollibus. Caterum materiei sylina quæ motis dentibus commoda est, talis existit.

Ab Archigene scripta, quæ mobiles dentes corroborant.

Mobiles dentium. stabilire volens, myrrha, pompholygis, aluminis scissi, amyli, æquales singulorum partes tritas adinoue. Aut oliuarum albarum succum & rutam melle mixta affrica, deinde nardum cum alumine liquido obline. Aut alumen rotundum cum duplo sale dentibus asperge. Aut aluminis scissi & misyos æquales partes cum cedria ad cerati liquidi spissitudinem redactas dentibus obline, & pituitam defluere sine. Quo facto, asinum lac colluant calidum, aut acetum, aut vinum in quo malicorium & galla sunt incocta.

Ad

Ad debilitatos dentes tum alios, tum molares.

MEl, ceram, æquis portionibus ad solem calida aqua diluito, & picis dimidium ammisceto, ac ad emplastri formam deducito, atque manducanda exhibeto.

Quod si aridum sit pharmacum, parum olei addito, Summè facit & mastiche chia commanducata. Cæterum in dentium stupore portulacam mādudent, Aut oleum calidum ore contineant.

De dentitione puerorum, ut Archigenes scripsit.

Infantibus qui dentiunt, si doluerint, canino lacte gingiuas obline, Aut si leporino cerebello infantis gingiuas illeueris, citò dentes proueniunt.

Amuleta dolori dentium reluctantia, quibus fidem deberi putant, hæc sunt.

Si batrachii siue ranunculii folia ei qui dentem dolet, in eiusdem partis brachium imposueris, dolore quidem liberabitur, Brachium autem exulcerabitur, cuius curam prout cōuenit facies. Si verò infans cui dentes prouenire incipiunt, dolores habeat, veteris cochleæ cornu pelliculæ illigatum pro amuleto appende.

De doloribus gingiuarum.

Gingiuis dolentibus collutiones ferè eadem faciunt quæ ad dolores dentiū sunt descriptæ, Magis tamen propriè facit

acetū cui hyoscyami radix est incocta. Verū inflammatis gingiuis alumē cum salis quarta parte tritum admoue: post morsum verò perceptum, vino aut foliorū oleæ decocto ipsas colluant. At verò fluxione laborantibus gingiuis & corrosis cum tumore & dolore, & per nomen depastis, præclarè conducit fomentū, quod fit per auiiscalpiū cui lana obuoluta est, in feruens oleum tinctum, & gingiuis vsquequo exæquetur ad motum & donec circumcirca albæ reddantur, Ita enim sistitur Nome, & ex sana carne id quod corrosum est connutritur: postea verò affriktionibus vtere & his quæ ad dentes sunt descripta, propriè autem conuenit galla tenuissimè trita acetabuli mensura, cum myrrha magnitudine fabæ, tritis itaque ac leuigatis vtitor. Quod si enascēdens ægrè exit & compūgit gingiuam, cyperum cum butyro & vngēto susino iuxta exortum illinito. Cæterum in Epulide, hoc est supercrescente ex inflammatione carne, atramentum sutorium cum pari myrteo, & modico alumine scisso admoueto, Faciunt pleræque etiam ex Antheris, id est floridis appellatis compositionibus.

Que dentes præseruent.

Quin & doloris dentiū præseruatiua Archigenes his verbis tradidit. In
den

dentium doloribus præseruantia à dolore
cõueniunt eiusmodi. Tithymalli radices
in vino ad dimidias coquito, & bis in mense
colluito, ac nũquam dolebis. Optimè con-
seruat citra dolorẽ, & fortes dentes, si fabã
ægyptiã, reiecto interno amarulẽto, triue-
ris ac dẽtibus & gingiuis semel in anno af-
fricueris. Aut alumine scisso cum modica
myrrha confricato, & nunquã erodentur: si
verò adstringat hoc nimium, melle vtitor.

Aut granorum Iuniperi paruorũ, & cu-
pressi foliorũ parem portionẽ, & gallæ pa-
rum, melle cocto excipito, & in pastillos
drachmæ pondere reducito, ac vtitor vnũ
ex his cõmanducando, insuperq; vino odo-
rato colluendo. Aut iridis illyricæ nucis
ponticæ magnitudinẽ mande, similiterq;ue
collue. Aut salĩ gallã omphaciten in vino
odorato coctã misceto & mādito. Optimè
prætereà tũ ad præseruãdos à dolore den-
tes, tũ ad corroborandos eosdẽ, ac pariter
gingiuas, ampliusq; ad decorẽ faciunt sme-
gmata subscripta. Lanas succidas linteolo
illigatas exurito, deinde salis tertia parte
addita affricato. Aliud, Aut dasypodis
caput vstũ tritũ. Aliud, Aut salem & mel
ad cerati formam terendo redigito, deinde
mundo linteolo illigata exurito, & ammi-
xta iride illyrica modica dentes cõfricato.

Quæ Andromachus scripsit ad omnes dentium dolores.

Compositio molaris eadem hora dolorem sedens. Piperis, pyrethri, succi tithymalli, galbani, singulo. drac. vna, galbano excepta in cauernam inde. Molaris Antiphanis, etiam si non præmundaris indito, & dentem ex ea integito. Seminis hyoscyami, opii, nitri, myrrhæ, pyrethri, piperis, singulo. drac. vnam, galbani drac. duas, tritis ex vino vtitor. Alia molaris qua vtor.

Aluminis scissi drac. i. viperis albi. drach. 2. opopanacis aut piperis longi obol. 4. foreos obol. 4. gummi aqua macerati drac. 2. ceræ duplum totius ponderis omnium, ceram in aqua calida tritam reliquis misceto, atque ita vtitor. Alia Chereæ. Myrrhæ drac. i. veratri sesquidrac. pyrethri ses-

* Addita quidrac. * Iridis illyricæ sesquidrach. Jalsunt hæc minis scissi obol. 4. Aqua terito, & dentem ex vet. co. oblinito, ac superne ceram imposito. Alia græc. molaris ex libris Aphrodæ. Aluminis scissi drach. quatuor, myrrhæ obol. tres, piperis grana quinque, ego obol. tres accipio, & melius facit, Resina excipe & præmundatæ cauernæ inde, & splenium illitum superim-

pone. Alia molaris eiusdem. Etiam non præmundatæ cauernæ hanc inde, & superne spleniū ex pharmaco ite impone, & probè
fa

faciet. Seminis hyoscyami, succi papaueris, myrrhæ, nitri, pyrethri, piperis albi, singulorū partem vnā, galbani partes duas. Cum aceto tritis vtitor. Alia ex libris Aphrodæ. Succipeucedani drach. vnā, succi papaueris drac. vnā, tithymalli myrsinitæ, succi cyrenaici singulorum drac. vnā, galbani drach. vnā, & dimidiam. Galbano excipe & in cauernam inde, & vbi præpurgaris dentem in splenium illine, in vna hora dolorem sedat. Molaris bona. Scissum alumen papaueris succo exceptum indito & oblinito. Alia vt Aristocrates. Papaueris drach. duas, sagapeni sesquiobolum, succi cyrenaici tantundē, piperis drachmam vnā, sphondylii tantundem, myrrhæ tantundem, galbani, pyrethri, croci, singulorum tantundem, mel quo strigmentitiam spissitudinem accipiat.

*Ad dolores dentium, gingiuarum, aliaq;
multa Aristocratis gram-
matici.*

MEllis lib. vnā, aceti acris sextarium vnum, aluminis scissi sexuncem. Alii liquidi trientem habent, coquito donec nigrescat. Ad dentes motos. Aluminis scissi partem vnā, manna partem vnā, tritis vttere conspergendo motum ex eis dentem.

D s

Ad erosionem & dolorem dentium.

Q Vinquefolii radices in vino coctas à cœna colluēdas præbe: coquito autē ad tertias. Aliud, Rumicis radices cū vino aut aceto coquito, & modicū auripigmenti triti inspergito, ac liquorem ore retinendum exhibeto. Coquatur itidem ad tertias. Ad gingiuas madore laxas. Pyrethri drach. 4. thymi drach. duas, aluminis scissi obol. tres, iridis illyricæ drac. vnā, tritis vttere, ac gingiuis impone.

Pythij, ad motos dentes, gingiuas humore gravidas, & subcorruptas.

A Lumen scissum chartæ inuolutū vritur, deinde tritum rubrica coloratur, atque ita gingiuis admouetur, similiter que subcorruptis inditur.

Dioclis medici ad dentium dolores.

G Albani, opii, piperis, ceræ, staphidis syluestris, grani cnidii singulo. drachmā vnā, trita cera excipito & illinito.

Aliud commodum ad corrosos dentes.

Succū silphii indito, aut ipsam radicem. Aut galbanū cū pipere. Aut opiū cū galbano. Facit & opopanax in cauernas infartus. Ad dentiū dolores. Soreos drac. 2. aluminis scissi drac. 2. misyos. 3. 1. Aridis vtitor.

Smegma quo vtor gingiuas contrahit.

Cornu cerui vsti lib. 2. lanæ succidæ te-
ne

neræ quadrantē, salis ammoniaci trientem, piperis albi sextantem, costi vnc. i. aluminis scissi sextantem, lentisci, & perdicii herbæ vstæ cum lanis, aut per se solum, vtriusque quartam libræ partem, foliorū malabathri vnc. vnam, contusis simul vtere.

Quæ Crito scripsit ad omnes dentium affectiones, Quædam ex eis etiam gingiuis conferunt, & ad fœtorem oris, & nigros in superficie dentes.

HOrdeum & salē melle ac vino subacta in charta ligato ac vrito, & ex leuigatis gingiuas confricato. Aliud, Atramentum sutorium, alumen, putamina, mali punici dulcis, equalibus partibus trita ac leuigata, gingiuis in ieiunio affrica: deinde vino adstringente collue. Aliud ad gingiuas vlceras. Nitri vsti, cyperi vsti hordei vsti singulorum pares partes leuigatas cum melle illine. Aliud ad gingiuas & dentes motos. Iridis trientem, corticis pinus trientē, aluminis scissi vnc. i. aridis vtere. Aliud ad motos dentes. Lentiscū, myrtū, gallā, in vino cocta colluenda præbeto. Aliud, Salis partes duas, aluminis scissi vsti & acri aceto extincti partem vnam, tritis vtitor, deinde vino colluito.

Ad motos dentes stabiliēdos. Atramentum sutorium cum oleo terito, & cum lana
den

dentium radicibus admoueto. Facit & ad erosos dentes cera exceptum & inditum. Item cum myrto pari tritum ac melle exceptum. Aliud, Vlmi corticem in vino coquito, & decoctum ore tenendum exhibeto. Item cerui cornua in vino cocta. Ad corrosos verò dentes capparis radicem cum acriaceto ad dimidias coquito, ac tepidum colluito. Cortice item eodem vti-
tor modo, Idem ad dolores facit. Fomentum dentium corrosorum & dolentium. Sulphuris viui partem vnam, butyri partem vnam, liquefacito & cum his per auriscalpium foueto. Aliud, Dentes ex sale præfricato, & lixiuium tepesactum mediocri tempore in ore contineto. Oportebat hic apponere, In gingiuarum dolore hoc conuenire.

*Compositio molaris eadem hora siue die
dolorem sedans.*

Piperis, pyrethri, succi tithymalli, galbani, singulorum drac. vnam terito & galbano excepta in cauernam indito. Alia,
Piperis sesquiobolum, grani cnidii tantundem, galbani sesquidrach. spumæ nitri obol. duos, croci sesquiobolum, iridis siccæ sesquiobolum, rosarum tenerarū drachmæ dimidium, trita melle excipe, & ad emplastri

stri formam redactis molarem dentem intege. Ad corrosos molares. Melanthium torrefacito & ex acri aceto terito, indeque molariū cavernam integito, & nō amplius erodetur, sed manebit vt est. Quidā etiam nitri drachma vna cum acri aceto vtuntur.

Ad idem, Castorii, pyrethri torrefacti, galbani, singulorum æquales partes mixtas indito. Vt molaris citra dolorem tollatur. Farinæ * cicerum puræ drach. * *Vet.cod. habent hic* duas, succo tithymalli exceptas denti imponito, supraque hederæ folia addito, & ad *farinæ* horam finito, tollito, & sua sponte in minu *erui.* tas partes frangetur. Facit idem ad erosos.

Verūm vsus tempore ceram emollitam circumponito. Aliud, vt dens digitis tollatur. Præmundato antea circūcirca dentem, & foreos, gallæ omphacines, staphidis syluestris, aluminis scissi, sulphuris vini, piperis longi, æquales partes leuigatas cedria excipe & impone, ceraque liquefacta dentem circumline. Eiicit ipsos etiam pyrethrum, & tithymalli myr finitæ succus cum farina erui ad massæ fermenti modum coactus & impositus. Aut pyrethrum ad dies quadraginta, aceto maceratum & denti circumpositum. Aliud ad sauciatos. Castorii, pyrethri, opii, galbani, singulorum æquas portiones mixtas indito.

De

*De dentifriciorum compositione,
quibus utor.*

QUædam ex dentifriciis à me cõpositis experimẽto comprobata, & generosa efficacia prædita, digna mihi visa sunt quæ conscriberentur, & primùm sanè ea quæ frigidas dentium affectiones curant, siue ob immoderatam frigida aquæ potionem, siue ex fructibus per niuem frigefactis, siue ex quibusdam aliis eduliis, aut potionibus, sint productæ, Insuperq; si propter frigidum humorem è capite in ipsos defluentem ortum habeant. Dentes igitur ob humorem refrigeratos magnificè iuvat Apophlegmatismus, Quomodo verò hunc præparare oporteat, alio capite priuatim conscriptum habes. Eos verò qui citra humorem frigefacti sunt, per solum medicamentum hoc quod nunc referetur curare decet. Præstat eo etiam post apophlegmatismum uti, ut nō solùm nocuum euacues humorem, sed etiam generatā ab ipso affectionem persanes. Compositio pharmaci hoc modo habet, Accipito herbas, duas, quarum altera sideritis, altera perdicias appellatur, easque domi sensim citra solis admissionem siccato, ut neque humidæ amplius, neque siccæ adeò extent, & vrito in tantū, ut vbi primùm contusioni & sectioni aptæ

aptæ fuerint, ab vrendo cesses: vilescit enim
 & corrumpitur vis earũ si diutius vrantur,
 In alia porrò ollula sal fossilis vratur cum
 alumine scisso, Attico melle subactus, De-
 inde hæc aliis permixta tundatur, & per an-
 gustissimũ excreta cribrũ, rursus in morta-
 rio terantur, Melius enim erit pharmacum,
 quãto diligentius fuerit leuigatũ. Utẽdum
 autem eo est solũ ad dentes cõfricandos,
 citra gingiuarum circũsitarum contactum,
 nisi humore fuerint prægnantes, Quĩ enim
 resiccandi vim habeat pharmacum, aptum
 quidem est gingiuis humentibus, inimicum
 verò siccis: attamẽ ipsas dentiũ radices post
 gingiuas sitas, eo cõfricare oportet itidem
 vt ipsos dentes. Cæterũ eorũ quæ in cõ-
 positionem miscentur eiusmodi ponderum
 proportio esse debet. Herbarũ quidẽ post
 vstionẽ drach. 16. Salis verò cum alumine
 vsti drach. vndecim. Ante verò vstionem
 vtriusque herbae par pondus misceatur. Sal
 autẽ quadruplici aluminis pondere ammi-
 sceatur. Aliarũ autem rerũ nihil vratur, sed
 arida iniiciantur iuxta subscriptã apponde-
 rationem. Comæ origani drach. 2. piperis
 drach. 9. in alio exemplari drach. 2. pyrethri
 drach. 2. costi drach. 3. seminis apii drach. 3.
 iridis illyricæ drach. 5. mentæ siccae drach.
 duas, cornu cerui aut caprae vsti drach. 2. se-
 sele

seleos, hyssopi, vtriusq; drach. 2. Si odoratum esse velis, calsiæ aut amomi drach. 2. ammi-
sceto. Si verò in regis vsum præparaueris,
cinamomi drach. vnam, addito.

Ad mobiles dentes aliud, quo vtor.

SEminis callitrichi libram vnam, alumi-
nis scissi & rotundi vtriusque quadran-
tem, spicæ nardi sextantem, malabathri fo-
liorum vnc. i. piperis albi vnc. vnā, pyrethri
drach. quinque, cōtundito & cribrato simul
omnia, ac gingiuvs vsq; ad radices dentium
ad moueto. Timocratis dentifriciū. Ad
gingiuas madore laxatas, putrescentesq; ac
cruentatas, mobiles molares, concussos den-
tes, ozænas, putrefactiones, parulidas, &
omnia oris vitia, ac dentium dolores. Acci-
pito herbae perdicidis modium italicum,
alii minā habent, salis albi tenuis sextarium
vnum, mellis hexagiū. Contundito vt mas-
sa friabilior reddatur, qua in ollam nouam
coniecta, ollā luto figulino obturato: oper-
culum autem adaptetur circa mediū perfo-
ratum, quo per ipsum foramen rudicula im-
missa pharmacum super prunas positū agi-
tetur, donec neq; fumosum quippiā neque
vaporosum efferatur, Deinde ab igne tol-
lito & refrigerato. Et sumito ex hoc toto,
drach. i. 4. piperis albi drach. quinque, pipe-
ris nigri drach. sex, pyrethri drach. sex, alu-
mi.

minis scissi vsti & vino austero extincti
drach. duas, pumicis, myrrhæ, hyssopi, semi-
nis apii, pulegii, singulorū sextantem, men-
tæ, iridis illyricæ, vtriusque drach. tres. Hæc
omnia in sole præficcata tundito & cribra-
to, ac reliquis ex olla leuigatis, ammisceto.

Aliud, Perdicii recentis drach. decem,
mellis drach. quatuor, aluminis scissi drach.
quatuor, iridis illyricæ drach. quatuor, pi-
peris albi drach. octo, nigri drach. tres, pu-
micis drach. duas, myrrhæ drach. tres, pyre-
thri drach. duas, mentæ siccæ drachm. tres,
hyssopi drach. duas, pulegii drach. duas, se-
minis apii drach. duas, herbæ sideritidis drach.
tres, salis fossilis drach. 14. Perdicium & si-
deritidem ac mel & salem mixta vrito: alu-
men verò per se vstum vino extingui-
to, deinde simul omnibus contusis vtitor.

Aliud, Salis assati cum melle & perdi-
cio drach. 14. aluminis scissi, assati, & vino
austero extincti, iridis illyricæ, vtriusque
drach. quatuor, helxines, myrrhæ, mentæ
siccæ, singulorum drach. tres, pulegii ficci,
pumicis, pyrethri, hyssopi, seminis apii, sin-
gulorū drach. duas, folii malabathri drach.
duas, piperis albi drach. quinque nigri drach.
sex. Tufis & cribratis vtitor. Aliud, Sa-
lis tosti cum melle & perdicio drach. 14.
pulegii drach. duas, aluminis scissi vsti &

E

vino austero extincti drach. quatuor, iridis
 illyricæ drach. quatuor, piperis albi drach.
 quinque nigri drach. sex, pumicis drach. 2.
 myrrhæ drach. tres, mentæ drach. tres, py-
 rethri drach. duas, hyssopi drach. duas, semi-
 nis apii drach. duas. Sal lotus, melle probè
 subigitur, tritusque in ollam nouam mitti-
 tur. Deinde etiam perdicium inditur, sale
 vndique conspersum: quo factò, operculum
 ollæ imponitur, ipsaque luto oblita in cli-
 banum datur, indita torrentur, & exempta
 simul cum aliis teruntur. Oportet enim val-
 dè leuigata in vsum adsumere. Smegma
 dentium quo albi & odorati redduntur, &
 ab erosione adseruantur. Nitri vnciam
 vnam, testæ sepia vnciam vnam, myrrhæ
 vnc. vnam, tritis vtitor. Dentifricium
 optimum. Aluminis scissi sex uncem, ma-
 stiches vnc. i. eomæ rosarum quadrantem,
 iridis trientem, tritis vttere, indeque aquam
 tepidam colluendam præbe.

*Dentifricium Damocrati
 inscriptum.*

Libellus parvus extat Pythici appella-
 tus, quem Damocrates Pythicum in-
 scripsit, ab eo qui ipsi pharmacorum ori de-
 finitorum cōpositiones tradidit appella-
 tione ducta, in quo sanè libello iuxta finem
 etiam hæc conscripta reperiuntur.

Si

Si dentificijs voles vti bonis,
 Quæ candidos custodiant, immobiles
 Dentesq; reddant, oris & grauolentiam,
 Laxasq; gingiuas sedent, & comprimant.
 Album hoc parabis optimum sic pharmacum.
 Cerui cape cornu sic quater vsti quàm optime
 Quartam libræ partem, salis solam libram.

In alio exemplari sic reperi,
 Cerui cape cornu sic quater vsti quàm optime
 Libram mediam, rursus salis uncias duas,
 Ammoniaci sicci nec amari hinc amplius,
 Alicæq; mastiches chiæ solam libram,
 Costi quadrantē, aut paululum quid amplius,
 Albiq; iunci tantum, & albi mox piperis
 Vnam unciam, malabathri at uncias duas.
 Contusa, cribrata omnia hæc mortario
 Utenda præbebis modo quem dixero.
 Quod si velis parare quando ad phlegmonas,
 Et vtile gingiuis cruentis, saucijs,
 Carnemq; callosam simul prominentibus,
 Aluminis coniungito his scissi libram.

Aliud Damocratis dentificium,
 Verum magis parabile hoc fortasse erit,
 Et promptius factum, minus nec commodum,
 Admixta & hoc quadam simul dulcedine.
 Multum Siderit in viridem capito herbulam,
 Magnam in nouā quam tu patinā mox inditam.
 Miscebis hordeo recenti, sed modico.
 Sic boi deo ut posito sequatur fasciculus

Herba, sal hinc, herba atq; iterū, mox hordeum.
 Fiantq; tam diu vicissim hec omnia,
 Donec patina omnem expleris amplitudinem,
 Ut mox supernum rursus herba habeat locum.
 Furnoq; mox calente, vel clibano indita:
 Torrenda per noctem fines, vel sic potius
 Vrenda, quo teriqueant ita promptius,
 Cribroq; mox sed arctiore hinc excuti.
 Odoris addes gratia his, parum tamen,
 Albi piperis thurisq; mox item modicum,
 Hinc iunci odori plus, cyperiq; optime.
 At omnibus mixtis probè & iam sepositis
 Plus mastiches aridae chie coniunxeris,
 Dabis sed hinc in vesperam volentibus,
 Maneq; rursus, maximè puris viris,
 Sed colluant à pharmaco mox Bromium
 Lymphis sociatum, & maxime hoc in vesperam,
 Sed mane acetum mulsum aquosum præstiterit,
 Oris leuandis turpibus fœtoribus.

Aliud Aurelii. Alumen in testa area
 aut figulina vrito, ac vino austero extin-
 guito, eiusque dodrantem accipito, & ma-
 stiches sexuncem, thuris vnc. vnā, folii ma-
 labathri drach. quatuor, cyperi drach. 4. mi-
 sceto ac vtitor. Aliud quo vtitor.

Cornu cerui vsti drac. 2. mar-
 moris vnc. i. origani
 drach. quatuor,
 vtitor.

Com

Compositio pharmaci dentes praeservantis.

TRagorigani drach. 2. hyssopi drac. 4. herbae perdicii seu perdicialis, melle & sale tenui subacta, & in olla exusta, donec in prunas redigatur, quadrantem, piperis drac. 4. tundito & cribrato, & post usum reponito, Neq; dolebunt dentes neq; findentur, neq; parulides producuntur, neq; gingivae superflua carne redundabunt, neque fluxione infestabuntur. Habebis autem os odoratum, & splendidos dentes. Quidam falsamenta in olla exusta ad pharmacum addunt, aut etiam cybium. Si quis enim eorum cinere per se utatur, dentis dolorem non percipiet.

FINIS QUINTI LIBRI.

CAPITA SEXTI

LIBRI.

De affectionibus in ore, & de pharmacis ad eas commodis.

Cap. I.

De crustis in ore.

Cap. II.


Ad columellam siue gurgulionem.

Cap. III.

De pharmacis ad ulcera oris aphthas appellatas.

Cap. IIII.

E 3



CLAVDII GAL- LENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE

pharmacorum secundum locos,


Liber sextus, Iano Cor-

nario medico, in-

terprete.

*

*De affectionibus in ore, & de pharmacis ad
eas commodis. CAPVT I.*



VERVS profectò sermo
est, quẽ plerique artifices
in ore habent, Quod non
idem sit, neq; simile, à vi-
ua voce discere, & ex li-
bro legere. At verò indu-
strii & natura prudentes homines, nō vulga-
rem sæpe vtilitatẽ cōsequuntur, si in libros
incidant nō obscurè conscriptos. Itaq; quũ
sciam nō paruã vtilitatẽ ex hac tractatione,
primũ quidem amicis ac sodalibus accessu-
rã esse, qui videlicet etiã per opera cogno-
uerũt quãtã vim habeat rationalis Metho-
dus ad medicamentorũ copiã parandã: de-
inde

inde verò etiam aliis qui optimarum rerum studiosè fatigare non cessant, re gratam facere volens, ad huius operis explicationem progressus sum, nō festinabundo & cōpendiario docendi modo in hoc instituto, sed prolixo & longiore, quali etiā in sermonibus, quos frequenter citra scriptum ad amicos habeo, vti soleo. Præstat rationalis auxiliorum inuentio experimētatrici: quemadmodum etiā anteq̃ iam mihi in sermone de fauciatis nervis dictum est, in cognitione vniuersalis facultatis pharmacorum, quorum vsus circa singulas affectiones contingit. In pharmacis itaq; ori destinatis: ob id stomaticis appellatis: velut est quod ex moris cōstat omnibus notum, primus medendi scopus est cōmunis omnium partium inflammatarum, deinde cōsequenter alter scopus priuatim ex ea quæ curatur. Quæ igitur sit affectio inflammatorum prius nosse oportet, si ex ipsa indicationem quaudā auxiliorum accipere velimus. Prædidicimus autem & prius demonstratū habemus, Inflammationes ex calidi sanguinis influxu fieri. Didicimus etiā quod hūc ipsum influxum in principio quidem reprimere ac repellere oporteat, præterquam si ad partē aliquā principalem recursurus sit, atq; aliud quoddam grauius malum effecturus. Verū nunc adeo

nihil opus habemus eiusmodi determinationibus, sed velut memores adhuc simus quomodo totum corpus præparare, ad curationem affectuum circa quancunq; partem consistentium oporteat, ad institutum progrediar. Etenim venæ sectione utimur, & purgatione, & clysteribus, & inedia, ubi totum corpus apparuerit aut multitudine humorum refertum, aut eorundem malicia vitiatum. Si verò neutrum horum adsit, statim ad curationem per localia remedia peruenimus. Quomodo igitur inuenire ipsa oporteat cum qui oris inflammationes ritè curare velit, præsens sermo statim te docebit, & quomodo inuentis convenienter uti oporteat: sodalibus autem in memoriam reuocabo, quòd sæpè viderint me pharmacis eorum medicorum qui me in consilium aduocarunt, curantem eas affectiones, quarum gratia vocatus fui. Impossibile enim est pharmaco ritè uti eum qui vim ipsius non no- scit, juxta cuius efficaciam auxiliatur. Eodem igitur modo in inflammationibus in ore consistentibus, communis scopus omnium ipsarum si adsumpserit ex natura particulæ indicationem, reperiet primum quidem genus pharmacorum quibus uti cōueniet. Deinde cōsequenter etiam particulares in ipsis differentias siquidē præcognouerit simplicium
cium

cium pharmacorum facultatem, velut iam sæpe est demonstratū. Genus igitur repellentium pharmacorum in principio inflammationum, in refrigerantiū materia situm est. Hæc autem ipsa quum duplicia existant vt didicimus. Quæcunq; adstringendi natura prædita sunt, efficacior vim habent ad influxum citius repellendum. Inest autē ipsis statim etiam vis cogendi & densandi superficiem corporis, cui adhibentur. Communis igitur scopus hic est prohibēdi incipientes inflammationes, ab ipsius affectionis indicatione insuentus. Alter verò à particulæ quæ curatur natura ipsi accedit: quū sciamus rariorem esse ac molliorem superficiem tunicæ oris, non paulò quàm est cutis, quæ totum corpus ambit. Inest autē & aliud quiddam particulis oris, atque id duplex, quod non adest ipsi cuti. Insuauitatem enim medicamentorum quæ adhibētur sentiunt, & duos meatus subiacentes habent, per quos in ventrem & pulmonem defluere quippiam ex stomaticis pharmacis potest: quale est quod per atramentū sutoriū constat. Et sanè medicus neq; imprudens, neque in expertus facultatis pharmacorū, vbi hoc miscuerit pharmaco ori destinato, multo quidem fortius ipsum reddet, verūm vehementer lædens, si quidē ad gulā, aut asperæ

arteriæ extremum quid præterlabatur, atq;
 hæc quidem vt statim occurrentia, per ipsa
 verò & ventrem, & asperam arteriã, & pul-
 monem. Adest autem pharmaco ipsi circa
 gustum insuauitas, quæ tum vsus tempore
 molesta est, tum per totam perseverat diẽ,
 adeò vt etiã in cibis accipiendis iniucunda
 sit. Huiusmodi itaque fortibus & quæ ve-
 nenosam habet facultatem nõ conuenit, vt
 ad affectionum oris curationem, nisi magna
 necessitas vrgeat. Neque verò de inflamma-
 tionibus solùm hunc sermonem intelligere
 oportet, quum neque ex harum indicatio-
 ne ipsum inuenerimus, sed communem esse
 de omnibus oris affectionibus intelligendũ
 est, vt qui indicationẽ ex ipsa particulæ na-
 tura habet. His igitur consideratis ab eo
 qui pharmacum ex succo mororũ cõposuit
 primũ quidẽ ipsum cum melle coxit, quo
 repositum in promptu haberet per totum
 annum, nõ illo tempore solũ, quo expressio
 fructu, succo vti licet. Melior enim solus
 est incipientibus inflammationibus, ideoque
 me sæpe ipso in huiusmodi inflammationi-
 bus vti vidistis. Durabilior autẽ est priua-
 tim cum melle apparatus. Appellauì autem
 durabiliorem, non solũ eo quod non æquẽ
 citò corrumpitur ac cum citra cocturam ex
 melle reponitur ita vt sequenti anni tem-
 pore

pore eo vti non possimus: sed etiam propterea quod vtilior est, ad sequentia inflammationis tempora, vsque ad perfectam curationem. Quemadmodum enim in principio commoda sunt pharmaca id quod influit repellentia: Sic post principium vsque ad finem, pharmaco opus est ex vtrisque mixto, repellente videlicet & discutiente facultate prædito: ac primo quidem tempore adstringens præcellere oportet, ad finem verò discutiens, interposito verò tempore æquales vtrorumque partes esse conuenit. Quando verò velut induratum quiddā de inflammatione relinquitur, penitus non conuenit adstringens ad diffusorium ammiscere, nisi prius totum corpus sit euacuum. Atqui neque in principio bonum est diffusorium adstringenti ammiscere. Cæterum qui pharmacum ex succo mororum composuit, parū ex croco & myrrha ei commiscuisse videtur, quod communem habeant facultatem cōcoctoriam inflammationum: priuatim verò crocus quidem adstringat, myrrha autē calfaciat, intantū vt sufficienter discutiāt. Penetrat enim magis in altum corporū myrrha quā crocus, vtpote substantiam tenuium partium habens, atque ex hoc duplicem vtilitatem exhibet, simul introducens quidem secum vires ammixtorum

rum, & per sanās vsque in altum inflammata. Et tamen adiuuāt se mutuo crocus & myrrha in penetrando in profundū, crocus quidem velut impellens myrrham: myrrha verò velut dux præcedens peditem sequentem crocum, si ita dicere liceat, deducens. Quemadmodum enim crocus, ob adstringendi vim, minus habet substantiam tenuium partiū quàm myrrha, Sic myrrha substantia tenuiorum partium prædita citius quidem vim suam in altum transmittit citius autem etiam ad cutem recurrit, simul secum efferens ea quæ in profundo sunt attenuata. Hanc igitur recursus eius velocitatem impediunt adstringentium mixturæ: non enim hoc solus facit crocus. Est itaque in pharmaco stomatico ex moris appellatorum mororum succus, qui non modicam habet adstringentem qualitatem, & facultatem, tum alia quædam etiam ammiscetur vbi quis forte pharmacum reddere velit. Hæc igitur adstringentia deducuntur quidem per myrrham, quæ vicissim ab illis compellitur, atque ita se mutuo adiuuant, quo vis ipsorum amplius progrediatur. Vidistis autem sæpè me ad pharmacum ex moris in principio quidem Rhois succum aut vuae acerbæ succū, quem priuatim omphacium appellant, ammiscere. Si verò hæc non
ad

ad sint, florem rosarum, aut ipsas rosas sic-
 cas, balaustium, cytinis, & malicorium ari-
 dum, & gallum omphacitin appellatam.
 Amplius autē & pini corticem, itemq; thu-
 ris, & tum hypocisthidis, tum lentisci suc-
 cum, & ut cōpendio dicam, omnia adstrin-
 gentia, præterea ea quæ corruptentem ha-
 bent facultatē, quam venenosam vocant, &
 lethaliū species quædā existit. Didicistis
 enim quod non omne lethale statim etiam
 est venenosum. Quemadmodum autem in
 principio inflammationis harum rerū mixtu-
 ra fortius efficit medicamētū stomaticum,
 Sic quum restiterit quod influit nullo eius-
 modi opus habet solo. Sufficit enim tunc id
 pharmacū quod crocum & myrrhā assu-
 p̄t ad inflammationē concoquendā. Nam
 ubi iam fuerit concocta, addimus etiam ali-
 quid ex discussoriis, velut sæpē vidistis me
 iniicere spumam nitri, & aliquando ipsum
 nitrum, quod tenuium partiū existit, & iam
 ab omnibus Berenicium appellatur. Ultra
 hoc etiā sulphur viuum vocatū, aliquando
 etiam sapani, origano quādoq; in cocto, in-
 terdum etiā hyssopo, aut alio quopiā simi-
 li, pulegio videlicet, thymbra, thymo, cala-
 mintha hortensiac agresti. Hoc igitur mo-
 do quis rectē vtetur pharmaco ex motis, si
 iuxta indicationum vniuersalium quantita-
 tem

tem ipsius vsum permutet. Quousq; enim quicquàm influxerit, id ipsum repellere conuenit, vbi verò restiterit, concoctoria afferre, & deinde consequenter discussoria. Manifestum enim quod per huius methodi vsum, nemo qui simplicium pharmacorū facultatē nouit, vnquam auxiliorū inopia laborabit, siue per montes venetur, siue quid operetur in agro, siue in peregrinatione quandoq; præparatis careat medicamentis, velut Erasistratus scripsit, qui seipsum curauit ad rubi succum progressus, quum in illo loco Andronius pastillus præsens non esset. Quum enim sciret pastillū Androniū in adstringendo curādi dominium habere, materiā adstringentē perquisiuit, Non velut Serapion & Menodotus aiunt, empirica transitione ad simile vsus. Iuxta hanc enim vobis demonstraui plurimā dissimilitudinem succi rubi ad pastillum Androniū esse, paucissimam verò similitudinem iuxta vnū solūm, vim videlicet adstringendi. Verūm qui generalē facultatē quā vniuersalem vocant, nouit: in quacunq; materia eam reperit, confidēter ea vtetur. Huiusmodi autem materierum ingens est aceruus, quibus omnibus vti licet, ita vt solū fugiamus quæ vim quandā iniucundā aut venenosam habent. Sic igitur etiā ego pharmacū ex suc-

co nucum viridium preparavi, nullo doctore vsus, neque aliquod præscriptum sequutus. Cuius vim expertus sum multum aliorum stomaticorum facultatem excedentem, alia autem dico, id quod ex moris constat, & id quod ex succo rubi mororū præparatur. (ita enim rubi fructum appellant) & tertium quod ex musto, & quartum quod ex punicorum succo, & quintum id quod per adstringentia mala cōponitur, ex quorum numero optima sunt cydonia & struthia appellata, & post hæc ad præsentē vsum quæ Cestiana à Romanis appellantur. Caterū composita ex multis talibus sunt, quæ ex fructibus præparantur.

De stomatico medicamento ex nucibus.

EGo autem quando primū ex Alexandria in patriam redii, agrum pertransiui & inueni quendam hortulanum ab vva & consillis ac glandibus ferè suffocatum: utebatur autē collutione aquæ mulsæ rosæ in ipsa incoctis. Quum igitur vidissem fructum nucum in vigore esse, iussi detractum ab eis externum corticem, quo etiam tintores videram vtentes, statim in mortario cōtundi, & succum eius per linteum excolari nondum sciens quomodo iuxta crassitiem aut tenuitatem haberet: quum verò reperissem aquosum & compage tenuem,

gaz

gargarissare eum iussi ipsum hortulanum. Postquam verò valde tenuis apparebat, præcoxi: & mel commensurate, velut in eo quod ex moris fit fieri sciebam, ammiscui: atque vbi iam ad cōpagem mellis redactum esset, hortulano vtendū reliqui. Porro quū viderem celerrimam vtilitatem ipsi inde oboriri, præstabile ratus sum in multis experiri, atq; ex hoc sufficiente experimento accepto de facultate eius pharmaci, semper ipso vtor, velut nostis. Meritò itaq; mirandum nullum ex prioribus medicis aliquid de hoc pharmaco mente concepisse, vt tum parabili, tum generoso hoc succo vteretur, maximè quum viderint quomodo etiā manus inficiantur eorum qui virides nuces decorticant. Ex his enim apparet qualis sit earum succus, & quod agrè elui possit ipsarum adstringendi vis, adeò vt neq; per fortissima extersoria elui queat. Amplius autem adhuc miratus sum de medicis quod non cogitauerint fortem esse ipsarum vim, quum etiā tinctores videant eiusmodi nucum corticibus vti. Nisi enim in profundū manuum descenderet, & nisi per omnē substantiam lanarum penetraret, nō certè agrè eluibilis esset. Quum verò descendat, indicat planè substantiam succi tennium partiū esse, rationi autem consentaneū est adstringen

gēdi vim maximè proficere, vbi in eiusmodi substantia contineatur. Etenim quæ ex adstringentibus crassas partes habent, per adstrictionem cogunt & cōdensant superficiem corporum quibus adhibentur, & à progressu in altum ipsorum corporum sese impediunt. Quibus enim etiā aliàs ob substantiæ crassitudinem impossibile erat progredi in altum, his sanè amplius impossibile fuerit densato corpore iuuare id quod totum est inflammatum. Optimum itaq; esse nucum succum persuasus, vt qui etiam coctum cum melle gustarim nihil insuaue habentem, eum in quatuor partes diuido, & ad primam statim aliquid ex adstringentibus iniicio, ad secundam ex croco & myrrha, ad tertiam sulphuris quiddam ac nitri addo; quartam verò solam sinceram seruo, pueris vtilem futuram ob dulcorem, Imò etiam viris ob delitias mente fractis, & mulierculis. Ego quidem igitur à ratione inductus inueni, quemadmodum neruorum fauciatorum curationē, ita etiam hoc pharmacum quod omnibus præstat. Est equidem id quod ex rubi moris constat, fortius eo quod ex moris fit, quemadmodum hoc eo quod ex musto paratur, Omnibus autem his præstat id quod ex nucum succo inuenimus, in principiis quidem inflamma-

F

tionum cum his quæ fortiter adstringunt
 confectum: in vigore verò croco & myr-
 rha additis, quanquam etiam solum aliquan-
 do moderatas inflammations sanare queat.
 Quando verò humorem qui inflammatio-
 nem produxit impactum digerere ac discu-
 tere oportet, cum acrium mixtura comin-
 dum existit. Verum dixerit fortassis qui-
 piam mihi ex medicis pauperioribus, se am-
 plecti quidem ipsum medicamentum, si vi-
 pyxidem expleri iubeam hoc pharmaco se-
 mel preparato, Me autem præcipere, au-
 statim à principio quatuor facere compo-
 sitiones, aut vnā ex melle & succo compo-
 sitam reponere, atque vsu expetente ei am-
 miscere, vsq; quo quidem influxerit qui-
 piam inflammatis, ea quæ vehementer ad-
 stringunt, postquam autem quieuerit flu-
 xus, concoquentia: vbi verò euacuationem
 postulauerint ea quæ influxerunt, discutie-
 tia: operosum autem hoc esse & difficile hi
 qui domi non habēt suppellectilem omnium
 simplicium pharmacorum, Imò neque a-
 peregrinationes me commodam cōfectio-
 nē exponere, in quibus impossibile sit qua-
 tuor vnicuiusque medicamenti differentia
 circumferre: Ob id igitur excogitata sum-
 tum mihi, tum aliis etiam prioribus medi-
 cis, pharmaca medias facultates habentia

& ad peregrinationes idonea futura, & pauperibus medicis utilia. Quæ verò hæc ipsa sint, paulò post referam. Nunc autem pauperum medicorum sermoni respondere volo. Quemadmodum enim ipsi exilem apparatus laudant, sic oportet etiam diuitibus permittere, ut confectiones pharmacorum pro opulentia suæ dignitate comparent. Satis enim scio etiam ipse, non solum multos pauperes esse medicos, sed & qui ab ipsis curantur: quibus satis est ubi ægrotent, aliam cum aqua mulsam accipere, & mundum panem habere, aut aliquam farinam utilem ad cataplasma. Verum eum qui curandi tractationem scribit, omnis materiae meminisse operæ pretium est, quo tum diuitibus copia sit ipsis artificiosè utendi, tum pauperibus electio sit illarum tantum, quibus unusquisque pro oportunitate abundet.

De mediocorum pharmacorum compositione.

Dicamus igitur iam aliquid de compositione mediocorum pharmacorum, initio ab eo quod ex moris constat sumpto. Commune est autem omnibus mediis, ut congruens modus mellis ad succum ipsum decernatur. Inuenitur autem hic modus per experientiam. Vbi enim succum ipsum cum

melle miscueris ac gustaueris, si quidem apparuerit moderatè habere, rursus similiter ipsa miscebis. Si verò deficere quid videbitur, addes. Velut exempli gratia, In mororum succosi quinta pars mellis addatur, medium fuerit temperamentum, vt hoc modo coctum pharmacū plurimis valdè placeat, & hanc mixturam pauci reprehendant, alii quidem velut dulciorem, alii verò vt austriorem. Quemadmodum enim aliqui aquā mulsam dilutiorem, alii qui dulciorem libentius bibunt, Sic etiam his pharmacis vtrique delectantur iuxta propriam naturā. Quando igitur aliquis pharmacum sibi præparari postularit, semper vtrique vidistis me ei qui dulcioribus delectatur, plus mellis iniicere, qui verò contrariis, minus. In pharmacis igitur quæ deglutiuntur maximè coniectare oportet naturam eorum qui ipsa sument, Quod enim cum molestia aut inuicundè acceptum est, stomachum subuertit. In pharmacis autem stomaticis eiusmodi sinceritatem aliquando contemnere licet. Medium itaque temperamētum, velut dixi, succi ad mel, quintuplum habeat multitudine succum. Audito autem me diligenter animaduertens quibus vtor verbis in symmetria seu commensuratione medicamentorum quæ inuicem miscentur. Iam etenim præ

præcepi quintuplum esse debere multitudine ipsum succum ad mel, quod nihil differt ab eo si dicam mole quintuplum esse ipsum oportere. Vtrouis enim modo dicatur, mensurare oportet pharmaca permiscenda. At verò si pondere iubeam quintuplum esse hoc pharmacum, per lancem utique facere oportet symmetriam grauitatis ipsorum. Caterùm ad permixtionem succi ad mel, non est necessarium heminae aut cyathi meminisse, sed iussit dicere, quintuplum esse oportere succum, mellis respectu. Si verò quid aliud his ammiscendum sit ex dictis paulò antè, necessarium est dicere, quanta quantitatis mole ipsis existentibus, quantum addendum sit illorum in lance appensorum. Velut in ipso adeò pharmaco ex moris, in Heræ Cappadocis medicamentario libro, Mellis coniicitur libra vna, succi autem mororum lib. 6. ammiscet autem ipsis croci drachm. x. myrrhæ duplum, par etiam croci pondus coniicit ex succo vuae acerbæ, qui omphacium appellatur, atque eius dimidium ex alumine scisso. Mihi verò placet quintuplum succum ad mel coniicere: par autem pondus croci & myrrhæ, vtriusque drac. vnam & dimidiam, ita ut ex vtriusque tres drachmæ conflentur. Quod si quis omphacium addat, & vini austeri item hemi-

nam vnā, velut Heræ videtur, rectè sanè
 drach. vnā, omphacii addet. Si verò citra
 vinum præparetur, multo plus de ipso cōii-
 cere conuenit, si quidem medium tempera-
 mento pharmacum efficere velis vnci. vnā,
 si verò austerius, vt in principiis conueniat,
 nihil peccaris si omnino duas aut tres ammi-
 scueris. Quod si non sit omphacium, pro
 ipso rhois succum iñice: & si volueris par
 pondus vtriusque indere, neque sic quicquā
 deliqueris. Heras tamen in symmetria hu-
 ius pharmaci etiam hoc adscripsit, hoc mo-
 do. Quidam autem & heminam vnā dul-
 cis vini, mustum eum velle indicare palām
 est: prædixit enim vini austeri maris exper-
 tis heminam vnā. Mihi verò non placet,
 sufficiente melle iam coniecto, vnā cum hoc
 quòd & heminam austeri vini addidit, rur-
 sus aliam misceri vini heminam. Reddetur
 enim valdè vinosum medicamentum. Co-
 quunt autem hoc ex moris medicamētum,
 aliqui quidem à principio miscentes succum
 mororum, aliqui verò modicè præcoquen-
 tes. Heras autem videtur velle succum solū
 diutius coquendum esse. scripsit igitur hoc
 modo. Succum mororum heminas sex, ad strig-
 mentitiam crassitudinem coquito, deinde
 trita ammisceto, croci drach. vnā, & reliqua
 videlicet iam dicta. Quin & ego cēseo suc-
 cum

cum ipsum solum per se præcoquendū esse: deinde verò adiciendum mel, atq; vbi iam cacabum ab igne auferre velis, reliqua ammiscenda esse. Verum Heras videtur simul cum melle etiam alia ammisceri iubere. Et vinum quidem rationabiliter quis tunc ammiscuerit. Myrrham verò & crocū, melius est in fine cocturæ iniicere, eo vsque saltem cum aliis coquendo, aut olla in terrā posita mouēdo, donec omnia probè vniātur. Amplior autem coctura ipsorū, destruit facultatē aromaticorū medicamentorū. Spuma argēti equidē & plumbago, atq; alia multa metallica per cocturā meliora hūnt. Crocus autē & myrrha multaq; alia aromata in decoquendo vires amittunt. Itaque medii facultate pharmaci & symmetria, & coctura, moderatis inflammationibus congrua, ampliusque in maiorū vigore, atque insuper in principiis & augmentis eorundem conueniens, iam relata est. Caterū ad induratas inflammationes, quum iam præterierit vigor, & nihil amplius influxerit, venerit autem tempus discutiendi, ammiscere conuenit ad stomaticum pharmacum aliqua discussoriorum. Talia autem sunt, Spuma nitri, & ipsum nitrum molle, asæque petræ flos, & sulphur viuum. Sufficit porro ad prædictam medii pharmaci commen-

furationem ammisceri Nitri quidem vnciā
 dimidiā, sulphuris autē vncias duas. Quod
 si neque sic pręparatum habeas ipsum, neq;
 pręsto sit tibi nitrum, aut sulphur, aut asię
 petrę flos: organū in sapa, quā alii siręon,
 nostri omnes hepsēma vocant, feruefacito,
 stomaticoq; pharmaco addito, ac gargaris-
 sare iubeto. Si verō neq; sapa adsit, in aqua
 mulsa organum coquito. Nihil autem re-
 fert etiam si hyssopum coniicias pro origa-
 no, aut pulegium, aut thymum, aut thym-
 bram, aut calaminthen, aut mintham odo-
 ram, quam veteres hedyosmon appellant.
 At verō in vigore inflammationum, nō so-
 lūm nihil ex eiusmodi pharmacis adhibere
 oportet, sed etiam cōtrarium totum: atque
 rarō quidem stomaticis medicamentis vti,
 collutionibus autem & gargarismis miti-
 gatoriis concoquere inflammationem. Cu-
 ius generis est, Decoctum pinguium cari-
 carum, & oleum lentiscinum in duplo vase
 reperfactum. Quin & ipsum stomaticū phar-
 macum in vigoribus gargarissare cōuenit,
 aqua mulsa dilutiore permixtū, aut calida
 sapa: quę si non adsint, aqua calida. Pręua-
 lere enim oportet tunc mitigatoriū & con-
 coctoriū ductum, velut in declinationibus
 discussoriū, qui ex fortioribus constat me-
 dicamentis. Porro meum pharmacum ex
 fuc

succo nucum omnium aliorum esse fortis-
 simum opere experti estis. Ad vos enim so-
 dales loquor, in quorum gratiam maximè
 ad hanc tractationē progressus sum. Quòd
 verò etiam omnium vilissimum & parabi-
 lissimum sit, nemo ignorat, proiciunt eni-
 hortulani viridiū nucum cortices, vbi ip-
 sas decorticarunt, vt vel maximos corbes no-
 bis explere liceat gratis. Mel igitur solum
 vt pauperibus medicis (Nam & illis opor-
 tet nos ea quæ narramus communicare) de-
 ficit, quum eius fuerit penuria, nihil verò
 aliud, nisi quis vltro adeò aliud velit, Sæpè
 enim hoc modo confectū pharvacū, nihilo
 deterius apparuit eo quod ex moris con-
 stat, in quod tum crocū, tum myrrhā inde-
 bamus. Quin etiam si Alumen ipsi addere
 velimus, nō est necesse scissum iniicere. Suf-
 ficienter enim adstringit etiā liquidū, quod
 aliqui phorimon appellant, quod vilis pre-
 tii & maximè parabile in omnibus regioni-
 bus existit, tenuitate tamen partiū à scisso
 deficit, & ob id etiā minus efficax est. At ve-
 rò si hortulanus aliquis aut ruralis hoc phar-
 vacū sibi præparare velit, habuerit gratis
 quos coniiciat, cytinos aridos contusos &
 cribratos, Nominatur autē sic primogenita
 punica. Quo tempore enim arbor florere
 desinit, fructus ipsius apparet figuratus in

speciem punici mali, quem ablatum & reficcatum adseruare licet ad tempus fructus nuncum. In fine enim veris cytini generantur. Desinente autem æstate ad perfectionem veniunt nuces. Quin & in terram decidunt multi cytini, aut à vento decussi, aut alio quopiam modo, quos collectos ficcare licet, vt neq; hac parte egenos medicos quicquam impendere opus sit. Nostis autem acidorum & acerborum punicorum, (quorum fructus parum abest vt esitari nequeat) cytinos meliores esse, Quare etiam si ex arboribus eos auellas, aut nemo penitus te prohibebit, aut certè vilissimū pretium sibi dari pro eis postulabit. Cæterum balauistiū appellatū penitus tibi nō conuenit, & si quis colligere id velit, quemadmodum origanū, & thymbrā, ac thymū, atque alia huiusmodi, gratis licebit. Itaque si balaustium velit quis crudū tusum ac cribratū iniicere iuxta proportionem quā antea dixi, pari omphacio pondere, vtile pharmacū efficiet. At verò & cortices punicorum malorum, valde parabilis res sunt, adstringendi vim sufficientissimā habentes, & qui ad prædicta statim in principio coniici queant. Optimum autem pharmacum reddetur, si iuxta id tempus quo punica nondum perfectè matura sunt, nō tamen longè à perfectione absunt, eos

eos cortices detractos conieceris atque id statim in principio cocturæ succi. Oportet autem prius in mortario tundere, quo ipsorum vis vniuersa citius in medicamentum quod paras diffundatur.

*De confectiōe pharmaci ex malis punicis,
& malis, alijsq; stomaticis.*

QUum verò tres sint punicorum maiorum differētiæ, Aliqua enim ipsorum sunt austera, aliqua verò dulcia, & quædam acida, Siquidem sola austera iniicias, magis adstringens pharmacum reddetur: si verò dulcia, suauius. Quemadmodum sanè fortius fiet, si acida tantum indas. Ego autem consueui par pondus vniuscuiusque generis ammiscere. Nam & aliàs ipsa sola maturapunica mala integra vnà cum corticibus tundo, deinde succum exprimo, ac cum melle coquo, & non solum stomaticū pharmacum ori commodū habeo, sed & ad multa alia vtile, veluti rursus dicetur: atque fit hic succus ad omnia præstantior ex tribus punicorum speciebus, aut generibus, aut differentiis, aut quomodocunque quis appellare velit. Miscemus autem & ruborum fructus quos aliqui quidem à planta denominant, batina, hoc est rubina appellant: aliqui autem composita appellatione Mora appellant, apponentes quæ à rubis pro

producantur. Ex quibus sanè succus simili-
 ter succo mororum præparatus, melius illo
 pharmacū redditur: sed minus validum eo
 quod ex nucū succo paratur. Quin & malo-
 rum cotoneorū, & pirorum syluestrium, ac
 mespilorū succus similiter præparatus, sto-
 maticum pharmacū efficitur, deuorari que
 aptū, quū hoc quod ex nucibus constat de-
 uorare non liceat: quāquam enim nocuum
 non sit, velut atramentū sutoriū, tamē sto-
 macho non est cōmodum. Manifestū verò
 quod & ex punicis cōstans pharmacū aptū
 est fracto & cibos fastidienti stomacho: de-
 ficit tamen ab eo quod ex malis constat.
 Innocuus est etiam rubi mororū succus de-
 uoratus, velut etiam ipsorum mororū, sed
 succus rubi mororū habet quid quod sto-
 machum corroborat, quod ipsum mororū
 succus non habet. Porro mel his omnibus
 succis non eadem proportione iniicitur.
 Plurimo enim nucum succus opus habet, &
 post eum rubi mororum, modico autē ma-
 lorum, & punicorum, & pirorū syluestriū.
 Medius autē inter hos est mespilorum suc-
 cus. At verò & ex cornis ac brabylis, &
 prunis apud nos appellatis præparantur apud
 nos stomatica pharmaca, eodē modo quem
 in principio de moris recensui, in quorum
 omniū confectiōe rationē quandam com-
 mu

munem referam, hanc. Siquidem crassus apparuerit succus, statim mel ammiscere oportet: Si verò liquidior sit succus præcoquatur. Suscipit autem pirorū ac malorum succus: amplius verò etiam plurimorū fructuum, parem sibi ipsis mensuram mellis. Succus verò eorū quæ multū acerbæ sunt, velut est corni fructus, aliquando duplum, aliquando triplum mellis adsumit. Omnia igitur hæc citra noxam deuorantur. Si verò atramentum sutoriū ammixtum sit, nō valde deglutire oportet confectum pharmacum, præterquam si iuxta stomachum aut aluum vlcerosam affectionem fieri suspicemur, Quin & si in ipso ore maligna vlcera fiant, præstant ex atramento sutorio medicamenta. Sufficit autē drachma ad prædictam cōpositionem ammixta in qua vnam mellis librā coniici est relatum. Sed & plus quandoque rectè iniicitur ad vlcera putrefacta. Singula porrò quæ dixi iniicere licet aliquando & musto vuarū austerarum quas Aminæas appellant. Præstat autē vltimum mustum in hunc vsum. Quod enim in principio fluit liquidius est & aquosius. Iniicienda verò sunt ex prædictis pharmacis acerbiora, quemadmodum sæpè vidistis me aut punica mala, aut balauftium, aut cytinus, aut ægyptiæ spinæ fructum, aut corna,

aut

aut aliud quid ex huiusmodi adstringentibus ammiscere. Maximè verò aptus est Rhus, siue masculino, siue muliebri genere ipsum velis nominare. Est autem duplex, Alter obsoniis inspergitur stomacho commodus, alter à tinctoribus coriorum expectitur. Vterque verò musto incoctus stomaticum efficit medicamentum, cui ammiscere licet etiam alia iuxta eandem proportionem, velut in eo quod ex moris constat relatatum est. At verò citra mellis mixturam, mustum solum per se in mellis compagem redactum, exemptis etiam quæ aliàs induntur, bonum sit pharmacum in principiis, augmentis, & vigoribus. Ad declinationes autem si tedas addideris pingues, aut etiam intenuia frustula cōtusas & fractas easdem vnà cum Rhoë in mustum conieceris, deindeq; interposita vna die coxeris, donec suā ipsorum qualitatem in ipsum mustum transmittant. Tunc enim tedas quidem eximere ac proicere oportet, Mustum verò vsque ad aptam compagem coquere, quo videlicet illi inri cōmodè possit. Quæcunque autem prius ex adstringentibus iniici dixi in id quod ex nucibus præparatur medicamentum, ea omnia etiā accipienda sunt rectè in mustum addi. Quod si verò pretiosius efficere pharmacum velis iniicies etiam cassiæ

cor

corticē, aut nardum indicā, aut malabathri
 foliū. Aequē enim vt pauperibus, sic etiam
 diuitibus nos pharmaca scribere oportet.
 Eadem etiā prædictis stomaticis pharma-
 cis miscentur. Sufficit autem drachma vna
 singulorum ex his tribus ad tantā medica-
 menti symmetriam ac cōmensurationem,
 iuxta quā libra mellis vna coniicitur. Nihil
 verò læseris si ad singulas drachmas adhuc
 dimidiam apponas, vt in totum quatuor
 drachmæ & dimidia fiant. Cæterum ad in-
 duratas inflammationes coniiciuntur quæ
 generosius discutere possunt, tusa videlicet
 & cribrata. Tempus autē indendi ipsa non
 est principiā, sed vbi propè perfectè coctū
 fuerit pharmacū, aut etiā penitus coctum,
 olla iam in terrā deposita. Sunt autē hæc
 costus, amomum, & quod Macer appella-
 tur, Nominatur autem sic cortex quidam
 aromaticus qui ex India affertur, multū ca-
 lefaciens & adstringēs. Quin & cyrenaicus
 succus ad discutiēdas induratas inflāmatio-
 nes aptus est, quēadmodum etiā Medicus,
 aut aliquis eorum qui postea celebres facti
 sunt. Pauperibus porrò pro sumptuosis dis-
 cussoriis pharmacis, aut dictamnū, aut aco-
 rum, aut Meon, aut pyrethrū, aut cardamo-
 mū, aut sinapi iniiciendū censeo, pari pōde-
 re, ita vt ad triū drachmarū pondus eorum
 mix

mixtorum moles perueniat, ad prædictam in principio stomaticorum pharmacorum symmetriam, in qua mellis libra habebatur. Si verò quatuor aut quinque drachmarum pondus ex his explere velis, magis discussorium pharmacum habebis. Semper enim pro constitutionis affectuum proportionem, augeri ac minui pharmacorum vehementiam oportet.

De confectione pharmaci ex musto, in quo etiam parabilia diuersa.

IN pharmaco ex musto, ad decem musti heminas, tres iniicimus heminas Rhois coriariorū, aut eius qui obsoniis inspergitur. Si verò vtrunque iniicimus, vtriusque vnam & dimidiā, aut paulò plus sumimus. Iuxta proportionē verò etiam ex discussoriis quodcūque tandem in promptu habuerimus. Quod si vnū tantum habeamus adstringendi vim habens, quod in principio iniiciamus, aut vnū saltem discussoriū quod iuxta finem indamus, ex illo totum pondus immittimus quod ex omnibus alias conflaretur. Quæ igitur dicta sunt in medicamentum ex nucibus cōiicienda, ea omnia etiam in pharmacū ex musto indantur. Quin & quæ isthic non dicta sunt, amplius iniicere licet. Velut gallam omphacitin appellatā, aut extremitates mollis rubi, aut rubi canini,

ni, & corni, & cuius etiam fructum diximus iniici oportere, velut etiam pruna, & myrti baccas, & fructū myricæ ac spinæ ægyptiæ fructum, omniaq; adstringentia præter ea quæ medicamentariâ vim habent, ne videlicet deuorata lædât. Omnia porrò stomatica pharmaca quomodocunq; parata iuxta propria tēpora oportuna ac cōmoda sunt. Si quidē enim austeriora fiant, in principiis & vehementibus influxionibus cōueniunt. Si verò moderatiora, in vigoribus. Si autē magis discussoria vi prædita, in declinationibus. Quare etiā si nō ipsi preparauerimus quid, neque symmetriam iniectorū nouerimus, sed tantū ipsum cōpositum pharmacum gustauerimus, cognoscemus quomodo eo sit vtendum. Hæc igitur si memoria conseruabitis, quando necessitate aliquando urgente eorum quæ experimento constant pharmacorū copia non sit, ex parabili illius loci materia, vos ipsi ex tempore aptum medicamentū componere poteritis. Non solum autem in hanc rem utilis fuerit prædictorū memoria, sed etiā ad iam inuentorū conuenientem vsum. Si enim in ipsis adstringentē qualitātē præualere inuenieritis, in principiis eis vtemini. Si verò mitigatoriam & laxatoriâ ac concoctoriam, in doloribus & vigoribus inflammationū.

G

Si verò obduratum quippiam & agrè solubile ab inflammatione relinquatur, in declinationibus discussoriis. Eodem modo etiā in mediis tēporibus, media relatorū pharmacorum medicamenta offeretis, ab repulso-riis ad discussoria paulatim transeundo, atque si vnum dūtaxat vobis præsto sit medicamentum, id ipsum per aquæ mulsæ & aquæ simplicis mixturā exoluentes, & per additionem parabiliū intensius reddentes. Sunt autem parabilia ex adstringentibus, Rosa, & baccæ myrti, & myrtus, & lentiscus, & rubus, & rubus caninus, & galla omphacitis appellata, & ægyptiæ spinæ fructus, omniaque aluminis genera. Post hæc parabilia sunt Rhus culinaris & coriarius, & succus qui ex Syria affertur, atq; hic quidem per se amiscetur, culinaris autem & coriarius Rhus aqua prius decocti, vtilis mixtura fiunt. Est autē & glaucium ex parabilibus, & omphacium, & cytini, & balau-
stia. Ex discussoriis autem parabilia moderata sunt, caricarū & furfurum decoctum, & aqua mulsæ in qua origanum, aut hyssopum, aut thymus, aut calamintha, aut pulegium, aut mintha odora, quam hedyosmū vocant, sint incocta: fortiora autem sunt etiam hæc, si diutius coquantur, amplius autē & nitri spuma aut ipsum adeo nitrum
ystum:

ustum: fortius verò his est sulphur viuum.

*Stomaticorum pharmacorum compositio,
in quibus etiam quæ ex moris constat, Hera.*

Propriè quidem stomatica appellantur quæ ad vuas, tonsillas, ac omnes quæ in ore sunt de repente inflammationes conueniunt. Componuntur autem per prædictam materiam, ex qua sanè multæ particulares compositiones à medicis sunt confectæ. Ego verò etiam hic celebrium tantum mentionem faciam.

*Compositio pharmaci ex moris
iuxta Heram.*

Pharmacum ex moris stomaticum faciens ad tonsillas, & vuas, atque alias in ore inflammationes, tum illitum, tum gargarissatum, velut est prædictum. Præparat autè ipsum Heras hoc modo. Succum mororum heminas sex, ad strigmenticiam spissitudinē coquito. Deinde tritas croci drach. vnam, myrrhæ drach. duas, omphacii drach. vnā, aluminis scissi obolos tres. Mellis heminam vnā addito. Ipse autem Heras se etiam aliter præparare ipsum ait, hoc modo, vt croci drachma dimidia iniiciatur, & paksi hemina vna, & vini maris expertis austeri hemina vna. Coctura autè fit vsq; ad compagem melleam.

G 2

Andromachi descriptio, pharmaci ex moris.

Andromachus autem de pharmaco ex moris in hæc verba scripsit. Succum mororum heminas sex accipito, & in ipsum gallas quinque conicito, radices autem dulcis drach. 20. Vini chii heminam vnam, & insolato aut coquito, deinde ubi coactum & spissatum fuerit pharmacum, radices tollito ac proiicito, gallas autem tritis ammisceto, & myrrhæ drach. 1. croci drach. vñ, aluminis scissi drach. 1. omphacii drach. 2. Quidam autem aluminis drach. duas, mellis attici heminā vnam. Manifestum autem est, quod hoc pharmacum magis adstrictorium est quam præscriptum, maximè si alumen adsumat. Sufficientes enim erāt gallæ, & omphacium, vt multum adstringens redderent pharmacum, verum ubi alumen amplius additur, plurimum in ipso adstrictoria vis augetur. Rectè tamen in eius confectioem ammixta est dulcis radix, quæ exasperata lenit, & propterea asperitatem ex adstringentibus inductam lenire potest. Cæterum pro mororum succo conicitur etiam mororum rubi succus, aliis quomodocunque velis apposis, siue vt Heras, siue vt Andromachus scripsit. Relatū autem à me antea est, quomodo liceat ipsum variare, per eorum quæ adiiciuntur ammix

mixtionem. Dictum est etiā, quod per succum nucum componi queat hoc pharmacū, reliquis eodem modo iniectis. Quin & per punicorum malorum succum similiter præparatur, tum succo solo cum melle præparato, tum iam dictis iniectis. Sic verò & rubi fructus cum melle cōfectus sufficienter adstringens fit pharmacum, quemadmodum sanè & quod ex nucum succo paratur, veluti prius est dictum. At verò etiam varia cōpositione pharmaca ex punicorum succo à medicis conscripta sunt, velut etiam ab Andromacho his verbis.

Stomaticon ex malis punicis, Andromachi.

PVnicorum dulcium nucleis carentium partes. 2. & acidorum partē. 1. Succum in vas * amplum quod congiū capiat ex- * *Aeneum vet. cod.* primito, deinde excolatum ad lentū ignem ad tertias coquito, Sint autem in promptu myrrhæ minnæ drach. 8. croco magnatis drach. 8. omphacii drach. 8. illyridis drach. 8. aluminis drach. 4. gallæ drach. 8. His affundito liquorem teritoque ac ad melleā spissitudinem coquito: deinde in pilam translata rursus terito ac vtitor, quandoque cum melle, quandoque sincero. Hic non simul coquit mel cum punicorum malorū succo, sed postea quum paratum est, dupliciter

G 3

pharmaco vti iubet, aliquando quidem sincero, ad inflammationes videlicet adstrictionis indigat: aliquando verò cum melle, quum discussione indigent. Multitudinem autem succi congiungi esse iubet, hoc est sextarios sex Romanos. Quum enim Romæ medicatus sit, semper eius vrbis mensuris vtitur. Iniicit autem in ipsum myrrham, & crocomagma, & gallam, & iridem illyricam. (Ipsam enim Illyrida appellare solet.) Amplius autem ad hæc omphacium, omnium quinque numero, singulorum vnciam vnā, octo enim drachmæ vnciā efficiunt. Ex alumine verò scisso vnciam dimidiam. Scripsit porrò deinceps Andromachus etiam id quod ex musto sit stomaticum, sic in hæc verba.

*Andromachi stomaticum ex musto,
quo vtor.*

Gallas triginta. Rhœis coriarii sextarios duos, musti sextar. 6. Gallas confractas cum Rhœe per diem & noctem in musto macerato, deinde coquito donec ex toto quarta pars super sit, & per linteolum colato, exprimito, & in olla ad mellis crassitudinem spissato, deinde trita addito, aluminis scissi drach. i. croci drach. i. myrrhæ drach. i. permixta reponito atq; vtor. De musto nihil manifesti retulit ex quali vna
ipsum

ipsum sumi velit, Num ea quæ austerum vinum fundit, aut quæ dulce, aut mediū. Nos igitur nosse oportet quod pharmacum ex dulci confectum magis mitigatoriū & moderatum erit, ac minus efficax. In quibus autem adstrictione opus est, vti vehementiore, id quod ex acerbis vuis fit vehementius quidem adstringit, leniendi autem vim non habet. Palam est autem ex medio vino paratum, etiam mediā facultatem habere.

Critonis stomaticum ex malis punicis.

CRito pharmacum ex succo punicorum his verbis descripsit. Stomaticum ex punicis ad vlcera & aphthas oris. Succi punicorum dulcium heminas. 6. in æreo vase ad tertias coquito, deinde cinamomi drachmas. 1. cassiæ drach. 1. myrrhæ drach. 1. omphacii obol. 3. croci obol. 3. nardi Indicæ obol. 3. terito, eisque mellis heminam. 1. ammisceto, atque ita ad infuso succo ad lentum ignem moueto, ac donec spissetur coquito ac vtitor. Scribit autem & aliā compositionem pharmaci ex punicis huiusmodi. Malorum punicorum dulcium vnā cum corticibus tusorum ac expressorum sextarios. 6. mellis boni sextariū. 1. in ollam coniecta coquito ad spissitudinem mellis: deinde aluminis scissi vnciam vnā, myrrhæ vnciam dimidiā, trita addito, ac mixtis

vtitor. Magis adstringēs scripsit certè hoc pharmacum Crito quàm præcedens. Ridicule igitur quidam faciunt interrogantes vtrum ipsorum altero melius sit. Alterutrum enim in proprio tempore altero melius est. atq; hoc quidē posterius ad ea quæ vehementi adstrictione indigent, ad ea verò quæ discussione, prius maxime quum & cinamomum iniecerit in ipsum discussoriū medicamentum. Scripsit autem & ex musto medicamentum Crito, hoc modo.

Critonis stomaticum ex musto.

STomaticū ex musto facit & ad aurium & sedis vlcera. Musti sextarios. 6. ad sextarios. 2. decoquito, deinde Rhois coriarii drach. 4. alii drach. 2. misceto, & gallarum drach. 4. alii verò gallas. 30. croci drachmas. 2. alii drach. 1. aluminis scissi drach. 2. Quidam etiā myrrhæ drach. 1. mellis sextarium. 1. mixtis vtitor. Multa verò alia pharmaca ex prædictis succis à multis medicis scripta sunt iuxta cōmensurationem varientia quum aliqui quidem omnia prædicta coniiciant: quidā verò auferant, alius aliud, & alius plus, alius minus in quibus velut dixi inspicere oportet quid redundet, an adstringens & repulsorium, aut lenitium & concoctorium, aut discussoriū. Ita enim rectissimè ipsis vtetur. Quare relinquam
par

particulares eorum quæ scripserunt differentias. Transibo autem ad alia pharmaca citra hos succos præparata.

Stomatica pharmaca citra succos composita ex aceto & gallis.

STomaticum pharmacum scripsit tum Andromachus, tum Crito, eandem habens symmetriam. Sufficiet itaque descriptione Andromachi referre, hoc modo habentem his verbis. Stomaticum Aristoclis ad Synanchas, quas anginas Latini vocant, & reliquas in ore affectiones. Hac & Antipater usus est. Gallas numero. 30. aceti albi sesquicyathum, alii cyathos. nouē, myrrhæ drach. 8. nardi Indicæ drach. 1. Rhois culinari sesquicyathum, alii cyathos. 19. aluminis scissi drach. 1. piperis grana. 20. mellis Attici cyathos. 2. alii sesquicyathum. Coquantur gallæ in aceto donec flaccescant, deinde tritæ melli miscetur tempore usus. Quidam etiã seminis mandragoræ vnciam vnā addunt. Hac quidē Andromachus scripsit. Fortassis autem dubitauerit quispiam propter quid, quum scripsisset aceti sesquicyathum, mox adscripserit alii cyathos. 9. multum enim mensura altera alteram excedit. Quemadmodū etiam rursus quum ait, Rhois culinari sesquicyathum, alii cyathos. 9. Singulatim itaque vtrunque ex-

G 5

pensum dubitationem affert. Si verò inter
 se complicantur, conuenienter scripta sunt.
 Si etenim cyath. 9. iniecerimus, iniiciemus
 etiam Rhois culinarii eosdem. 9. cyathos.
 Si verò aceti sesquicyathum, sufficiet etiam
 Rhois culinarii sesquicyathus. Quare in
 pharmaco plus aceti habente, diutior coctu
 ra facienda est, in minus habente breuior.
 Præstat autem diutius fieri cocturam. Ita
 enim gallæ molles reddentur. Conspicuum
 verò est, generosum esse hoc pharmacū ex
 contrariis compositum. Gallæ enim & ace-
 tum, & Rhus magis adstringentia sunt, &
 maximè repellunt: valde autem discussoriū
 est piper, sed mixtæ facultatis est nardus.
 Myrrha verò discussoriā habet vim, sed &
 lenem ac mitigatoriam vnā cum hoc quod
 etiam concoquit. Discussoriæ facultatis est
 etiam mel, sed citra mordacitatem earum
 affectionum quæ in ore fiunt, quum in ocu-
 lis mordax existat. Verum de aceti viribus
 iam sæpè mētionem fecimus, quod & secat,
 & discutit & repellit. Album autem in de-
 scriptione addidit, vt videlicet tenuium
 partium indicet. Quidam verò tum aceti
 quinque cyathos, tum Rhois eosdē iniiciunt,
 medium quodāmodo apprehendentes in-
 ter eos qui plurimum, & qui minimum de
 vtroque coniiciunt. Manifestum igitur est
 eos

eos medium quoque pharmacum iuxta facultatem preparare, quemadmodum symmetria ipsa media existit.

Stomatica illitio ex besasa, hoc est, semine rut. & sylvestris.

Celebre est & hoc pharmacum ab Andromacho hac verborum serie descriptum. Stomaticum ad anginas ex besasa, faciens ad desperata, quo utor. Seminis anisi, seminis apii, seminis ammii, floris iunci odorati rotundi, aluminis scissi, iridis illyricæ, besasa quod aliqui harmala vocant, cinamomi, myrrhæ, troglodyticæ, aristolochiæ longæ, singulorum vnc. i. cassiæ, rosarum siccatum, vtriusque vnc. i. crocomagmatis, vnc. i. costi, cineris hirundinum recentis, vtriusque quadrantē, croci sesquiunciā, nardi indicæ, amomi, vtriusque vnciæ dimidiū, gallas. 8. tritis cum melle utere, Verū vsus tempore tandē mel adde. Hoc ipsum pharmacum etiam Heras scripsit, vt parum absit quo minus penitus idem sit, Solas enim rosas variavit, & non ipsas coniicit, sed florem ipsarum, & ad finem addit, Quidā etiā cassiæ fuluæ vnc. i. De hirundinibus autem ambo obscurè tradiderunt, quanquā alii clarè scripserint, nisi quod inter ipsos non conuenit. Alii enim nidum vrere iubent ex stercorebus hirundinum maximè
com

compositum. Alii ipsas hirundines. Alii ipsarum pullos. Hi verò obscurius scripserunt, & Andromachus quidem, cineris hirundinum recētis, oportebat autem ipsum apponere vstarum, Tale enim quiddam cineris vox significat, nisi nidum ipsum terere ac leuigare iubet. Heras autem, hirundinū recrementi, non apponēs vstarū. Fortè igitur neuter vult cōburi debere hirundinum recremētum, quemadmodū alii. In quibusdā tamen exēplaribus sic scriptum est. Hirundinum tenerarū vnciam. i. quēadmodum in aliis hirundinū à trabibus. Palam est autē acre & discussorium hoc pharmacū esse ex hirundinum excremētis cōstans, Quemadmodum etiā alia omnia omnium animalium stercoreum, aliqua magis, aliqua minus. Velut etiam ipsorum animalium vstorum cinis. Dictum est etiā nobis de besasa in simplicium pharmacorum tractatu, quod tertii sit ordinis calfacientium, & nūc sanè vt eiusmodi ammixtum est etiam prædicto medicamento, quod plurima discussoriae facultatis in se habet. Quemadmodum aliqua ex aliis stomaticis adstringentis & repulsoariae. Etenim iam relata pharmaca valde discussoria sunt, & ad hæc amplius cinamomum super omnia vim tenuium partium & discussoriam habens. Quin & semina
anisi,

anisi, apii, & ammi discufforia sunt, & iris & aristolochia ex discufforiis sunt, velut etiam myrrha. Mixtæ autem facultatis ex discufforia & adstringēte est calisia, & crocus, & nardus, & amomum, & costus. Præcellit autem in ipsis califactoria & discufforia, & maximè in costo. Mixtæ facultatis est & iunci rotundi odorati flos, sed vtraque imbecilli tum adstringēte, tum calfaciēte. Gallæ verò, clarum est autem quod de omphacitidum genere loquor, ex adstringentibus multum sunt pharimacis, velut etiam alumen scissum. Rosæ autem rursus debilissimam habet adstringendi vim. Ex contrariis igitur facultatibus particulariũ pharimacorum, hoc medicamentum propositum iam constat, & non solũ contrariis, sed etiã vtriusque fortibus, atque velut dixi antea, multò fortioribus discufforiis quàm adstringentibus. Quando verò confectionem eius clarè conscripserit Heras, visum est ob id etiam illius verba in commune proponere ac adscribere, quæ hoc modo habent.

Stomacicum ex besasa, Heras.

STomacicum faciēs ad anginas, & inflamas tonsillas, ac vlcera facta in ore. Conuenit etiam stomachicis & dysentericis summè, in frigida exhibita magnitudine fabg. Est & Arteriaca bona, & dolorē sedat.

Anisi

Anisi vnc. i. ammi vnc. i. apii seminis vnc. i.
costi sesquiunciam, floris iunci odorati
vnc. i. iridis illyricæ vnc. i. aluminis scissi
vnc. i. gallas oniphacitidas mediæ magni-

* *Aliàs. 2.* tudinis. 8. crocomagnatis vnc. * i. croci
sesquiunciam, myrrhæ vnciæ dimidium, flo-
ris rosarū vnc. 2. aristolochiæ longæ vnc. i.
seminis besasa vnc. i. cinamomi vnc. i. spicæ
nardi sesquiunciam, amomi racemi vnciæ
dimidium. Quidā etiam cassiæ fuluæ vnc. i.
cineris hirundinū recrementi vnc. * vnam.

* *Aliàs*
vnc. 2.

Myrrham cum melle terito: reliqua verò
omnia contusa & cribrata in mortarium
coniicito, & per pistillū myrrham cū melle
moderato cōmisceto, vt pharmacum melle
crassius reddatur, Vfus verò tempore mel-
le dilutum illine, atque ex aqua gargarissan-
dum præbe, aut ex aqua mulsa vel succo
ptisanæ. Cæterū pharmacum hoc in stan-
neo vase reponitur ac adseruatur.

*Aliud stomaticum ex hirundinibus absque
Besasa, Asclepiade.*

Scripsit etiam Asclepiades stomaticam
sillitionem his verbis. Aliud stomaticum
facit & ad Anginas. Hirundinum syluestriū
vstarum cineris drach. 4. croci drach. i. nar-
di indicæ drach. i. melle excipe. Mixtura fit
quum iam sub manibus sunt affectiones.
Hirundines porrò vruntur hoc modo. Pul-
los

los sale conspersos vnà cum pennis in fictile coniiciamus, obturatumque prunis imponimus. Gratia habenda est Asclepiadæ ob id quod tam diligenter describit quomodo hirundinum pullos vri iubeat, & quod ipsa animalia, & non eorū recrementa, in pharmaci compositionem præparanda censeat, Scripsit verò etiā Andromachus stomaticū pharmacum ex hirundinibus, hoc modo.

Stomaticum ex hirundinibus ad anginas, vt Harpocras.

PVllorum hirundinum vstorum numero ii. mellis cyathum. 1. alii cyathos. 2. habent, succi myrti viridis cyathum. 1. alii cyathos. 1. myrthæ obolos. 3. Pullos vrito omnibusque mixtis ac tritis vtitor. Clarè etiam hic hoc loco pullos comburi iubet. Hæc itaque duo præscripta pharmaca ex hirundinibus sunt absque befasa, Alia autè duo stomatica hæc præcedentia ex hirundinibus vnà cum befasa constant. Est autem & tertia coniugatio pharmacorum eiusdè generis, in qua ea quæ ex befasa citra hirundines præparantur, continentur.

Alia stomaticæ illitiones Andromachi.

PRæstat autem opinor neq; alias relinquere oris illitiones, quæ sanè laudantur ab his qui de pharmacorum experientia sunt

sunt curiosi, maximè quū multorum ex eis etiā ipsi experimētū fecerimus, partim quidem ex nostro vsu, partim verò eorum qui nobiscum sunt medicati. Incipiam autem ab his quæ Andromachus scripsit, ipsas cōpositurus iuxta illius verba.

Ad Columellam laxatam.

MEllis lib. i. aluminis liquidi lib. i. florū rosarum libram dimidiam, succi hypocistidis quadrantem. Alumen in melle coquito, deinde sicca inspergito atq; ita vtitor. Coquito autē modicè. Verè bonum est hoc pharmacum, eoq; tribus modis vtī oportet, quēadmodū vidistis me plurimis stomaticis pharmacis vtī. Vnus vtendi modus est & maximè in principio, vt dissoluatur per aquam calidam aut aquam mulsam ac gargarissetur, Nam & mitigatorium est hoc, & quod cōuenit efficit. Interea autem dum eo sic vtimur, etiam sincero pharmaco vtī cōuenit, partim quidem cum digitis illinendo, partim verò per cochleare admo- uendo, vna cum hoc quod reprimamus & intrepidè foras columellā ipsam ducamus. Confert enim quā maximè ad linguam ipsam vergere, & à rectitudine secedere quam habet vt plurimum ad ipsius asperæ arteriæ extremum.

Aliud

*Aliud stomaticum eiusdem Andromachi
ad omnia vitia oris.*

CRocomagnatis drac. 2. iridis drac. 4.
sandarachæ drach. dimidium, hoc est
obol. 3. terebinthinæ drachm. 2. lycii Indici
drach. vnam, vuæ passæ drach. octo, aloës
drac. 1. omphacii drac. vnā, nucū pinearum
tostarum drac. octo, succi glycyrrhizæ drac.
vnā, aluminis scissi drac. 1. balauſtii drac. 1.
floris rosarum drac. 2. mellis heminas duas
& dimidiā. In quibusdam exemplaribus
sesquihemina habetur. Ipse quidē Andro-
machus sic scripsit, non ostendens quomo-
do mel miscere oporteat, Num crudū, aut
coctum, aut despumatum tātum. Ego verò
despumatum miscendum esse censeo. Scri-
psit etiā alias stomaticas illitiones Andro-
machus omnes bonas, quare minimè relin-
quendas putauī, ideoq; subscribam omnes
deinceps, quemadmodum ipse præscripsit.

Stomaticum quo ipse se vti dicit. Flo-
ris rosarum drac. 2. nucum pinearum drac. 1.
croci drac. 1. Excipe melle. Aliud quo itē
se vti dicit. Iridis illyricæ drach. 8. croci
drac. 8. alii 4. florum rosarum drach. 4. Ex-
cipe melle. Aliud, Misyos cyprii drac.
octo, iridis illyricæ drach. 4. myrrhæ drac. * Vet. cod.
* octo, croci drach. vnam. Excipe melle. *habent*
Aliud. odorum tenerum ad inflammatio- drach. 2.

H.

nes & crustas commodum. Nucum pinearum drach. tres, amyli drac. 2. aluminis scissi drach. 1. floris rosarum drach. vnam, croci obol. 3. Excipe melle. Hæc ex ferula Cratippi esse ait. Aliud stomaticum Menecratis. Croci drac. quatuor, balauftii drach.

* Aliàs ses tres, florum rosarum drac. * 1. alii dimidiā, quidrach- fructus ericæ drach. vnam, malabathri drac. mam.

vnam, nardi indicæ drach. 1. nucum pinearū nume. x x. Excipe melle. Aliud quod ex * Aliàs libris* Meliti esse ait. Rhois rubri drac. 2. Mēphiti. florum rosarum drac. 1. costi, croci, vtriუსq; obol. 3. Excipe melle. Hanc etiam gargarisari cum passō, aut aqua mulsa ait, neq; scio cur hoc hic adscripserit, quum omnia gargarisari possint. Aliud stomaticū quod etiam ipse laudat. Floris iunci rotundi odorati, myrrhæ, croci, cassiæ, aluminis scissi, illyridis, singulorum drach. quatuor, nardi indicæ drach. vnam. Excipe melle cocto. Hic quidem igitur cocto adiecit, In prioribus verò semper simpliciter melle dixit, permittens nobis quomodocunque præparare velimus. Ego autem velut dixi melle despumato vtor.

Aliæ illitiones stomatice, quas Asclepiades scripsit.

Illitio ad putredines oris Asclepiadæ. Rhois rubri drac. quatuor, acaciæ drac. vnam,

vnam, medullæ drach. quatuor, vino pranio dissoluta excipe melle cocto, & vtere ad illitionem. Haud scio quomodo reliquerit adscribere ad medullam, Num ceruinam, an vitulinam coniici velit. Quando igitur non adscripsit, tutius est ceruinam adiicere. Fortè enim esse vult medicamentum, fortior autè est medulla ceruina quam bubula. Alia, Succi hypocisthidis drac. duas, balauftii drach. vnā, lycii drac. vnā, acaciæ drach. vnā. Excipe oliuæ immaturæ succo, & melle subactis vtere.

Illitiones oris aptæ eis qui medicamentarias qualitates agrè admittunt.

Porrò de mulierculis quid attinet dicere, & maximè diuitibus, quæ præ delitiis stomatica medicamenta agrè admittunt? Iam verò etiam viri quidam non solum præ delitiis, sed etiam natura quodam modo malum stomachum habentes, eiusmodi pharmaca non ferunt. Et sanè præterlabentia sæpenumero in stomachum, non solum iniucunda aliquo modo sunt, sed etiam nociua. Mansuetissima igitur ex ipsis crocum habent & myrrham, & alumen. Melius igitur est aliquas stomaticas compositiones absque his factas habere. In moderatis itaque inflammationibus aut

H. 2

tonfillarum, aut vuæ, aut alterius alicuius partis, sufficiunt succi soli fructuum iam dictorum, velut rubi & mororum, punicorūque malorum & cotonearum. Quin & succus nucum, vbi cum solo melle paratur, suauem gustum habet, itemque mustum ex acerbioribus vuīs, ex quibus Aminæum vinū funditur, si in ipsum Rhus addatur: hoc enim velut adscripsit optimum fit pharmacum coctum vt dictum est. Ad eas verò inflammationes quæ multa adstrictione indigent, illitiones stomaticas huiusmodi parui. Austerorum punicorū succum, aut austerorum cotoneorū, aut etiam vtrorumq; simul, iuxta prædictam proportionem cum melle miscui, atque sufficiens erat. At verò mororum succus debile pharmacū est. Sed inter hūc & prædictos medius est iuxta adstringendi vim succus rubi mororū. Fortis autem est nullo minus ex corticibus nucū, quanquam non sit etiam in gustu acerbus. Vnicuiq; verò ex his licet vuas acerbæ expressas miscere, si quidem vehementius efficere velis, eadem mensura: si verò non, omnino tamen dimidium succi ipsarum addes. Vehementissimum autem reddetur pharmacum si punica integra tundas vnà cū corticibus, indeq; succum exprimas, atque hoc magis si fuerint acerbæ. Amplius verò acerbis

bissimū ex his fiet, si ad punicorum austero-
rum ita tusorum succum, vuæ acerbæ suc-
cus superaddatur cū moderato melle. Præ-
stantius adhuc erit, si tota contusa punica
mala passo cocta excoles. Licebit etiam ex
solis dulcibus punicis pharmacum præpara-
re, vt debilius, ita suavius, & magis si ex so-
lo succo citra cortices cōposueris. Ego ve-
rò sæpe tria punicorum genera permiscui,
austera, acida & dulcia. Ne verò valdè ex-
speret, ammixto glycyrrhizæ succo, optimū
pharmacum efficies. Quin & ex fructibus
factum per se solum optimum est medica-
mētum, tum his qui gargarissando collue-
re, tum qui illinire oris inflammationes vo-
lunt. Est autē & hoc partim austerius, par-
tim moderatius in adstringendo, diceturq;
de compositione ipsius paulò post. Quādo
verò nō solum repulsorium pharmacū nos
habere oportet, sed etiam discussorium si
quid appareat induratum, in hunc modum
ipsum parabis. His quæ medias facultates
habent ex prædictis, iniicies aliquid dū co-
quantur, expulegio, aut thymo, aut origa-
no, hyssopo, mintha, aut calamintha, deinde
colabis, & habebis optimū medicamentū.
Si verò calidius efficere velis, piper addes.
Præparavi quandoque etiam sine pulegio,
aut thymo, aut aliquo huiusmodi id quod

ex succis constat, solo pipere in ipsum con-
iecto. Omnibus autem si glycyrrhizæ suc-
cus addatur, melius pharmacum efficietur.
Quod si pro opulentis componas, etiam a-
moni quid miscebis. Quantitas autem hu-
iusmodi eadem tibi seruetur, cum his quæ
crocum & alumen ac myrrham adsumunt,
velut præscriptum est: pro illis enim tibi hic
amonum erit. Quin & mastichen chian
quandoq; inieci, post factam videlicet co-
laturam, & postquam ea quæ incocta sunt
fuerint exempta.

De crustis in ore.

CAP. II.



IN calidis & humidis corporis lo-
cis, quale est os, citò putredo ac-
cedit, ex quacunque tandē causa
fuerit exulceratum. Confert ad
hæc rem etiam, id quòd nihil penitus in ipso
ex pharmacis incūbere queat, velut in aliis
vulneribus potest. Eluuntur enim omnia à
salina. Quapropter etiam fortissimis phar-
macis sæpè ad ea vti cogimur. Fortissima
autem sunt quæ crustam, escharan Græcis
dictam, efficiunt ad modum cauteriorum.
In externis igitur vlncribus, vbi parti cu-
randa crusta fuerit inducta, à fortibus phar-
macis desistimus, ad ea quæ crustas tollunt
transgredientes, quæ manifestum est exter-
soriæ qualitatis ac facultatis esse. In his ve-

rò

rò quæ in ore sunt propter loci naturam, tutius mihi esse videtur ammiscere ad extensoria pharmaca quædam fortiora, quæ singulatim admota crustas infligunt. Ob hanc igitur causam melli vehementissima extergendi vi prædito, pharmaca ammiscemus ipsas crustas efficientia. Quemadmodum sanè in sordidis vlceribus in cuticula obortis, diximus ammisceri oportere melli, quæ parum extergent, thus, eruum, iridem, aristolochiam, & quæcunque alia huiusmodi, eadem ratiocinatione contraria apponētes, velut Hippocrates dixit: Vna enim eademq; ratiocinatio in vtrisq; est, vt videlicet extensorium pharmacum moderatè habens ad affectionē adhibeatur. Habebis autem commodatū pharmacum ipsum mel, in vlcerum quidem sorde, debilibus extensoriis permixtum. In quibus autem ob loci naturam, putredinis accessionem formidamus, ex fortioribus quippiam ad ipsum mel ammiscemus. Rationabiliter igitur ad oris vlcera arida medicamēta cū melle commiscuerunt, per quæ crustas inducimus. Quædā igitur ex huiusmodi pharmacis prius recē sui in eo loco, quo ad nomas oris medicamēta scripta sunt. Eadē enim etiā ad crustas cōuenire dixi, si mel ipsis addatur. Quin etiam nunc de ipsis scribā, omnia tamen si bis

dici cuiusdam videantur. Quæ igitur ab Andromacho scripta sunt paulò antè, in memoriam saltem me reuocare oportet, ex eo loco in quo docuit quæ pharmaca ad nomas oris conueniant: apponam autem principia ipsorum tantùm. Vnũ igitur pharmacũ sic cõscripsit. Andromachi stomaticũ odorum tenerum ad inflammationes & crustas commodum. Composuit autem ipsum ex nucibus pineis, amylo, & alumine scisso, flore rosarum, ac croco, melle ammixto. Alterum hoc modo scripsit. Pastillus ad affectiones in ore, crustas, ac nomas, quo etiam ipse cum melle vtitur. Quin & omnia alia ab ipso ad nomas descripta, etiam ad crustas commoda sunt cum melle.

Quæ Crito ad crustas conscripsit.

Quæ verò Crito ad crustas scripsit illius ipsius verbis sic habent. Misy crudum euestigiò tollit. In alio exemplari cum melle tostum habetur. Ad oris verò crustas, aqua diluto ac modico vtere. Sint autem misyos torrefacti drach. tres, mellis boni cyathi sex, commisce ac vtere. Similiter facit & chalcitis assata, cum melle, ut strigmentitia sit spissitudo.

Quæ Archigenes ad crustas scripsit.

Archigenes autem de his sic tradidit. In crustis quæ Escharæ Græcis appellantur

lantur, priuatim commodum est stercus caninum cum melle illitū. Aut atramentum sutorium * purpuræ marinæ tomēto inuolūtum vrito, neque agitato, deinde cū melle tritum illinito. Aut pice liquida cū pari melle, modica cedria ammixta vtitor. Aut Rhoëncoriarium in aqua sufficiēter, donec strigmentosus reddatur, macerato ac coquito, & melle ammixto vtitor. Facit & Syriacus Rhus cum melle. Aut hirundinum vstarum, & stercoreis humani parem modū cum melle illine. Aut hepatis lupi aridi cochlearia duo trita bibenda præbe. Horum pharmacorum maximam partē laudo, quod verò ex rhoe constat danino, quum adstringentis sit facultatis quæ nequaquā crustis conueniat, Verū de lupino hepate nō habeo quod dicā. Ad hepaticas enim affectiones scio hoc pharmacum tum per se, tum pharmaco ex eupatorio mixtū bibi. An verò etiam ad crustas in ore potum conueniat, iuxta aliquam totius substantiæ proprietatem, per solam experientiam iudicare oportet, de qua non est quod dicam vt qui hoc non sim vsus in huiusmodi affectionibus. Caninum autem stercus vbi ossa comederint canes, per omnia optimum est, Nam & magnopere auxiliatur, neq; vllam insuauitatem exhibet vtenti. Humanū verò

H 5

tāquam abominandum semper detestatus sum. Vfus est itaque ipso quidam non prædicens, sed latere conatus. Accepit autem non vulgare, sed pueris dabat in cibo panē cum leguminibus quæ lupini vocantur, atque ita resiccatum habebat in promptu ad quæcunque eo vtique opus esset. Quin & Musa plurimum vsus est primus adeò stercore canino, albū semper adsumens. Scribit igitur in præsentī affectione similiter eodē canino stercore se vsum, his adeò verbis.

Musa ad Anginam.

AD Anginam stercus caninum album accipito ac resiccato, tritumq; cribro medico cribrato, & in promptu habeto. Vfus tempore melle diluito, atque tunc vt deuoretur illinito. Hæc quum scribat Musa, meritò ei ad stipulamur: hoc enim pharmacum fortius nullum nouimus, neque in angina, neque in magna tonsillarum inflammatione, aut his quibus ex glandulis suffocationis periculum imminet. Ex Sorano. Experti sumus etiam Sorano scripta pharmacum probè facere, quæ his verbis tradidit.

Chalcitidis rostræ, mellis Attici, quod satis est, chalcitidem cum melle terito ad strigmentitiam crassitudinē, ac vtitor. Aliud ad crustas faciens & humore prægnantes itemque fœtentes gingiuas. Misyos vñ drac.

drach. octo, iridis illyricæ drach. quatuor,
croci drac. vnā. Hæc trita ac mixta in pyxi-
de lignea reposito, & tum per se, tum cum
melle vitior. Consequenter verò etiā hæc
hoc modo prodidit. Aliud pharmacum
Anthera ad prædicta faciens. Iridis illy-
ricæ, sandarachæ, cyperî, singulorum drac. * His myr-
quatuor, aluminis scissi, * croci, crocoma- rham ad-
gnatis, singulo drac. duas, his tritis ac mi- dunt ve-
xtis vttere. Quidam verò & florum rosarū, tu. cod.
& gallæ, vtriusque drachm. duas, adiiciunt.
Vtere autem ad putredines, & disparatas * Vetus
per abscessum ac cruentas gingiuas arido, cod. non
Ad crustas cum melle. bdellij sed

Quæ Heraclides Tarentinus ad crustas in ore scripsit. Biβλίου id
est libri cō

Heraclides Tarentinus in scriptis suis busti quod
ad Antiochidem in hunc modum scri forsitā idē
psit, de putredinibus in ore. Facit quidem est quod
& Anthera admota. Si verò validior sit pu- charta cō-
trefactio, apposita est hæc compositio. busta ha-
* Bdellij vsti partes tres, auripigmenti par- bent: item
tem vnā, tritis mixtis vitior, & superne ex paulō
linamentū conuulsū impone, rosaceo tin post, ego
etum ac expressum. Quidam bdellij partes verò re-
octo, capiunt. Aliud ad robustas putrefa- scio an a-
ctiones oris, ac reliqui corporis. Chalci- lias bdel-
tidis partē vnā, calcis viuæ tantū dē, auripi- liū vti le-
gmenti partē dimidiam, tritis mixtis vttere. gerim.


Aliud

Aliud ad putredines in ore & gingivarū
 abscessus. Florum rosarum drach. 4. alu-
 minis scissi drach. 2. gallæ drach. 2. myrrhæ
 drach. 1. trita melli misceto ac vtitor. Ve-
 rùm ad vlcera leuiter crustosa, iniice alu-
 minis drach. 4. myrrhæ obol. 3. gallarum
 drac. 1. Aliud, Aceti accerrimi heminam
 vnam accipito, in ipsumq; tantum salis do-
 nec non amplius liquetur conicito: deinde
 donec ficcetur coquito, & ex illo accipito,
 atq; aceti cyathum vnum affundito, ac ore
 detinendum exhibeto, per satis multū tem-
 pus, deinde iterum atq; iterum idem facito
 ter aut quater per diem, respectu habito ad
 subiectas partes. In pueris verò lanas circū
 specillum apponito, intingitoque ac locum
 confricato, ea corporis figura ordinata ne
 ipsam deuoret. Quidam verò arido sale
 vtuntur terentes ipsum cū aceto & resiccan-
 tes. Faciunt & alumen rotundū ac fori, pari
 pondere. Oportet autem colluere lentium
 decoctum modico ammixto melle, aut ro-
 sarum cremorē cū melle. Quod si non exu-
 peretur per hanc putrefactio, vrere iube,
 munitis & cōtectis in orbem circumsitis lo-
 cis, Sit autem candēs ac pellucens cauteriū,
 quod admoueatur donec nullus humor
 amplius defluat, & locus videatur exupera-
 tus. Postea colluenda prædicta, & Anthera
 com

compositione vtendum ex melle, vsquequo crustæ circunrūpantur, atque tum sanè melle vteris. Aliud odorum tenerum ad inflammationes & crustas cōmodū. Nucum pinearum drach. 3. amyli drach. 2. aluminis scissi drach. 1. florum rosarum drach. 1. croci obol. 3. Excipe melle. hoc medicamentum ex Ferula Cratippi sumptum dicit.

Ad columellam siue gurgulionem.

C A P. I I I.



Arnosa quædā particula in summo ore apparet dependēs, si quis aperto plurimum ore toto, linguam deprimat. Hæc ipsa caruncula duobus nominibus appellatur à veteribus Græcis, gargareon, & cion, hoc est gurgulio & columna. Cæterùm posteriores Medici ferè omnes, non ita, sed cionidem, id est columellam vocant. Nam qui staphylen, id est vuam, ipsam appellant, eorum neque meminisse præstat. Nos enim non particulam ipsam, sed vnā aliquam eius affectionem, staphylen id est vuam nominamus. Rarò autem hæc affectio circa columellā contingit. Verùm valde sæpe inflammatur. Et sanè quemadmodum in aliis omnibus, in quibus ex humorum influxu contingit morbus. Ita etiam hic prima auxilia reprimunt fluxum. Adstringētis
igi

igitur facultatis hæc esse oportet, & siquidem moderatus sit influxus, moderatè adstringentis, quam austerā priuatim dicunt, Vbi verò vehemētior fuerit influxus, acerbæ. Ambæ enim adstringunt, sed debilius austera, vehementius autem acerbæ. Relatæ sunt autem sæpe ambarū materiæ. Verum præstat & nunc meminisse, quo in paruis inflammationibus debiles, in magnis vehementes adhibeatis. Collutiones itaq; moderatè sunt ex palmulis, aut phœnicobalanis, aut quomodocunq; appellare velis, decoctis quandoq; sola aqua, quandoq; modico melle iniecto. Huic consimilis est collutio ex decocto rosarum, pampinorum vitis, rubi, rubi canini* aspalathi, cyperi, ac cy-

*Vet. cod.
his addit
hederae, cy
pri there
binti, rhū-
ni.

tinorum, Itē siliquarum, & radicum mori, hypocisthidis, malorū austerorum, & pitorum acerborum, ac sorborum. His fortiora sunt myrti ac baccarum eius decoctū, & ex acerbis cotoneis malis, & virgultorum tenerorum ilicis, arbuti, smilacis, ac phagi, & ipsarum glandium, mespilorū item & cornorum, & fructus memæcyli. Generosissimum autē est decoctum gallarū, & Rhois culinarii ac coriarii, ac fructus miricæ, & spinæ Aegyptiæ. Ex his singula tum per se, tum etiam mixtim, cocta ex aqua gai garisfare oportet. Mirum enim quàm mixturæ ipso

ipforum vtiliores saepe fiunt ipso simplici
 vsu. Quin & aridis tritis columellam con-
 tingere oportet, sensim quodammodo ad
 supernam regionem & externā, ad linguā
 videlicet, ducendo. Verū trita arida phar-
 maca cochleario excipiantur, & melius est
 vt ipsum cochlearium ad finē in obliquam
 lineam desinat, quā in rectam. Et ex his
 ipsis, Moderatae quidem sunt rosae, & flos
 ipsarum, & virgulta iam enumeratarū plan-
 tarum, hypocisthis, Rheon, lapis quo su-
 tores muliebria calciamenta expolunt, vo-
 catur autem Ageratus, velut non senescēs,
 aloëque & cyperus, & iunci rotundi odora-
 ti flos, radix nardi Indicæ, ac nostræ monta-
 næ. Fortiora his sunt, & citra manifestam
 aspritudinem adstringunt, fructus spinæ
 Aegyptiæ, Rheon, & quod diphryges ap-
 pellatur, Rhus obsoniorum siue culinaris,
 & ex-acerbis, balauitium, cytini, malico-
 rium, galla, & magis exactè quum ompha-
 citis fuerit. Adstringunt etiam eximiè
 omnia aluminis genera, Scissum verò in-
 ter ea tenuiorum partium est, & ob id
 vtilius. Atramentum verò sutorium vehe-
 mentem habet adstringendi vim, sed non
 expers est calfaciendi, & propterea pu-
 tredinosi vlceribus conuenit, & tamen
 exacerbat columellam, etiam si iam sit in
 scir

scirrhum indurata. Succī porrò adstringentes ex omnibus dictis plantis sunt, & fructibus ipsarum cōsimiliter. Dictum est de ipsis inter illitiones stomaticas, quarum aliquæ ex musti, aliquæ ex mellis mixtura præparantur. Corruptuntur enim succi omnino, si absque melle reponantur, aut rursus reficcantur, si plurimum fuerint cocti. Quidā verò succi etiam si ad solē æstiuum siccantur ad moderatam spissitudinē, per tempus tamen exarescunt: & si ad plures annos durarint, in eam perueniunt ariditatem vt cōteri queant in modū cytinorum & balauftiorum. Tales sunt hypocisthidis succus, & vuae acerbæ, ac glycyrrhizæ & centaurii. Et vt in summa dicam, Omnes succi etiam si absque melle diutius fuerint cocti, nō quidem corruptuntur, verū tēpore fiunt aridi, & quidā sanè velut dixi cōteri possunt, quidam verò natura videlicet tenaces & viscosi, in laminam magis abeunt, quàm vt conterantur. Atque hæc quidem simplicia commoda existūt. Composita autē ex ipsis iuxta duplicem vtilitatē fiunt, Vnā quidem ex his quæ eiusdem generis sunt, quando vehemēti mole ammiscemus, carentes medio, velut florem rosarum aut ipsas rosas cū galla aut alumine permiscentes, & vnumquodq; ex prædictis lenibus pharmacis ad
vehe

vehemens addentes. Non pauca enim numero iuxta huiusmodi permutationē erūt. Imò & iuxta mixturam ipsam ex duobus factam, plura pharmaca fient, quum aliàs alia quantitate misceantur. Velut si duplus sit rosarum flos quantitate aluminis, aut vice versa, duplum alumen ad florem rosarū: possit autem non solum duplum, sed & triplum, & quadruplum, alterū alteri misceri. Neq; clam est etiam par pari, atq; hoc quidem medium fuerit inter summa siue extrema. Reliqua verò omnia partim propius molliori accedunt, quæ videlicet plus rosarum habent, partim autē vehementissimo, quæ scilicet plus aluminis capiūt. In vtrisque verò non obscurum est magis & minus, Quum enim duo sunt pharmaca, fortè quidem est in quo alumen rosas excellit. Fortius autem est in quo triplum alumen ad rosas continetur, quàm pharmacum quod duplum saltem habet. Quod igitur semper me dicere audiuiſtis, etiam nunc dicā. Stulti sunt qui inter duo eiusdem generis pharmaca, vtrum ipsorum melius sit querunt, aut quod tandem omnium optimum existat. Perinde enim faciunt ac si quis querat, præstetne alicam aut ptisanam agris exhibere, aut Num vinum, an acetū mulsum, aut aliquod purgatorium medicamentum, aut Num me-

lius sit veratrum album an nigrum, aut si in
 vniuersum quis de omnibus auxiliis inter-
 roget, quod ipsorum optimum existat.
 Omnia enim respectu ad aliquid, tum emo-
 lumentum, tum detrimentum in se habent,
 quod ipsum etiā Hippocrates dixit primus
 omnium posteriorum quod equidē sciā. Ex
 recentioribus autem medicis aliqui, quem-
 admodum alia multa nugantur, sic etiā ta-
 lia. Vidistis porrò saepe opere perfectam
 quam dico veritatē. Intempestiuē namque
 aliqui pharmacis quæ habebant vñ, deinde
 quod exacerbari affectionem his viderent,
 ad alia citra methodum transgressi, & neq;
 his quicquā efficientes, ad tertiā deinceps
 transitionem, aliquando etiā quartā præter
 rationem delati, & affectum iam malignum
 esse iudicantes, me in consiliū adhibuerūt:
 quibus ostendere mihi iussis pharmaca quæ
 habebant, id quod cōmodum esset ad præ-
 sentem constitutionem indicaui: atq; quum
 ipsi dicerent per pharmacū quod ego con-
 sulebam, ægrum exacerbatum esse, & ob id
 se eo vti formidare, verūm etiā sic persua-
 sos à me ad ipsius vñ cōpuli, & tum illis
 tum vobis, utrūq; quod Herophilus dixit,
 verūm esse ostēdi. Siue enim dixeris phar-
 maca nihil esse sola per se ipsa, recte dices.
 Nihil enim sunt, nisi vtentem eis rectē fue-
 rint.

rint adepta. Siue rursus pharmaca veluti Deorum manus esse dixeris, etiam hoc rectè dices. Iuuant enim maximè, si is qui eis vtitur in rationali methodo fuerit exercitatus, & cum hoc natura prudens. Quidam enim haud sanè præstantiores existètes, de sapientia cum prudentissimis contendunt. Mixtura itaq; medicamentorũ eiusdẽ generis, mediorum pharmacorum vsus gratia fit, & ob id semper duo contraria facultatibus pharmaca in vnoquoq; affectu vos habere operæpretiũ duco. Permiscendo enim ipsa omnino multis mediis pharmacis abundabitis. vna igitur mixturæ eiusdem generis pharmacorum causa hæc est, iam videlicet relata. Alia porrò mixtura ex diuersi generis pharmacis, ex huiusmodi ratiocinatione cœpit. Rarò equidem inuenerit quis affectionem aut discussoriis tantũ, aut repulsiis indigentẽ. Paruæ etenim, & affectionis nomine vix à medicis dignatæ, cōfestim sedantur. Vbi verò generatus affectus maiorem habuerit causam, impossibile est ipsum per repulsiua perfectè sanare, & maximè vbi ægri corpus fuerit humoribus multis refertũ, aut particula affecta natura debilis. Ob id igitur cogimur sæpe quidẽ in principio, sæpe verò paulò post ammiscere quippiã ex discussoriis. Si verò dolor affuerit

500 DE COMPOSIT. PHARMACO.
simul vehemēs, etiam ex mitigatoriis. Itaq;
tunc opus est vnicuique prædictorū phar-
macorum aliquid ex discussoriis addere.
At verò quum & hæc omnino multa sint, à
mollioribus auspicandum erit. Ab acris
enim inflammata exacerbantur. Atque ea
gratia cōposita medicamenta in vsum ve-
nerunt, quum ad aliarum partiū inflamma-
tiones tum gurgulionis. Veluti quum ad
alumen iridem illyricā ammiscemus, aut fa-
rinam eruina, aut thus aut myrrhā. Quū
enim adstringentia sint multa, & non pau-
ca citra acrimoniam discutientia, varietas
pharmacorum ad columellas inflamas
meritò multiiuga facta est. Cæterum tu
perspecta inflammationis magnitudine ac
caliditate, & considerata influxus quāti-
tate, ampliusque copiā humorum in toto cor-
pore per cōiecturam assequutus, pharmaco
in quo aut adstringentium aut discutientiū
vis excellit vteris. Adscribam autem rursus
etiam hic pharmaca quæ ab expertissimis
tradita sunt, partim quidem cum propriis
discriminibus, non pauca verò etiam citra
distinctiones. In quibus sanè ego, velut etiā
in aliis quæ supra tradidi, propria discrimi-
na apponam.

*Quæ Archigenes scripsit ad gurguliones
inflammatos.*

Ad

AD propositam affectionem sic scripsit Archigenes in primo pharmacorum. Vua laxata succum dissolutū admoue, aut gallam tritā cum sale, aut ipsum sal dissolutum, aut lycii radicem tritā, aut omphaciū cum melle. Si verò fortius velis, Atramenti sutorii, squamæ æris, aluminis scissi, misyos, myrrhæ, gallæ, æquas partes tritas ac vino exceptas illine. Si sola illa Archigenes tradidisset & sic cessasset, haud iniuria ipsum reprehenderim citra discrimen scribentem pharmaca facultatis penitus contrariæ. Verum quando in sequentibus hanc ipsam tradēdi negligētia corrigit, rectè facit. Quod verò in discriminatim hæc dicta sint, hinc discere licet. Vua inquit, laxata succum dissolutum admoue. Oportebat equidem etiā hic apponere, qualem succum dicat, Verum quū omnibus iam persuasum sit cyrenaicū succum optimè facere ad columellam inflammata, nō apposuit cyrenaicum, & ob id sanè quispiam ipsi succensuerit. At verò quòd acerrimum & maximè calfactorium pharmacum, ipsum cyrenaicū succum cum contrariis scripsit, nō apponens discrimen, neque ostendens quādo ipso succo vti conueniat, & quando adstringentibus pharmacis, In hoc perperam fecit. Atramentum sutorium enim & squamam æris, & alumen

scissum, & misy, & gallā, omnia æquis partibus in vino terere iubens, ampliusque ad hæc myrrham pari pondere addēs, hoc modo composito pharmaco vuam illinit, quod fortissima adstringendi facultate præditū est. Verūm huius scripturæ indeterminatam incertitudinem mox mitigavit, præscribendo videlicet hæc verba pharmaci compositioni. Si verò fortius velis. Hoc enim scripsit tanquam scientibus nobis quando fortibus utendum sit. Porro mixtum pharmacum est & hoc ubi scripsit, aut gallā tritam cum sale, Galla enim vehementer adstringit. Sal verò discutit cum modica adstrictione. In principio verò sale non est priuatim utendum, sicut neque succo, sed in indurata iam & diuturna columellæ inflammatione. Ipse autem non columella scripsit, sed vua laxata, cum vulgo existimans columellæ inflammationem vuam appellari. Et quid mirum hoc putandū, quando etiam ex nostratibus quidā ob Atticismū superciliosus & iactabundus, vuam ipsam particulam appellari existimavit. Maior enim huius quàm Archigenis ignorātia fuit, quanquam tum ex aliis veteribus huius appellationis vsus parabilis sit, tum ex Hippocrate constet, ex his adeo in prænotationum libro, verbis. Gurguliones cum periculo excinduntur,

tur, vruntur, ac refecantur quandiu rubri fuerint, & magni, Nā & inflāmatio ad hoc cōsequitur, & sanguinis eruptio. Verūm tales graciles reddere aliis artibus hoc tempore oportet. Hæc præfatus Hippocrates deinceps ait. Quum verò totū fuerit separatum, quod sanè vuam vocant, & extremū gurgulionis maius & liuidum fuerit factū, superior verò pars tenuior, in hoc sanè tempore tutum est manus admoliri. Præstiterit autem alio prius euacuata manum adhibere, si tempus hoc permittat, & non suffocetur homo, Manifestius autē adhuc Diocles interpretatus est, qualis sit affectio vua appellata, & post eum Praxagoras & Mantias, & quicunque concomitantia affectus conscripserunt. Quidam verò etiam ob id affectionem vuam appellatā esse dixerunt, quod vux fructui extremum gurgulionis simile apparet. Quæ porrò deinceps ab Archigene scripta sunt, rectè dicta sunt, discrimina nimirum vsus ipsorū eo adscribente. Habent autē sic. Cōmune pharmacū columellæ & tonsillarum. In cōmune tum tōsillis, tum columella inflāmatas, aut exulceratas, in principio conuenit, quies, inedia, & consequens diæta, gargarismi simplices leniter adstringentes. Posca dilutior tepida, aut aqua mulsa, aut palmularū, aut vitis

pampinorum, aut malorum cotoneorū, aut
mespilorum, aut pirastrorū, aut rosarū de-
coctum, ita vt ad austerā decocta parum
* Sic vet. mellis ammisceatur.* rectè hoc loco scri-
cod. psit oportere quid mellis austeris admisce-
ri. Quod tamen Jantè aqua mulsa per se vt
iusserit in principio inflammationū, non re-
ctè fecit. Nihil enim adstringēs habet aqua
mulsa, sed rectissimè quis ipsam extersoriā
dixerit: & si simul discussoriam dicat, nihil
deliquerit. Quæ verò deinceps ab eo scri-
pta sunt, rectè habent in hunc modū. Facit
& acaciæ succus aqua dilutus. Illinenda sunt
etiam consimilia stomatica medicamenta,
velut est quod ex moris constat simplex.
Rhois item syriacæ ac coriariæ cremore
cocto ad spissitudinem, cū melle mixto vte-
re. Aut punicorum dulcium atq; acidorum
succum ad mellis crassitudinem decoquito
ac vtitor. Aut vuæ acerbæ succum expres-
sum adhibeto. Aut rubi, aut lentisci, aut te-
rebinthi, aut myrti, aut rosarum succo cum
melle vttere. Et postea forinsecus alumen
scissum quum dimidia aloës parte, ac modi-
ca acacia cum succo solani, imponere con-
sulens, hæc verba infert. Quod si moretur
inflammatio, acetum tepidum per se garga-
risset, aut galla trita ammixta, aut rubi aut
agrestis oleæ radice. Aut cyperi decoctum
cum

cum melle. Aut passum cum aqua. Aut sycites vinum calidum. Aut malux decoctum. Manifestum est enim hæc auxilia communia esse, velut prædictum est, tum columellæ, tum tonsillarum. Verùm non rectè videtur mihi passum cum aqua confidere, utpote inbecilli ad talia medicamento: quemadmodum etiam vino sycitæ, & malux decocto, priusquam ad suppurationem perveniat affectus: oportebat autè hoc ipsum ab eo indicari. Connectit deinde Archigenes ad prædicta sic scribens. Illinito & ea quæ supra ad vlcuscula in naribus scripta sunt. Priuatim autem picem cum oleo aut melle. Aut crocomagma cū modica galla & melle. Aut alumen rotundum cum flore rosarū tritum, aut rosas aridas, aut florem ipsarū, trita insperge, aut tum tōsillis, tum vux insuffla. Aut cyperi radicem, vel myrtum, aut lentiscum, vel rubum, aut gallā, aut salē tenuem similiter insperge. Aut omphacium vel lentiscum cum melle illine. Aut florem rosarum vel crocum cum mali punici succo. Hic rursus adstringentia ad discussoria citra discrimen permiscuit. Nihil enim simile est inspergere salem tenuem, aut rosas siccas, vel florem ipsarum. Aut pice cum oleo uti, quod pharmacum est calfactorium ac discussoriū, aut galla & alumine, quæ phar-

maca sunt maximè adstringentia. Cæterùm indurata iam inflammatione, rectè pix liquida adhibeatur, aut arida oleo liquefacta. Tunc verò etiam sal commodus fuerit, corpore videlicet prius euacuato. Incipiente verò aut augescente & cū multa caliditate vigente, maximè contrariū auxilium est pix cum oleo, eademq; ratione etiā sal. Consequenter autē rectè descripsit Archigenes ad vigentē affectionem auxilia. Indicat autē ex eo, augescens & nihil opis sentiens ex præscriptis malum. Habet sermo eius hoc modo. Si verò in vigorē peruenerit affectio, aut alius subducatur, aut furfurum loturam calidā gargarisset, aut ptisanæ succū, aut passum tepidū, aut radicis dulcis decoctum cū passō & hyssopo, aut ficus vino incoctas, aut ptisanę succū in quo vuæ passæ sunt incoctæ. Magnopere iuuantur si amygdalinum oleum in aures infuderis, forinsecusque spongiis expressis leniter foueris. Quin & omelysis ex cruda hordeacea farina imponenda, aut ex farina seminis lini aut fœni græci, aut etiam mixtura ex his omnibus facta. Si ita propè suppurationem fuerint tonsillæ, coadiuuare assiduè per ficuum decoctum oportet, & tantum non indefinenter id ad gargarissandum exhibere, similiterque aquam mulsam calidam. Si

ve

verò nihil tale apparuerit, augeſcat tamen
 malum, ita vt ægrè tranſglutire poſſint
 ægri, & ſuffocationis principium ſit nobis
 ſuſpectum, alius forti clyſteri aut glande
 ſubducendus eſt, & vena cubiti ſecanda, cu-
 curbitæq; cum ſcarificatione collo ac men-
 to affigendæ. Fomentis etiam ac cataplaſ-
 matis frequentius & robuſtius vtendum,
 & aſſiduis gargarismis. Quod ſi ad nullum
 horum præſidiorum cedat ſed augeatur,
 venæ ſub lingua ſecetur, aut iuxta angulos
 oculorum, atq; ea quæ in fronte eſt. Illina-
 tur autē aſſiduè fel tauri, & elaterium cum
 melle, aut ſal cum oleo veteri melleque &
 aceto. Aut centaurea cum melle. Aut Abſin-
 thium cum nitro & melle. Aut hirundines
 integras vnâ cum pennis vſtas ac tritas cum
 melle illinito. Aiunt aliqui etiam ſummè
 facere hirundinum pullos teneros valde
 ſiue recentes, ſiue inueteratos aſſatos, &
 in cibo exhibitos. Statim enim leuant ſuf-
 focationem. Siue autem pueri ſint, ſiue ſe-
 nes, ſulphur & iridem cum melle delingen-
 da dato. Quod hæ communes medelæ ſint
 vtriuſque, velut in principio dixit, vix vi-
 delicet & tonſillarum, manuſtum fecit ex
 his quæ conſequenter infert, quum ait. Ali-
 qui angina prehenſis, quos tum ſynanchi-
 cos tum cynanchicos Græci appellant,
 cla

elaterii, & fellis tauri, vtriusque obolos. 2.
cum aqua mulsa tepida bibendos præbent.

Quidam verò asellos sub aquariis vasis nascentes in potu exhibent, aut delingendos dant, aut dolētibus & affectis partibus illinunt, & valde se iuari testantur. Quin &

per vaporem intra os receptum hoc modo fomentum adhibetur. Origanū aut hyssopum, aut satureiam, cū sufficienti aceto diligenter in olla feruefacito obturata. Operculum autem circa medium habeat foramen.

Deinde harundinem ad foramen operculi ac os ægri adaptato, ac fomentū admittito.

Si verò os à feruore harundinis cōburatur, ouum vacuum vtrinque perforatum ægri in ore contineant, & per ipsum harundo inseratur. Mollius fit fomētū, si pro aceto aqua sumatur. Quidam nitrum, & origanum, & nasturtii semen, ac oleum in posca trita miscent, & similiter pro fomento adhibēt.

Aut cinerem pullorum hirundinum implumium illine, aut solani succum, & butyrum æquis partibus cum rosaceo cerato mento impone. Eis verò qui suffocantur, picem cū aqua & nitro in potu præbe. Hæc quidem Archigenes scripsit. Ego verò nunquam

tentaui vllialicui, ea quæ bibuntur pharmaca, in eiusmodi affectionibus exhibere, quallium sanè tum ipse, tum alii quidā memin-

runt

unt. Itaque hoc quod ad finem sermonis
 præscripti habetur, his verbis: Eis verò qui
 suffocantur, picem & nitrum cū aqua in po-
 tu præbe: non possum mihi persuadere qua
 ratione sit dictum. Imò neq; ex præcepto-
 ribus aliquem, neque aliū vllum eo vtentē
 vidi, neque etiā ipse in vsum assumere ten-
 tavi. At verò venam secare eis qui suffocan-
 tur, & eluere forti atque acri clysteri, &
 purgatoria exhibere, gratia euacuandi vni-
 uersum corpus, & transferendi infra humo-
 rum momentū qui ad affectas partes ferun-
 tur, rationabile est, & multa experientia iu-
 dicatum ac cognitum. Similiter etiam post
 totius corporis euacuationem, & diuersio-
 nem ad infernas partes, pharmacis acribus
 multum discussoriis vti, rationi consenta-
 neum est, & experientiā testem habet. Pi-
 cem verò cum aqua & nitro in potu præbe-
 re, abstinui, vt pote quum neq; alium vten-
 tem viderim, neque rationem ad hunc vsum
 duceam:

*Quæ Apollonius in primo parabilium
 prodidit.*

Apollonius in primo parabilium sic ad
 verbum scripsit. Ad inflammata[m] co-
 lumellam illitiones. Sale trito & melle illi-
 neus reprimēs columellā. Picem illinēs per
 digitum apprimito. Succū cyrenaicū aqua
 dilui

diluito, & columellæ adhibeto. Chalcitidē
tritā similiter admoueto, omphacio trito
cum melle vtitor. Hæc Apollonius. Licet
autem nobis videre in his quæ absq; disci-
mine scripta sunt, quod si quis nō vniuscuiusque
indefinitè scripti facultates nouerit,
quo in oportuno tempore eis vtatur, ma-
ximum omnino nocumentū inferet. Scri-
ptum est itaque hic primum omnium, Sale
trito & melle vtendum esse. Postremū au-
tem, omphacio cū melle. Contraria autem
facultas est omphacii ad salē. Quare si quis
in principio sale vtatur, maximè si humores
in corpore ex æquo abundant, aut etiā cir-
ca caput hæreant, extremè ægrum lædet.
Omphacium verò in principio commodis-
simum est, non trahens, neque euellens ad se
ex alto, velut sal cum melle, sed repellens.
Sales autem cum melle discussoriam vim
habent, modica adstrictoria vi sali com-
mixta, quæ sanè per ammixtionem mellis
penitus euertitur. Cæterum id quod ex pi-
ce cōstat, inueteratis inflammationibus, &
iam in scirrhum, vt ita dicam, induratis con-
uenit. Quemadmodum etiam cyrenaicus
succus non incipientibus, sed vbi iam quod
influit per adstringentia repressum est,
prodest. Chalcitis verò in totum inepta
est, præterquam si valde inueterata & ægre
cura

curabilis sit affectio. Est enim medicamentū
 mordax si cruda adhibeatur, quapropter ut
 vim ipsius deleamus, vsta frequentius uti-
 mur. Deinceps Apollonius hæc ad verbum
 scripsit. Gargarismi ad pendulam columel-
 lam, Origanum tritam, aceto & aqua affu-
 sis, seruefacito, & cum caricarum succo mi-
 sceto, ac utitor ad gargarissandum. Aut
 hyssopum terito, & caricarum coctarum
 succo misceto, ac utitor velut origano.
 Mentam ac rutam & coriandrum lacte asini-
 no trita gargarissanda præbe. Apium &
 lauri folia trita, & vino aut lentis decocto
 diluta gargarissato. Noui quendam qui
 omnibus ab Apollonio scriptis in discrimi-
 natim utitur, in principio inflammationis
 gurgulionis vno ex his vsum esse, & ægrū
 extremè lesisse: præter alia enim neque scie-
 bat quid pendula columella esset, quum ve-
 lit Apollonius valde laxatam absque in-
 flammatione, gurgulionis affectionē osten-
 dere, quam etiam resecare consueuimus,
 atque in hac reuera pituitam detrahen-
 tia & calfacientia pharmaca commoda exi-
 stunt. Nam in totum subalbida fit & exan-
 guior. Deinde Apollonius hæc sub-
 dit. Lotium asini plurimum & calidif-
 simum bibendum præbe. Idem etiam in
 angina. Miror equidem eiusmodi auxilia
 tra

tradentes: certè enim scio omnes homines, paucis omnino exceptis, citius mori velle, quàm urinam asini bibere. Verùm hic etiam plurimam addidit, & aliàs velut etiam antè dixi, absurdissimum est curantè oris inflammationem, pharmacum potabile exhibere, nisi si expurgantium numero existat, hæc enim alterius vsus gratia dantur. Ex aliis sufficiunt quæ citra transglutitionem auxiliari possunt. Quin & quod postea scriptũ est similem habet absurditatẽ, quod itidem bibere iubet. Scribit itaq; sic de ipso. Lauri folia trita ex vino & aqua bibẽda præbeto.

Quæ ab Hera tradita sunt.

Heras igitur multò melius quàm Apollonius scripsit hoc modo. Ad columellam laxatam. Gallæ omphacitidis partem. i. *salis ammoniaci partem. i. Singula per se ac simul terito, & expleto inde conducunt hîc chleario vuam cõtingito. Lapidem Ageraluminis tum appellatum, quo sutores ad muliebria scissi parcalciamenta expolienda vtuntur, deradito, tem vnã. indeque cochlearium expletum vuæ adhibeto. Ex his duobus pharmacis, alterũ posterius omni molestia caret, neque nocere potens, neque magnopere iuuare, quocunq; tandem tempore quis eo vtatur. Fortius est prius. In principio itaque & quum valde rubent, minimè aptum est. Si verò præcua
cua

cuato toto corpore, & post repulsoriorum pharmacorum vsum, adhibeatur, vbi non valdè rubens sit gurgulio, iuuare potest. Ex contrariis enim fortibus componitur facultatibus repulsoria & discussoria. Quare non rectè fecit Heras indiscriminatim ipsa tradendo.

Quæ Heraclides Tarentinus tradiderit.

Tarentinus porro Heraclides in libris ad Antiochidem, ad inflāmatas columellas sic scripsit. Omphacium siccum terito, & ammixto sufficiēti melle adhibeto. Aut gallam tritam cum melle, aut alumen scissum eodē modo. Aut succū cyrenaicū cum melle. Aut Melanteriam qua sutores vtuntur. Aut Andronium pastillum, quē in vulnerariis medicamētis referam, cū vino. Oportet autē post hæc lentiū decoctū gargarissare. Rectè ad finē hoc adscripsit. Vehemētia enim sunt omnia præscripta ab ipso pharmaca, acerbæ qualitate prædita, & ob id exasperanti, Itaque aspretudinē ab ipsis inductam mitigare vult per lētium decoctū. In moderata inflammatione nō est necesse his vtī, quemadmodum neque vbi columellæ valdè rubræ fuerint, & calidam inflammationem habēt. Imò neque in declinatione earum: tunc enim discussoriorum medicamentorum vim prædominari oportet.

K

Ab Asclepiade prodita.

Asclepiades ad easdem sic scripsit. Sic-
cum ad laxatas columellas. Anethum
vnà cum semine & radicibus quod satis est
accipe, & in vas fictile cōiectum, cuius os sit
subobturatum, & ipsum vas luto oblitū, in
furnū donec vas ignescat mitte, deinde ex
furno extractum anethum vstum tere, &
sublatum repone. Vsu verò expetente ane-
thi partes duas, accipe, & iridis illyricæ in
tenuissimum puluillum redactæ partē vnā,
ammisce, ac per arundinē insuffla. Aliud,

Rosarū siccarum sextariū vnū, nardi cel-
ticæ vnà cum radicibus & adhærente terra
fasciculum vnum, nidi hirūdinū syluestriū
aridi drach. 3. myrrhæ drach. 8. gallas om-
phacitidas nume. 15. contusa & trita insuf-
fla, & cum digitis adhibe. Ex his duobus
pharmacis prius penitus nihil ex repulsoriis
habet, sed est rotum discussorium. Alterum
verò ex cōtrariis mixtum est facultatibus:
multam enim discussoriam vim habet syl-
uestrium hirundinum nidus, adstringentem
autem gallæ, Mediæ verò potētix est myr-
rha, & mixtæ nardus celtica, Ita vt tum di-
scussoria, tū adstrictoria facultas, ambæ in
eo sint moderatæ. Ceterū per arundinem
eiusmodi pharmaca insufflari, valdè impro-
bo. Defertur enim ex ipsis multum, tum in
gu

gulae summum, tum in ipsam gulam. Praestat itaq; cochleario indita apprimere, quē admodum ego vti soleo, vt vidistis. Quin & tertium pharmacū Asclepiades post praedicta duo conscripsit his verbis. Siccum ad laxatam columellam & tumentem Neapolitae. Piperis albi drach. 1. myrrhae drach. 1. aluminis scissi drach. 2. gallae omphacitidis drach. 2. trita admoue. Hoc pharmacum à principio vsque ad finem vtile esse poterit, praeterquam in vehementer rubentibus. In his enim vitare oportet acrium ac mordacium valde mixturam, quale hoc loco piper existit. Aliud deinceps eiusdem facultatis scripsit ad tumentes columellas ex his compositum. Lapidis agerati drach. 4. floris lapidis Afii drach. 4. terrae samiae drach. 4. aluminis scissi drach. 2. croci torrefacti drach. 2. gallarum omphacitidum drach. 2. tritis vttere. Hoc & nos vsi sumus saepe vt optimo, & quod omni tempore iuuare possit, praeterquam velut in praecedenti dixi, statim in principio, & quū ruber & calidus fuerit inflammationis tumor. In inueteratis autem iam, & corpore euacuato, post vnum vsum statim magnam commoditatem exhibet. Sunt enim vehementer adstringētia, ac discutientia, & ea quae mediae materiae sunt, in ipso temperatè mixta.

*Critonis pharmacum hoc modo scriptum
ad columellas.*

HOc pharmacum ad ipsam temporis
oportunitatem apparato. Ofsium pal-
mularum, nucum tenerarum immaturarum
ficcarum, vtrorunque drach. quatuor, vrito
ac in puluillum terito. Vtere arido admo-
to. Et in hoc pharmaco ofsium palmula-
rum vis satis discussoria est. Nam & in aliis
affectionibus, eorum experiētiā habemus,
quod eiusmodi viribus sint prædita. Nucū
verò tenerarum ficcarum cinis, discussoriā
vim habet vnā cum adstringente.


Sorani ad columellas.

Quin & Soranus pharmacum indiscri-
minatim scripsit, non apponens in
quibus priuatim faciat. Habent autem ver-
ba eius hoc modo. Radicem dulcem con-
rundito, & mel & dulcem aquam pari men-
sura affundito, deinde coquito, & succum
gargarissandum præbeto. Peccauit in hoc
quod non adscripsit, maximè mitigatorium
hoc pharmacum esse, quod in vigore inflam-
mationū magnopere auxiliari pōtest, Hu-
ius vsus commodus etiam est, vbi ex acer-
bis pharmacis immoderatus quis irritarit
& exasperarit columellam inflammata.
Hanc enim lenit hoc pharmacum.

De

De pharmacis ad vlcera oris aphthas ap-
pellatas.

CAP. II II.



Lceratiões in superficie oris ob-
ortas aphthas appellāt, habētes
quippiam igneæ caliditatis: fiūt
autē vt plurimū pueris lacten-
tibus, quū aut vitiosum fuerit lac nutricis,
aut nō probè ipsum concoxerit infans. Cu-
rantur facilè vtpote quæ ex moderatè ad-
stingentibus sedantur. Quandoque tamen
diuturnæ fiūt ac ægrè solubiles, & progres-
su temporis putredinosum quid acquirunt,
quod à Medicis Nome appellatur. Scripta
itaq; sunt & ad ipsas medicamēta modera-
ta quidē ad eas quæ nihil maligni habent.
Fortia verò ad eas quæ iam quid putredi-
nosum & serpēdo depascens habent. Men-
tionē faciā eorū quæ recētiore coacerua-
runt, Nam ex his quæ veteres cōscripserūt,
optima cum magna experientia ipsi elege-
runt, & quædā eorū quæ postea inuēta sunt
apposuerūt. Inuenias autē post veteres, etiā
Mantiæ & Heraclidæ Tarentini plurima
pharmaca scripta. Similiter & Menecrates li-
brū optimorū pharmacorum inscripsit, ex
quibus plurima ipse inuenit. Quēadmodū
& cappadox Heras. Andromachus autem
duos, & tertiū in quo oculorum pharmaca
continentur. Plures autē libros cōposuerūt

Antonius Musa, & post eū Asclepiadē duo, & post hos Crito. Verū hi quidem tres post Andromachum nati sunt, Heras autem ante Andromachum, & ante ipsum etiam Musa ac Menecrates. Longo verò tempore etiam hos præcessit Heraclides, & præceptor eius Mantias. Verū Mantias velut ab initio Herophili sectator fuit, ita etiam per omnia mansit. Heraclides autem medicorum empiricorum sectā elegit, optimus medicus tum circa alias artis partes factus, tum plurimorum pharmacorum expertus. Quum itaque aphthæ, (de his enim sermo institutus est,) malignæ euadunt, fortioribus medicamentis egent, qualia etiam alias in tonsillis ac ore affectiones sanant. Prædicto igitur scopo compositionis eorum, nihil amplius opus habeo de his dicere, sed ad narrationem progrediar præcognitorū, initio sumpto ab his quæ Andromachus scripsit, quemadmodum consueui ad verbum ipsa transcribere.

Quæ Andromachus scripsit ad aphthas.

Non solū Andromachus, sed & alii multi duo pharmacorum genera ad aphthas cōscripserunt. Ad eas quidem quæ nihil maligni habent, moderata viribus pharmaca componētes. Ad malignas verò fortiora: adscribūt autem in his ipsi aliquādo, qu

quod ad aphthas & vlcera hoc pharmacum conuenit, aliquando quòd aphthas putredinosas, Quum verò simpliciter ad aphthas adscripserint, simplices indicant & nihil maligni habentes. Andromachus igitur ad malignas aphthas sic scripsit. Ad aphthas in ore & vlcera. Aluminis scissi vsti drach. duas, fructus ericæ drac. vnā, oleo excipito, & per digitum locis apprimito. Aliud, Aeruginis drac. 2. aluminis scissi partes duas, gallæ in puluillum redactæ partem vnā, terito & per linteolum cōcernito, deinde digitum oleo madefacito, succumq; excipito, & tonsillis extergendis apprimito, item palato, & vuæ. Disparat pelliculas, & tollit asperitates circa ipsum os, callos excoriat, & vlcera ad cicatricem perducit. Cæterum ad aphthas in superficie hærentes sic scripsit. Ad aphthas lycium Indicū vino tritum circumlitum facit, & ericæ fructus tritus, aut rosæ siccæ cum melle. Hec præfatus infert. Si verò nigra sint & maligna, Vuæ passæ puræ partes tres, anisi tantundem, trita cum melle illine, deinde collue.

Que Crito ad aphthas scripsit.

CRito verò sic ad aphthas scripsit. Portulacam in melle tinctam manducet, aut oleæ foliis in vino coctis os colluat, aut foliorum myrtialbæ decocto ex vino, aut

aruginis vermiculatae obol. tres, in vini he-
 minae parte quarta tritos colluat. Quin &
 * Sic vet. galla in acri aceto teratur, ac illinatur. * In
 cod. pueris autem tedas minutim cōcisas, & me-
 dullam bouinam coquito. Faciunt & amy-
 gdalae amarae cum melle. Nigrefactas autē
 aphthas, vna passa exacinata & aniso tritis
 cum melle illine. Tarentinus autem Hera-
 clides, vbi ex terferis ait farina erui cū mel-
 le, gallam cum melle adhibe. Conuenit &
 Rhus obsoniorum cum mentae ramulis. Sit
 autem Rhoeis copia quātum tribus digitis
 prehendi potest, mentae verò ramuli tres, &
 rosarum folia septem, & nuces pineae septē.
 His omnibus cū melle tritis vtitor, aut ly-
 cio ex aqua. Conuenit & fex vini dulcis il-
 lita cum melle. Aut alumen, & malicorium
 punici dulcis, æquis portionibus terito, &
 adipe anserino mixta illinito, atque aquam
 calidam frequentius colluendam præbeto,
 ampliusq; adipem anserinum admoueto.
 Aliud Musae. Fructus myricae drach. sex,
 aluminis scissi drach. duas, oleo excepta ad-
 moue. Aliud maximè in pueris. Rhoeis
 rubrum tritum melle mixtum illine, aut
 adipem suillum & mel liquefacta. Præbeto
 eis etiam gargarissandum lac asininum.
 Quod si multa saliuā feratur, gallam & fo-
 lanum aceto diluta gargarissare facito, aut
 vio

violas albas siccas cum melle tritas illinito.

Hæc quum scripserit Crito, meritò quis eis succenseat, velut etiam alios semper reprehendo, qui ex ordine indiscriminatim auxilia recensent, non apponentes an incipiente affectione, aut progrediente, aut decedente, aut vigente, aut decrecente, conueniant, & Num parua existente affectione & mansueta, aut adeò maligna vt iam putredinosum quid habeat. Ex his enim quæ scripsit aliqua simplicissima sunt in pueris maximè conuenientia nullam affectionem habentibus. Velut quum adipem suillum & mel liquefacta assumit, & multò magis quum asininum lac colluere præcipit. Simplicissimum pharmacum est & portulacæ melle tincta & manducata, & collutio ex foliis oleæ, similiterq; ex myrto alba. Fortissimū verò quod ex ærugine & vino constat, quemadmodum etiam galla acri aceto trita ac illita. Valdè enim forte hoc pharmacum, velut etiā id quod ex ærugine constat. Verū in illo paucissima est ærugo, (obolos enim tres dixit in vini quarta hemina parte terendos esse ac colluēdos) debilisq; fit, copia mixturæ vini exoluta, Gallæ verò aceto acri trita vt crassa fiat, & illitioni apta, valde vehemens est pharmacum: Quemadmodum etiam quod ex alumine

K s

& malicorio punici dulcis cōponitur, quod nisi ad adipem anserinum ammixtum esset, ad putrefactiones fortes congruens esset. Fortè est & quod ex myricæ fructu ac alumine constat, sed non adeò velut id quod ex galla & aceto. Semel porrò tantum rectè fecit apponendo in verborum serie sic. Quod si multa saliuā feratur, gallam & solanum aceto diluta gargarissare facito. Multam enim saliuam ferri, maiorem affectionem esse significat. Præstabilius autem fuisset statim dixisse. Quod si pascendo proserpat affectio, aut vlcera profunda fiāt, aut eiusmodi quippiam adscripsisse.

De his quæ Asclepiades ad aphthas scripsit.

Rectè igitur fecit Asclepiades, tametsi non multa pharmaca ad aphthas conscripsit. Verū tamen in duobus quæ in principio tradidit sic. Ad aphthas citra nomen serpendo depascentē. Deinde post duo rursus adscribens. Ad aphthas depascentes. Lenia enim sunt duo pharmaca, alterum quidē prius in quo ait, Medullam bubulam melle mixtam ac tepesactam illinito. Maximè verò pueris infantibus est commodum. Alterum verò est, Adipe suillo melli ammixto vtitor. Cæterum ad depascentes aphthas, gallarum decocti cyath. i. ac mellis tantundem miscere iubet, & feruefacto vti. Verū
ego

ego tum hoc pharmacum, tum alia tria post ipsum tradita, paulo antè in pharmacis ad nomas præscripsi: neque enim referre puto, siue ex aphtha, siue ex alio quopiam transitio ad nomen contingat.

Quæ ab Apollonio ad aphthas scripta sunt.

A Pollonius autem Herophili sectator in primo parabilium pharmacorum sic scripsit ad verbum. Ad aphthas albas.

Chalcitidem oleo tritam pēna illinito, hoc euestigiò sedat. Postquam verò pura facta fuerit, Myricæ fructū tritum, & aqua mulsā aut vino dilutum illinito, maximè infantibus. Deinceps autem aliud scribit, & maximè ad nigras aphthas. Vuā passā exacī natam & anisum trita cum melle illinito.

Et rursus aliud, Atramento sutorio trito cum melle vtitōr. Videtur fanè in malignis, eiusmodi pharmacis iubere vti. Adscripsit itaque ad primum, Ad aphthas albas. Ad secundum, Ad nigras, ostendens per id colorem præter naturam, & magnitudinem affectionis. Consequenter adscribit & collutiones ad aphthas, hac verborum serie. Vino nigro austero & subadstringente colluito. Oleæ foliis in vino coctis colluito. Myrti albae foliorum decocto cum vino similiter vtere. Hæ collutiones citra discrimen scriptæ nullum detr

detrimentum inferunt. Nā & in moderatis,
 & in maioribus, & in maximis affectioni-
 bus conueniunt. Rectè verò deinceps aliud
 valde efficax scripsit. Aeruginis vermicu-
 lata obolos. 3. in vini quarta heminae par-
 te gargarissandos præbe. Deinde etiā vi-
 num colluendum præbe. Hoc enim in for-
 tioribus conuenit, quemadmodū etiā quod
 consequenter sic scriptū est. Muriam oliua-
 rum & acetum pari mensura mixta colluen-
 da dato, indeque vino colluito, postea etiā
 * In pue- aqua mulsa, & deinde aqua * In omnibus
 ris vetu. cod. autem oleum colluendum præbe. Post hæc,
 duo pharmaca scribit diuersis formis ac
 speciebus aphtharum congrua. Hyssopum
 enim tritum ad calidas & erosas affectio-
 nes, itemque puras maximè cōtrarium est:
 congruit autem sordidis & inflammatis
 aphthis. Omphacium verò cum vino aptū
 est pueris & mordacitatem sentientibus ac
 erosis. Iubet autem omphacium cum vino
 tritum collui, hyssopum verò cum vino aut
 aqua mulsa. Validum valde est quod ab his
 sequitur pharmacum, vt iam pascendo pro-
 serpentibus aphthis conueniat, quod ipsum
 componit, myricæ fructum coquens cum
 aceto. Validum est & quod deinceps ab eo
 scriptum est, in quo ait, Gallam tritam in
 acri aceto colluendam præbe. Hoc verò
 quod

quod postea sequitur, in quo ait, succo fil-
 phii diluto similiter vtitor, & postea oleum
 coluendum dato: etiam ipsum acre & mor-
 dax est ac discussorium non adstringens.
 Non rectè itaque adstringentia & acerba
 ac repulsoria, discussoriis ammixta sunt ac
 acribus, atque hoc nullo discrimine adie-
 cto. Quod verò sequitur ex aceto apparatū
 generosum est: quod autē non apposuit ad
 acetum, acre, in hoc deliquit, & quod per se-
 men lini moderatius reddi tacuit, adiecit
 autem ipsi etiam lolium, pharmacum multū
 discussorium, atque propterea ipsum ad lin-
 guæ tumores conuenire ait. Verū adscri-
 bam omnem ipsius dictionem. Semen lini,
 ac lolium, æquis partibus aceto trita col-
 luito. Hoc itidem ad linguæ tumores facit.
 Longè lenius his omnibus pharmacum de-
 incept scripsit hoc modo, Folia pruni con-
 tusa ac lacte permixta colluito. Quū enim
 adiecerit sermoni, colluito, manifestum est
 quod multo lacti pauca folia ammiscet. Nā
 si folia cum lacte trita pro pharmaco inun-
 ctili esse iussisset, palam utique esset, quod
 multa folia, paucum verò lac esse iussisset.
 Deinceps porrò etiam quæ mansa aphthas
 iuuent annectit. Mandendæ sunt oliuæ mu-
 ria conditæ. Manifestū est lenissimū hoc
 pharmacum esse. Et rursus. Portulaca melle
 tin

tineta manducetur. Et hoc similiter mite est. Differunt hæc duo inter se in eo, quod oliuæ muria condita & adstringunt, & discutunt: plurimam verò in se adstringendî vim habent. Portulaca verò cû melle imbecillius est pharmacû. Consequenter probè fecit quum ait, In pueris conuenire quæ dicturus est medicamenta. Scribit verò de eis in hæc verba. Vbi puer aphthas habeat, Similaginem & medullâ bubulâ, ac farinam, cocta in cibo exhibeto. Si verò fugere nequeat, lienê bubulû in vino coctû, ac tritû cum melle, in cibo dato. Hoc pharmacû superuacaneum est, & plus æquo curiosum. Deinceps rectè scripsit. Abstinentum circa dietam, ab acris, & salis, & acidis tñ edulis, tum potibus. Deinde haud scio quo modo, in hanc sententiâ scribit. Atramentû sutorium vltum tritû cû melle illinito. Hoc enim medicamentû superius scribere oportuit cum aliis fortibus pharmacis.

Quæ Archigenes scripsit ad aphthas.

Quædam ex his quæ Archigenes ad aphthas scripsit, eadē sunt cû præscriptis, Verùm visum est mihi ex ordine omnem ipsius sermonem adscribere, ita vt nihil ex eo relinquam. Scribit igitur sic. Ad aphthas collutiones faciunt, Foliorû oleæ decoctum, aut foliorum myrti albæ eodem mo

modo. Aqua oliuæ colymbadis appellatæ, hoc est muriaë innatantis. Facit & amurca, & marrubii succus, aut lentis decoctum, seu rubi, aut cypri. Aut æruginis vermiculatæ obol. 3. in vini cnidii quarta hemina parte dissolutas colluat. Illitiones autem faciunt pleraque ex descriptis stomaticis medicamentis: priuatim autē congruunt hæc. Aluminis scissi, florum rosarū, æquales partes, fructus myricæ duplum, vtere siccis. Aut thus & glycyrrhiza succum æquis portionibus, gallæ, myrrhæ, anisi, singulorum parū quid, cum vino protropo illine. Aliud,

Mannam & salem pari pondere sicca, per pennam adhibeto. Aliud, Fecem vini dulcis cum melle illinito. Aliud, Misy & alumen & Rhoën cum melle, aut chalcitidem cum oleo, per pennam illinito: vehementer bonum est. Aut oleæ folia cū oleo illinito. Postquam verò repurgatæ fuerint, myricæ fructum cum aqua mulsæ aut vino illine. Aut ubi cum erui farina & melle exterseris, gallam cum melle adhibe. Aut myricæ semen & aluminis tertiam partem cum oleo illine. Hoc etiā ad nomas facit. Aut adipem suillum aut anserinum manna inspersa illinito. Aut gallam tritam cum oleo. Aut liquidum alumen dilutum. Aut cypri folia manducent.

Aut

Aut lycii radicem aridam adhibe. Aut oleæ germina trita ex melle. Aut gallā cum sale. Si verò extendatur affectio, & serpēdo putredinosē depascat, collutionibus quidem & gargarismis vtendum est ad aphtas descriptas fortioribus: priuatim autem muria frequentius colluenda est. Aut herbā sacrā aqua aut vino incoctam colluendā aut gargarissandam dato. Illitionibus etiam ad aphtas descriptis fortioribus vtantur: priuatim verò cornu cerui tritum affrica. Aut atramētum sutorium tostū tritum cū melle. Aut æruginem æris siue squamā cū melle. Summè facit ad nomas, fœniculi radicis vstæ cinis. Hæc ad aphtas Archigenes in primo de pharmacis scripsit, quæ parum ab est vt omnia etiam aliis sint scripta. Quid igitur operæ pretium duxi eadē bis scribere, quanuis cauerim ne hoc facerem? Quod sanè & Archigenem, quem scimus maiore quàm alios dignitate, etiā communia cum propriis discriminibus scribere posse videbam nunc ipsum in pluribus eiusmodi doctrinæ negligentē. Nunc enim omnia confusim proiicit auxilia, vnā cū hoc quod cōtinenter inter se scribendo commiscuit, lenissima & acerrima. Quid enim simile habet ærugo ad lentis & rubi ac cypri decoctum? quid galla simile adipi anserino aut
sui

fuillo? Acre enim & erodens fortiterq; re-
 siccans pharmacum est ærugo. Rubus autē
 & cyprus, & lens, paucissimam habent ad-
 stringendi facultatem. Sic etiam galla for-
 tissimè adstringens, contrariam vim habet
 fuillo ac anserino adipi. Quin & deinceps
 ab eo scripta planeque omnia quorū men-
 tionem facit, eandē confusione perturbati
 ordinis habent. Præstabat autē velut semel
 alicubi in sermone apponendo dixit, Hoc
 etiam ad nomas facit: eodē modo etiā alia
 distinxisse vt adscripsisset videlicet, hoc
 quidem infantibus ac pueris conuenit, hoc
 verò perfectis: & hoc incipientibus aut mo-
 deratis aphthis, hoc autem vigentibus &
 fortibus. Maximè verò omnium, aut inflā-
 matis & calidis, aut magis frigidioribus: &
 ex inflāmatis, hoc quidē rubicundioribus,
 hoc verò flauioribus. Aliæ enim ex sangui-
 ne, aliæ ex flaua bile inflammationē habēt.
 Quemadmodum rursus non inflāmata pi-
 tuitosa in totū existunt, quemadmodum
 aliqua ex inueteratis humoris atræ bilis
 malignitatem acquirunt. Cognoscentur hæ
 omnes facilè visu simul & tactu. Visu quidē
 ex coloribus, quemadmodū etiam nunc di-
 ctum est. Rubicundiores enim sanguineum
 humorem præualere ostendunt: flauiores
 autem amaram bilem. Quemadmodū rur-

L

sus albescentes pituito siorem, liuescentes,
 & nigrescentes, atreæ bilis succum. Qui
 enim hæc ritè discreuerit, noueritque am-
 plius singulorum simpliciū pharmacorum
 facultatem, quemadmodū in libris de ipsis
 à me scriptum est, is in vnaquaque aphthæ
 specie, tum simplicibus, tum compositis vti
 sciet, velut iam sæpe est prædictū. Conside-
 rabit autem simul & corporū naturas, Num
 molles sint & humidæ, velut in pueris, eu-
 nuchis & mulierculis, an duræ & aridæ, ve-
 lut in piscatoribus ac nautis, & venatori-
 bus atque agricolis. Fortioribus enim cor-
 poribus fortiora adhibebis pharmaca, debi-
 lioribus molliora. Ego porrò infantibus
 qui adhuc à nutricibus aluntur, lentem cum
 modico pane & medulla cerui, aut vituli
 præbeo. Ammisceo etiā cibis, ex malis co-
 toneis, atque aliis quæ adstringunt, velut
 Romæ cestiana appellata. Quin & ex piris
 addo, sorbisque ac mespilis, & cornis, Quā-
 doq; etiam de lactuca, & feride, ac solano,
 & portulaca in cibos permisceo, si aphtha
 fuerit inflammata. Quod si cibū adhuc ad-
 sumere non queant, nutricē eiusmodi victu
 alo, ei que simul bonā concoctionē prospici-
 o. Verū tamē etiā infantes pharmacis illi-
 no, siquidem subrubras videro aphthas, in
 principio quidē his quæ moderatissimè ad-
 strin-

stringunt ac frigefaciunt: deinde verò his
 quæ citra mordacitatem discutiunt. Si ve-
 rò subflauas, videro, iisdem quidem vtor,
 sed magis refrigerantibus. Si verò pituito-
 flores, adstringentibus. Si nigrescentes, di-
 scussoriis generosioribus. Caterū in maio-
 ribus pueris, eiusdem generis facultatibus
 pharmacorū vtor, auctis tātū viribus ipso-
 rum. Quēadmodū sanè etiā in perfectis &
 duris corporibus, singulis relatis facultati-
 bus fortissimis vtor. Suffecit autem mihi in
 his per omnia misyos vsus cū vino adstrin-
 gente, quod tū intēdit, tū remittit vim suā,
 prout magis aut minus vinū fuerit adstrin-
 gens, & prout crassius aut liquidius effici-
 tur pharmacum ex misyos ac vini mixtura.
 Quod si sordida appareat aphtha, Mili cū
 vino mulso tero. His verò qui fortioribus
 quàm misy est, pharmacis opus habēt, Aeru-
 go similiter cum vino & vino mulso utilis
 existit. Illinendæ autē sunt ex his pharmacis
 affectæ oris partes. Cōmodū est etiā phar-
 macum ad hāc rē, chalcitis oleo trita. Atq;
 hæc quidem efficaciora, Moderata verò &
 maximè ad incipiētes affectiones, omphaciū
 cū vino & vino mulso. Similiter etiā Rhus.
 In pueris sufficit rosarum flos, & ipsæ rosæ
 ficcæ, & collutiones moderatè adstringētes,
 pro ætatis & naturæ eiusmodi corporū ra-

tione. Et in summa, Moderatæ aphthæ maximè in teneris corporibus, moderatis pharmacis opus habent. Fortes verò & maximè in duris corporibus, à fortioribus curantur. Fortia pharmaca dico, tum quæ fortiter adstringunt, tum quæ mordent, sicuti moderata quæ cuiuscunq; morsus expertia sunt ac parum adstringunt. Fiunt porrò etiam in his, velut in aliis prius dictum est affectionibus, composita medicamenta, & sæpe etiam ex contrariis, quale est quod ex oleo & chalcitide constat. Ipsum equidè oleum per se infestissimum est aphthæ affectui, velut etiam chalcitis. Quandoquidè alterum quidè humectat & sordidum facit. Mordet autem vehemèter chalcitis. Verùm mixtura ipsorum ubi fuerit moderata, optimum pharmacum efficit. Quemadmodum igitur ex cerato & ærugine, incarnans effici pharmacum ostensum est, quum tamen ambo incarnationi contraria existant. Eadè ratione ex oleo & chalcitide aptum medicamentum efficitur. Si verò in putredinem aphtha vertatur & exulcerationes facit, neque aphtham amplius affectionem nominare convenit, neque pharmaca eiusmodi affectiones curantia, inter ea quæ aphthis commoda sunt connumerare. Quemadmodum neq; inter erysipelata sanantia, rectè connumerantur ea quæ

quæ præclarè discutiunt lividas & duras partes, ex frigidorum medicamentorum adhibitione tales factas, & iam ad induratum in schirrum affectionem, ex erysipelate delapsas. Profectò enim qui eiusmodi scripturarum indiscriminata incertitudine decepti, erysipelatis calida & discussoria medicamenta, aphthis autè ea quæ putrefactis conveniunt, adhibet, non parum detrimenti inducunt.

FINIS SEXTI LIBRI.

CAPITULA SEPTIMI

LIBRI.

*De affectionibus circa partes respirationis
contingentibus. Cap. I.*

De Arteriis ab Andromacho descriptis. Cap. II.

*Confectiones ad tussim ab Andromacho
libro. II. de confectionibus interius con-
scriptæ. Cap. III.*

De reiectione sanguinis. Cap. IIII.

*Confectiones dolorem sedantes, tabescenti-
bus & sanguinem reiectantibus com-
modæ, item quibus alijs quibusdam accom-
modatæ, præterquam colicis. Cap. V.*

De Orthopnæa. Cap. VI.

L 3



CLAVDII GAL- LENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE

pharmacorum secundum locos,

Liber septimus, Iano Cor-

nario medico, in-

terprete.

*

*De affectionibus circa partes respirationis
contingentibus. C A P. I.*



OS est recētiorebus me-
dicis arteriæ pharmaca,
Arteriacas appellare, non
apponentibus num anti-
dotos dicāt, an iuxta aliud
significatum. Quidā verò
electa nominant ipsā, nō apponentes phar-
maca, & quidam penitus nullum discrimen
ipsis adscripserunt, aliqui verò rarò addide-
runt, alii ad vocē interceptā, alii adhuc ge-
neralius ad vocem læsam. Sunt qui & ad
exasperatam arteriam, & ad exulceratam
scripserunt: adeò vt rationabile sit, eos qui
arteriacis appellatis pharmacis indiscrimi-
natim

natim vtuntur, aliquando feliciter eis vti,
 aliquando verò nihil penitus ægros iuua-
 re, sed maximè lædere. Palā est autem quod
 asperam arteriam in huiusmodi affectio-
 nibus criminantur. Quondam igitur quando
 nondum eas quæ similiter vt cor pulsant
 arterias, sic nominabant, in solam eā quæ
 ex pulmone in laryngem emergit arteriam,
 ipsum arteriæ nomen inferebant, Venas
 appellantes in totum, velut alias quæ non
 pulsant, sic etiā pulsantes. Postea verò con-
 suetudine obtinente arteriæ appellationem
 in pulsantibus dici, propter æquiucatio-
 nem asperæ nomen apponentes, eam quæ
 ex laryngē in pulmonem descendit arte-
 riam, asperam arteriam appellauerunt, vnā
 cum hoc quod ipsam etiam bronchum vo-
 cant, quandoquidem cartilaginosa corpu-
 scula, quæ plurima eius pars sunt, bronchia
 appellant. Ambit autem ipsam arteriam in-
 trinsecus crassa pellicula, quam ob crassitu-
 dinem aliqui tunicam vocant. Quum igi-
 tur affectio aliqua aut circa hanc, aut circa
 laryngis (qui summa arteriæ pars est) mu-
 sculos contingit, arteriacas appellant cu-
 rantes ipsam, nō apponentes, velut dixi, an-
 tidotos. Dissimiles autē facultatibus sunt
 ab ipsis descriptæ, & ob id contingit vten-
 tes ipsis absq; discrimine, à scopo aberrare.

Quod verò multa sit differentia earū quæ in medicamētariis libris scriptæ sunt, ex tribus exemplis discere licet, quorum primum omnis acrimoniæ expers est, & exquisitè meatus obturat, leuigans asperitates: alterum huic contrariū est, acrimoniæ mordacis non parū habēs, vt si sanæ particulæ adhibeatur, ipsam exasperet. Medium deinde inter ambo dicta, aliud genus arteriacorū pharmacorum est, lenis & citra acrimoniā extergentis facultatis. Id igitur quod meatus obducit, ex passo cretico, & gummi, & tragacantha, ac radice dulci apparatus. Acre verò ex pipere, & cassia, & cinamomo, & galbano, ac resina terebinthina. Mediū autem amborum ex ptisanæ constat succo, & amygdalis, & fabis fresis elixis, & aliis huius generis. Inter mediū autē & utrūq; extremum plura pharmaca sunt, partim magis partim minus, à medio progressa, De quibus deinceps determinabo, eos quidem qui discriminē aliquod addiderūt laudaturus, qui verò simpliciter protulerunt, neq; admissurus. In horū medio locādi sunt, qui discrimina nō tamē integra fecerunt, qualia sunt eorum qui scripserūt. Arteriacæ ad interceptā vocem, aut rursus. Arteriacæ ad raucā vocē. Etenim vox intercepta, hoc est nō posse loqui, ad plures causas sequitur, partim quidem

dem ad destillationes à capite diuturnas, partim verò suppuratis pectore ac tabidis, & his qui ex magno & multo clamore læsi sunt, & deinde non probè curati sunt, aut etiam affectionē quæ adhuc generatur habent. Eodem modo etiā raucoſa vox fit ob easdem causas, & amplius ob frigidi aëris inspirationem. Affectio itaq; interceptæ ac raucoſæ vocis eiusdem generis est. Magnitudine tamen differunt inter se hæc mala. Quum enim vocis organa ab humiditate vehemētius & vt ægrè solui possit, fuerint madefacta, vox intercipitur: quando verò moderatius sunt humecta, raucedo oboritur. Organa vocis quum dico, arteriā accipite, & eius summum, ac fauces. Qui igitur ex vehemēti clamore vocē amplius oblæsam habent, his similis quædā affectio contingit ei quæ manibus, & cruribus, & lumbis, & spinæ, & musculis vbi plurimum laborem pertulerint, accidit. Vocant autē aliqui exercitiorum magistri eiusmodi affectionē musculorum, in quibus cōsistit, lassitudinē inflammata. Itaq; iuxta arteriā intrinseca pellicula, aut tunica, aut quomodocunque quis nominare velit, à spiritu in magnis vociferationibus extra prolato perculsa, in affectionem inflāmatā deuenit: atq; hoc multo magis si ad magnitudinē vocis, acumen

L 5

quoddam accesserit. Iuxta arteriæ verò summum ultra hanc plagã, etiam muscutorũ ipsum mouentium actio offensa, maiorem affectionem efficit. Porro curationis ipsarum genus, in omni particula secundũ materias euariat. Etenim crura, & manus, & spinã, per oleum confricare facilè licet, quũ per cutem in adiacentes ipsi musculos, vis ipsius olei penetrare possit. Iuxta asperam verò arteriam cartilagines post cutem sitæ, prohibet in subiectã pelliculã trãsitũ facultatis emollientium vngentorũ. Quemadmodum enim oleum, sic etiã alia multa cõposita pharmaca eandẽ utilitatem præbent, Quin & ea quæ in principio Acopa tantum appellata sunt, hoc est lassitudines emendantia, paulatim appellationem suã à seipsis extenderunt ad similia cõpage medicamenta, etiam si gratia vehementer calfaciendi assumantur. Cæterũ cõmunis materia auxiliorum ad vocis organa, præter reliqua, est quæ ex balneis cõtingit. Manifestũ est autem quod dulciũ aquarũ dico. Marina enim balnea, & sulphurulenta, & aluminosa, & atrametum sutoriũ olentia, ac bituminosa, propterea quod fortiter resiccant, inepta sunt. Et sanè ita faciunt phonsci, qui magno vocis exercitio vtuntur, quum cõtendendo oblæserint vocẽ. Sunt autẽ hi citharædi,

rædi, & præcones, & tragædiâ ac comæ-
 diam personati repræsentâtes: balneis enim
 multis vtuntur, & cibos lenes ac laxantes
 edunt. Si verò etiâ aspretudinem percipiât,
 cibos qui infarciuntur particulis quas con-
 tingunt assumunt. Vna enim est tunica sibi-
 ipsi cohærens & continua, quæ summo gu-
 læ, summo asperæ arteriæ, gulæ etiam, atq;
 ipsi asperæ arteriæ, intrinsecus prætenditur.
 Quod si ex victu ac balneis oborta affectio
 non sedetur in organis vocis, ad arteriâcas
 transeunt, per totû hoc tempus cibis vtētes
 qui ex lacte, amylo, alica, ouis, & dulciariis
 libis componuntur. Si verò per hæc nō cu-
 rentur, inuenta sunt à Medicis pharmaca
 sub lingua tenenda, inde etiâ hypoglotti-
 des appellata. Sunt autem ea eiusdē cū arte-
 riâcis inflammationem arcētibus facultatis,
 ex vino Thæreo & gummi, ac tragacātha,
 & glycyrrhiza cōposita, quæ vt dixi, leuigāt
 simulq; reprimūt asperitates, quicquid ve-
 rò reliqui est in partibus inflāmationis, hoc
 concoquunt & citò persanant. Industrium
 porrò esse oportet qui pharmacum linguæ
 subdit, quo eo paulatim liquecente, asperæ
 arteriæ summum id quod in ipsum defluit
 suscipiat, renitēdo oborienti tussi, Obluctā-
 tes enim vt ne tussiāt, permittēt quippiā ex
 pharmaco in arteriæ summū ipsamq; adeò
 arte

arteriam demanare. At verò sic curatos claram vocē habere impossibile est, citra vsum pharmacorum absq; acrimonia extergentium, quale est faba fresa elixa, & ptisana, & semen lini torrefactū: huiusmodi enim me-

** Quæ me* dium obtinēt, inter ea quæ ** mordaci facul-*
dia sunt tate prædita sunt, & ea quæ meatus obdu-
facultate cunt pharmaca. His verò magis detergunt
prædita, le resina terebinthina, thusque, ac despumatū
gūt omnes mel, & amigdala amaræ, quæadmodū istis
cod. græci, rursus fortiora sunt farina erui, semen or-
quos ego mini, radix iridis panacisque. Cæterum his
viderim. omnibus vina mollia, & passum creticū, &
 theræum, ac scybelites apta sunt, & ad hæc
 haud scio quomodo neglectum, id quod à
 Græcis in nostra Asia hepsēma appellatur,
 Latini sapa dicunt. Verum Atticissantes
 ipsum Siræum vocāt, quæadmodū alii cari-
 carum decoctū Siræum appellandū cēsent,
 pugnantq; inter se utrū ipsorū Siræum vo-
 care oporteat. Est sanè & hoc ipsum Siræū,
 quod pinguibus caricis in aqua decoctis fit,
 mediæ facultatis, quā lenē & citra acrimo-
 niam extergentē appellauimus. Mustū qui-
 dem igitur coctū, hoc est sapa ipsa, lenissi-
 mum pharmacum est & maximè meatus
 oblinens. Caricarū autē decoctū magis di-
 scutit & extergit. Quemadmodū igitur in
 præcedentibus dixi, Omniū simpliciorū me-
 dica

dicamentorum vires exquisitè nosse oportet eū qui cōpositum quoddā sit facturus, atq; hic ipse etiam ab aliis compositis rectè vtetur, & maximè vbi indiscriminatim fuerint conscripta, quemadmodū plures arteriacæ habentur. Palā est etiā quod hic ipse his quæ cū discrimine prodita sunt rectius vtetur. Etenim iuxta exactam rationem, in quantū apparatus affectionū transmutatur, tantū etiam cōmodū ipsi pharmacū permutare oportet. Hoc ipsum verò solus is qui singulorum simplicium pharmacorū vim nouit, exactè præstabit, ad primū pharmacum parum quiddā ex sequenti ordine apponendo. Velut exempli gratia, In lassitudinibus tenuis, quum in summi ipsius asperæ arteriæ musculis fiunt, in principio lenissima edulia conueniunt, pharmaca verò meatus obducētia. Cōsistente autē inflammatione parum quid extergentiū addendū est. Deinde consequenter amplius. Deinde rursus aliud illo præstātius, quo paulatim cōpositio ad medium extersorium perueniat, & rursus secundū eundē modū ab hoc magis discussorium ac extersorium, ita progressū ad vehementissimū factū, vbi diutius velut in scirrhum indurata affectio in vocis organis præstiterit. Primi itaq; ordinis est tragacātha, & gummi, & samius aster, amy-
lumq;

lumque & ex alica ac trago probè coctis
 sorbitio. Quin & lac aptum est, & dulciarii
 panes, & oua sorbilia, ac nûces pineæ, quas
 nunc omnes Græci strobilos vocant: quon-
 dam autē apud Atticos Coni vocabantur.
 Sesāma etiā ex hoc genere sunt. Ab his au-
 tem deinceps est butyrū, quod etiā buty-
 ros masculino genere Græcis appellatur, &
 decoctum radicis dulcis ad crassitudinem
 Attici mellis liquidi redactū. At qui radicē
 dulcem quā glycyrhizā vocant, præstat in
 primo tēpore in aqua, velut dixi, coctam, ad
 fireum siue sapam ex musto paratā ammisce-
 re, ad passum item Creticum idē decoctum
 misceri potest: siue autem cū sapa, siue cum
 passo Cretico fuerit permixtū, rursus post
 mixturā decoquendū est. Hæc igitur in af-
 fectionibus inflāmatis iuxta arteriā eiusq;
 summum, cōmoda in principio sunt, donec
 inflammatio moderata fiat, & præ omnibus
 à vini potu hoc tēpore abstinendū. Quum
 verò moderatior facta est inflāmatio, Vinū
 dulce Theræum aut scybelite bibere li-
 cet, aut ex nostra Asia carynum, & deinde
 Therinum appellatum, deinde etiam dulce
 Tmolite. Eo tempore etiā butyrū aptum
 est, & sorbitio ex amygdalis, sorbitio itē ex
 lacte & melle diūtius coctis, amylo iniecto,
 & si amyllum nō ad sit, filigine Romanis ap-
 pel

pellata iniecta. Manifestum est autē quod per huiusmodi victū, inflammatio tum pellicularum, tum muscutorū, circa arteriam eiusq; summum sedatur. Relinquitur autē humiditas multa, ob quam impossibile est claram vocē proferri. Quare transire tunc conuenit ab his eduliis, ad omnia ex melle cocta, & ad fabam fresam elixatā, & ptisanam, ac brassicam, & porrū probè coctum. Pharmacorum porrò vsus idoneus est, quo tempore aut inflāmatio, aut aspretudo praeualefcunt, eorū quæ sub lingua detinentur, de quorū cōpositione dicam: post hæc magis extersoria & resiccantia damus, & deinde rursus his ipsis magis extersoria, & adhuc magis resiccantia, vsquequo ad ea quæ aliquid acredinis habent perueniamus, ita ut etiā in his à moderatioribus initio facto, ad vehemētiora paulatim trāseamus. Itaq; qualē formam esse conueniat victus, antea dictum est, quemadmodū etiam simplicium pharmacorum species est relata. Cæterū composita ex ipsis pharmaca multiformiter alii iuxta aliam symmetriā & cōmensurationem cōscripserunt. Et quibusdā sanè ex tribus aut quatuor simplicibus cōpositum pharmacum suffecit. Quidā verò in maiorem numerum extenderunt. Et quidam velut dictum est, ex mollissima & lenissima

ma

materia, arteriacas cōfectiones composuerunt. Alii vice versa ex acri, calida, extergente, ac multum resiccante. Sunt & qui tertium genus medium inter ambō ista fecerunt. Post hos verò, alii medii generis inter medium & mollissimum, alii medii generis inter medium & acerrimum, & iuxta eandem rursus rationem, quidā magis, quidā minus, à mediis facultate pharmacis digressi, diuersas cōpositiones fecerunt, quibus omnibus solus is rectè vtetur, qui singulorum simplicium pharmacorum vires nouit. Ipse enim sciet & ordinē pharmaci, & quanta distantia sit à mediis digressum. Porrò eiusmodi pharmaca scripserunt etiam qui ante

* Hec ex Mantian & Heraclidem vixerūt.* & qui his
vet.cod. fuere posteriores] Verū multo præstantiora à prædictis viris tradita sunt, per libros quos nobis reliquerunt, & in quibus medicamentariā artis partem auxerūt, partim ipsi componentes, partim ab aliis composita transcribentes. Progressū verò temporis tum hæc, tum etiam priora, exacta & longa experientia cognita, à viris electa & coaceruata sunt, quorum iam sæpe in hoc opere mentionem fecimus. Sunt autem hi: Asclepiades, Musa, Andromachus, Heras, Crito, & Menecrates. Quin & multa alia pharmaca Archigenes & Philippus scripserunt,

runt, vt nullo ex veteribus opus habeamus.
Hii enim omnia ab antiquioribus inuenta
optimè velut dixi, tradiderunt.

De Arteriacis ab Andromacho descriptis.

CAPVT II.

PLurimas arteriacas cōfectiones
scripsit Andromachus, vt prom-
ptum sit à debilissimis ad fortis-
sima paulatim per media trāsitu
facto progredi, si quis ipsorū differentiam
nouit. Ipse enim Andromachus indiscrimi-
natus ipsas prodidit, Verū ego discrimi-
na apponam, in memoriā reuocatis his quæ
paulò antè dixi. Quod enim circa simpliciū
pharmacorum tractatū præexercitatū esse
oporteat eum qui dicēda assequi velit, sape
à me dictum est. Citra enim singulorū sim-
plicium exactam accertam cognitionē, im-
possibile est cognoscere ex quo ordine eius-
dem generis medicamentorum cōpositum
sit, Num ex mollissimo, an vehemētissimo,
aut medio, aut alio aliquo inter hūc & alios
intermedio. Primā itaque arteriacā con-
fectionē, nō longe à principio librī, in quo
affectionum corporis internarum curatio-
nem tradit, hoc modo in hac verba scripsit.
Arteriaca qua vtor. Thuris drach. i. alii
quatuor, myrrhæ drac. i. alii quatuor, croci
drac. i. alii 4. scyllæ drac. 2. passi cretici sext.

M

3. Scylla in passo coquitur donec passum spissetur, deinde scylla abiecta, reliqua insperguntur. Hoc pharmacū si scyllā nō reciperet, inter exactē mollissima numerādū esset, vtpote in tres passi cretici sexta. paucissimo thure, ac myrrha, & croco cōiectis, vt parū absit quo minus totū passum creticū existat. Manifestū est autē quod pharmacū hoc, electō hoc est delingibile efficitur. Vocāt autē huiusmodi etiā fœminino genere electas, hoc est, delingibiles cōfectiones. Cōsequenter ad præscriptā alterā addidit Andromachus hoc modo. Arteriacē diacodyon ex capitibus papaueris. Capita papaueris viridia mille & ducenta, mellis

* Aliās s. Attici lib. * 4. croci cilicii drac. s. alii 10. succi hypocythidis drach. 10. acaciæ drac. 10. aquā pluuiā ad capita papaueris. Aqua quidē pluuiā additur, quo minus putredini ob-

* Quæcū- noxiū sit pharmacū, habet aut & adstringēs
que illa su quippiā in se hæc aqua. Scopus est prædicto
erit aiunt pharmaco cōcoquere affectionē circa arte-
cod. græci riam, * quod sanē continget per somnū, &
omnes ve concoctoria, cum adstringendi vi non aded-
tus tamen multa. Cæterū simplex pharmacū ex pa-
interpret paueris capitibus, vt ego facere, sum solitus
videtur le sola capita habet in aquā coniecta, atq; vbi
gisse vt flaccida reddita fuerint, ipsa quidē proici-
hic. mus, aquā verò ipsorū ad solū mel Atticū

am

ammiscemus, vsque ad cōpagem delingibili-
 lis pharmaci facta coctura, quomodo sanè
 ego apparare cōsueui, Quantā autem co-
 piā aquæ itēq; mellis miscere oportet, in hu-
 iusmodi pharmacorū prapARATIONE, in se-
 quentibus dicā eo loco, quo talia verba scri-
 pturus sum, Cōfectio ex capitibus papaue-
 ris. Tertiā deinceps cōfectionem Ar-
 teriacā Andromachus hanc prodidit. Arte-
 riace qua vtor. Blasti, ad tabescentes valdè
 bona. Nardi celticæ drach. 4. amomi drac.
 8. cinamomi drach. 10. malabathri drach. 4.
 nardi indici drach. 3. floris iunci rotūdi odo-
 rati drach. 2. casia drac. octo, thuris drac. 3.
 myrrhæ drac. 1. costi drach. 4. fecis vngenti
 malabathri drach. sex, succi glycyrrhizæ
 drach. 3. succi mādragoræ drac. 5. mastiches
 chiæ drach. tres, croci drac. sex. Palmulas in
 vino mulso aut protropo coquito: deinde
 in ipsum decoctum nuces pineas 20. conici-
 to ac terito. Postea ex pharmaco ad nucis
 ponticæ magnitudinem, aut paulò minus
 accipito, & ad aliquot dies cū hoc decocto
 vtitor, deinde etiā simplici pharmaco vta-
 ris. Postea autem ad duos vel tres dies hie-
 ra ex aloë vteris, cochlearii mēsurā ex aqua
 in diem data. Vtere pharmaco etiam cum
 lacte, in his qui arteria affecti sunt ad gar-
 garissandum, & rursus factō interstitio,

M 3

vtere pharmaco fabæ Aegyptiæ magnitu-
 dine. Quum verò fortis fuerit fluxio, opiū
 & castorium in antidotū miscemus, vtri-
 que parum quid. In his autem qui stoma-
 cho malè affecti sunt, ea ipsa vitamus. Ma-
 nifestum igitur ex ipsis verbis, quæ scripsit
 Andromachus, quod influxionibus partiū
 thoracis, & pulmonis, ac arteriæ, præscripta
 cōfectio aptè componitur. Dixit enim ipse,
 quum fortis fuerit fluxio, opium & casto-
 rium in antidotum miscemus vtriūque mo-
 dicam partem, resiccare nimirum fluxionē
 & sanam reddere volentes. Varium autem
 est pharmacum, & ex multorum mixtura
 constans, vt ad omnes conueniat affectio-
 nes, quæ etiam diuturnæ & malignæ exi-
 stunt ac ægrè curabiles, etiā si vlcus sit cir-
 ca arteriam aut eius summam extremitatē,
 Laringem Græcis dictā, & multo magis si
 iuxta pulmonē. Talia enim fortibus. adeò
 opus habēt pharmacis, quo ad longius tem-
 pus sufficere queāt tabidā affectionē haben-
 tes. Quū enim obtigerit eis regio sicca, &
 in cōuenientis victus ac pharmacorum vsu
 perseuerarint, quā diutissimè renitentur
 cōsuetas actiones moderatè obeūtes. Hanc
 igitur cōfectionē nō censuerim ammiscēdā
 esse his quæ priuatim Arteriacæ appellan-
 tur. 4. deinceps cōfectionē Andromachus
 sic

sic scripsit. Altera eiusdem, Blasti videlicet
 dicit, de quo circa præcedētē arteriacā scri-
 ptū est, Arteriaca Blasti qua vtor, cōpositio
 nē autē eius talē facit. Aloës sextantē, croci
 vnc. i. mastiches vnci. i. Palā est hoc phar-
 macū ex eorū numero esse, quæ priuatim
 stercoreū eductiua appellantur, vnā cū hoc
 quod cōcoctoriū quiddā habet crocus. At
 verò quū concoctoriū dico, intelligere o-
 portet eius affectionis cuius gratia exhibe-
 tur. s. ex ordine cōpositionē Andromachus
 talē prodidit. Confectio sedās dolorē eius-
 dē. Opii quadrantē, croci vnci. i. myrrrhæ
 sextantē, acaciæ vnc. dimid. succi radiceis dul-
 cis drac. 4. Excipe melle. Hæc Androma-
 chus. Verū ego nō auidē recipio eiusmodi
 cōpositionē pharmacorū, vbi nō ostēditur
 affectio, in qua ea sit vtēdū. Scimus etenim
 cōponendi sedātia dolorū scopū, quū som-
 nū videlicet inducere voluerimus, & vehe-
 mentē dolorē stupefacere. Acaciæ autē mī-
 xtura velut ad vlcus est, quemadmodū ra-
 dicis dulcis succus ad lenienda exasperata.
 Crocum autem & myrrhā in cōpositiones
 dolorem leuantes miscere plurimis placuit.
 Videntur enim ipsis omnes affectiones suffi-
 cienter cōcoquere posse. 6. consequēter
 cōfectionē Andromachus hoc modo scri-
 psit. Arteriacæ eiusdem. Thuris vnci. vnā,

succi radicis dulcis vnc. vnā, myrrhæ drac.
4. tragacanthæ drac. sex, nardi drac. i. amo-
mi drac. 4. croci drac. quatuor, mellis Atti-
ci quod satis est. Non obscurum est etiam
hanc ad respirationis organorum affectio-
nes cōpositam esse, ex concoctoriis, mitiga-
toriis, adstringentibus & extergentibus.

Myrrha enim & thus, & crocus, affectiones
cōcoquunt. Radicis dulcis succus exaspera-
ta mitigat, idem etiam tragacantha facit.
Amomū fortiter resiccat cum modica ad-
stringendi facultate. Mel autē calfactoriā
& extersoriam vim habet. 7. post relatas
cōpositiones Andromachus scripsit ex mul-
tis valde medicamentis cōstantem, quæ o-
mnes ferme facultates habent. Nam & ad-
stringentia, & mordentia, & attenuantia, &
mitigantia, & leuigantia, in ea continentur.
Quin & soporifera vis & discussoria ac ex-
tersoria in ipsa habētur, In quibus omnibus
multifariam mixtis facultatibus cōmunis
ratio est, quēadmodū etiā antea dixi, quod
videlicet quispiam ex omnibus pharmacum
quoddam cōponere voluit, spe faciēdi vnū
medicamentū ad omnes eiusdē generis af-
fectiones cōmodum. Verūm ex ipsis aliqua
quidem per experientiam cognita sunt ma-
ligna, & propterea relictā. Aliqua verò feli-
citer pro ipsius componentis coniectura,
effi

efficacia euaserunt, & ob id recepta: Quin
 & preparandi ipsam modum Andromachus
 adscripsit, quanquam hoc facere alias non so-
 leat. Quod verò ex pharmacis composita sit
 eas quas dixi facultates complectentibus,
 præstat meminisse eos qui hos libros in ma-
 nus sument: si tamen non promptam habeant
 memoriam, eo sanè tempore quo huiusmo-
 di pharmaca discunt, sextum & septimum ac
 octauum de simplicium pharmacorum facul-
 tate librum legant: in illis enim omnem phar-
 macorum materiam conscripsi, qua radices
 & folia, & flores, & semina, & fructus, & li-
 quores, & succi, omnium ex terra nascentium
 plantarum existunt. His itaque præmissis,
 iam animum ad ea quæ Andromachus de hoc
 medicamento scripsit aduerte. Arteriaca
 qua utor. Radices filicis crassissimæ lauan-
 tur donec purissimæ fiant, & omne terreum
 deponant, deinde per diem unum perfrigeran-
 tur, & in frusta magnitudinis trium digito-
 rum secta coquantur, atque ex eis lib. 10.
 in ollam nouam picatam aquæ dulcis sexta-
 rios decem, complectentem iniiciuntur, & ad
 dimidias, hoc est ut sextarii s. reliqui fiant,
 coquantur, exprimuntur: & liquor quidem
 in duplum vas diffunditur, & aromata cras-
 sa ac integris partibus adduntur, Nardi in-
 dicæ drach. quatuor, cinamomi drach. sex,

radicis dulcis drach. 6. casiae drach. 4. Rheipontici drach. 4. balauftii drach. 6. rosarum ficcarum drach. 4. alii sex. Hæc similiter ad dimidias coquuntur, ac exprimuntur, & ad decoctum mellis Attici sextarius vnus additur: sit autem mel præcoctum & in duplici vase priuatim spissatum vsquequo manus nō inquinat, adiciuntur & terebinthinæ pellucidæ drac. 3. galbani drac. 2. croci drac. 5. succi hyoscyami drac. vnam, succi hypocythidis drac. vnā, mandragoræ succi obol. 3. ** Vet. cod. vnā.* piperis albi drac. * octo. 8. deinceps confectionem scripsit, summa facultatis ipsius indicata, quod ipsum in omnibus fecisse oportuit. Habet autem sic. Arteriace laudata Mithridatis, ad thoracis collectiones, subpurgat & leuigat. Irionis torrefacti drac. * 1. in quibusdam exemplaribus fabæ fresæ scriptū est, Sunt autē ambo extersoriæ potentiæ, seminis lini tosti drach. 20. & hoc extersoriā vinū habet, nucis pineæ drac. ** Aliās 20.* * octo, hæ leuigandi vim habent. Vuæ passæ exacinatæ drac. 4. & hæc ob id quod modicè subadstringat, simulq; cōmodus corpori cibis sit, meritò ammixta est, habet autē & passi facultatē, qualē in quarto de simplicium pharmacorum viribus indicauimus, croci obol. 2. Minimū quid ex croco cōiecit qui pharmacū cōposuit, vt prope nihil sit

fit aliorū proportionē. Diximus de croco
eū cōcoquendi vim habere, vnā cū adstri-
ctione, Dictum est etiam quod adstrictio,
corpora cogit, constringit & corroborat.
Adiecit autē etiā mellis heminas * 4. à vino * Viden-
dulci, ac sapa digressus. Vult enim hoc mo- tur tamē
do preparatū pharmacū velut pręfatus est, omnes cod.
in pectore hærentes collectiones depurga- graci hæ-
re. Cæterum in huiusmodi pharmacis ea bere mellis
quæ crassos succos habent, impediūt repur- quartam
gationē. His ammiscuit tragacanthæ drac. partē he-
4. quod pharmacū leuigat exasperata: præ- mine.
dictum est autē quod vult hoc propositum
medicamentū repurgare, & leuigare ea quæ
iuxta thoracem hæret. Scopus enim huius-
modi est, attenuare & abstergere, ac ad edu-
ctionem supernè aptas facere collectiōes in
thorace. Verū sedandi doloris gratia, &
ne nimium extergantur ac emungantur par-
tes exasperatę, leuigantia apponuntur. Ma-
ximum hoc est, atq; ipsius per omnia memi-
nisse oportet, Nimirū quod sæpe vnus sco-
pus sit, in quē pharmacū cōponitur, Ne ve-
rò hoc ipsum aliquo modo offendat, vtraq;
miscetur primū vtilitatis scopum minimè
habentia. Nonam arteriacen post has An-
dromachus his verbis tradidit. Arteriacę
Marini. Croci vnc. i. gūmi sextantē, traga-
cāthæ vnc. i. mellis Attici sexta. i. Coquito

M s

donec quum diffunditur nō inquinet. Hoc pharmacum mediū est facultate, essetq; exactè mitigatorium ac dolorem sedans, si nō crocum haberet, neque mellis sextariū, sed pro ipso Theracū vinum Creticum, aut sapam ex musto cocto factam, quam nos Asiani, vt dixi, hepsēma appellamus. Verūm hoc loco importunè inter relata fortia pharmaca locatum est, vtpote quæ suppuratis & tabescentibus conueniunt. Decimam consequenter recenset, quæ inter exactè lenissimam ac mediam, qualem fanè esse dixi præcedentem, intermedia est. Ex gummi igitur hanc, & passio cretico, ac aqua cōponit, melle etiam ammixto, & gummi quidem iniicit bessem, passi sextarium vnū, mellis lib. vnā, dissoluere cum aqua iubens ipsum gummi, copia eius non expressa. Itaque ob gummi, & passum, & aquam penitus nihil extersorium habet, ob mel verò, à lenissimo & leuigante est digressa. Scimus enim extersoriū esse mel. Coqui autem super prunas oportere ipsum dixit, hoc est ad mollem & non fumantem ignē. Melius verò fecisset si etiā ad alias omnes hoc adscripsisset. Ego itaq; sic ipsum præparo, & neq; ad prunas adhuc ardentes cocturam facio, ne videlicet inde quid acre & fumosum sublatū, acrimoniam nō necessariam medicamento ipsi affricet.

Mel

Mellis equidē ac redinē toleramus, quāquā ea nō sit vehemens, propter aliā ipsius vtilitatē, Verū fumi nulla est vtilitas. Quare fugiendus est fumus in quantū possibile est, circa omniū huiusmodi pharmacorū præparationē. Præstat autē & in his quæ meatus obducunt, lignis fumum nō edentibus vti.

II. cōfectionē sic prodidit. Arteriaca alia bona. Cinamomi, thuris vtriūsq; vnc. i. succi radicis dulcis vnc. i. myrrhæ drach. 4. tragacanthæ drac. * 6. nardi indicæ drach. 4. * Aliā 3. amomi drach. 4. croci drac. i. melle Attico excipe. Rectē dixit bonā hanc Arteriā esse, verū deest sermoni, ad quas affectiōes bona sit. Dictū enim in principio est & per vociferationē, & per distillationē lædi arteriā, ampliusq; propter vlcus & inflammationē obduratā. Hæc autē cōfectio quā nūc Andromachus descripsit, etiam ad tabidos aptū pharmacū est, & simpliciter omnes inueteratas thoracis ac pulmonis affectiōes. Cinamomi etenim natura tenuiū partiū & resiccatoria, etiā induratas affectiōes sanare potest, Ab eo proximū locum amomi facultas habet, simulq; adstringens quippiā habet. Verū ob horū actionem vehementē rationabiliter ammixta sunt, thus & radicis dulcis succus & tragacantha, pharmaca exasperata lenire à natura apta. De croco &

& myrrha sæpe diximus, esse videlicet cō-
coctoria & modicè resiccatoria huiusmodi
affectionum. 12. arteriacā Andromachus

hoc modo scripsit. Alia ex libris Galli ad
arteriam affectam, vlcera pulmonis, puris &
sanguinis reiectiones, & fluxiones in tho-
racem, & ad ea quæ ægrè educi possunt, ve-
hemēter efficax. Resinæ terebinthinę drac.

4. croci cilicii drac. 4. thuris drac. 4. myrrhę
troglodyticæ drach. 4. cinamomi drach. 4.

amomi drac. quatuor, nucis pineæ drach. 4.
radicis dulcis eiecta medulla drac. quatuor,

nardi Syriacæ drac. duas, & dimidiā, cassiæ
nigræ drac. duas, tragacathæ drac. tres, pal-

mularum Syriacarum carnis drac. tres, aste-
ris Samii drac. 4. galbani puri obol. 4. costi

drac. 4. alii drac. vnā, mellis Attici heminas
quatuor. Mel & resina in duplo vase coquū-

tur, atque vbi spissari cœperint galbanum
miscetur, donec nō inquinent. Deinde refri-

geratis reliqua trita ammisce, & sic vtere.
Rectè fecit in hoc pharmaco, tum quod ad

quas affectiones cōueniat, tum quod quo-
modo preparare ipsum oporteat, adscripsit.

Ratio autem cōpositionis ex superioribus
constat. 13. arteriacen Andromachus his

verbis tradidit, Arteriaca Galli, eadē etiam
antidotus est ad eadem efficax. Nardi Sy-

riacæ drac. quatuor, myrrhæ drac. quatuor,
cro

croci drach. *4. costi drach. 4. alii drach. 1. *Alia. 2.
 piperis albi grana. 30. radicis dulcis drac. 1.
 nuces pineas centum, styracis drach. 1. tra-
 gacanthæ drachmam vnam, cinamomi dra-
 chmam vnam, amomi drach. 1. thuris dra-
 chmam vnam, obolos. 4. cassiæ fistulæ dra-
 chmam vnam, balaustii drach. 3. obolos. 3.
 mellis Attici aut passicretici hemin. duas.
 Passum in duplo. vasculo coquitur ad spis-
 situdinem mellis, atque ita ad arida trita af-
 funditur. Tragacantha autem & styrax per
 diem antea in sufficiēte protropo maceran-
 tur, & ita ad reliqua ammiscetur, Reponi-
 tur pyxide argentea aut vitrea. Rectè fecit
 & hic quod tum ea quæ promittit hoc phar-
 macum, tum quomodo præparatur adscri-
 psit. Ego verò propterea omnes ab ipso de-
 scriptas Arteriacas apposui, ne quis alium
 scriptorem requirere cogatur. Omne enim
 facultatum genus in ipsis cōtinetur, molliū,
 fortium, ac mediōrū. 14. Arteriaca eius est
 de qua sic prodit. Arteriaca ex *vehemen-
 tibus, Moschionis. Est eius facultas nō mo-
 dicè medias transgressa ad fortissima. Ha-
 bet vim secandi & attenuandi ac calfaciēdi
 ex multis pharmacis, quibus etiā lenia quæ-
 dam ammixta sunt ob eā quā dixi causam.
 Compositio eius hæc est. Rubricæ lemnæ,
 thuris, myrrhæ, nardi, amomi, cassiæ rufæ,
 cro

*Ex com-
 mentarijs
 aphrode-
 asunt cod.
 vetu.

croci iridis illyrice, floris iunci odorati, singulorum drach. 2. cinamomi drach. 4. resinæ terebinthinæ drach. 4. floris rosarum drach. 4. opobalsami drac. 2. mellis heminā unam, aut passi cretici heminæ dimidium ampliusq; quartam eius partē. Liquorem & resinam donec fulua reddatur coquito, deinde ab igne ablatis reliqua addito ac conquassato. Datur in thoracis & arteriæ affectionibus fabæ græcæ magnitudine, cum aqua quarta heminæ parte. Reliquis formæ eleginatis delingēdū. 15. Arteriā sic scripsit. Arteriace ad gutturis siue arteriæ aspretudinem, vocē interceptā, & sanguinē reiectātes, qua vtor. Ex libris Apollonii & Alcimionis, Tragacanthæ drac. 6. gūmi drac. 6. thuris drac. 1. obol. 1. myrrhæ drac. 1. obol. 2. croci drac. 1. obolos. 2. succi radicis dulcis drach. 1. obol. 3. aut radicis* sesquidrachmā, piperis albi grana. 25. palmularū pinguum carnis drach. 3. alii palmulas. 5. aut tres habent. Tragacanthā passio maceratā ac tritā, reliquis aridis tritis cōmitte, ex eisq; omnibus catapotia fabæ magnitudine effice, sub linguaque tenenda exhibe. Huiusmodi confectiones hypoglottidas medici, ab eo quod sub linguā dantur, appellāt, iubentq; id quod à dissoluto pharmaco defluit, sensim in asperæ arteriæ summū excipere, ob-

* Aliās
drach. 2.
semis.

nitē

nitendo simul ne tussis excitetur. 16. ex ordine sic scripta est. Arteriace delingibilis ad omnes internas affectiones, maximè tabescentes, & suppuratos, ad hydropas incipientes, tussēs veteres. Datur per diē & noctem, cochlearii mēsurā. Succī scillæ sextarios. 4. passi cretici sextarios. 3. vini falerni sextarios. 8. mellis Attici sextar. 3. myrrhæ trientem, croci sextantē, thuris sextantem. Aristolochiæ dactylitidis minam vnā & dimidiam, glycyrrhizæ minam vnā, radicis eryngii sextantē, cassiæ vnc. i. nardi celticæ vnc. i. xylobalsami bessem. Aristolochiam, eryngium, glycyrrhizam, xylobalsamū, cassiam, nardū, in crassas partes contusa in vini sextariis. 8. macerato ad triduum, deinde ad lentum ignē ad terrias coquito, atq; ita exprimito, & recrementis abiectis passum, mel, & scillæ succū cōmittito, & ad mellis crassitudinem coquito. Crocum verò thus & myrrham cum vino terito, atq; vbi optimè habuerit pharmacum addito, & vbi modicè fuerint liquata ab igne tollito, & repositis vtitor. Rectè fecit & hic Andromachus quod quæ promittit, & quomodo præparatur adscripsit. 17. Confectio talis ab eo traditur. Arteriaca alia vt Heraclides Tarentinus. Succī scillæ sextarios. 3. passi cretici sextarios. 3. mellis Attici heminā vnā

cro

croci trientem, alii sextantem, myrrhæ quadrantem, tragacanthæ vnc. i. succi radiceis dulcis sextantem, thuris vnc. i. opobalsami sexuncem vtere præparato. Iuxta hanc confectionem neque quæ promittat, neq; quomodo præparetur tradidit, tanquã iam ante sententiam ipsius legentes intelligere queant. Ex eo enim quod dicit. Alia Arteriaca, similia præscriptæ ipsam promittere, nos intelligere conuenit, præparationẽ autem ex antea relatis cõputare oportet. 18. Cõfectio sic tradita est. Arteriaca ex libris Perigenis, ad omnes arteriæ affectus. Croci drach. i. vuæ passæ exacinatæ drachm. i. amygdalarum drach. 8. myrrhæ obolos. 4. tragacanthæ drach. 4. piperis albi obol. 4. mel coctum. Vuapassa torretur, amygdalæ excorticantur. Tragacantha in aqua maceratur per diem vnam, & teritur, ac reliquis ammiscetur. Et hic rectè ab eo factum est quod tum promissionẽ, tum compositionẽ eius adiecit. Cæterũ mediæ facultatis pharmacum existit, quare ad omnes affectus ipsum cõmodum esse ait. Est enim medicorum pharmacorum natura talis, vnde etiam ipsis mediis affectionibus propriè & primario conuenit: his verò qui mollibus aut fortibus opus habent, neque emolumentũ neq; detrimentum magnum affert. Vltimam
omnium

omnium Arteriacam hoc modo descripsit. Vini mulsi veteris sextarios. 3. ad vnũ decoquito, deinde nucum pinearum tostarũ heminam adiecito, piperis albi sextantem, ac vtitor. Effet sanè hoc pharmacum ex molissimis, si non piper accessisset. Hoc verò addito, ad mediam facultatẽ peruenit: quapropter etiã eiusdem generis cum præscripto esse ratus subscripsit.

Arteriace à Critone conscriptæ quatuor numero.

Ex arteriacis à Critone conscriptis quatuor produxisse suffecerit. De prima scribit in hæc verba. Ad vocem interceptã ob contentionem. Ficum & eryngium probè coquito, & ad decoctum gummi misce-to, vt melle durior confectio fiat, Dato ad noctem. Facit & ammoniacum. Ob id sanè pharmaci huius mentionem feci, quod in principio apta est hæc præscripta confectio si per eryngium præparetur. Ammoniacum autem inueteratis commodum: forte enim pharmacum existit, non rectè igitur Crito fecit, quod cū moderato fortissimũ pharmacum indiscriminatim tradidit. Si enim duro pro moderato permutatis vicibus vteris, non solũ nihil iuueris, sed etiã lædes hominem. Alteram arteriacã scripsit Crito mediam facultate, cõcoctoriã & lenem

N

his verbis. Alia faciens maximè ad phona-
 fcos, & asperam arteriam & tussis irritatio-
 nes, dolorem auriũ, vlcera in auribus, ac pu-
 dendo. Concoquit etiã destillationes. Thu-
 ris obol. 4. myrrhæ drac. 2. passi cyathos. 3.
 passum ad mellis spissitudinem decoquit, &
 Deinde myrrham & thus trita cū passo fe-
 micocto ablato adicito. Facit etiam ad dy-
 sentericos, & cœliacos. Quidam croci etiã
 drachmam addunt, & fit auribus commoda
 atque oculis inflammatis. Hæc Crito per-
 spicuè & probè scripsit, Neque opus est me
 eiusmodi pharmacorum expositionē appo-
 nere, vt qui sæpe iam de his dixerim. Porro
 alias duas prædictæ quidem similes, verũ
 moderatiori facultate & simplicissimas sic
 scripsit. Eclegma Faustianum appellatum.
 Vini falerni sextarium. i. mellis attici lib. r.
 In duplici vase coquito, rutæ ramulo agitã-
 do. Alterum pharmacũ tale est. Eclegma ex
 vino scybelite quo vtimur. Vini scybelitæ
 sextarium. i. gummi quadrantẽ, mellis do-
 drantem. Coquito in duplici vasculo, gũmi
 prius macerato ac dissoluto. Hoc solũ lo-
 co apposuit, in duplici vasculo, hoc est di-
 plomate, cocturã fieri debere. Rectissimè
 autem fecerit, qui omnes arteriacas quæ
 mitigatoriam, cõcoctoriã, & lenitoriã vim
 habere prædicantur, in duplo vase coxerit,
 quod

quod Diploma Græcis vocatur, quomodo sanè vngentarii vngenta præparant, Nimirum calidam aquam in magnum quendam lebetem infundentes, ac postea vasculum quod pharmacum coquendum in se habet, imponētes, & sic præustas prunas, aut ligna fumum non edentia succedentes.

Confectio Diacodyon ex capitibus papaueris, iuxta veterum traditionem.

Quin & circa huius cōpositionem veteribus indiscreta discordia fuit, Quidam enim ex ipsis ad capita papaueris. 120. aquæ sextarios. 20. infundēdos censent, vt quælibet sextarii mensura, sex papaueris capita recipiat. Quidā verò in. 80. sextarios octingenta papaueris capita iniiciunt, vt singuli sextarii capita. x. accipiāt. Quidam ita temperauerunt vt sextario vno. 8. capita tribuerentur. Quidam autem haud scio qua ratione, in aquæ sextarios tres capita papaueris. 80. coniiciunt, alii capita. 120. in eosdem tres sextarios addunt. Verùm mihi videtur valde pauca aqua esse, ad tantam copiam capitum.

Confectio ex capitibus papaueris, Andromachi.

Andromachus igitur, velut suprā in arteriacis præscriptū est, alterā ex ipsis pparās sic scripsit. Capita papaueris viridia

N 2

564 DE COMPOSIT. PHARMACO.
mille ducenta, deinde ad finē, Aquam plu-
uiam, non apponens aquæ quantitatem.

Confectio ex capitibus papaueris, Critonis.

CRito verò sic, Confectio ex capitibus
papaueris simplex, Capita papaueris
agrestis octingenta, aquæ sextarios. 80. co-
quito ad tertias, atq; expressis addito mel-
lis lib. 10. Si verò variam efficere velis, adde
croci, myrrhæ, succi hypocythidis, singu-
lorum drach. 12. thuris drach. 6. acaciæ dra-
chmas. 12. Rectè videtur mihi ad singulos
sextarios capita. 10. coniicere: ita enim con-
tingit, quum scribat ipse, capita octingenta
in aquæ sextarios. 80. indendos esse. Et ego
sanè hoc modo præparo non apponens, neq;
crocum, neque myrrham, neque aliud quic-
quam. Optima est enim simplicissima.

Confectio ex capitibus papaueris, Heræ.

AT verò Heras ad capita. 120. aquæ
pluuiæ sextarios. 3. infundit, modicā
omnino quantitatem, tamen si in quibusdā
exemplaribus, non numerus capitum papa-
ueris. 120. scriptus sit, sed pondus totidem
drachmarum. Adscribam autem totā ipsius
dictionem sic habentem. Capita papaueris
viridia. 120. in vas coniicito, & affusis aquæ
pluuiæ sextariis tribus ad tridui madescere
finito, deinde ad tertias coquito, & abla-
ta ab igne exprimito ac colato, ammixtoq;
mel

mellis sextario in duplici vase coquito, atq;
vbi spissari cœperit, acaciæ rufæ drach. vnâ,
succî hypocythidis drach. i. adiucito. Cæ-
terùm quum ipsa capita coxeris in aqua,
croci drach. i. linteolo illigatam simul co-
qui permittito. Quidam etiâ myrrhæ dra-
chmam vnâ, addunt, ipsaq; cum modico
passo terunt, atque ita indunt ac simul co-
quunt, donec aliquantulum fuerit cōfectio
inspissata. Quod si tamen non medicamen-
tariam cōfectionem facere velis, cum ca-
pitum decocto ad tertias redacto, mel co-
ques, reliquis non adiectis.

*Confectio ex capitibus papaueris,
Damocratis.*

HOc pharmacum primùm à Themiso-
ne præparatum est, inquit Damocra-
tes, in libro Damocratis Philiatrus, hoc est
rerum medicarum studiosus, inscripto. Sci-
mus autem ex versibus eum constare. Aiunt
Themisonem hoc pharmacū primùm præ-
parasse ad tussēs humidās, dolorem arteriæ,
& gulæ, species fluxionū simpliciter omniū
quæ circa thoracem consistunt, & ad vigi-
lias, quarum sanè illæ existunt causæ.

*Papaueris quod nominant ipsi agricole
Agreste, nam spontaneum est, nec conseritur,
Capita virentia & recentia, integra,*

N 3

Semen rubens nondum nigrum gerentia.
 Centena bisq; dena magnitudinis
 Mediocris, in novam ollulam atque amplā indito,
 Infundetres pluvia de aqua sextarios,
 Macerato in his totam diem noctem simul,
 Dein coquito lento igne, ac diutiuscule, &
 Omnem liquorem expressum in ollam excipito.
 Et mellis Attici libras tres addito,
 Rursusq; lenem ad flammulam decoquito.
 Dum mellis haud fiat liquidum bona compages,
 Mox frigefacta in vitreum vas condito.
 Sic nos quidem, at Themison primus qui prodidit
 Vsum, addidit myrrham, acaciam, & rubens
 crocum, &

Hypocistidis succum, ast ea obsoleta iam,
 Simplex enim parata commodissima est,
 Incunda valde, lenis atque viribus.
 Ex hac datur mystri minuti quantitas,
 In noctem aliquando plus, minus rursus diem,
 Ut tempore pauco in ore quis hanc sic det ineat,
 Iussus liquentem sensum ita post ut deuoret.
 Quod si voles aluum morandi gratia, &
 Sistatur ut pulmonis & stomachi fluor,
 Eruptioq; sanguinis septum supra:
 Facere, Eupatoricæ aut tu potius hinc Ponticæ
 Addes Rhois succi simul drachmas duas,
 Tantundem & Acaciæ bonæ, non veteris, &
 Auferre iam volens ab igne pharmacum,
 Diluta passo ambo hæc simul confundito

Pau

Paulatim, adhuc fervere in ollula,
 Quo ferueant parum simul, mox vasculo
 Refrigerata indantur inde vitreo.

Confectio ex capitibus papaueris Sorani.

SOranus porrò ita præparandam censet.
 Capitum papaueris numero. 150. aquæ
 sextarios. 20. in lebetem nouum cōiecta ad
 dimidias coquito, & reiectis capitibus mel-
 lis sextarium vnū addito, postea verò myr-
 rhæ, croci, hypocisthidis & acaciæ succi sin-
 gulorum drach. 1. obolos. 3. linteolo illiga-
 to, & in ollam siue lebetem suspendito, quo
 simul cum melle coquantur: postquàm verò
 crassescere inceperit, fasciculum colligatū
 tollito, & in mortarium cōiectum cū passi
 cyathis. 3. terito, indeque in lebetem conie-
 ctum, lente simul donec spissetur coquito.
 Verùm mitior est confectio quæ ex solo
 melle & capitum papaueris cremore cōstat.
 Efficacior autem redditur, si in fasciculum
 linteoli, pro adstringentibus, melilotum &
 radicem dulcem addideris.

Confectio ex papaueris capitibus, Galeni.

CAeterum velut ego compono confe-
 ctionem ex papaueris capitibus, ita ea
 vtendum censeo. Etenim quum de prædi-
 ctis confectiōibus experimentū sumpse-
 rim, præstantior ea visa est, in qua ad vnum
 aquæ sextarium capita decem iniiciuntur,

quemadmodum Crito scripsit, aut ad duos sextarios quindecim capita, velut Soranus. In medio autē horum amborū terminorū est, vbi. 8. aut. 9. capita in vnum sextarium coniiciamus. Præmacero autem ea non ad triduum, velut Heras, sed neque statim ablatas coquo, sed si quidē humidiora & molliora fuerint, ad vnum diem, Accipienda est autem in omnibus huiusmodi sermonibus etiam nox, Quemadmodū etiam annū dierum. 365. esse, solemus dicere. Si verò duriora & sicciora sint, etiam longiori tēpore ipsa macero, præstat autem accipere nondū indurata. Manifestum verò quod etiā val-

* *Multum* de mollia abiiciēda sint. Sicciora enim mo-
quidē vet. dicum succum habent, Humeſtiora verò *
rod. crassum quidem sed crudū adhuc & aquo-
sum ac debilem: quapropter ex humidis ac
palustribus locis accepta fugienda sunt. At
verò numerum quē dixi iniici oportere iuxta
proportionē aquæ, de mediocribus in-
telligere oportet. Quum enim quardā ma-
iora moderatis, quardam minora existant,
Quardam verò inter hæc media, quemad-
modum vt plurimū esse solent, ex his præ-
dictum numerū ad sextariū coniicere oportet.
Terminus autem cocturæ sit nō vt ter-
tia, aut quarta, aut aliqua talis pars aquæ
fiat reliqua, verū vbi primū in totum
flac

flaccida fuerint facta. Succum enim ipsorū exprimere volumus, hoc verò sufficienter continget, ipsis flaccidis factis. Superuacuum igitur diutius coquere. Caterum mellis dimidiam mensuram huic succo ammiscendam censeo, & coquendo simul ad lentum ignem ad compagem Attici mellis. Verum in aqua pluuia quidam capitum cocturam fecerunt, ne videlicet ipsa ad aliam putredinosam qualitatem transmutetur. Tibi verò etiam fontana sufficiet, pluuia non præsente. Satis est & ipsam mundam esse, & omnis mixturæ exortem, ob quam rem ea quæ per plūbeos canales deriuatur fugienda erit: limus enim quidam ex plumbo in ea continetur. Vnde etiam qui aquæ eiusmodi fecem combibunt, dysenterici euadunt.

De usu confectionis ex papaueris capitibus.

V Suseius est in his qui somno opus habent, quibus etiam ex opio constantia sæpe exhibere congitur. Opus habet maxime huiusmodi pharmacis hi quibus tenuis fluxus à capite ad asperam arteriam destillat, non permittēs dormire, ob consequentem tussim, In talibus ego etiam ex sapa pharmaci confectionem parare soleo. Dictum autē à me antea est Sapam, Hepsēma à nobis appellari mustum coctum, quod etiam

N s

firaxum quidam Medici vocant. Sufficiens
 coctura eius ad huiusmodi est, vbi capita
 papaueris ad medietatem aquæ fuerint de-
 cocta, Quin & per passum, aut Theraxum
 Creticum, melius est quam per mel coctu-
 ram fieri, vbi fluxus valde tenuis extiterit.
 Scimus enim attenuâtis facultatis mel esse,
 fugiendum igitur tunc, tenues enim fluxio-
 nes auget. Ammiscetur etiam huiusmodi
 pharmaco dum coquitur, radix dulcis quo
 simul coquatur. Vbi verò hæc non adsit,
 succus qui ex Creta asportatur. Si verò cir-
 ca pulmonem consistat copia fluoris à capi-
 te delati, cōfectio ex melle melior est. Quæ
 admodum enim somno opus habentibus,
 ea quæ ex sapa constat, Sic reiectione per
 sputum indigentibus, ea quæ ex melle fit,
 commodior existit. Cōtravrgēti igitur re-
 nitendo, vbi somnum capere vult ager,
 aut quod ex melle constat, aut quod citra
 hoc apparatus est, pharmacum exhibebis:
 aliquando etiā ambobus permixtis, scopum
 habens ipsum vrgens, circa mixturam, ex
 vtro amplius conicere oporteat. Appello
 autem vrgens, id quod maiori auxilio opus
 habet. Datur commoderata mensura, duo-
 rum cochleariorum satis magnorū copia,
 Augebis autem & minues, hanc copiam ad
 magnitudinem corporis cui exhibiturus es
 respi

respiciēs, item ad ætatem, & anni horam, ac regionem, In omnibus enim his, frigidioribus minimum dabis, calidioribus amplius. Quod verò etiam multitudinis ac qualitatis ipsius destillationis respectu, aut plus aut minus dabis, manifestum existit. Commune enim hoc in omnibus auxiliis est. Suffecerant equidem præscriptæ arteriacæ, verùm apponere amplius mihi visum etiam eas quæ Asclepiades in secundo interiorum scripsit. Aliquæ enim ex eis penitus eadem sunt, quædam præscriptis valde vicinæ, vt & ex eo certitudo descriptionum cõfirmetur. Quin vltra hæc præparandi & vtendi modus diligentius ab ipso Asclepiade traditus est.

Arteriace ab Asclepiade in. 2. internorum conscriptæ, Quæ Mnasoni inscribit.

Antonij Muse, ad vocem interceptam.

B Rassicæ viridis cauliculos depuratos manducandos præbe, & quod instar palearum exuccum est expuere iube, succū verò delingere. Alia, Brassicæ succum cum melle coctum delingendū exhibe. auxiliatur confestim. Alia, Succu eryngii in aqua cocti heminas duas excipito, & succi ficuum in aqua coctarū tantundem, his adde gummi subtilissimè dissoluti drach. 8.
coqui

coquito diligenter ad arteriacæ spissitudinem, & inde cubitum ituris ad cyathi mensuram delingendum præbe. Alia arteriaca Charixenis. Facit ad sonum vocis fractum, destillationes in arteriam, vocē interceptam & raucosam, ad interceptiones vocis ex distensione. Croci drach. 2. succi cyrenaici drach. 1. mellis Attici cyath. 6. Mel coquito & ubi spissatū fuerit, reliquis ammisceto, ac vtitor velut dictum est pilulis inde formatis, quæ sub lingua detineantur.

Alia, Galbani drach. 6. piperis drach. 1. nitrī drach. 1. mellis Attici cyath. 6. Galbanū & mel coquito, & densata reliquis vnito, vtitor vt dictum est. Alia ad exulceratā arteriam, Charixenis. Facit phonsæcis ante & post certamē data. Facit ad oculorū dolores, forinsecus imposita. Lana ex ea madefacta facit & ad internas affectiones delinita. Gummi, tragacanthæ vtriusque drachmas. 6. thuris, myrrhæ, vtriusque drach. 1. obol. 3. croci, hypocysthidis succi, vtriusque drach. 1. passi scybelitæ aut Theræi sextarios. 6. Gūmi, tragacantham, myrrhā, thus, vnā cum hypocysthidis succo macerato, affusa ipsi passi portione, atque ubi dissoluta fuerint, diligenter terito, & ad passum misceto, assidueque mouēdo coquito. Crocum verò laneo pāniculo inditum, & in ollā suspen

fuspēsum, vnā cum pharmaco coquito, De-
inde exemptum; assio dilutum ac tritum ad
pharmacum conicito, & repositis vtitor.

Alia. Succi radiceis dulcis, tragacanthæ
vtriusque drach. 3. croci, myrrhæ, vtriusque
drach. 1. thuris, spicæ nardi vtriusq; obol. 3.
protropi sextarios. 3. Vtere. Alia Lysæ
ad easdem affectiones. Croci, myrrhæ, succi
radiceis dulcis, thuris, casia, singulorū dra-
chmas. 1. piperis grana. 24. passi cretici sex-
tarios. 3. mellis Attici cyathos. 6. Vtere.

Alia Charixenis. Croci drach. 3. myrrhæ
drach. 1. & dimidiam, thuris, glycyrrhizæ* **Succi ad
vtriusque drach. 1. passi cretici sextarios. 3. dunt vet.*
Facit ad sonum fractum, destillationes in cod.

arteriam, interceptā vocem, tonsillas inflā-
matas, facit etiā ad phonascos ante & post
certamen data. Iuuat perfrigeratos, facit ad
recentem & veterē tussim, ad spuētes san-
guinem, eundemque sursum reiectantibus
prodest, & cœliacis. Conducit itē ad spiri-
tus foetorem. Alia hypoglossis, sub lin-
gua tenenda. Facit ad arteriā exaspera-
tam, & vocē interceptā, itemq; reliquas af-
fectiones. Tragacanthæ, gummi thebaici,
vtriusque drach. 3. myrrhæ, thuris non secti,
vtriusque drachmam. 1. obol. 3. croci dra-
chmam vnā, succi glycyrrhizæ obolos. 3.
Phœnicobalanorum trium carnē, passi pro-
tro

tropi aut Theræi quod satis est his excipiendis. Decoquatur ad crassitudinē mellis, Datur fabæ Aegyptiæ magnitudine sub lingua tenenda, & dissoluta transglutiēda.

Alia hypoglossis Dioscoridis. Croci, myrrhæ, tragacanthæ, radicis dulcis succi, sin-

* Aliās de gulorum drach. i. nuces pineas* cōtusas nupurgatas mero sexaginta, amygdalas mundatas to- aliās vstas tidem. Excipe melle cocto. Datur nucis legitur in ponticæ magnitudine sub lingua tenēda.* vet. cod. Alia hypoglossis Scribonii largi. Facit

* Compo- ad vocem interceptam. Glycyrrhizæ, myrrisio hæc rhæ, terebinthinæ, singulorum drach. 18. iri- in altero disillyricæ drach. 16. tragacanthæ drach. 8. ex vet. co- piperis grana. 360. excipe melle cocto, & tedid. reper- rebinthina vnā cocta, vtere sub lingua nucis ponticæ magnitudine. J Alia Scribonii Largi hypoglossis. Facit ad vocem interceptam, glycyrrhizæ drach. 8. myrrhæ drach. 24. terebinthinæ drach. 32. tragacanthæ drach. 38. Arida singula per se tundito ac cribrato, Resinam autē in pilā coniectam tundito, arida ad ipsam inspergendo, deinde ex vnitis omnibus pastillos formato, fabæ Aegyptiæ magnitudinis, quos in vmbra siccato, atque vsus tēpore vnū aut duos sub lingua tenendos dato, ac liquefcētes deuorandos. Oportet autē hoc pharmacū confestim in pastillos cōformare. Quo tēpore

igi

igitur pastillos cogis, eodē etiā tundes, Reficcantur enim cito, & ob id pastillos ex eo formantē ad manū simul tundere oportet.

Alia aromatica Mithridatis. Facit ad Arteriæ affectiones, pulmonis vlcerationes, spuentes sanguinē, tabescentes, suppuratos, & peripneumonicos. Croci drach. 2. & dimidiam, myrrhæ, resinæ terebinthinæ vtri-
usque drach. 2. thuris sesquidrachmā, nardi, cinamomi, cassiæ, tragacanthæ, singulorum drach. 1. mellis Attici heminā. 1. Mel & resinam coquito, vt tractilia fiant ac fibrosa, & nō inquinent in frigidā aquā instillata, dein cū aridis cōmittito, ac probè contundito, & reponito. Vtere nucis pōticæ magnitudine sub lingua detenta. Vt prædictum est. Alia Mithridatis. Myrrhæ, croci, vtri-
usque drach. 2. thuris, cassiæ, cinamomi singulorum drach. 1. passii cretici heminas. 3. Passum & terebinthinam ad perfectam cō-
pagem coquito, & cum ficcis committito, Indeque ad nucis ponticæ magnitudinem sub lingua tenendum dato. Alia ex filice Andromachi aromatica. Prodest hæmo-
ptois, pleuritis, tabescentibus, splenicis, hepaticis, ictericis. Facit & ad affectiones circa vterū & vesicam. Radices filicis quā-
crassissimæ lauantur diligenter donec
omne

omne terreum ab eis decedat, deinde perfrigerantur ad diem vnam, & ex ipsis librae decem, in frustra digitalis magnitudinis secantur & cōquassantur, ac in vas figulinum cōiiciuntur. Infunduntur deinde aquae dulcis sextarii decē, & ad ignem positae coquuntur, Quum verò ad dimidias deuenierint per cocturam, eas tollimus & in duplum vas vngentarium excolamus, & radices quidē expressas proiicimus, In aquam verò crasso modo contusa coniicimus, balaustii drac. sex, nardi Indicæ, rosarum siccarum vtriusq; drac. quatuor, cinamomi drach. tres, glycyrrhizæ drac. sex, casiae drac. quatuor. Rhei pontici drach. quatuor. Deinde rursus ad ignē admota coquimus, & vbi ad dimidias peruenierint, rursus in aliud paruum vas vngentarium excolamus, & arida quidem expressa reiiicimus, ad aquam verò mellis Attici hemi. 4. addimus, probeq; mixta & igni adhibita, rursus coquimus, & quum instillata in frigidam non inquinarent eam, his resinæ terebinthinæ drac. tres, galbani nō lignosi tantundem, ammiscemus. Hæc verò liquefacta ad subscripta deplemus. Sunt autem hæc, croci, succi hyoscyami, succi mandragoræ, piperis albi, succi hypocisthidis singulo. drac. vnam, omnia hæc tenuissimè trita, & cum primo filicis succo vnita habeto,

vt

vt strigmentitiam crassitudinem habeant.
 Postquam igitur inuicem permixta ac pro-
 bẽ conuassata fuerint, in vitreum aut ar-
 gẽteum vas reponimus. Datur ex pharma-
 co cochlearium, maximẽ iuuat vocem in-
 terceptam. Alia panacea Mithridatis, ad
 phonasos ante & post certamen. Facit &
 ad glandularũ inflãmationes, laxatas colu-
 mellas. Facit ad gingiuas humore prægna-
 tes, & nomas in ore, & motos dentes, Pro-
 dest destillationibus, recenti ac veteri tuf-
 si, hæmoptoicis, & sanguinẽ reiicientibus,
 Vtor pharmaco hoc quãdoque puro, quan-
 doq; passo dissoluto, aut vino scybelite, &
 aqua calida. Etenim ad tonsillarũ inflam-
 mationes dissoluto pharmaco vtẽdum est.
 Ad affectiões verò in profundo, puro. Cõ-
 positio sic habet. Capita papaueris agrestis,
 nume. C L. filicis lotæ * drach. 3. symphyti * *Graci*
 depurgati, corticis mādregoræ, Rhei pon- *cod. habet.*
 tici, rosarũ siccarũ, iridis chalcidoniæ, gly- *lib. 3.*
 cyrhizæ ponticæ, balaustii, singulo. trientẽ,
 cinamomi, drac. 2. nardi celticæ sesquidrach-
 mam, aquæ pluuiæ sextarios. 15. Prædicta
 in crassas partes contusa in vase duplici vn-
 gentario ad triduum macerantur, sequenti
 deinde die ad tertias coquũtur, & postea in
 quallum coniecta exprimimus ab ipsis in a-
 liud vas vngẽtariũ liquorẽ, & res decoctas.

O.

adiicimus quidem, verū de expresso liquore quantū sufficit accipiētes, subscriptas res in ipso dissoluimus. Sunt autem hæ, gūmi, tragacanthæ albæ, vtriusque lib. i. myrrha, succi radicis dulcis, succi hypocythidis, singulo. sextantē, croci, mastiches vtriusque vnc. vnā. Hæc dissoluta diligēter terimus, paulatim de expresso liquore adstillantes. Postea ad pharmaci confectiōē vino scybelite, aut thereo, aut pramnio vtimur. Sint autem eius sextarii 24. Passum in vas fictile diffusum coquimus, atque vbi mellis spissitudinē acceperit, ipsi dissoluta & trita pharmaca adiicimus, rursusq; coquimus ad cōpagem, & sublato in vas vitreū aut argenteum vtimur, quemadmodū dictum est antea. Aliam ad destillationes, & omnes tussiculosas affectiones, Asclepiades in secūdo internorum sic tradidit. Ad destillationes pharmacum quo vsus est Comon philosophus, auxiliatur statim. Pyrethri, costi, vtriusque drach. i. piperis albi drach. i. rufa & cribrata reponito. Vsu verò expetente, naribus adiuuere, & pharmacū attrahere iubeto. Alia. Piperis albi drac. i. seminis vrticæ tantundē, costi, myrrha, croci, singulo. obol. 3. præparato ac vtitor vt dictū est.

Alia dolorem sedans, Antonii Musæ. Facit ad destillationem, & vocem interceptā,
Op

Opii, myrrhæ, seminis hyoscyami singulo.
 drac. 2. singula in cicutæ decocto macerato
 ac diligenter terito, & ex mixtis catapotia
 erui magnitudine formato, & duo ex ipsis
 ante somnum dato. Alia facit ad hæmo-
 ptoicos, Seminis hyoscyami albi drach. 8.
 nardi Indicæ drach. 6. croci drachm. 4. opii,
 amyli, anisi singulo. drac. 2. rubricæ lemnæ
 drach. 1. cum aqua catapotia erui magnitu-
 dine formato, ac vtitor vt dictum est. Alia
 delingibilis, ad tusses extremas & inuetera-
 tas. Vini falerni sexta. 1. mellis Attici lib. 1.
 coquito assidue agitando cū ramulis rutæ,
 Dato inde mystrum. Facit & ad stomachi-
 cos. Alia Petini, ad vlcerationes & suppu-
 rationes in profundo. Vini mulsi veteris
 sextar. * 1. axungie veteris sextantem, alii * Aliàs 2.
 vnc. 1. Axungia probè cum vino mulso te-
 rito ac dissoluito, indeq; in vas fictile transf-
 fert, & ad prunas ramulis rutæ agitādo co-
 quito, & vbi densata fuerint, in vase vitreo
 reponito, ac mystrū delingendū vt prædi-
 ctum est exhibeto. Alia Origeniæ, Gly-
 cyrhizæ ponticæ drac. 2. seminis vrticæ to-
 sti, seminis lini tosti, vtriusque drach. vnam,
 myrrhæ, croci, vtriusq; obol. vnum, mellis
 Attici, aquæ, vtriusque cyath. 6. Glycyrhi-
 zam aqua coquito, deinde expresso liquo-
 re, reliqua terito, & melle cocto excipito,

ac delingenda præbeto. Alia, Aristotli
 drac. vnam, ammii torrefacti, nucum pinea-
 rum tostarum, Irionis tosti, singulo. drac. i.
 excipe melle cocto. Alia placentula, hoc
 est, Coptarium ad rufsientes. Seminis lini
 torrefacti, contusi, & cribrati. Vuæ passæ
 pinguis citra acinos, vtriusque sextar. vnũ,
 nucum pinearum tostarum, nucum ponti-
 carum depurgatarum, vtrarumq; heminã i.
 piperis albi sextantẽ, myrrhæ, croci, vtrius-
 que vnc. i. mellis Attici lib. 4. contusa vt o-
 portet tritaq; reponito. Semen lini cũ mel-
 le coquito, & densata reliquis addito, misce
 to ac contundito. Datur nucis ponticæ ma-
 gnitudine. Alia. Facit & ad Thoracis
 affectiones. Farinæ fabacæ tenuissimæ
 tostæ heminam i. iridis Illyricæ quadran-
 tem, nucum pinearum tostarum sextantem,
 pulegii aridi contusi sesquidrachmam, semi-
 nis vrticæ drach. i. piperis vnci. dimidiam.
 Mellis boni sextar. 2. farinam cum melle ad
 dẽsitatem coquito. Seminis lini etiam tusi,
 tosti, & cribrati heminam vnam, in prõptu
 habeto & adicito. Alia ad tussim, & spi-
 ritus prolationem, valde probè expurgans.
 Hyssopi, pulegii, vtriusq; sextantẽ, iridis,
 feminis sinapis, nasturtii, singulo. vnci. vnã,
 anisi, piperis, vtriusq; vnc. i. tusa & cribrata
 melle cocto excipito. Datur cochlearii bo-
 ni

ni mensura. Si verò hyems sit, & accepturus
nō febrat, piperis sextāte, & pro aniso, fœ-
niculum aut cuminū, & pro nasturtio, sinapi
duplū coniicito. Catapotium ad tussim
recentem, Panacea pharmacum dolorem le-
uans, inducens somnū, facit ad hæmoptoi-
cos. Styracis drac. 8. opii, myrrhæ vtriusq;
drach. 4. diluta passo in catapotia cogito, &
erui magnitudine cubitum euntibus dato.
Alia exemplaria par pondus omniū habēt.

Aliud Platoni inscriptū, euestigio auxi-
liatur. Styracis, myrrhæ, opii, galbani,
singulorū par pondus, passo diluta in cata-
potia redige. Aliud Basso inscriptū phar-
macum accōmodatū auxiliatur statim. Fa-
cit hæmoptoicis, sanguinē reiiciētibus, sup-
puratis. Galbani, styracis, iridis illyricæ,
corticis pinus, singulo. drach. 2. enulæ, opii,
vtriusq; drac. 1. Excipe melle cocto, & præ-
be ciceris magnitudine ex aquæ mulsæ cya-
this. 4. Confectio ex marrubio Platonis.

Myrrhæ, styracis, opii, succi marrubii,
galbani, croci, æquales partes, præpara ac
vtere, melle exceptis cocto. Catapotium
dolorem sedans, pharmacum accommoda-
tum ad inueteratas affectiōes. Facit ad de-
stillationem, dolorem capitis, ægrè spiran-
tes, peripneumonicos, ad vesicæ & vteri af-
fectiones. Inscribitur panacea accommo-

data, ab aliquibus Stichus, myrrhæ, piperis, opii, styracis, castorii, galbani, æquas partes excipe passo, fac catapotia, & vtere. Aliud pharmacū valde bonū, Inscribitur Harmonia, Facit ad destillationes, & inexuperabilem defluxum, Styracis, castorii, piperis, cardamomi, singulo. drach. tres, opii, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, singulorum drach. quatuor. Excipe passo, reduc in catapotia, Dato ciceris magnitudine ad somnum.

Aliud, Croci, sulphuris viui, myrrhæ, opii singulo. drach. quatuor, seminis hyoscyami albi, cardamomi, piperis albi singulorū drachm. octo, mellis cocti quincuncem, aut quod satis est. Vsus prædictus est, Datur cubitum euntibus. Confectio Proxeni, ad tussēs inueteratas, & valde diu durantes humectas affectiones, appellatur Symphonos Lexopyretos, id est optimè sedans febrem. Hac vsus est Antonius Musa. Piperis albi, opii, cardamomi, singulorum drach. octo, croci, sulphuris viui, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, singulorum drach. quatuor, mellis cocti sexuncem. Datur nucis ponticæ magnitudine cum aquæ mulsæ cyathis tribus.

Confectiones ad tussim ab Andromacho libro secundo, de confectionibus internis conscriptæ.

CAPVT III.

Post



Postquam multas ad tussim Andromachus scripsit cōfectiones, deinceps omnes soporē inducentes, & ob id soporiferas appellatas tradidit. Cæterū hæ omnes tenues fluxiones inspissare possunt, resiccātes simulq; refrigerantes, & propterea aliquæ nō tātū opiū, sed & mandragoræ succū, aut radicis corticē, aut hyoscyami semen, aliquæ etiam duo aut tria, aut etiā omnia huiusmodi habent. Quemadmodū aliæ styracē, & crocū. Rationabiliter autē his alii partim calfaciētia ammiscuerūt, partim cū modica adstringendi vi aromatica & resiccātia, itemq; semina quædā familiaria. Velut anisi, fœniculi, apii dauci, seselis, vtpote quæ tum pharmacorū iniucunditatē ac vim obtundunt, tum urinā etiam prolestant. Quædā verò etiā aspretudines leuigant, velut sunt, tragacantha, glycyrrhiza, & vina dulcia. At ve-
 * Alias de
 rō ex his, quæ minus de * soporē inducenti- aromati-
 bus cōplectūtur, eas etiā tabescētibus præ- cis.
 bent. Cōfectio ad tussim ex duobus piperis generibus. Cinamomi drach. i. succi papaueris drach. i. myrrhæ obol. 3. piperis nigri obol. 3. castorii obol. 3. piperis albi obolos. 3. galbani obol. 3. croci dimidium, Redigito in pastillos, Dato cum melle aut passo. Alia ad tussim excellenter efficax.

Eadem febres sedat. Seminis hyoscyami vnc. dimidiam. Vnū exemplar vnc. i. habet, cardamomi drach. i. succi papaueris vnci. i. myrrhæ, sulphuris viui, croci, singulo. vnci. dimidiam, piperis albi iuxta Heram sesquīciam. Mellis Attici quod satis est. Alia ad tussim siccam. Styracis partem vnam, succi papaueris tantūdem, croci partem dimidiā. cōtundito simul & catapotia inde exhibe-
to. Confectio ad tussim qua vtor, Sacri-
ficuli bona. Succi papaueris drach. 10. semi-
nis lactuæ drach. 20. castorii drach. 18. alii

* Hec ex
vet. cod.
addita
sunt.

16. rutæ hortensis aridæ drach. 14. * semi-
nis lini drach. 16. panacis drach. 36. myrrhæ
drach. 14. J croci drach. 8. alii vnciam vnam.
Excipe melle. Datur pro viribus ægyptiæ
fabæ magnitudine, febrientibus ex aqua,
febre carentibus ex vino, ad noctem. Ca-
tapotium ad tussim quo vtor. Styracis, myr-
rhæ, opii, singulorum drach. 4. opobalsami,
croci, vtriusque drach. duas, simul trita ex-
cipe, ac vttere. Ad tussim siccam. Succu
radicis dulcis drach. duas, styracis drachm.
vnam, opii, croci, myrrhæ singulorum obo-
los tres, excipe passo aut aqua, & ad fabæ
græcæ magnitudinem redigito ac vtitor.

Potio qua vtor ad phthísicos, Rhipali
multis commoda appellatur Menodorios,
& Ambrosia. Facit ad febres per circuitum
rep

repetentes. Nardi, croci, myrrhæ, costi, cassiæ, cinamomi, iunci rotundi odorati, piperis nigri & albi, castorii, galbani, terebinthinæ, styracis, succi papaueris, seminis hyoscyami, singulo. drac. * 1. tragacanthæ drac. * *Aliàs 3. sex, * anisi drach. vnā, seminis lini drach. 1.] * Ex vet.* mellis quod satis est. Vini falerni heminam *cod.* vnā. Tragacantham vino sufficienti macerato, & reliqua simul cum melle committito. Datur febrientibus sesquidrachma, ex aqua mulsa. Febre carētibus vncia dimidia, cum melle, & aceti cochleario 1. & vini Falerni cyath. 2. Apollonii confectio, facit ad multa præsertim ad tusses egregiè. Cardamomi drach. 18. myrrhæ, drach. 12. hyoscyami drach. 12. opii drach. 10. alii 12. seminis petroselini drac. duodecim, croci drach. 15. malorum mandragoræ drac. decem, zingiberis drac. octo, sulphuris viui drach. sex, ari drac. sex, thuris drac. sex, costi drac. 6. piperis albi drach. 6. mellis Attici. Alia ad internos abscessus, probè repurgans. Sagapeni drac. duas, myrrhæ drach. duas, cardamomi drac. quatuor, alii drach. vnā, castorii drac. vnā, piperis albi obol. tres, opii drach. duas, cum aqua in pastillos formato duorum obolorum ponderis. Dantur cum aqua. Isotheos ad tussim, ad tabem, ad omnes internas & per circuitum repetentes

affectiones. Nardi drach. 2. myrrhæ drach.
 1. croci drach. 1. & dimidiam, costi drach. 1.
 piperis albi drach. 1. fecis opobalsami drach.
 2. cinamomi drachm. 2. succi mandragoræ
 drach. 2. castorii drach. 2. seminis dauci drach.
 1. & dimidiam, opii drach. 2. amomi sesqui-
 drachmam, cassiæ nigræ sesquidrachmam,
 mel coctum. Facit ad dolores stomachi, he-
 patis, pulmonis, oculorum, sanguinis reie-
 ctionem, abscessus. Prodest dysentericis,
 voluulosis, nephriticis, ischiadicis, ægrè spi-
 rantibus. Vrinæ suppressæ, doloribus late-
 rum, præcordiorum, ad fluxum muliebrem, &
 vteri strangulationem. Admiranda est An-
 tidotus ad lethalia venena, ante & post ci-
 bum sumpta, ad omnem sanguinis eruptio-
 nem cum frigida, & ad morfos à vipera, &
 percussos à phalangiis, in vini cyathis tri-
 bus. Quartanariis prælotis dantur ante ho-
 ram accessionis obol. 2. ex vini cyathis tri-
 bus. Potio ad tussim, Dyspnœeam, & alia
 multa Antipatri, qua vtor. Styracis drach.
 sex, terebinthinæ drach. 4. opopanacis drach.
 2. galbani drach. 2. iridis, Illyricæ drach. 2.
 myrrhæ drach. duas, seminis hyoscyami albi

* Piperis obol. quatuor, spumæ nitri obol. 4. piperis
 obol. 4. ad albi obolos 4. opii obol. 5. * Datur quan-
 titate fabæ Aegyptiæ ad somnum. Quidam
 cod. opii obolos tres, alii drach. vnam coniiciunt.

Ec

Eclegma ad tussim. Nucleorum nucū
pinearum drach. duodecim, seminis lini tosti
drach. octo, tragacanthæ drach. duodecim,
carnis palmularum drach. decem octo, iridis
Illyricæ drach. duodecim, amygdalarum dul
cium drach. sexdecim. Mel coctum. Dato
delingendum bis per diem, mane & vespere.
In quibusdam tragacantham aqua pluvia
dissolutam primum cum melle coquito.

Catapotion ad tussim, Crispi Liberti.
Myrrhæ piperis albi, galbani, castorii, sty
racis, croci, opii, singulorum par pondus,
styracis dimidium. Dato inde catapotia
duo, ad noctem. Scribonii, ad tussim.

Seminis apii drach. duas, floris iunci odo
rati, nardi celticæ, styracis, croci singulo
rum drachmam vnam, balauustii obol. tres,
succu papaueris drach. quatuor, mellis quod
satis est. Datur magnitudo fabæ nō febrien
tibus ex aceto mulso, febricitantibus cum
aqua. Asclepiadæ ad tussim. Rheipon
tici, croci Cilicii, succu papaueris, spicæ
nardi, thuris, myrrhæ, singulorum drach
mam vnam, radicis nardi Celticæ sextan
tem, styracis sex uncem. Datur drachmam
vnam cum vino mulso. Thespiana Apol
lonii ad internos abscessus. Seminis apii
drachmas tres, succu papaueris drachmas
tres, melanthii drachm. tres, iridis Illyricæ
dra

drach. 7. castorii drach. duas, seminis dauci drac. septē, sinopidis rubricæ drac. 7. excipe melle cocto, & dato nucis ponticæ magnitudine ex aqua. Catapotium resiccatorium, ad fluxiones Thoracis, ad molæ dolorem, affectiones per circuitum repetentes, & percussos à scorpio. Succipapaueris, seminis hyoscyami, vtriusque par pondus cum passo aut melle ad fabæ græcæ magnitudinem formato, Dato ad noctē, somnum inducendo prodest. Confectio finiens febrem Pamphili pharmacopolæ bona. Seminis hyoscyami vnc. vnā, cardamomi exenterati vnci. vnā, succi papaueris vnc. vnā, sulphuris viui vnci. dimidiā, croci vnc. dimidiā, myrrhæ vnc. dimidiā, euphorbii drac. 2. costi drac. 3. iridis illyricæ drac. 3. piperis albi drach. 4. & dimidiam. Mellis quod satis est. Vtere. Catapotium ad tussim & alia multa commodum, & præsertim ad tussim humidam. Iunci odorati drach. 6. opii drac. 4. galbani drac. 6. styracis drach. 4. fiant Catapotia araci magnitudine, dentur ad somnum. Alia sedans febrem, Darii. Hac antidoto vsus est ad omnia, ad ton-

* *Alia* 2. fillas, tusses, & anginas. Croci vnc. * vnā, piperis quincūcē, myrrhæ vnc. i. succi papaueris vnc. i. thuris tantundem, seminis hyoscyami tantundem, cardamomi tantundem

co

costi drach. 4. iridis Illyricæ drac. 3. aristolochiæ drac. 2. melle Attico excipito. Aliud ad omnem tussim expertū. Anisi drac. 2. costi obol. tres, myrrhæ drach. 1. castorii, galbani, piperis albi, seminis hyoscyami, opii, succi radiceis dulcis, singulo. drac. vnā, excipe passo, redige in catapotia ciceris magnitudine. Dato in noctem. Catapotium cōcoctorium ex libris Perigenis, ad tussim & destillationem. Styracis obol. 2. piperis grana. 20. myrrhæ drac. 2. & dimidiam, seminis hyoscyami obol. 4. euphorbii drac. 2. iridis Illyricæ drach. 2. opopanax drach. 2. croci obol. 3. opii obol. 3. terebinthinæ drac. 1. piperis albi obol. 3. galbani drach. 2. trita excipe galbano ac resina, opioq; & styrace. Datur prout sunt vires. Apollonii confectio ad tussim commoda. Foliorum malabathri drac. octo, croci drac. sex, opobalsami drac. 1. spicæ nardi drac. 1. rosarum siccarum, floris iunci odorati, singulo. drac. vnā, costi, cassiæ, styracis, myrrhæ, mei, singulorum drach. 3. vuæ passæ mundæ drac. 16. succi mandragoræ drach. sex, mellis quod satis est. Vuam passam in Cretico passo per noctem & diē macerato, deinde ammixtis aridis terito, & mel misceto, ac reposito vtitor. Potio ad tussim ex libris Apollonii, item ad muliebrem fluxum. Seminis hyo

* Græci * succi mandragoræ, thuris, singulo. drach.
 cod. habet 3. piperis albi & nigri vtriusque drach. 4. vi-
 corticis ticus drach. 3. opii drach. 3. mellis & vini chii
 mandra- quod satis est. Datur magnitudo fabæ. Ad
 gore. tussim, incipiētem phthisim, hæmoptoicos,

ad fluxiones. Seminis hyoscyami drac. 4.
 radice nigræ mandragoræ drach. quatuor.
 Rhei drac. 3. corallii drach. 3. opii drach. 3.
 lycii drac. 2. balauſtii drach. 3. thuris drach.
 5. tragacanthæ drach. 2. croci drach. 3. Cum
 aqua pastillos triobolares formato. Datur
 hæmoptoicis ex posca, Reliquis in aqua.

Potio prodita à Cletio Abascanto, ad ra-
 bescentes, qua vtor abunde, Verum inepta
 est ad sanguinis reiectionem. Aristolo-
 chiæ dactylitidis drach. 20. sulphuris viui
 drach. 20. corticis mandragoræ drach. 20.
 thuris drach. 40. gentianæ drach. 30. fefelis
 drach. 30. opii drach. 40. seminis hyoscy-
 ami albi drach. 40. myrrhæ drach. 40. croci
 drach. octo, piperis albi grana 100. euphor-
 bii drac. decem, baccarum lauri drach. septē,
 & dimidiam, costi drac. septem, & dimidiā,
 Cardamomi drach. septem. Euphorbium,
 & myrrham in vino tundito, opium verò &
 hyoscyamum in vino mulso. Reliqua priua-
 tim tundito, ac simul misceto ad mel co-
 ctum. Vtere pharmaco non recenti. Rectè
 app

apposuit Andromachus ad hoc pharmacū,
quod sit ad sanguinis reiectionē ineptū,
ob sulphur videlicet viuum, & euphorbiū,
partim etiam ob lauri baccas. Catapotiū
ad tussim statim auxilians. Iridis obol. 4.
croci Cilicii sesquiobolum, myrrhæ obol.
2. cinamomi obol. 4. cassiæ obol. 4. seminis
hyoscyami albi obol. 2. seminis papaueris
nigri obo. 2. seminis cicutæ obol. 2. *redige **Vet. cod.*
in pastillos obolares aut semiobolares cum *addit hîc*
passo, & prabe in passi quarta heminæ par- *lactuce ni*
te. Aliud, Ad omnem tussim, & fluxio- *græ semî-*
nem, & abscessus internos, vt Apollonius. *nis obol. 2.*

Sagapeni, gentianæ, myrrhæ, opopana-
cis, piperis albi, singulo. drach. duas, bacca-
rum lauri mundarum drach. quatuor, trita
cum aqua reduc ad magnitudinē fabæ græ-
cæ, Dato autem ischiadicis paulò plus ex vi-
ni diluti cyathis tribus. Ad Phthisicos
aliud, Cuius vtilitatem expertus sum, Fa-
biani Cretenfis. Succi hypocythidis drac.
octo, myrrhæ drac. octo, castorii drach. sex,
rhuris drach. octo, succi Rhois drac. nouē,
sagapeni drach. sex, succi papaueris drach.
octo, anisi drachmas nouem, seminis apii
drach. octo, * Liquoris panacis drac. quin- ** Ex vet.*
que, seminis hyoscyami drac. octo, styracis *cod.*
drac. octo, croci drac. decem, liquoris cire-
naici drac. vnam, seminis dauci drac. vnā, I
mar

marrubii drac. i. corticis mandragoræ drac. 10. piperis longi drac. 8. & albi drac. 5. & dimidiam, verbenacæ supinæ drachm. vnam, mel coctum. Catapotium album, vt Prytanis & Apollo. Myrrhæ seminis hyoscyami albi, opii, styracis, singulo. æquale pondus, formato catapotia quāta deuorari possunt, his ipsis vna passa, aut passo, aut palmarum carne exceptis. Catapotium ex libris Perigenis. Ad tussim Seminis hyoscyami, castorii, myrrhæ, styracis, opii sing. par pōdus. Dato magnitudinem fabæ cum passo, aut aqua mulsæ. Catapotia ad tussim humidam ex libris Perigenis. Styracis, galbani, ammoniaci thymiamatis, castorii, opii, singulorum æquales partes in catapotia erui magnitudinis redigito, ex eis que duo exhibeto.

De reiectione sanguinis. CAP. IIII.



Nreiectione sanguinis primū periculum est, ne immoderata eius euacuatio fiat. Verū post suppressum sanguinem, Curatio eius quidem quæ ex apertione osculi alicuius vasis contigit, per obturationem fit oris dilatati. Eius verò quæ ex vasis ruptura, per eiusdem cōglutinationē. Quēadmodū eius quæ ex erosionē, per renutritionē erorum. Obturatur igitur osculū dilatatū, per

per adstringentia: conglutinetur autē ruptum, per eadem, & quæcunq; ipsis in cōpositione miscentur citra mordacitatē resiccantia, & glutinosum quiddā habentia. Velut est lemnia terra sphragis appellata, & Samius aster. Renutriuntur autem corrosa, per cibos boni succi, & pharmaca carnem gignentia, sarcotica Græcis appellata, de quorum facultate dictū est in secūdo opere huiusmodi tractationis. Iuxta primam quidem igitur rationē, ex talibus pharmaca componuntur ad reiectionem sanguinis curandam cōvenientia. Iuxta secundā verò, in his qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut summa arteriæ parte sanguinem reiectionem. Miscentur enim prædictis cōgruenti mensura tum calida, tum tenuium partiū existentia, quæ infestissima sunt prædictis tribus affectionibus, apertioni videlicet orarum, rupturæ, & corrosioni. Cuius rei gratia itaq; miscetur? Distributionis nimirum ipsorū in corpus. Etenim adstringentia & viscosa ac tenacia sibiipsis vias præcludunt, quare opus habent facultate ipsis viā fruente ac præparante. Porro quū ex locis circa stomachū, aut aluum, aut aliquod intestinum, sanguis educitur, huiusmodi pharmacorum mixtura non est opus. Verū rursus infestissimum his est hoc genus phar-

P

macorum, quod in tantū refrigerat, vt affectio stupe fiat: & tamē etiam hac ammiscen-
tur medicamentis ad hæmoptoicos conue-
nienter paratis, vt quæ altiore somnū ac
foporem inducant, & cōmodissima sunt his
qui à tussi lancinantur, sistētia nimirū san-
guinem qui ad affectum vas deferretur, atq;
hoc per suam frigiditatem. Atq; hi quidem
sunt cōponendi scopi. Copia autem mate-
riæ pharmacorum, quæ sufficientem expe-
rientiam prioribus medicis, qui circa cura-
tiuam artis partem diligenter versati sunt,
exhibuerunt, deinceps referetur.

*Quæ Andromacho ad sanguinis reiecta-
tionem scripta sunt.*

Primū ex his quæ sanguinē reicien-
tibus conueniunt pharınacis, Androma-
chus sic tradidit. Ad sanguinis reiectatio-
nem, quo ego vtor. Acaciæ drach. 4. rosarū
ficcarum drach. 8. balauſtii drach. 8. gummi
drach. 2. tragacanthæ drach. 1. cum aqua pa-
stillos facito drachmæ vnius. Dato ex aqua
pluuia. Aliud Apollonii. Seminis hyoscy-
ami drach. 8. opii drach. 4. thuris drach. 8.
terræ Samiæ drach. 4. amyli drach. 2. ru-
bricæ lemnis drach. 2. aut si hæc non sit, si-
nopicæ drach. 3. coralli drach. 4. costi dra-
chmas quatuor, floris balauſtii obol. 3. alii
drach. 2. excipe succo polygoni, ac redige
in

in pastillos triobolares, quos ex frigida præbeto. Quidam cicutæ seminis drach. 3. adiiciunt. Aliud quo vtor. Cytinorum drach. 6. spinæ Aegyptiæ drach. 6. succi papaueris drach. 4. hypocythidis drach. 6. balauustii drach. 6. acaciæ drach. 6. lycii Indici drach. 4. myrrhæ drachm. 2. excipe myrti baccarum decocto, & fac pastillos drachmę vnus. Ex eodem decocto præbe bibendos.

Aliud sistens sanguinem. Croci Cili-
cii, myrrhæ, iridis, nardi Indicæ, thuris, aca-
ciæ, singulorum vnc. 1. succi papaueris, co-
sti, piperis, singulorum vnciam dimidiam,
rosarum siccarum trientem, melle excipito.
Datur fabæ Aegyptiæ magnitudo. Aliud
fluxiones sistēs. Prodest fluxionibus inter-
nis, tonsillarum, & vuæ, & ad exulceratam
arteriam gargarissatum, & ad sanguinis flu-
xum ex aqua frigida. Pluribus ex posca ma-
gnitudine ponticæ nucis. Congruit etiam
mingentibus sanguinem, & fluxui mulie-
bri, potum & appositū. Myrrhæ vnc. 1. nar-
di Indicæ vnc. 1. cinamomi vnc. 1. thuris
vnc. 1. croci vnciā dimidiam. piperis drach. 4.
succu acaciæ drach. 4. costi drach. 4. styracis
drach. 4. iridis Illyricæ sextantem, rosa-
rum siccarum sextantē. Excipe melle cocto.
Aliud sistens fluxiones, ex librīs Galli. Fa-
cit probè & ad sanguinis reiectionem.

Croci, myrrhae, iridis, nardi Syriacae, cassiae, nigrae, Rhei pontici, singulorum drach. 1. styracis, piperis albi vtriusq; vnc. dimidiam. rosarum siccarum quincuncem, tritis mellis Attici quod satis est affunde. Datur nucis ponticae magnitudine ex aquae cyathis tribus. Aliud ad haemoptoicos, ex libris Apollonii. Succi hypocythidis drach. 12. balauustii, acaciae, cytitorum singulorum drach. 12. gallae drach. 12. succi papaueris drach. 6. croci drach. 6. Redigito in pastillos triobolares. Aliud ad haemoptoicos. Succu papaueris* obol. 1. Gummi obol. 2. amyli. obolos. 3. Dato ex aqua. Aliud ad sanguinis educationem, & omnem sanguinis eruptionem, ex aqua potum. Succu papaueris drach. 1. cinamomi drach. 1. castorii drach. 1. costi, piperis longi & rotundi, myrrhae, singulorum, obolos. 3. croci sesquiobolum. corallii obolos. 2. balauustii drach. vnam, anisi drach. 2. gummi drach. 1. Ex tritis pastillos formato ac vtitor. Aliud ad sanguinis reiectionem. Rubricae sinopicae drach. 4. thuris drach. 8. anisi drach. 1. seminis cicutae drachmas. 4. succu papaueris drach. 4. lapidis haematitae drach. 4. seminis hyoscyami drachmas. 8. terrae samiae drach. 3. dato pharmacum ieiunis ex aqua. Aliud. Succu hypocythidis drach. 1. opii obolos. 3. balauustii dra

* Ex vet.
cod.

drach. 1. acaciæ drach. 1. Ex aqua. Aliud
ad sanguinis educationem, vt Herophilus.
Radicis symphyti quadrantē, terræ asteris
vnc. 1. thuris sextantem. balaustii vnc. 1. hy-
pocysthidis vnc. 1. croci obolos. 3. myrrhæ
drach. 2. opii drach. 1. rubricæ lemnæ qua-
drantem, & obol. 3. gummi drach. 1. Excipe
succo polygoni aut plantaginis. Aliud
ad hæmoptoicos, Boni præceptoris. Ba-
laustii drach. 2. acaciæ drach. 2. tragacanthæ
drach. 4. succi hypocysthidis drach. 4. florū
rosarum drach. 4. opii drach. 2. thuris dra-
chmas. 3. myrrhæ drach. 2. seminis hyoscy-
ami obol. 4. Excipe succo sanguinariæ quæ
Græcis est polygonum. Aliud sanguinē
reiicientibus vt Acacius. Terræ Samiæ
drach. 4. corallii. drach. 4. rubricæ sinopicæ
drach. 2. balaustii obol. 3. opii drac. 4. amy-
li drach. 12. thuris drac. 8. seminis, hyoscy-
ami, drach. 8. Cum polygoni succo pastillos
triobolares formato. Dato in posca, si flu-
xio sit multa cum vitello oui assato & aqua
plantaginis. Aliud ad hæmoptoicos &
dysentericos. Floris rosarum, opii, acaciæ,
gummi, balaustii, hypocysthidis singulorū
quadrantem. gallæ vnc. 1. seminis plantagi-
nis eiusdemque succi vtriusque sextantem,
lycii Indici vnc. 1. succi rosarum vnc. 1. Re-
digito in pastillos drachmales. Quidam

etiam omphacii vnciæ dimidium addunt. Dysentericis etiam infunditur. Aliud ad hæmoptoicos, Carteri robustius Seminis cicutæ drach. 2. seminis hyoscyami drach. 1. amyli drac. 1. nardi obol. 3. rubricæ lemnia obol. 3. alii. 4. anisi obol. 4. alii. 3. croci obolos. 3. Dato cum vitello oui assati, ex aqua lactosæ cyathis tribus. Facit & ad destillationes. Aliud ad Hæmoptoicos, Magni Philadelphi. Corallii obol. 2. asteris Samii obolos. 4. succi sanguinariæ cyathos. 6. Dato hoc totū pro duabus vicibus in potu.

*Vsus prædictorum Andromachi
pharmacorum.*

I Am ante quidē palām est, ex his quæ in principio sermonis de reiectione sanguinis dixi, qui sit vsus præscriptorum pharmacorum. Verū maioris lucis gratia, repetam etiā nunc id quod primū omnium ex acacia, rosis siccis, balauſtio, gummi, tragacanthaque est cōpositum. Manifestū autem est acaciam quidem, & rosam, & balauſtium, adstringentia habere, gummi verò & tragacantham viscosa & glutinatoria. Igitur impossibile est ipsum vsque ad thoracē & pulmonem per se deferri, si non habeat quæ adstringentia & viscosa ac tenacia deducant. Et quod his amplius accedit, neque
mel

mellis quicquam eius compositor addidit. Sed per aquam pluuiã, quæ & ipsa adstringentem vim habet, tum compositio ipsius, tum exhibitio tradita est, vt ad sanguinis ex stomacho & ventre educationes conuenire possit. Quin & si possibile sit ex intestino ieiuno aliquid per nauseam efferri, ad hoc etiam commodum pharmacũ fiet. Contrariam autem vicissim ad præscriptũ pharmacum compositionem habet quintum ex ordine scriptum, itemque nonum. Nimirũ quum cinamomũ, & piper, & costus, & myrrha eis sint ammixta. Reliqua verò omnia media quodammodo inter hæc sunt, neque exactè adstringentia per totam sui compositionem, neque fortiter calfacientibus permixta. Cæterũ opium, & hyoscyamus, & cicutæ semen, maximè quidem his qui à tussi, aut etiam aliàs lancinantur, apta sunt: quanquam omnibus quomodocunque sanguinem reiicientibus conueniant. Quare ipsa miscere licet, tum in his qui ex nutritiuis organis sanguinem sursum educũt, tum quibus ex spiritualibus organis idem contingit.

Que Asclepiades ad Hæmoptoicos scripsit.

AD sanguinis reiectionem. Radicis symphyti sexuncem, balaustii drac. 2.

aut. i. aquæ sextarium. i. Coquito ad tertias, & expresso liquori hæc addito, amyli drachmas. i. gummi Thebaici tantundē. Dato in potu. Aliud, Cucumerū satiuorum lib. i. in tenuia frusta disseccato, & aquæ potabilis sextarium. i. affundito, ac ad tertias coquito. Expresso deinde liquori terræ sarmiacæ sesquidrachmam inspergito, ac bibendum exhibeto. Charixenis pharmacum accommodatū. Radicis polygoni manipulum, radicis symphyti tantundem, Rhois rubri acetabulū, aquæ sextarios. 3. coquito ad tertias, & expressi liquoris cyathū vnū dato, cum gummi tenuissimè triti ac dissoluti drach. vna. Pharmacum Arrhabiani quod ponticum dicitur, Vuæ vrsi libras. 16. aquæ pluuiæ sextarios. 16. Coquito ad tertias, & expressum liquorū reponito. Aliud, Mororum rubrorū nondum maturorum libras. 16. aquæ pluuiæ sextarios. 16. Coquito ad tertias, & expressum liquorem reponito. Aliud, Fructus corni libras. 16. aquæ pluuiæ sextarios. 16. fac eodem modo. Aliud, Palmularum Thebaicarū lib. 16. aquæ pluuiæ sextarios. 16. coquito ad tertias, & postquam expresseris liquorem, ad prius expressos liquores infundito, omnesque probè mixtos ad tertias coquito, & in fictili vase reponito. Et inde cyathum vnū ante

ante cibum dato. Pharmacum hoc est valde bonum, & regenerationē prohibens. Oportet autem singula suo proprio tēpore præparare, & ad pharmaci confectionem reponere. De vrsi vua. Quæ vrsi vua appellatur in ponto nascitur. Planta est humilis & fruticosa, folio memæcyli, fructum ferens rubrum & rotundū, gustu austerū, quē vrsi * Aliàs cavuam appellant. * Catapotium ad hæmoptoicos. Corticis thuris, terræ samiæ, amyli, singulorum drach. 4. tusa & cribrata reponito. Vsu verò expetente, cochleariū vnū in aquæ frigidæ cyatho dato. Aliud, Ba. laustii, terræ samiæ, corticis thuris, gummi, singulorum æquale pondus tusa & cribrata exhibe vt prædictum est. Ad sanguinis reiectionem eclegma Amaranti, pharmacum accommodatum. Vini falerni sextarium. i. mellis Attici lib. i. in vas fictile coniecta & conquassata super prunas ponito, & vbi arteriacæ acceperint spissitudinē, ab igne ablata refrigerari finito, eisq; contusa & cribrata addito, gūmi cochlearia. 4. balaustii, thuris, terræ samiæ, singulorum drach. 2. & rursus ad ignem admota & calfacta reponito. Dato vt prædictum est. Aliud Origeniæ. Succu gentianæ, succi symphyti, balaustii, singulorum drach. 8. croci, myrrhæ, succi radicis dulcis, singulorum dra-

chmas quatuor, protropi, aut Theræi, aut
 Scybelitæ sextarios. 6. præpara ac exhi-
 be, vt dictum est. Catapotia ad sangui-
 nis reiectionem dolorem sedantia. Vfus est
 Charixenes. Succi hypocysthidis, balau-
 stiorum, opii, singulorum drach. 4. excipe
 vino Myrtite, & fac catapotia. Dato ex
 his triobolipondus. In aliis exemplaribus
 opii drachmæ duæ habentur. Aliud, Suc-
 ci hypocysthidis, succi acaciæ, succi Rhois
 Syriacæ, singulorum drachmas quatuor,
 balaustii, opii, gummi, singulorum drach. 4.
 vini Myrtitæ quod satis est. Vfus ostensus
 est. Pastillus hæmoptoicos, pharmacum
 accommodatum, Inscribitur Trypherum,
 hoc est, Delicatum. Amyli, balaustii, ter-
 ræ Samiæ, succi hypocysthidis, gummi, cro-
 ci, opii, singulorum drachmas duas, Exci-
 pe succo plantaginis, & exhibe drach. vnā.
 Verum liquor ipse affectioni sit conue-

* Alias niens. Aliud, * Amyli, terræ Samiæ,
 amyli dra hypocysthidis singulorum drachmas duas,
 chmas. 4. opii, croci, balaustii, tragacanthæ, singulo-
 rum drachmam vnā, excipe succo planta-
 ginis. Pastillus ex succino. Facit hæ-
 moptoicis, diurnæ & recenti tussi, Phthi-
 sicis sanguinem reicientibus, suppuratis,
 cœliacis, dysentericis, & inflatis. Est etiam
 Auricularis bona. Psyllii mundi drach. 4 s.

iri

iridis Illyricæ, mastiches, ramentorū succi-
 ni, croci, singulorum drach. 30. opii drac. 15.
 Psillium in aquam calidam coniectum ma-
 cerari finito, atque vbi viscosum ac gluti-
 nosum de se in aquam deposuerit, liquo-
 rem exprimito, & cum eo pharmacum præ-
 parato, in pastillos ipsum cogendo, ex qui-
 bus obolos tres, ad somnum dato. Sint au-
 tem aquæ sextarii tres, In aliis exemplari-
 bus psyllium ad triduum madescit, deinde
 ebulliat ter donec coquitur, & ab igne adē-
 ptum rursus ad triduum finitur, atque tunc
 liquor ad pharmaci confectionem segre-
 gatur. Pastillus Neapolitæ. Facit hæmo-
 ptoicis, suppuratis, phthificis, affectionibus
 fluidis. Seminis hyoscyami albi, succi
 mandragoræ, vtriusq; drachmas quinque,
 thuris masculi, opii hispani, styracis, coagu-
 li hinuli, singulorum drachm. 10. mastices
 drach. 20. ramentorum succini, iridis Illyri-
 cæ, croci, singulorum drach. 30. psillii dra-
 chmas. 45. aquæ sextarios tres, præpara ac
 vtere vt prædictum est. Pastillus ex co-
 rallio, vt Niceratus, Corallii, terræ Sa-
 miæ, vtriusque drach. 8. balaustiorum, amy-
 li, terræ lemnæ, singulorum drach. 4. semi-
 nis hyoscyami albi opii, hypocythidis, sin-
 gulorum drach. 2. Excipe succo arnoglos-
 sæ, coge pastillos ac exhibe. Aliter Dioclis
 Chal


Chalcedonii. Corallii drachmas octo, succi hypocythidis, balauftii, succi acaciæ, Rhei, pontici, terræ Samiæ, opii, thuris, succi symphyti, singulorum drachmas duas, excipe succo plantaginis. Aphrodisiacum Clidion, pharmacum accommodatum. Facit hæmoptoicis, cœliacis, dysentericis, & qui stomachi fluxionibus laborant. Cytinorum, spinæ Aegyptiæ, balauftiorū, succi hypocythidis, succi acaciæ, singulorū drachmas. 6. lycii, Rhei pontici, opii, singulorum drach. 4. myrrhæ drach. 2. contusa & cribrata diligenter baccarum myrti decocto excipe, & pastillos coge. Exhibe pro viribus cum rosarum decocto, aut baccarum myrti, aut aqua frigida. Forinsecus spongiam aceto imbutam imposito. Postquam verò fluxus constiterit, pectus & fluxione infestatos locos omphacio cum aceto dissoluto illinito. Tepe fiat autem ad cinerem calidam, donec aliquantulum spissetur. Philippi pharmacum accommodatum dysentericis, & hæmoptoicis, Balauftii, acaciæ, hypocythidis succi, opii, * thuris, * Hic cod. myrrhæ, croci, gallæ, lycii, aloës, Rhei pontici, baccarum myrti nigrarum, malicorii, singulorum drach. 4. excipe vino Italico, & redige in pastillos triobolares. Dato febrientibus ex aqua, nō febrientibus cū vino.

* Hic cod.
vet. habet
thois.

Corb

*Confectiones dolorem sedantes, tabescentibus,
& sanguinem reieclantibus commodæ, itemq;
alijs quibusdam accommodatæ, preterquàm
colicis.*

CAP. V.



Phis equidem qui sanguinẽ re-
ieclant, nondum tamẽ exactè ta-
be apprehensũ sunt, hoc genus
pharmacorum dolorẽ sedantiũ
priores medici cõposuerunt, ipsumq; anody
non appellauerunt, cõueniens & his qui san-
guinem reiciunt, & qui tum hoc perpetiun-
tur, tum etiam iam tabescũt, itemq; ad alios
dolores & affectus, qui circa pulmones, &
arteriam, & Thoracem, atq; alias quasdam
partes cõsistunt, colicis tantũ exceptis. Dif-
ferunt enim hæc pharmaca ab his quæ pri-
uatim colica appellantur, aromatũ, & odo-
ratorum ac vrinã cientium seminũ mistura.
Colicæ enim confectiones his vehementio-
res sunt. stupefactoriam vim prædominan-
tem habẽtes ex multitudine refrigerantiũ
pharmacorum. Quale est, hyoscyami semẽ,
& cicuta, & papaueris succus, & cortex ra-
dicis mandragoræ, His namq; in colicis vtĩ
cogimur ob magnitudinem doloris.

*Quæ Andromachus scripsit ad prædi-
ctas affectiones.*

Confectio sedans dolorẽ, ad omnes in-
ternos affectus & pleuritidas, qua
vtor.

utor. Radicis panacis, seminis dauci, vtri-
 usque drach. 4. castorii drach. 4. alii drac. 2.
 seminis hyoscyami, opii, vtriusq; drach. 4.
 alii drach. 2. Mellis quod sufficit. Dantur
 obol. 4. cum aquæ cyathis tribus. Alia se-
 dans dolorē, Marcellini. Anisi drac. 2. semi-
 nis hyoscyami drac. 2. succi papaveris drac.
 1. seminis apii drac. 2. croci obol. 4. rosarum
 siccatū drac. 1. myrrhæ drac. 1. amomi dra. 1.
 Trita cum aqua in pastillos triginta duos
 redige. Dato insomni tēpus cum aquæ cya-
 this duobus aut tribus. Alia sedās dolorē,
 Ex seminibus. Seminis apii drach. 8. opii
 drach. 2. ammi drac. 8. anisi drac. 4. fœniculi
 drac. 4. cassiæ nigræ drach. 2. Cum aqua fac
 pastillos triobolares. Dato ex passo, sexta
 & decima heminæ parte, aut ex aqua. Alia
 Achillæ Aurigæ. Anisi drach. 8. ammi
 drac. 8. seminis fœniculi. seminis apii drach.
 4. opii drac. 2. nardi Indicæ drac. 2. myrrhæ
 drach. duas, piperis drach. 1. cassiæ nigræ
 drach. 2. Fac pastillos triobolares qui re-
 ficcati ponderent obol. 1. Dato vt reliquos.

Alia dolorem sedans vt Xenocrates, qua
 vtor maximè ad tormina & dysentericos.

* Vet. ced. Seminis apii drachmas duas, anisi drachmā
 habet opij vnam, piperis albi drachmam vnam, myr-
 obol. 3. cro rhæ obolos quatuor castorii obol. 4. * opii
 1. obol. 3. obolos duos, gentianæ drachmas duas. Fac
 pa

pastillos triobolares, & variè exhibe. Alia
Sphragis dicta sedans dolorem, resiccans
fluxiones, & tormina ac tusses, qua vtor.

Myrrhæ obolos quinque, alii sex, cor-
ticis mandragoræ drachmas quatuor, succi
papaveris drach. 5. seminis hyoscyami dra-
chmas quatuor, alii drachmas duas, thuris
drach. 5. croci drach. 5. Excipe vino, exhi-
be pro viribus, aliquibus fabæ Aegyptiæ
magnitudine, aliquibus obolos duos, Alia,
Aster appellata, sistens dolorem, Qua vtor
ad omnem fluxum, dolorem, & omnes in-
ternos affectus & destillationes, ad vesicā,
ad suffocationes, fluxum muliebrem, sto-
machi fluxionem, dysentericos, sanguinem
reciicientes. Facit & ad paralyti resolutos.

Croci obolos. 3. seminis hyoscyami drac. 6.
seminis apii drach. 6. anisi drach. 4. styra-
cis drach. quatuor, seminis dauci drach. 4.
castorii drach. duas, opii drachm. 3. myrrhæ
drach. 2. Quidam etiam mandragoræ succi
drach. 4. vt verò Xenocrates, etiam piperis
albi drach. 6. cum aqua fac pastillos triobo-
lares. Dato ex aqua. Alia sedans dolorē
Lycomedis. Resiccant destillationes arte-
riæ, & fluxiones oculorū. Seminis hyoscy-
ami drac. 2. seminis apii drach. 2. opii drac. 2.
anisi drach. 1. croci obol. 4. rosarum sicca-
rum drach. 2. myrrhæ drach. 1. alii drach. 2.

Cum

Cum aqua redigito in pastillos triobolares. Vtere quemadmodū Trigono appellato. Alia sedans dolorē, reficcatoria. Facit

& ad hæmoptoicos, cœliacos dysentericos rupta & conuulsa. Anisi drach. 4. semini apii drach. 4. opii drach. 4. croci drach. 1. seminis hyoscyami drach. 4. styracis drach. 1.

* Hæc v. e.
tu. cod.

iunci odorati drac. 1. balauftii obol. 4. * alii drach. 7. foliorum rosarū drach. 1. nardi indicae obol. 3.] cum aqua formato pastillos

diobolares. Dato ex vino, aut aqua, aut pro tropo. Alia dolorem sedans potio, Rufi

qua vtor. Corticis mandragoræ drach. 4.

thuris drach. 5. piperis albi drach. 2. & dimi-

diam. croci drach. 5. seminis hyoscyami dra-

chmas. 4. succi papaueris drach. 5. myrrhæ

drach. 5. nardi obol. 3. cassiæ nigrae drach. 2.

Trita cum passo in pastillos drachmales co-

gito, ac reponito ne humecti fiant. Dantur

ex aquæ calidæ cyathis duobus, cholericis,

hoc est, biliosa supernè & infernè reddentibus, ex frigida.

Alia sedans dolorem ad

omnes internas affectiones, qua vtor. Cas-

sia nigrae, myrrhæ, opii, styracis, croci, sin-

gulorum drach. 1. quidam drac. 1. & obol. 3.

Cogito in pastillos trium aut duorū obo-

lorum. Præbe febrientibus ex aqua, non fe-

bricitantibus in vino. Hepaticis in aqua

mulsa, itidem & pleuriticis. Efficax est &

ad

ad tussim. Alia Trigonos vocata, resic-
 catoria & sedans dolorem. Seminis hyo-
 scyami drach. 4. seminis apii drachm. 4. anisi
 drac. 2. opii drac. * 2. cum aqua pastillos for * *Alia 1.*
 mato. Dantur cum frigida, mane & vesperi,
 vnus pro vice. Alia sedans dolorē, Ascle-
 piadæ ad omnes internos affectus. Seselidis,
 chamæpityos, herbæ saluæ, seminis rutæ
 syluestris, seminis dauci. singulo. drac. 6. se-
 minis hyoscyami, opii, vtriusque drach. 8.
 castorii drach. 25. Rheipontici drachm. 14.
 Excipe melle. Alia vt Charicles. Tor-
 dillii drach. 8. chamæpityos drach. 8. Rhei
 pontici drach. sex, castorii drach. 12. & dimi-
 diam, herbæ saluæ drachm. 8. seminis rutæ
 syluestris drac. 8. seminis dauci drac. 8. opii
 drach. 4. seminis hyoscyami drach. 4. croci
 drach. 5. Quidam addunt mel Atticum reli-
 qua ipso excipientes. Alia dolorē sedans,
 iucunda appellata. Facit & ad tabescētes, &
 inflatos. Iridis Illyricę drac. 30. succini, cro-
 ci, mastiches chiæ singulorum drachm. 30.
 psyllii drachm. 45. aut 30. succi papaueris
 drach. 15. cum aqua pluuiæ pastillos drac. 1.
 & obol. 3. ponderantes formato, ac exhibe-
 to. Psyllium per diem & noctem aqua plu-
 uiali macerato, deinde coquito & exprimi-
 to, atque sic cum reliquis committito. Alia
 potio sedans dolorem, ex libris Aphrodæ.

Q

Ad omnem dolorē, in neruis, vtero, coxendicibus. Succipapaueris drach. i. opobalsami drach. i. aut carpobalsami drach. i. obolos 2. myrrhæ, seminis hyoscyami, castorii, styracis, singulo. drach. i. Excipe passio, & fac pastillos oboli vnus & dimidii, Dato ex aquæ calidæ cyathis duobus aut tribus. Aliud sedās dolorem Catapotiū. Ex libris Aphrodisiæ, ad omnes internos affectus, & ad quartanarios, qui interualli tempore inedia ferunt, & deinde accipiunt. Facit & ad calculosos, dysentericos, stomachicos, & iam desperatos atq; anxios. Est & oculis valde commoda. Seminis hyoscyami, anisi, styracis, singul. drach. 4. croci, opii vtriუსq; drach. 3. castorii drach. 2. fac catapotia Aegyptiæ fabæ magnitudine. Præbe ex aquæ cyathis duobus. Aliud dolorem sedans, ad omnes internos affectus, & sanguinis reiectionē vndecunq; feratur, etiam si ex vulnere prodeat quibusdam prodest, facit & ad nephriticos & hepaticos. Hanc ne prius dederis quàm mercedem acceperis. Cinamomi, cassiæ vtriუსque drach. duas, myrrhæ drach. i. piperis albi drach. i. & longi drach. vnam, galbani drach. vnam. opii drach. 2. Trita cum melle paucō in catapotia redige, partim magnitudine fabæ, partim quantitate araci. Dato pro viribus cum aqua, aut pro iudicio tuo.

tuo. Alia dolorem sedans ad omnia interna. Seminis apii drac. 2. anisi drac. duas, piperis longi drac. 2. & nigri drac. 1. castorii obol. 4. myrrhæ, opii, vtriusque obol. 4. panacis, gentianæ vtriusque obol. 4. * succi * *Addit* radicis dulcis obol. 3. fac pastillos triobol. *hinc vetu.* lates, dysentericis drac. vnus. Alia sedas *cod. cina-* dolorem, Crateri, ad tabescentes, & sangui *moni o-* nem reiicientes. Myrrhæ drach. sex, man. *bol. 3.* dragoræ drac. 4. seminis hyoscyami drac. 4. opii drach. 5. croci, thuris, vtriusque drach. 5. Rhei drachm. 5. seminis cicutæ, styracis, vtriusque drac. 5. Excipe vino mulso. Alia sedatiua doloris, Mysterium appellata, vt Niceratus. Ad phthysicos, tussietes, cœliacos, dysentericos, destillationes, confestim auxiliatur. Croci, costi, castorii, asari, seminis hyoscyami, opii, styracis, singulorum drachm. vnam, quidam hyoscyami seminis drachm. dimidiam. Excipe melle ac vtere. Alia doloris sedatiua ad destillationē conueniens. Seminis hyoscyami, succi papaueris, amyli, singulo. drach. duas, anisi drac. vnam, spicæ nardi drach. vnam, croci drach. vnam, rubricæ sinopicæ obol. 3. aut lemnis drac. vnā, formato pastillos 30. Dato duos in noctem cum aqua.

Que ab Asclepiade scripta sunt ad easdem affectiones.

Q 2

E Clegma. Farris Clusini appellati sexta Erii dimidium, decocti marrubii viridis sexta. vnū, hæc in vas vitreum coniecta per diem & noctem macerari finito. Sequēti die pharmacum mollito, quemadmodū alicam maceramus, atque vbi penitus dissolutum fuerit, exprimito liquorem, eiq; pinguedinem aliquā addito, & igni admota assiduē mouens coquito, donec spissata mellis crassitudinem acceperint. Ex hoc mystrū datur ante cibum, & post cibū tantundē. Aliud,

Foliorum marrubii tenerriorū manipulum cum sufficienti aqua in fictili coquito, & vbi exoluta fuerint eximito ac terito, & decocto diluta rursus coquito, pollinis acetabulum inspergens, & pinguedinis arietinæ probè subactæ quadrantē addens. Et vbi coctura rectè habuerit, veluti reliquæ sorbitiones præparantur, ablata ab igne, & modico sale cōspersa, sorbenda exhibe. Amplius absorptū amplius iuuat. Aliud Nicerati. Facit suppuratis, dyspnoicis, veteri tussi, viscosum ac glutinosum reiectantibus, & his quæ à partu nō purgantur, secundas deducit. Prodest etiam infantibus alimentū non sentientibus, si nutricibus præbeatur.

Succi marrubii sexta. sex. Verū probè hūc succū colligere oportet à recenti marrubio tuso expressum. Vini falerni sexta. i. mellis
Att

Attici tantundem, piperis albi, myrrhæ, thuris, singulo. drac. 8. Vinum & succū ad tertias coquito. deinde mel addito, quibus inspissatis arida inspergito & diligēter mixta in vitreum vasculum transferto. Dato mystrum ante cibum. Aliud, Scribonii Largi. Succum marrubii sexta. 6. succi semperuiui tantundem, mellis Attici sextar. 4. alii sextar. 1. Vini Italici sextar. 1. picis liquidæ brutiæ tantundē, nardi indicæ, croci, myrrhæ, thuris, piperis albi, singul. drac. 8. præpara ac vtere vt prædictū est. Aliud phthificis & ad fluxiōes Thoracis. Seminis cucumeris hortensis decorticati drac. 8. amyli drac. 4. seminis lini, seminis papaueris albi, vtriusque drac. 2. tusa & cribrata excipe tragacanthæ cremore, & in drachmales pastillos redige, Dantur obol. 3. non febrientibus ex vino & myrti cremore, febrientibus cū Rhois succo. Aliud, Amyli drac. 4. seminis cucumeris satiui tosti, seminis papaueris albi tosti, amygdalarum depurgatarum, singulo. drach. 2. tragacanthæ drach. 1. obol. 3. croci drach. 1. excipe tragacanthæ cremore, & postea etiam vino scybelite cocto. Vtere eodem modo. Aliud Scribonii Largi catapotium, phthificis, sanguinem reiectantibus suppuratis, educit pelliculas, repurgat, sufficienter. Verūm immorari

Q 3

pharmaco oportet. Sagapeni, myrrhae vtri-
 usq; drac. 2. opii, cardamomi, vtriussq; drac.
 4. castorii drach. 4. piperis albi obol. 3. exci-
 pe passo, fac catapotia, Da ex aquae calidae
 cyathis 3. Alia cōfectio Thespesiana. Fa-
 cit suppuratis, & ad abscessus occultos. Se-
 minis apii, opii, melanthii, singulo. drach. 3.
 castorii drach. 2. seminis dauci, sinonis, iri-
 dis, singulo. drach. sex, excipe melle cocto,
 praebe nucis ponticae magnitudine ex cali-
 da cyath. 3. Alia Cofi. ad humores a grē
 educiles, suppuratos, peripneumonicos.
 Maximè autem his qui crassa & glutinosa
 educunt utilis est. Mellis Attici cocti ad
 glutinis compagem libram 1. piperis cōtusi
 & cribrati, myrrhae, vtriussque vnci. vnam.
 Myrrhā & piper trita melle cocto excipe,
 & nucis ponticae magnitudine deuoranda
 praebe. In aliis exemplaribus habetur. Mel-
 lis lib. 1. piperis vnc. 1. myrrhae, opopanacis,
 vtriussque drac. sex, praeparata ac exhibe simi-
 liter vt praedictum est. Pastillus ex man-
 dragora, inscribitur Sphragis. Facit ad hæ-
 moptoicos & suppuratos. Resiccet omnem
 fluxionem. Radicis mandragorae corticis
 drach. quatuor, seminis hyoscyami drac. 4.
 thuris masculi, succi papaueris, croci, myr-
 rhæ, singulorum drac. quinque. Trita redi-
 ge in pastillos obolares, & praebe conue-
 nienter

nienter iuxta affectiones. Aliud Ptole-
mæi familiaris. Styracis, opii, thuris, croci,
singulorum drach. 5. corticis mandragoræ,
seminis hyoscyami albi, dauci cretici, singu-
lorum drach. quatuor, cassiæ drach. 2. excipe
vino Aminæo, ac præbe obolum cum aquæ
calidæ cyathis duobus. Aliud, ad easdem
affectiones. Styracis drach. sex, myrrhæ,
opii, seminis hyoscyami, irionis torrefacti,
singul. drach. quatuor, corticis mandragoræ,
opopanax, vtriusque drach. 2. piperis albi,
spumæ nitri vtriusque drach. vnam, excipe
melle cocto. Dato magnitudine ciceris.

Alia confectio Panchrestus ab omnimoda
commoditate dicta. Facit ad tussim anti-
quam, suppuratos, orthopnoicos, tabescen-
tes. Prodest hypochondriorum, hoc est, præ-
cordiorum distentionibus & ad omnem in-
flationem. Mulieribus menses, & quæ à fœ-
tu corrupto, aut à partu relinquuntur secun-
das deducit. Liberat etiam ab affectioni-
bus circa vesicam. Terebinthinæ drach.
octo, styracis drachm. sex, myrrhæ drach.
quinque, croci, iridis, galbani, singulorum
drachm. quatuor, seminis hyoscyami, corti-
cis mandragoræ, irionis torrefacti, opopa-
naxis, singulorum drachmas duas, piperis,
spumæ nitri, vtriusque drachm. vnam, exci-
pe passo. Charixenis. Facit peripneumo-

nicis tabidis, sanguinem reiectantibus suppuratis, ac veteri tussi. Myrrhæ, corticis thuris. In alio exemplari opii, mandragoræ, sagapeni, seminis hyoscyami albi, opopanax, dictamni cretici, pilularum marrubii, singulo. drach. 4. Subigito cum aqua & in pastillos cogito, Dato ex his obol. 3. ex aquæ mulsæ cyathis tribus. Alia Asclepiadæ qui Philophysicus, à naturalium rerum studio, appellatus est, pharmacum accommodatum. Corticis mandragoræ, seminis apii, utriusque drac. 4. myrrhæ, croci, anisi, seminis dauci, succi rhois rubri, seminis hyoscyami, piperis albi, castorii, sagapeni, opopanax, singulo. drac. 2. excipe melle cocto. Dato pro viribus. Liquor verò ex quo exhibetur sit conueniens affectioni. Antidotus Thespesiana, phthificis, sanguinem reiectantibus, suppuratis. Facit & ad alias internas affectiones, & præ omnibus cibi appetentiã excitat. Seminis apii drac. 12. myrrhæ, anisi, opii, singulo. drac. 6. piperis albi drac. 5. petroselini, nardi, piperis longi, singulo. drac. 4. castorii, floris iunci odorati, croci, singulo. drach. 3. cinamomi drac. 2. cassiæ aromaticæ drach. 4. excipe melle cocto. Dato nucis ponticæ magnitudine ad noctem, cum aquæ cyathis tribus. Antidotus Aristarchi. Compositio admiranda hanc Paulinam

nam appellamus. Facit hæmoptoicis, tussie-
 tibus, phthificis, suppuratis, peripneumoni-
 cis ad conuulsa rupta, ad stomachi subuer-
 sionem, & bilem vomentes ac secernentes,
 cœliacos, dysentericos. Facit ad affectiones
 circa vesicam, suffocationes vteri, febres per
 circuitum repetentes, vna hora ante exacer-
 bationem exhibita: facit in malum habitum
 delapsis, cibum non sentientibus, & ad le-
 thalia pharmaca, ac plagas venenū iaculan-
 tium bestiarum. Cinamomi, costi, galbani,
 castorii, succi papaueris, piperis nigri & lon-
 gi, styracis singu. vnc. i. mellis sexta. i. Ari-
 da tunduntur & cribrantur per angustissi-
 mum cribrum. Galbanum coquitur cū mel-
 le, & vbi dissolutum fuerit, mel excolatur,
 ipsiq; reliqua adduntur & tunduntur. Dein-
 de in pyxidem vitream aut argenteam re-
 ponuntur. Vsus est ad prædictas affectiones.
 Datur fabæ Aegyptiacæ magnitudine, cū
 aquæ mulsæ cyathis duobus, irroratis de
 digito guttis acetini nouem. Alia Antonii
 Musæ Panacea. Vsus est ea Diotas Iatrapi-
 pes. Facit ad eos qui per circuitum à rigo-
 re infestantur, delet febres antiquas, ac reli-
 quos morbos. Facit ad tussim veterē, phthi-
 ficos, sanguinem reiectantes, suppuratos,
 dyspnoicos, conuulsa, rupta, inueteratas in-
 flammationes, splenicos, hydropicos inue-


Q s

teratos, coeliacos. Extrahit lapides è reni-
 bus. Probe cit vrinam, Prodest omnium re-
 ptilium plagæ, & ad lethalia venena, & ad
 omnem materiam venenosam ac corrupto-
 riam vim habentem. Piperis albi aut longi
 drach. 8. seminis hyoscyami albi, cardamo-
 mi, myrrhæ, thuris, singu. drac. 12. opii, cro-
 ci, vtriusque drac. decē, sulphuris viui drac.
 sex, costi, aristolochiæ longæ, corticis man-
 dragoræ aut ipsorum malorum, euphorbi,
 singu. drach. tres. Mellis Attici cocti quod
 satis est. Datur his qui per circuitum infe-
 stantur magnitudine nucis pōticæ, reliquis
 pro viribus. Alia Cerusiana, Data est à
 Philippo Trallianis. Huius vsu phthificos
 & suppuratos liberabat. Piperis albi, succi
 cyrenaici, syriaci, succi papaueris, singulorū
 quadrantem, myrrhæ, croci, sulphuris viui,
 seminis hyoscyami albi, singulorum vnciā
 dimidiam, malorum mandragoræ drach. 2.
 cardamomi vnci. 1. mellis Attici lib. vnam.
 Datur pro viribus vt dictum est. Porro al-
 terum exemplar sic scriptum habebat. Pipe-
 ris quadrantem, succi cyrenaici vnci. 1. succi
 papaueris vnc. dimidiam. succi Syriaci vnc.
 dimidiā, *croci vnc. vñā sulphuris viui vnc.
 dimidiam myrrhæ vnc. dimidiam.] seminis
 hyoscyami albi, malorū mandragoræ vtri-
 usque drach. 2. cardamomi vnc. vñā. Mellis,
 Attici

* Hæc ve-
 tu. cod.

Attici lib. i. Datur pro viribus, vt dictū est.

De Orthopnoea. CAP. VI.



Vi citra febrē dēse respirāt, qualiter faciūt qui velociter cucurrerūt, ab accessione hac Medicis Græcis asthmatici, Latinis anhelosi appellantur. Eosdē etiam ab alia accessione orthopnoicos vocāt, propterea quod thoracis corpus penitus rectum habere coguntur, ob timorem suffocationis. Quin & stratū circa supernas partes ad quas thorax reclinatur, sibi ipsis erectius faciunt, ne dormientes strāgulentur. Minus est enim quod inspirant, quā pro vsu respirationis, quāuis thorax plurimū ipsis dilatetur. Ex quo manifestū sit, intrinsecus ipsis coarctationē locorū factā esse præter naturā, quā etiam ægri ipsi non obscuro sensu perceptant. Fit equidem & suppuratis locorum coarctatio, ob coaceruatum inter thoracem & pulmonē humorem. Fit etiā peripneumonicis, ob pulmonis inflammationē. Restāt aut adhuc duæ affectiōes, quæ locorū coarctationē efficiunt in viis, per quas aër inspiratur, Quū sanè aut humorū crassiorū ac viscosorū multitudo pulmonis bronchiis fuerit infarcta, aut tumor abscessui similis in ipso cōstituerit. Cæterū curatio ambarū affectiōnū aliquid cōmune habet, aliqd priuatū & alteri

tan

tantum propriū. Cōmune quidē vtrīsq; est,
 vt redundantia humoris affectiones gene-
 rantis expendatur & cōsumatur. Proprium
 autem affectioni viscosorū ac crassorū hu-
 morum, vt per attenuantia & extergentia
 pharmaca cōsumantur: ei verò quæ propter
 tumorem abscessui similē contingit, vt per
 attenuantia & resiccantia eadem consum-
 ptio fiat: quæ curatio rursus omnibus in
 profundo corporis abscessibus communis
 existit. Vini itaq; potus ambabus conuenit
 tenuis substantia. Omnis autē potus modi-
 cus sit in his qui alicubi abscessum habent.
 Multus contra, in his quibus brōchia visco-
 sis ac crassis humoribus sunt obturata. Et-
 enim pharmaca quæ eiusmodi humores re-
 purgāt, necessariò quidē tusses mouent, nō
 verò facilē per sputū reiicitur quod expur-
 gatū est, ob crassitudinem videlicet. Qua-
 propter humectatione multa opus habent,
 quo facilē efferatur. Porro quemadmodū
 in aliis pharmacis plurimi medici, sic etiam
 in his quæ ad ambas has affectiones cōmo-
 da sunt, delinquūt, indiscriminatim ipsa tra-
 dentes, quū tamen composita sint quædam
 pharmaca alteri affectioni cōmoda, quædā
 rursus alteri, quædam verò sic vt ad ambas
 quidem moderatē conueniant, verū nihil
 operæpretium efficiant. Quare recensendo
 phar

pharmaca alicuius pretii à prioribus medicis prodita, indicabo iuxta singula quali facultate prædita sunt, Initio ab his quæ Asclepiades scripsit in 2. internorum, factò.

Asclepiada pharmaca ad dyspnoicos conscripta.

EClegma ad dyspnoicos, Antonii Musæ. Asellorum sub hydriis nascentiũ sexta. i. in vas fictile conicito, & ad prunas torreto, in albatos autẽ terito, ac melle cocto excipito, & ante cibum mystrium delingendum dato. Aliud, Scillæ crudæ succum exprimito, ei quæ parem mellis Attici mensuram addito, & ad prunas admota coquito. Dato inde ante & post cibum mystri mensuram. Aliud Charixenis. Origani drach. 8. comæ thymi, iridis Illyricæ, calaminthæ siccæ, piperis albi, anisi torrefacti, singulorum tantundem, tundito & per angustissimum cribrum concernito, ac melle cocto excipito. Dato nucis ponticæ magnitudinem. Aliud. Piperis albi lib. i. libyfici trientem, calaminthæ siccæ, anisi tosti, pulegii semen non gerentis, singulo. quadrantem, seminis apii, comæ thymi, vtriusque vnciam vnam, excipe melle, & præparato vtere vt prædictũ est. Potio ad dyspnoicos, Chariclis, pharmacum accommodatum, auxiliatur confestim. Vuæ passæ Rhodiæ exacinatæ acetabulum, fœni græci loti
tan

tantundē, aquæ pluuiæ sexta. vnū. Coquito donec dissoluantur, & liquorē excolatū reponito. Ex hoc præbeto assiduè & iuxta singulas irritationes, cyathi mensuram calefactam. Alia potio. Abrotoni partes duas, vix passæ pinguis tantundem, summitatum rutæ partē vnā, aquæ pluuiæ sexta. tres. Coquito ad tertias, & exprimito liquorē, eiq; mellis vnc. i. addito, rursusq; coquito ac dato vt prædictum est. Catapotium dyspnoicis, asthmaticis. Abrotoni, virgultorum rutæ, comæ absinthii, singulorum drach. 4. tusa & cribrata aceto subigito, & catapotia 12. formato. Dato ex aceto mulso. Aliud Nicerati. Castorii, ammoniaci thymiamatis, abrotoni, singulorum sextantem, absinthii, cumini Aethiopici, vtriusque drac. i. aceto subigito, ac catapotia formato, ac dato ad ciceris magnitudinē. Pharmacum ex sulphure viuo dyspnoicis. Anisi, sulphuris viui, vtriusque quadrantem, ammoniaci thymiamatis, castorii, melanthii singulorum drach. 4. Aqua diluta in catapotia cogito, vnumq; in aceti mulsi cyath. 3. dato.

Aliud, Seminis rutæ sylvestris drach. quatuor, aristolochiæ, abrotoni, absinthii, ammoniaci thymiamatis, sulphuris viui, singulorum tantundem. Aceto subigito & catapotia ciceris magnitudinis formato, ex
qu

quibus duo cum aceti mulsi calidi cyathis tribus exhibeto. Hæc omnia pharmaca ab Asclepiade conscripta, his qui propriè dyspnoici, hoc est, ægrè spirantes appellantur, conueniunt. Vocant autem sic eos quibus bronchia pulmonis crassis & viscosis humoribus sunt obfarcita, in quibus velut dixi, ultra hoc quod crassitudinē & viscositatem humorū necessariò secamus atq; attenuamus, humiditatem quandā cum pharmacis, tum victui adesse oportet. At verò abscessus qui attenuantibus & resiccantibus opus habent, maximè gaudent aromatum facultatibus, quas omnes ostēdimus tenuiū partium esse, & resiccatorias, vnā cum hoc quod calfaciant, quare his qui propriè orthopnoici & asthmatici appellantur, pharmaca conuenient secantia citra calfactionem, & ob id maximè eos iuuat acetum scilliticum appellatum, atque ipsa adeò scilla, & acetum mulsum ex eiusmodi aceto confectum. . Caterū in asellorum sub hydris nascentium meminit inter ea, vt qui attenuatoriam & discussoriam vim habeant. Verū quo consilio ad vsum ipsorum peruenierit, nō habeo quod dicā. Quemadmodum autē in hac affectione vehementer cauendum est ne calfaciamus, propterea quod viscosi & crassi humores non solum nihil,
ab

ab his auxilii sentiūt, sed etiā offenduntur: Eodē modo etiā quæ valde refrigerāt vitāda sunt. Omnia enim crasse faciūt, & co-
gunt, ac coagmentant humores, eosq; ægrē
eluibiles reddūt: & ob hanc rem sanē rectē
fecerunt, qui eiusmodi pharmaca cōposue-
runt, quod neque papaueris succū, neq; man-
dragoræ succū, aut radicis corticē, aut hyo-
scyami semē, aut cicutę, aut psyllii, aut semē
lini ammiscuerunt. Et multo magis quod
neq; ex adstringentibus quippiā pharmacis
addiderunt. Maximē enim contraria sunt
eiusmodi affectionibus, vt palām videtis.

*Quæ pharmaca Andromachus ad huiusce-
modi affectiones conscripsit.*

AD dyspnœam. Sulphuris viui drac. 1.
seminis rutæ syluestris drach. 1. aristo-
lochiae, absinthii, ammoniaci thymiamatis,
abrotoni, singulorum drach. 4. Trita cum
aceto ad catapotia magnitudine fabæ redi-
ge. Dato mane tria & vesperi totidem.
Aliud ad dyspnœam, vt Alcimius. Colo-
cynthidis carnis obolos 3. panacis obol. 3.
anisi obolum 1. fac cum aqua catapotia 4.
& resiccatorum obol. 1. præbeto. Præceden-
te autem die æger simplici euacuatorio eua-
cuetur. Aliud, Colocynthidis sesqui-
drachmam. iridis Illyricæ drachm. 2. radicis
opopanacis drach. 2. abrotoni drach. 1. nam,
nit.

nitri drac. 1. alii obol. 3. excipe aqua & redige ad fabę magnitudinem. Dantur cataportia. 4. & post semihorę spatium, datur aquę mulsę hemina dimidia. Aliud, Sinapis drac. 1. salis cõmunis obol. 3. elaterii obol. 3. alii obol. 1. & dimidium. Terito cū aqua, fac pastillos. 8. Dato alternis diebus cū hydro-melite. Aliud, Ammoniacy thymiamatis drac. 1. abrotoni drac. 2. sulphuris viui dra. 1. formato cū aqua pastillos, & cū aquę mulsę cyathis tribus prębeto. Aliud ad orthopnoicos. Elaterii obol. dimidium, asellos ex sterquiliniis. 3. terito simul, & dimidium ex aquę cyatho vno dato. Aliud vt Philinus ad anhelos & dyspnœam. Cardamomi drac. 3. iridis sesquidrach. panacis sesquidrach. cassiæ sesquidrachm. struthii sesquidrach. styracis drac. 2. thymi drac. 8. seminis rutę syluestris drac. 8. abrotoni drac. 8. aristolochiæ clematitidis, sulphuris viui, ammoniacy thymiamatis singulorū drac. 8. cū acri aceto ad cerati crassitudinem redige, prębe fabę Aegyptiæ magnitudine ex aquę cyath. 3. Ad orthopnœas, vt Apollonius. Scyllę partē vnā. sulphuris viui, bituminis, singulorum partē. 1. Dantur oboli tres in aceto mulso. Ad orthopnœam, Sossicratis. Opopanacis drac. 1. myrrhæ drac. 1. piperis grana. 40. rutę fasciculum quantus

R

duobus digitis apprehendi potest, ex tritis catapotia. 20. formato. dato mane itemque vesperi vnum, febricitantibus in aqua cyathis duobus, aliis ex vino. Ad orthopnoeā, Andronici. sulphuris viui obol. 3. ammoniaci thymiamatis drach. 1. anisi, myrrhae, castorii, singulorum drach. 1. cumini Aethiopici drach. 1. cum aqua pastillos cogito, scrupulorum trium aut quatuor. Dato ad noctē ex aqua cyathis duobus. Ad orthopnoicos, tussientes, peripneumonicos, tabescentes, ægrè spirantes, hepaticos, Vt Eugenius. Croci, drach. 8. misios drach. 4. baccarū lauri drachm. 2. piperis albi & longi vtriusque drach. 1. opii. drach. 3. costi obol. 3. terebinthinæ obol. 5. galbani obol. 3. succi radicis dulcis obol. 2. gummi obol. 1. mellis lib. dimidium. Dato cochlearium. 1. cū aqua cyathis duobus aut tribus. Si res vrgeat ante & post cibum. Ad orthopnoicos, Valentis. Opopanacis drach. 2. carnis colocynthidis drach. 1. Tantum datur ad summum. Aliud Onetri. Castorii drach. 1. ammoniaci thymiamatis drach. 2. Detur dimidium ex aqua mulsa. Ad dyspnoeam, Podanithæ. Sinapis drach. 1. salis drach. 1. nitri obol. 3. Redigito in catapotia. 8. Dato ex his duo ad noctem alternis diebus.

FINIS SEPTIMI LIBRI.

CAPITA SEPTIMI

LIBRI.

De pharmacis stomacho congruis. Cap. I.

Confectiones stomachicae Andromachi.

Caput

II.

Stomachica pharmaca ab Asclepiade in
primo internorum conscripta. Cap. III.

Quae Archigenes in primo pharmacorum
secundum genus prodidit, de affectioni-
bus circa stomachum. Cap. IIII.

De pharmacis quae forinsecus ori ventris
imponuntur. Cap. V.

De hepate & eius affectionibus. Cap. VI.


Quae pharmaca ad hepaticos ab Andro-
macho sunt conscripta. Cap. VII.

Confectiones hepaticae ab Asclepiade con-
scriptae. Cap. VIII.

Quae Archigenes ad Hepaticos in secundo
pharmacorum secundum genus scri-
psit. Cap. IX.

Malagmata à Damocrate conscripta ad
hepar & praecordia, Quaedam ex eis
& ad totum ventrem & splenem. Cap. X.

R 2



CLAVDII GAL- LENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE

pharmacorum secundum locos,

Liber octauus, Iano Cor-

nario medico, in-

terprete.

*

De pharmacis stomacho congruis.

CAPVT

I.



QVOD semper dico, etiã
nunc proloquar, Nimirũ
persuasum me habere,
quod difficillimum sit ad
veritatẽ reuocare eos qui
sectæ alicuius seruituti se
addixerunt. Verũ qui prudentes sunt, si-
mulque veritatem sincere amant, eos spero
custodituros esse ea quæ veluti iudicandi
instrumenta nobis à natura data sunt, ad
actionum vitæ cognitionem, Experiẽtiam
dico, & rationem, quæ quidem vtrique ex
æquo quibusdam conferunt ad artem, qui-
busdam verò alterum altero amplius: & ta-
men

men tanquam semper ad perfectionē alterum altero opus habeat, Sic sanē ad residuū sermonis & doctrinæ huius absoluendum progrediar. Falsæ etenim opiniones animas hominum præoccupantes, non solū surdos, sed & cæcos faciunt, ita vt videre nequeant quæ aliis conspicue apparent. Quod ipsum vel maximè circa affectiones oris ventris videre contingit, præsertim quum fuerit inflammatum. Eius enim itemq; iocineris inflammationes, adstringētium cōplexu opus habēt. Si namq; per laxatorium medicationis ductum, citra ammixtionem facultatis robur addentis, curentur, periculum incurrunr de ipsa vita, atque hoc ipsum quum omnes Empirici medici per experientiam edocti sint, & omnes dogmatici in artis operibus obseruent, Non pauci tamen huius temporis Methodici (neq; enim de omnibus dico) innumeros quidem stomachicos ipsi in animi deliquium inducūt, omnes verò hepaticos occidunt: nullū enim ego vidi seruatum ex his qui in eiusmodi medicū inciderunt. Quidam tamē ex ipsis quanquam pauci, oleo eos fouent in quo absinthii coma est feruefacta, & lanam nardino vnguento imbutam obligant. Quidam verò etiam mastichen chian, aut aloē ammiscent: aut etiam pro nardino melinum adhibēt. In di-

R 3

uitibus verò mulierculis foliatum & spica-
 tum ab eisdē appellata vngenta admouent,
 atq; equum hæc faciunt, laxatoriū ductum
 se seruare putant, Tantū scilicet habent ex-
 perimenti facultatis pharmacorum. Malim
 autem ego omnes sic indoctos esse, quā
 quod adstringentia quæ sint sciant, vsum
 tamen ipforum vitēt. Quæcunq; igitur ad-
 stringentia in fomenta & cataplasmata mi-
 sceantur, in hepatis aut oris ventris, quod
 sanè & stomachum vocāt, affectionibus, nō
 est præsentis sermonis explicare. Quæcūq;
 verò in emplastra & ceratiformia medica-
 menta, quæ forinsecus imponuntur, cōmo-
 da sunt, & quæcunque vtiliter deuorantur,
 hæc ipsa indicabo, ea quæ inflammatis pro-
 sunt primū tradendo quando quidē etiā in
 ipsis ægri maximè periclitantur. Ceratum
 igitur quo assiduè vtor, ex aloë, & masti-
 che, & cera pontica amara, atque vngento
 nardino constat. Cōponitur autem hyeme,
 ad. 8. drac. ceræ, vncia vna mēsurali Roma-
 na vngenti nardini cōiecta: Aestate autem
 ad. 7. eadem vngenti proportionē. Opti-
 mum autē vngentū esse oportet, quale an-
 tea qui in sola Laodicea Asiæ præparaba-
 tur. Nūc verò etiam in aliis multis Asianis
 vrbibus componitur. Cera si non pontica
 amara tibi in promptu sit, aliam ponticam
 conii

coniice, & neque illa praesente, eam quae Tyrrhenica appellatur. Si verò neque hac adsit, aliam aliquam odoratā & pinguem, si neque talem habeas, eā quam habere potes lotam adde. Liquefiat autē in duplici vase, atque ita refrigeratum & erasum ceratum, cum tritis reliquis probè permisce, cū aloē videlicet & mastiche. Sit autem vtriusque drach. i. & quandoque plus, non tamen vt sesquidrachmam transgrediaris. Quod si ampliori opus sit adstrictione, nimirum debilitate tanta existente, vt cibum retinere non possint, omphacium pari pōdere addatur, vt trium singulorum drachma sit vna, aloēs vna, mastiches vna, & tertia omphacii. Caterū in cerati praeparatione primū omphacium misceatur, deinde etiā alia his vniātur. At verò quemadmodū omphaciū, sic etiā absinthii succū ammisceto, quādoq; etiam ambo, & tertiū insuper hypocysthidis, & quartū cenanthes. Sic autem appello vitium syluestrium germē vnā cū floribus, ex quo succedentibus diebus vna fit. Quin & Rhōis succū non rarò ammiscui. Sed & cerati nardini copiā augere oportet, iuxta proportionē numeri reliquorū pharmacorū, ita vt si. 4. drach. aliarum rerū accumulētur, triens sit nardini cerati, sextās quidē cere, sextās itē nardini vngēti, hoc est vtriusq;

R 4

drachmæ. 16. Porrò si inueterata fuerit inflammatio & iam obdurata, magis varia pharmaca adhibere oportet, & quæ ex aromaticis quippiam habeant, ac mollientibus, & discussoriis. Quale est quod fit ex meliloto. Est autem cõpositio ipsius multiformis, propterea quod omnibus iuxta præcordia inflammatis conuenit, non magnis adeò differētiis euariās, Ita vt aliqua ipsius præparatio inflammato hepatis sit commodior, alia stomacho, aut aluo, aut spleni, aut quibusdam istius loci musculis, quæ omnes communi descriptione cõprehensæ sunt in malagmatum compositionibus. Verùm in præsentī loco ea quæ prioribus medicis ad omnes stomachi affectiones scripta sunt, & non solùm forinsecus imposita, sed etiam in potu accepta auxiliantur, omnia cõscribentur. Quædam verò ex ipsis communia sunt etiam affectionibus ventris. Sæpenumero iam dictū est, quod medici in more habēt os ventris, veluti cardiacum, hoc est, cor: sic etiam stomachū appellare. Verùm quondā frequentior cardiacæ appellatio erat, Nunc autem ab ea adhuc restāt, cardio-sin, & cardialgia, quibus vocibus non cordis, sed oris ventris dolores significantur. Particulā autem ipsam stomachū vocant æquiuoce cum illa particula quæ cibum ex ore in ipsam defert.

defert. Scripserunt igitur priores medici
 pharmaca ad affectiones in ipso cum alias,
 tum subuersiones ab ipsis appellatas. Viden-
 tur autem sic vocare tum appetitus perdi-
 tionē, tum nauseosas dispositiones, in qui-
 bus aliquando quidē vomitus contingunt.
 Fiunt autem & morsus quidā in ipso, quem
 admodum etiam magnæ famis & anxiosæ
 affectiones. In quibus omnibus communis
 quidam adstringentium pharmacorū vsus
 inuentus est. Ammixta autem sunt plerisq;
 ipsorum calfacientia & resiccantia. Fiunt &
 aliæ affectiones rariores, humectantibus,
 aut refrigerantibus aut vtriusq; simul opus
 habentes. Cæterum qui ab experientia ci-
 tra rationalem methodū, auxilia inueniunt,
 meritò ea quæ sæpe iuuerunt in memoriam
 reuocant, & in vsum conuertunt. Eorum
 enim quæ sæpe eodē modo facere visa sunt,
 obseruationem & memoriam, suam ipsorū
 experientiam esse aiunt. Quemadmodum
 autem in ore ventris, sic etiam circa ipsum
 totum, singulaque intestina, & vt compre-
 hensum dicam, circa omnem corporis parti-
 culam, eadē intemperaturæ obortæ, actio-
 nes similium partium offendunt, quas si
 quis non esse morbos ipsarum credet, nihil
 circa cognitionem efficiet, qua ignorata
 neq; curationem inueniet. Habēt autem

R s

non modicam coniecturã cognitiones ipsæ affectuum in profundo corporis consistentium, & ob id vtilissima medicæ artis pars est quæ cognitionem docet eiusmodi affectionum, quas neque quod primæ & maximè sunt, plerique ex vulgo medici sciunt. Quare meritò neque cognitionẽ ipsarum, neque curationẽ inuestigarunt. Coguntur igitur etiam si dogmatici sint in rationalibus methodis, ad solam experienciã peruenire: vt iustè miremur quod quum absq; febre & inflammatione, abscessuq; & vlceratione, quispiã debiliter concoquat, aut penitus non concoquat, promissione facta se inuenturos curationẽ, quærant an cõtritione ciborũ concoctio fiat: & deinde vbi hoc vt maximum inuenerint, edulia quæ faciliè conterantur exhibent, neq; quod promptissimum est intelligentes, quod etiã quispiã rei medicæ rudis, alias autẽ prudens vir me interrogauit, Quomodo prodest scire per contritionem ciborũ fieri cõcoctionem, ad hoc vt quis affectionẽ ventris sanet, in qua debilitatur ad cõcoctionem ciborum, quũ non per exhibitionem alimentorũ quæ faciliè conterantur curatio fiat, sed læsio tantũ euitetur. velut etiam per paucum alimẽtum ac inediam. Quemadmodũ enim qui inediã perfert, in cõcoctionis quidem debilitatem
non

non incurrit, non tamen ab affectione hoc modo curatur: Sic neque qui in cibo accipit ea quæ in totum nulla contritione opus habent, Quale est lac, ptisanæ succus, & sorbitiones ex alica. Hæc quidē igitur in libris de curandi methodo sufficienter tradita sunt, & non obscurū est præsentem doctrinam vtilem esse his qui se in illis præexercuerunt. Quemadmodū autem in aliis quæ prius tradidi, reuocatis in memoriam singulis de illis mihi præmonstratis capitibus, ad pharmacorum compositionem progressus sum, Sic etiam nunc faciā. Quum octo sint in singulis partibus corporis intemperaturæ, atque hæc omnes aut circa solas nudas qualitates, aut cū alicuius humoris complexu fiant, Intemperiem quidē siccam humectare oportet, Humidam autem siccare: sic & calidam refrigerare, frigidam calfacere. Similiter verò etiam compositas intemperaturas, aut calfacere & siccare, aut humectare & calfacere, aut refrigerare & humectare, aut siccare & refrigerare oportet. Quando verò veluti dixi, plurimæ intemperaturæ hominibus ex redundātia humorum, magis quā ex inopia fiunt pharmaca resiccantia plerosq; magis iuuant. At verò quum resiccantia partim quidem adstringant, cogēdo ac adstringendo substantiam
eo

eorum quæ contingunt, partim verò discutiant & in hoc substantiam ipsorum dissoluant, ob hoc ipsum sanè plures sunt qui adstringentibus indigēt. Verùm si humida intemperies cū frigiditate fiat, læduntur qui per sola adstringentia curantur quæ frigida facultatis existunt. Quapropter meritò plurima pharmaca per experientiam inventa, ex mixta materia componuntur, adstringente videlicet & calfaciente. Verū ipsorum differentiam cognosces, si simplicium pharmacorum facultatem memoria teneris. Dictum enim mihi iam sæpe est, Neminem posse rationabiliter & secundum methodum vti his quæ in hoc opere cōscripta sunt, si non memoria teneat quæ in duobus operibus ante hoc opus editis prodita sunt, de simplicium pharmacorum facultate, & curandi methodo dico, Quidā enim absq; discrimine pharmaca ad eiusmodi affectiones stomachi & ventris cōscripserunt. Quidam verò aliqua discrimina attigerunt ab accessionibus omnibus apparentibus. Quo igitur & vos cognoscere sciatis facultates vniuscuiusque pharmaci per experientiam approbati, etiam si non inueneritis differentias affectionum in quibus conueniunt adscriptas, primū quidem ea quæ Andromachus prodidit adscribā. Deinde quæ Ascle-
pia

piades, & post hæc si ita videbitur etiam alia quædam.

Confectiones Stomachicæ Andromachi.

C A P V T

I I.



Andromachus postquam præscripsit, Stomachicæ, post hæc præscriptionem, sic auspicatur. Ad Stomachicos hiera qua vtor, & deinceps totā eius compositionē adscribit in hunc modū. Floris iunci odorati, xylobalsami, mastiches, croci, nardi Indicæ, asari, cinamomi, singulorum drach. 6. aloës lotæ drach. 100. simul trita reponere, præbe ieiunis cochlearia duō, alii vinum præbēt cū aquæ frigidæ cyathis. 4. aut calidæ. Hæc quidem Andromachus scripsit, neq; quos stomachicos nominet ostendens ac declarans, neque an omnibus ipsis hoc pharmacū conveniat, an pluribus. Itaq; mihi necessarium est dicere, quum ex his qui stomachici dicuntur aliqui quidem statim magnopere ex prædictæ hieræ vsu iuantur: aliqui verò lædantur. Plerique equidem vulgo homines eos qui appetentiam perdiderunt ita vocant, & quibus post acceptū cibum vētris os grauatur, & præmitur, & quandā ægrè tolerabilē anxietatem habet. Appellant eodē modo etiā illos quibus nausea contingit, & maximè si ad vomitum impellat, & adhuc magis si simul

mul cibi corrumpantur, quandoque accidi,
quandoq; nidorosi facti, quādoq; etiā aliam
vitiatam qualitātē adepti. Et prae his omni-
bus adhuc magis illos stomachicos nomi-
nant, quibus ructus eiusmodi, cum molestia
quadam, & anxietate ac subuersione cōtin-
gunt, saepe quum nondū cibum acceperunt.
Quinetiam si per plurimū tēpus cibi in ore
ventris morentur, grauantes & vix descen-
dentes, hos itidem stomachicos appellant.
Alios item appetitū caninum appellatū ha-
bentes, vt & plurima edant, & maximē gra-
uati paulò post reuomant, similiter vocant.
Alios rursus qui fortiter exoluuntur, vbi
diutius in ediam pertulerint, & si non citius
cibum accipiāt, in ore vētris morsus perci-
piunt, eodē modo stomachicos vocāt. Ho-
rum ipsorū verò aliqui facilē nauseosi fiunt

* Nisi, ha- * si citius potum ac cibū acceptent. Itaque
bet codex qui secundū rationālē methodū auxilia in-
vetustus. uestigat, ad affectionis inquisitionē proce-
dit, qua inuenta, abundaturū se sperat pro-
priis ipsi auxiliis. Qui verò per solam expe-
rientiā auxilia accumulat, ipse suam fortui-
tam occasionē expectat, & à prioribus tra-
dita relegit. Quum verò plurima ab ipsis
indiscriminatim prodita sint, & in plerisque
etiam inter se differāt ac dissentiāt, meritò
etiam ipse alias aliud sentit, maximē vbi ab
ipsis

ipsis auxiliis aliquando quidē iuvari stoma-
 chicos videt, aliquando verò lædi: Quēad-
 modum inproposita hiera cōtingere solet.
 Quamre quidē omnes qui nunc Romæ me-
 dicantur, picrā, hoc est amarā nomināt, quā-
 do quidem hieræ appellatio, pharmaco ex
 colocynthide ritē ab ipsis indita esse vide-
 tur. Verūm qui ante nos Romæ medicinam
 exercuerunt, ambo ea pharmaca hieras ap-
 pellarunt, & distinctionis gratia alteri ex
 colocynthide, alteri ex aloë, appositione
 addiderunt, Sic scribētes. Hieræ ex colocyn-
 thide. Hieræ ex aloë. Hieræ itaq; ex aloë du-
 pliciter preparatur, ab aliquibus velut An-
 dromachus describit, ad centū aloës drach-
 singulorum aliorum drach. 6. ammixtis, ab
 aliquibus verò non sex sed. 8. Quidā verò
 in. 80. aloës drachmas, sex aliorum addunt.
 Plurimi autē ad pharmaca quæ aloë miscen-
 tur, & sex numero sunt, etiam florem iunci
 odorati apponunt. At verò ipsam aloën
 Andromachus quidē lotam, Aliqui verò ex
 aliis etiam sic, aliqui verò illotā addiiciunt.
 Verūm nosse operæpretium est, ad ventris
 subductionē illotam aloën aptiorem esse,
 multū verò de medicamētaria vi depone-
 re lotam, quam etiam febricitantibus dare
 aliquis audeat, si non vehemens, sed valde
 debilis sit febris. Quidam verò etiam ex
 illo

illota aloë pharmacum multis sic febricitantibus exhibuerunt, deindeq; quū nihil manifestè leuissent, in aliis rursus magnam experti sunt cladē. Infestissima est enim aloë, etiam lota, his qui citra vitiatos humores ex intemperie calida & sicca affliguntur. Proximam ab his cladē percipiūt, qui siccā intēperie habēt vel frigidityte etiā implicatam. Et in vniuersum qui ex sola qualitate particulam aliquā affectam ac læsam habēt. Etenim in humoribus intemperaturæ, pharmacis ipsas euacuantibus egent, Quæ verò absq; his consistunt, penitus in tabem deueniunt ex pharmaci huius ex aloë cōstantis vsu. Itaque vbi humiditas vitia tunicas ventris perrigat, Hiera ex aloë utilis est, expurgans humiditatem. Omnino autē sic affectis accessio nausæ plus aut minus adest. Euacuatio igitur affligentis humoris per solam aloën cōtingit, quæ purgatoriam vim non fortem habet, sed vt ea quæ circa aluum sunt, quæ etiam contingit, purgare possit. Et si aliquando ampliori pondere exhibeatur, vsque ad locos circa hepatis conscendit. Non tamen totius corporis purgatoria aloë existit. Cæterum ex his quæ ei ammiscentur, Mastiche vt stomacho commoda & odora, & quæ medicamentariam aloës vim frāgere queat, ammiscetur.

Cina

Cinamomum verò eadē gratia, & præterea quod tenuissimarum partiū est, vt aperire ventris meatus possit, extergereque ac attenuare si quid viscosum aut crassum in humoribus feratur. Crassos enim humores ob purgatorie facultatis imbecillitatē, aloë trahere non potest. Quapropter biliosarū ventris affectionum optimum pharmacum est, adeò vt in vno die saepe multos stomachicos creditos persanet. Iuvat aptē & hos & alios omnes affectus ex vitiatissimis humoribus ortos cinamomum ammixtum, vtpote quod alterantem habet facultatem vitiosarum qualitatū in id quod secundū naturā habet. Quare scire oportet affectiones in humoribus vitiatissimis circa ventrē & stomachum, maximē per medicamentā ex aloë iuari, in maximum verò detrimentū peruenire ex adstringentiū eduliorū, potuum, ac pharmacorū vsu. Quēadmodū vice versa, in quibus humiditas multa, & velut mador quispiam est circa affectam partem, citra vitiatos humores, qui ipse sola quantitate & copia affligat, & velut irriguum ventris os reddat, Vtilissimus adstringentium eduliorum, potuum ac pharmacorum vsus existit, languida nimirum & exoluta tunc reddita affecta particula ad modum laxatorum articulorum, In quibus ipsis etiam adstringē-

tium vsus corrigit affectionem. Caterum picra confectio (de hac enim nobis sermo est) velut cinamomū, sic etiam alia partim vt stomacho commoda, partim vt tenuium partium & extergentia assumit, quæ robore quidem multum à cinamomo deficiunt, idem verò facultatis genus habent. Secundam à præscripta compositione Andromachus sic ad verbum tradidit, vt Lampon Pelusiota. Cinamomi, calami aromatici, cassiæ nigræ, xylobalсами, floris iunci odorati, palmæ elates, singulorum quadrātem, alii vnc. r. Omnia in crassas partes tusa in ollam nouam coniice, & aquæ pluuiæ sextariis tribus infusis, donec dimidium super sit coque, & excola, & accepta aloës Indicæ libr. vnam, aquam pluuiam sufficiens superfundito, & sub caniculæ æstus donec resiccetur terito, atq; vbi primū per hanc aquā aloē ipsam edulcaris, postea eam quæ ab aromatis excolata est aquam affundito, & in sole donec resiccetur terito, indeque trita hæc quæ sequuntur ammisceto. Croci, myrrhæ, mastiches, singulo. quadrantem, alii vnc. r. Conterito simul omnia & sicca reponito, atque in potionibus ad conuulsa, rupta, plagas internarum partiū, incipientes laterum dolores vtitur. Item ad inflatos, dolentes stomachū, tardè concoquentes, reiectantes
san

sanguinem, & iſchiadicos. Datur ad ſummũ
 obolus vnus, aut duo, ex aquæ cyatho vno.
 Reliquis pro viribus præbeto. In vulneri-
 bus & inflammationibus dilutũ aceto mul-
 ſo imponitur. In oculorum inflammationi-
 bus ſucco mentæ, aut calaminthæ, aut ſola-
 ni, aut alicuius conſimilis. In podicis inflam-
 mationibus cũ roſaceo aut vino Aminæo.
 Vtere etiam in vnguium abſceſſibus, paron-
 ychias Græci vocant, ſicco, ſuperne lina-
 mento cum roſaceo impoſito. Et ad ſanguĩ-
 nis eruptiones ſiccum cum aceto, & ad cru-
 ſtas in ore ex paſſo, gargariffandum dato.
 Hoc pharmacum quod Peluſiotæ Lampo-
 nis eſſe ait, ad multas affectiones commo-
 dum eſt, polychreſta ob id talia Græci ap-
 pellant, de quibus etiam ante aliquid dictũ
 eſt, quod videlicet deficiãt ab his quæ vnũ
 quoddam optimè faciunt, ob multitudinẽ
 eorum quæ promittunt. Apparantur autem
 quum vnum habere viginti affectionibus
 cõgruum malum, quàm tot numero alia,
 quum tamen ad ſingulas affectiones vnum
 aliquod deſtinatum, eo quod ad plures pa-
 ratum eſt, melius exiſtat. Facultas autem
 ipſius per quam in prædictis efficax eſt, te-
 nuium partium exiſtit & caſſatoria, ſe-
 cans, extergens & aperiens, & ob id diſcuſ-
 ſoria redundantium in quibuſdam partibus

ferosorum succorum ac humorum. Et propterea etiam prædictis in sermone affectibus conuenit, discutiens vt dixi, vitiosos & serosos succos ac humores affectarum partium. Quare etiam prædictas alui affectiones, in quibus picra confectio moderatam purgationem operatur, curauerit per modicam resiccationem, nõ per coaceruatã euacuationem. Præstantior igitur est ad huiusmodi affectus picra compositio prima descripta. Tertium post prædicta pharmacũ Andromachus sic descripsit. Ad stomachicos & cœliacos pastillus amarus, mollit aluum. Facit ad somnum. Est autem ex libris Aphrodæ. Facit & ad vesicam, & coli affectus. Seminis apii drac. 6. anisi drach. 6. piperis albi sesquidrachmam, castorii drac. 2. myrrhæ sesquidrachmam, nardi celticæ floris sesquidrachmam, opii sesquidrachmam, cinamomi sesquidrachmã, comæ absinthii drac. 4. aloës obol. 3. mastiches drach. vnã, cũ aqua pastillos formato triobalares aut drachmales & dato cum aquæ cyathis tribus. Neque in hoc pharmaco adscripsit Andromachus, quos nam stomachicos dicat, & quid patiantur. Verũ ex eo quod compositioni additum est opium, manifestum fit compositorem huius pharmaci intentionẽ suam eò direxisse, vt resiccatorium simul &

& doloris sedatorium pharmacum efficeret, somnumq; aliquem induceret, non tamē contentiosē contra vnam aliquam ex prædictis affectionibus instando, quo videlicet breui ipsam excinderet. Quartū deinde pharmacum Andromachus scripsit, neq; ad vnam aliquam affectionē contentiosē compositum, neq; ad multas moderatē. Habet descriptio hoc modo. Ad stomachicos hiera Antipatri. Aloës bonæ drach. 4. mastiches drach. 2. asari drach. 4. rosarum siccarum, iunci odorati, Mei, phu, cassiæ, singulorum semiunciam. Vtere arido trito quē admodum aliis. Quintum post hæc pharmacum, quod ex plantaginis succo præparatur, & ipsum Apollonii esse ait, tale est. Succu plantaginis aridi drach. 3. mastiches drach. 2. myrrhæ drach. 1. mentæ drach. 1. zingiberis drach. 1. Videtur mihi Apollonius hanc cōpositionem experimento cognouisse, in stomacho calidiorem affectionē habente, atq; ita ipsam indiscriminatim extulisse non potentem frigidis affectionibus conuenire. Refrigeratorius enim est plantaginis succus. Porro quæ sequitur videtur mihi composita esse ab eodem autore, in prioris usu successum non sentiente, & recognoscente pharmacum refrigeratorium se effecisse, & ob id castorii modicum,

& aloës quippiam apponente quæ euacuare potest, & mastichen vt stomacho cōmodā, ac crocum & myrrham, vt quæ concoqueſcunt. Quapropter neque hoc, neq; præcedens pharmacum adhibuerim in stomachica affectione, quā nullam probè curare poſſint, præterquā ſatis multū calidā. Scripſit de ea hoc modo. Succi plantaginis ſicci drach. decē, aloës Indicæ drach. i. maſtiche drach. i. croci obolos 2. opii obolos 3. caſtorii obolos 3. myrrhæ drach. vnā, formato ad magnitudinem ciceris. Similiter autem neque conſequenter ſcriptum citra diſcrimen, rectè quis adhibuerit in alia affectione, quā quæ moderata ſiccatione & adſtrictione opus habeat, in humoribus, qui-

* Aliàs nō
vitiatis.


dem modicis, qualitate verò * vitiatis. Cōponitur enim ex ſuccino & maſtiche, ſic ipſo Andromacho prudente. Succini, maſtiche chiæ. Succini plus conſice. Dato cochlearium vnum ex aqua tritum. Cæterū quod ſequitur pharmacū, hac deſcriptione, Stomachica Galli, affectioni quæ calſieri & ſecari poſtulat, vtilis exiſtit, ex fœniculo, aceto, & melle conſtans, quod ipſum Andromachus his verbis tradidit. Stomachica Galli. Corticis radicis fœniculi, libræ dimidiū, aceti acris ſextarium vnum, eiꝯque dimidium, aloës quadrātem, mellis Attici lib. i.

Rad

Radices lotas ad triduum aceto macerato, deinde coquito, atq; vbi coctæ fuerint expressas proiicito, & affuso ad acetum melle simul coquito, deinde aloën inspergito, & coclearia tria cum aqua dato. Alcetius sophista ad hanc descriptionem addidit rutæ, & apii, semina, gerentium, vtriusque manipulum, iubens cum radicibus macerari ac coqui, Verùm aceti * sextarios sex, & mel-
 *Vet.cod. habet sextarij dimidium.
 lis lib. duas, coniicit, atque hanc laudat. Post præscripta pharmaca, Andromachus sic ait. Stomachica vt Nicostratus. Succini, mastiches chiæ puræ, iridis Illyricæ, singulorum trientem, floris rosarum sextantē. Dato aridi triti cochlearia 2. cum aqua lactosa. Statim enim dolorem leuat. Reponatur in corneo vase. Et hoc pharmacū palàm est adstringentius quodammodo esse, optatq; affectionem humidiores in humoribus non multis, neque valde mordacibus. In quibus sanè experimentum pharmaci fecisse eius autorem opinor, aut certè assiduo eius vsu ægrum à dolore leuasse, atque inde vniuersalem pronuntiationē ipsi apposuisse, quod videlicet statim ægrum dolore leuet, quum nōn possit id in multis præstare. Postremum deinceps pharmacum ab Andromacho scriptum hoc modo est. Ad stomachicos. Corticis radicis fœni-

culi drach. duas, vini cyath. 3. coquito ad tertias, vt vnus cyathus super sit, ac totum præbeto. Et hoc ex calfaciētibus est, opusque habet affectione quæ cal fieri ex optat.

Stomachica pharmaca ab Asclepiade in primo internorum conscripta. CAP. III.



Asclepiades porrò de stomachicis scripturus, de ipsis sic orditur. Ad Stomachi subuersiones. Quas verò subuersiones dicat non manifestè indicauit. Potest enim & appetitus perditionē ita appellare, potest etiā nauseolas affectiones ab accepto cibo fieres. Aliquando enim hoc vnum solū symptoma accedit accepto cibo, vt si paulo fortiori motu moueantur, statim vomāt. Appellant igitur aliqui etiam tales stomachicos, & stomachum ipsis supinū reddi aiūt. Sequitur autem hac accessio quandoq; ad solam oris ventris debilitatem, quod cibos amplecti eisq; obuolui non potest, velut tota ventris amplitudo solet. Quandoq; verò & cum vitiata alicuius, modicæ tamen humiditatis complexu. Etenim multa quæ admodum etiam valde vitiata, etiam citra cibum, nauseā efficit. Caterùm quæ à multis vulgò Supinitas stomachi appellatur, contingit quidem iuxta intemperie quamcunque tandem citra vitiatos humores. Fit
eti

etiam per humiditatem, multā quidem, non
tame malignæ qualitatis, Irriguus enim sto-
machus per largam humectationem, simili-
ter vt ligamenta neruorum laxatur. Facili-
mè itaque curabilis est hæc affectio ex o-
mnibus ferè aliis, pharmacis indigens, quæ
ficcare humiditatē, & coagmentare & con-
stringere laxatum corpus valent. Vbi igitur
per profundum fuerit extenta humidi-
tas, crassaque sit & viscosa, opus est mixtu-
ra pharmaci attenuatorii, & si ita dicere li-
beat, perrosiui quale est acetum, & acetum
mulsum. Si verò neque talis sit humiditas,
neque in altum extensa, adstringentia sola
suffecerint ad curationem. Propositum igitur
in sermone pharmacum, non moderata-
rum supinitatum, sed fortiorum est curati-
uum: esset autem & moderatarū sanatiuū,
si adstringentia sola quis misceret, aut etiā
ex calfacientibus quippiam, si frigidam esse
affectiōē sentiret. Sufficiens autē signū
est frigida affectiōis, Si æger se non sitire
percipiat. Vbi enim neq; siticulosus fuerit,
neq; ardorem senserit in ore ventris, palam
est affectiōem non calidam esse. Idonea
itaq; sunt ad huiusmodi vētris affectus, qua-
tuor pharmaca ab Asclepiade cōscripta, quæ
etiam ego nunc scribam, ipsius Asclepiadæ
& verbis & ordine seruatis. Ad stomachi

subuersiones. Nucleorum mali punici tuso-
rum succi sextarios. 3. succi mentæ sexta. r.
mellis Attici sexta. vnũ, in vas fictile conii-
cito, ac coquito assiduè agitādo, & vbi den-
sata fuerint, ab igne ablata reponito. Tem-
pore vsus dato mystrum 1. aut 2. ante cibũ.

Aliud, facit ad dysentericos, & vomētes
cibum. Radicis mali cotoneæ libr. vnā,
vini myrtei sexta. tres, coquito ad tertias,
deinde exprimito liquorem, & mellis Atti-
ci sesquilibram addito rursusque coquito,
assiduè mouendo. Dato ex reposito velut
dictum est. Confectio ex fructibus. Facit
ad stomachi subuersionem, cœliacos & dy-
sentericos. Mala cotonea nume. x. sorba
numero quinquaginta, mespila quinquagin-
ta, Rhois rubri sexta. vnum, aquæ congios
septē. Fructus tusos & in aquam coniectos
diligenter coquito, & vbi dissoluti fuerint,
liquorem exprimito ac rursus coquito, eie-
cto eo quod ex fructibus instar palarũ ex-
succum reliquum est, quum verò tertia pars
liquoris superfuerit, mellis Attici libras. 4.
addito, & ad prunas assiduè agitando co-
quito, ac spissata reponito. Vsus ostensus
est. Aliud pharmacũ, Sorborũ maturo-
rũ sexta. vnũ, baccarũ myrti nigrarũ sexta.
vnũ. Rhois syriaci sexta. vnũ, prunorũ syl-
uestriũ sexta. vnũ, mespilorũ sexta. vnum,
phœ

phœnicobalanorū Thebaicorū lib. 2. mala
 cotonea decē, mala punica integra vnā cum
 nucleis. 10. Musti aminæi sextar. 48. præpa-
 ra pro consuetudine, & expressum liquorē
 rursus diligenter coque donec spissetur.
 Vtere vt dictū est. Porro post præscriptas
 confectiones, Quintam scripsit Asclepiades
 hoc modo. Catapotia ad stomachi subuer-
 siones, Origeniæ, bona & valde probata.
 Florū rosarū drach. 8. baccarū myrti nigræ
 exacinatārū acetabulū, seminis hyoscyami
 acetabuli dimidiū. Terito simul diligēter,
 sufficiēte protropopaulatim instillato, de-
 inde his palmularū, passerū, patetos Græci
 vocāt, nu. X. carnē addito, & ex cōtritis cata-
 potia ciceris magnitudine formato, & 3. aut
 4. cū aquæ mulsæ veteris dilutæ cyath. 2.
 exhibeto. Et hoc pharmacū in iisdē affe-
 ctionibus commodū est, in quibus quatuor
 præscripta. Voluit aut̃ autor huius pharma-
 ci per seminis hyoscyami mixturā, doloris
 sedationē & somnū inducere, vnā cū resic-
 catione. Manifestū est autē refrigeratoriū
 quippiā hyoscyami semē habere, velut etiā
 papaueris semen habet, quare ad calidos af-
 fectus facit. Simile præscripto pharmacū
 deinceps proditum ab ipso est, his verbis.
 Rosarum recentīū defectis vnguibus drac.
 octo, seminis papaueris albi drach. quatuor,
 se

feminis hyoscyami drachm. 2. aloës obol. 3. asari obol. 3. Cum aqua diluta in pilulas redigito, & ceteris magnitudinem præbeto.

Septimū post prædicta pharmacū Asclepiades scripsit appposito discrimine ab accessione palàm apparente. Ait enim ardori stomachi ipsum conuenire, & propterea sitim extinguere testatur, vnde etiā ad ipsos Græci appellant, compositionem ipsius sic tradens. Ad ardorem stomachi Adipson catapotium sitim extinguens. Seminis cucumeris satiui drac. 8. feminis portulacæ drac. 8. tragacathæ drac. 4. Tragacantham ouorum crudorum recētium candido dissolue, & probe tritis aliis adde, & ex mixtis catapotia forma, eaq; in vmbra resicca, atq; vnū sub lingua tenendum præbe, ac liquorē inde solutum deuorare iube. Quin & quod postea sequitur refrigerat ac corroborat stomachum madore prægnantem, & qui humidam ac calidam affectionem habet. Scribit autem de ipso Asclepiades hæc verba.

Aliud facit ad stomachi subuersionem, maximè commodum est ardorem multum perferentibus, & qui stomacho exuruntur, Foliorum rosarū viridium drach. 6. glycyrrhizæ drach. 4. nardi Indicæ drach. 4. Excipe vino dulci aut protropo, & redige in catapotia, ex quibus vnum sub lingua tenendum

dum præbe, aut ciceris magnitudinem cum frigida aqua dissolue, & in potu exhibe. Nonum deinceps pharmacum Asclepiades scripsit, hoc modo. Ad singultū & stomachi debilitatem & cibi reiectionē. Reiectione itaq; hoc est vomitus, ex genere est Supinitatū. Quando enim os ventris fortiter afficitur, hoc autē velut dixi, ob vitiosos humores, quos venter abrūpere conatus, propter debilitatem nausæ accessionem perpetitur, atque hanc etiam tum ante acceptionē cibi, tum post ingestū cibum, ob extremā debilitatem perfert. Supinitates igitur ex vitiatis humoribus obortas, picra cōfectio quā celerrime curat, nempe vitiatos humores expurgans. Vomitus verò ob imbecillitatem grauati stomachi oborti, curātur per intemperaturæ correctionem. Nō parū sæpe contingit etiam, nō solum stomachū, sed & ventrem ob debilitatē ferre nō posse ciborū onus, atque ideo reiicere aliquādo quidem ad infernā partē, vbi illis robustior sit stomachus, aliquādo verò sursum, ob stomachi imbecillitatē, quādo sanē hic debilior fuerit infernis partibus. Hoc itaq; vomitus symptoma vnū quidē est, sequitur autē ad affectiones multas diuersam medelā exigentes. Similiter & singultus, stomacho interdū ob frigiditatē aut repletionē accedit,

dit, interdū ob mordacitatē humorū acriū
& medicamentaria qualitate præditorum.

Impossibile itaque est pharmacū inuenire
omnibus dictis affectionibus aptū. Cete-
rū quæ deinceps scripsit Asclepiades duo
pharmaca, ostensa sunt substantiam habere
multum ab humana natura diuersam, quæ
ipsa maximè omnīū inter reliquas corporis
partes stomachus nō fert, ob excellentiam
sensus qua præditus existit. Magnopere
igitur affligitur stomachus etiā ubi ex sto-
maticis pharmacis quippiā in ipsum fuerit
præterlapsus, maximè quæ atramentū su-
torium, aut tale quid in se habent, Quod
enim ex fructibus cōstat, ex comestili mate-
ria cōpositum est. Verū atramentū suto-
rium contrariæ penitus homini naturæ est.
Quemadmodum etiam mandragoras. Fu-
gienda itaque sunt hæc duo pharmaca ex
chrysobalano & radicis mandragoræ cor-
tice cōposita. Apponam tamen etiā ipso-
rum cōpositionem. Et prioris quidem de-
scriptio hæc est. Chrysobalani lib. i. ma-
stichis chiæ libræ dimidiū. corticis radicis
mandragoræ quadranteū. Tusa & cribrata
excipe mentæ succo, & redige in catapotia.
Da inde obol. 3. cum aquæ frigida cyathis
tribus. Posterioris autē descriptio hæc est.
Mastiches chiæ lib. * vnā, corticis radicis
man

* Traga-
canthæ al-
be lib. i.
habeant
cod. vet.

mandragoræ sextantē. tusa & cribrata re-
 ponito. Vsu exigente dato cochleariū in-
 fersum aquæ frigidæ cyatho vni. Post
 præscriptas cōfectiones, Asclepiades sic scri-
 psit. Ad voluulosas stomachi subuersiones.
 Cōiectarit quispiā ipsum voluulosas appel-
 lare fortes, quemadmodū enim in voluulis
 subuersiones fiunt cum magna contentione
 & violentia, adeò vt stercus etiā reuomant:
 Sic etiā alios vomitus concitato, quis ap-
 pellare voluulosos possit. Sequuntur autem
 huiusmodi vomitus, vbi affectæ partes à
 medicatis serosis humoribus magnopere
 fuerint afflictæ: si verò etiam imbecilliores
 fuerint, duplicatur malū. Erit itaque ob id
 curationis scopus, vt simul ad affectas par-
 tes odoratas qualitates imponamus, quales
 aromatū sunt, & quorundā seminū in cibo-
 rum vsum venientiū, velut est anisum, apiū,
 daucus, cuminū & fesceli. Iuxta hāc itaque
 rationē Hippocrates in pleuriticis purga-
 tiuū exhibēs medicamentū, misceri aliquid
 ex his iussit, sic scribens. Si verò sub septo
 trāuerso sit dolor, & ad clauiculā nō se ex-
 tendat, mollire ventrē oportet veratro ni-
 gro, aut peplio, ad veratrū quidem dauco,
 aut fesclide, aut cumino, aut aniso, aut alio
 quopiam odorato addito. Apparet enim
 quod in his miscēdis maximè odorē ipsorū
 respi

respiciat, quo medicamentariam vim, quæ hominis naturæ cōtraria est, mitiget & obtundat. Quemadmodum enim graueolentia omnia stomachū subuere solent, sic odorata corroborare. Si verò ultra hoc etiam in ciborum vsum veniant, multipliciter auxiliantur stomacho ob vitiatos serosos humores subuerso. Atq; iuxta hanc ratiocinationē autor propositi pharmaci anisum & apium ammiscuit: absinthium verò propterea quod à natura vim habet extergendi, ac repurgandi, & subducendi vitiatos stomachi humores, ampliusq; densat & constringit ac robur addit parti affectæ. Cinamomum autem addidit, vt quod omnibus fœtidis & putredinosi serosis humoribus se opponat, iuxta vtramque facultatē suam, alteratiuam & discussoriam. Nō paruum enim ex odore suo exhibet vtilitatem omnibus malis affectionibus. Opii verò parū pharmaco immiscuit, sensum stomachi hebetare volēs, qua ratione etiam coeliacis ipsum damus, vt quod profundū quēdā soporē inducere possit. Quo verò vehemētē opii frigiditatē cōpositor ipse corrigeret, castoriū ipsi adiecit oppositū fermē ipsi in facultate. Eadē ratione etiā piper ammixtū est. De myrrha verò operæ pretiū est scire quod in quantū facultas ipsius est cōcoctoria

ria

ria humorum præter naturã & vitiosorum, in tantũ cõuenienter ammiscetur. In quantum autẽ medicinalia est, nõ cõuenienter. Verũ paucitas eius ad concoctionem quippiam cõfert, qualitatis autem peregrinitas non apparet, vt pote victa ab odoratis. Ego itaque hoc pharmacum etiam sine myrrha præparare cõsueui, ad securitatem perducere semper tentans vsum omnium pharmacorum, præsertim vbi in acuta febrile quid exhibetur. Quum igitur cinamomum habeat hoc pharmacum, & semina calida vrinam cientia, ac piper, & præterea castorium ac apium, meritò multis affectionibus cõmodum est, quãdoq; cum vino stomacho grato datum, quale protropum est, quandoq; cum myrti baccharũ decocto, velut in dysentericis, aut cũ aceto mulso, velut in splenicis. In cholera verò & bilis vomitu ac effluxu, cum frigida, velut Asclepiades scripsit, sed addito discrimine, si siticulosior est nunc quã antea, aut nausæ calidæ sensus circa os ventris ipsi cõtingat, aut frigidam bibere sanus consuevit. Ego sanè hoc medicamentũ ad securiorẽ vsum perduxi, myrrhamq; dimisi, & piperis quantitatem auxi. Quum verò plurimũ cinamomum accipiat, necessariũ nobis est vbi cinamomo caremus, cassiã optimã coniciamus,

T

aut plus quàm duplo cinamomi pondere,
aut omnino non minus. Cæterùm cōmen-
suratio ac apponderatio pharmacorū quæ
ipsum constituunt, ab Asclepiade his verbis
proditur. Ad voluulosas stomachi sub-
uersiones pastillus Amazonum. Facit ad in-
fiatos, ardorem stomachi, & vomentes ci-
bum. Facit & ad internas affectiones. Se-
minis apii drach. 6. anisi drach. 6. absinthii
drach. 4. piperis drach. 2. myrrhæ drach. 2.
cinamomi drachm. 6. opii drach. 2. castorii
drac. 2. Cum aqua pastillos formato, & sum-
mum drach. 1. dato, stomachicis cū protro-
pi diluti cyathis tribus, cholericis & vomē-
tibus cibum cum frigida. Cœliacis & dy-
sentericis cum baccarū myrti decocto, sple-
niticis cum aceti mulsi cyathis 3. Aliud
pharmacum deinceps scripsit Asclepiades,
non solum ad voluulosas stomachi sub-
uersiones ipsum conuenire promittens, sed
& ad intensos singultus, & stomachicos qui
ardorem, hoc est, multam caliditatē perci-
piunt. Dictum autē iam sæpe à me est, Im-
possibile esse inuenire pharmacum ad mul-
tas affectiones optimum, Inuenitur enim in
vnaquaque ipsarū id quod propriè ipsis de-
stinatum est præstātius esse. Verùm his qui
vnum pharmacū ad multos affectus habere
volunt, etiam horū præparatio ac compo-
sitiō

tio utilis existit. Continetur tamen ambiguitas quædam in huiusmodi pharmacorū promissionibus, qualē Asclepiades nunc de proposito pharmaco fecit. Putabunt enim fortassis aliqui ex ignaris, tum singulorum trium symptomatū curationem promitti, tum duorū simul coincidentiū, aut omniū simul. Velut quum lancinatur vehementer nauseans æger, & singultit, & multæ anxietatis caliditatis sensum circa stomachum percipit. Et de tali sanè affectione primò dicā in qua tria hæc mala simul hominē infestāt, nimirum ardoris sensus, & singultus, & affectio voluulosa. Hippocrates quidē igitur conuulsionē fieri dixi ex repletionē & euacuationē, & additum est ad aphorismū fermè in omnibus exemplaribus, Sic autem & singultus. Ego verò in conuulsionē tertiam aliquā causam supra euacuationē & repletionem nondū reperi. Singultū etiā sine his fieri video, acris humoribus, aut serosis & medicatis stomachum mordentibus, quos ubi vomitu reiecerint statim singultu liberātur. Quin & multi deuorato pharmaco ex tribus piperis generibus cōstāte, si statim vinū insuper bibāt, omnino singultiūt, ex quorū numero etiā ego sum. Amplius autem & cibo in mordacē qualitātē corrupto, aliqui singultiunt, & quod à vomitu statim

liberatur omnibus notum est. Quidam etiam ex rigore oris ventris singultiunt. Verum pueros maximè frequenter singultire contingit, tum ob corruptionem alimentum in ventre, tum ob partis frigiditatem. An verò & ob nimiam euacuationem fiat singultus, veluti etiam conuulsio, dignum consideratione est. Verum si in præsens hac consideratione relicta, eos qui ob frigiditatem, aut ciborum copiam, aut mordacem acridinem grauantur, intueamur, vomitum reperiemus sufficientem medelam eorum qui ob copiam aut morsum singultiunt, caliditatem verò eorum qui ob frigiditatem. Alio autem modo reperiemus etiam sensus stupefactionem per refrigerantia, & permutationem ac discussionem mordacium per attenuantia & resiccantia. Componitur autem ex huiusmodi ipsum pharmacum. Opium enim & rosæ, & psyllii succus, ex refrigerantibus sunt, Spica nardi verò & chrysobalanos ex discutientibus & corroborantibus. Asarum autem per urinam deducit vitiosos humores. Aloë verò vitiatos humores expurgat & infernè per ventrem euacuat. Crocus autem concoquit & roborat partes, per temperamentum quidem caliditatis concoctionem efficiens, per adstringendi verò vim, quæ ipsi adest, robur addens. Costus autem sufficienter calfacit,
mode

moderatè verò adstringit, quod & ex gustu eius percipitur. Ex his porro cōpositum pharmacum aptū est singultientibus aptū est & his qui ad vomendum lancinantur, & qui circa præcedens pharmacum dicti sunt, verū nō similiter vt illud, aliquid ex odoratis habet, aut cinamomum. Refrigeratiū autem in ipso mixtura stupefacere sensum potens, mitigando molestiā ex mordacitate serosorum & aliorū etiā humorū obortam, vere aptum pharmacum efficit, ad nauseosæ affectionis imminutionem. Quandoquidem verò etiam ad stomachi ardorē cōuenire pharmacum dixit, Repugnet autem huic sermoni calefaciēs Costus, operæpretium fuerit & de eo dicere. Quemadmodum in antidotis colicis appellatis, & à quibusdam, dolorum sedatoris, qualis est Philonis antidotus, Scopus componendi pharmacum est stupefacere sensum dolentium. Quo verò non cum magno detrimento id fiat, & vt per altum dolentiū corporum frigiditas citò penetret, calfacientia miscetur, quæ refrigerantium stupefactionē deducere possunt, quum illa ipsa per se tardi transitus existant. Hæc igitur vbi quis inaudiuerit, quantitatem consideret simplicium pharmacorum quæ in compositiones miscentur. Ex hac enim sciet num magis, an minus

efficere possit compositum pharmacum ea quæ promittit. Si namq; refrigerantia plura apparuerint, sensum affectorū magis obtundit, & quantum caloris in ipsa particula fuerit etiā hunc extinguit. Vbi verò calfacientia fuerint aucta, minus quidem hæc efficiet ipsum pharmacum, innocentius autē reddetur. Nosse enim oportet, corpora viventium mortificationi simile quippiam perpeti, ab omniū ex opio, & hyoscyamo, & mandragora compositorū pharmacorum usu, nimirum causis dolorem infligentibus insensibilibus factis, & multi sanè qui assiduè talia accipiunt, ad immedicabilem frigiditatem particulas perducunt. Quemadmodū autē in refrigerantium & calfacientium oppositio-
ne, utrorumq; quantitas ostendit prædominantem pharmaci actionem, Eodem modo etiam in aliis considerationē facere oportet: velut densantibus & rarefacientibus, coagulantibus & diffundentibus odoratis & graueolentibus, humectantibus & siccantibus, discutientibus & cohibentibus. Itaq; ubi subscripsero his mixtorum in compositione quantitatem, ad coherentia transibo. Scripsit autem ipsam Asclepiades in hæc verba. Stomachicis, ardorē sentientibus, & ad intensos singultus, & voluulosas stomachi affectiones. Costi drach. quatuor,
spi

spicæ nardi drach. quatuor, chrysobalanorum drach. quatuor, rosarum viridiū drachmas quatuor, mastiches drac. 4. aloës drachmas duas, asari drach. 2. opii drach. 1. excipe succo psyllii, & reduc ad pastillorum formam, exhibe obolos. 3. Liquor sit affectioni conueniens. Post præscripta pharmaca, Antidotum Hierā iam antea in Andromachi pharmacis conscriptā, ex aloë & cinamomo compositā, etiam ipse tradidit nō iuxta eandem cōmensurationem & symmetriam. Habent autem verba eius in hunc modum.

Antidotus Hiera, hoc est, Sacra, Themisonis. Ad stomachi subuersiones. Facit & ad sentientes ardorem, & omnem inflationem, tardam concoctionem & affectiones vteri. Probè cit vrinam, & omnino admiranda confectio est hydropicis, hepaticis & nephriticis. Deducit & fœminis menses. Aloës drachmas. 100. mastiches vnc. vnam, croci vnc. vnam, nardi Indicæ vnc. vnam, cinamomi vnc. vnam, carpobalsami vnc. vnam, asari vnc. vnam, tundito & angustissimo cribro excernito atque aridum vt ne transpiret seruato. Vfus eius est ad tardè concoquentes, atque ita sanos drachmam vnam, cū frigida cyathis quatuor, Vomentibus bilem, aut alias fluxione laborantibus drachmæ dimidiū. Ad

inflammationes internas conuenit cum aqua mulsa. Verum quibus urinam ciere volumus, aut menses deducere, pharmacum cum vino damus. Est autem medicamentum inspersile in pulueris ac farinae formam redactum. Hæc quidem scripsit Asclepiades de prædicto pharmaco. Videamus autem primum in his de quantitate pharmacorum ipsum constituendum quatenus consensit, & dissentit cum Andromacho. Deinde consequenter de promissione & usu. Equidem in mixtura pharmacorum consenserunt inter se Andromachus & Asclepiades, in hoc quod aloës drac. 100. coniiciunt. Dissentiunt autem in eo quod Asclepiades simpliciter aloës scripsit, Andromachus autem lotæ apposuit, & quod Asclepiades reliquorum singulorum singulas uncias ammiscuit, hoc est drachmas argenteas. 8. aut septem & dimidiam. Andromachus verò sex. Amplius etiam in eo quod Asclepiades carpobalsamum. Andromachus xylobalsamum iniicit, & præterea quod Asclepiades florem iunci odorati penitus relinquit. Cæterum circa promissionem operum Andromachus nihil amplius scripsit, quam quibusdam vnum cochlearium, quibusdam duo, cum aquæ frigidaë aut calidaë cyathis. 3. exhibere, Verum Asclepiades plura de usu propositæ antidoti

doti prodidit. Ad tardas enim concoctio-
 nes sanorum drachmam vnam dari iubet,
 cum aquæ frigida cyathos. 4. Opinor au-
 tem ipsum dicere drachmam argenteam,
 etenim sic ferè omnes recentiores medici ap-
 pellare in more habent: neque ipsa rei na-
 tura aliud nos intelligere cogit. Manifestū
 est autem quod drachmam dicimus nunc in
 huiusmodi omnes, quod Romani Denariū
 appellant. Verū non omnibus tardè con-
 coquētibz expedit præbere hoc pharmacū,
 sed his solum quibus ob vitiosos humores
 tarda concoctio cōtingit, & maximè quum
 tenues fuerint & biliosi, fecerit & quietem
 in his quibus citra vitiatos humores, humi-
 da intemperies intantum affectam partem
 perrigauit, vt exoluatur & laxetur ad mo-
 dum ligamentorū neruorum circa laxatos
 articulos. At verò qui bilem in ventre ha-
 bent, quæ præsertim ipsis in tunicis in alto
 continetur, præstantius pharmacum nō re-
 pererint. Verū haud scio qua ratione pa-
 rum de ipso exhibeat Asclepiades, quū mo-
 derata exhibitio ipsius ad * drach. 6. pro-
 grediatur. Porro ad inflammationē ha-
 bentes non simpliciter in omni inflamma-
 tionis tempore dandum est, sed vbi conco-
 cta fuerit & declinarit. Concocta enim me-
 dicanda rectè censet Hippocrates, non cru-

* Omnes
 vetu. cod.
 habet hic
 drach. 4.

T 5

da, neque in principiis, nisi sua sponte cōcitata id expetant, hoc est, nisi motus ad excretionem nos adducat, qui nondū firmam aliquam inclinationē ac stationem ad vnam partem habeat. Rectē autē hoc pharmacum tardē cōcoquentibus, aut bilē vomentibus, aut alias stomachi fluxione laborantibus, aquæ cyathis. 4. inspergens præbet, nimirū subuersionem stomacho ex melle oborientem formidans. Ad declinationē autē internarum inflammationū cū aqua mulsa tempestiuē quis exhibuerit. Quemadmodum etiam vrinā ciere volens, aut mēses euacuare, Asclepiades quidem ex vino dandū ait: præstiterit autem, vt ego sentio, cum vino mulso pharmacum præberi. Ita enim simul & quæ circa distributionē & delationem ex ventre in vrinam, & quæ circa vterū instāt, secat ac dissoluit, & robur partibus addit per quas transitum facit. Ampliusq; & locorum per quos fertur caliditatem auget, quæ & ipsa non parum confert ad instantes humores fundendos ac euacuandos. Post præscriptam sacram Themisonis Antidorum, Asclepiades sic scripsit. Alia ex Mantix compositionibus Attalica. Facit ad stomachicos & reiicientes cibum, cholericos, cœliacos, dysentericos. Compositio sic habet. Croci drach. duas, nardi drach. 2. seminis

nis hyoscyami drach. i. aloës vnc. i. balau-
 stii vnc. i. tragacanthæ vnc. i. piperis albi
 vnc. i. acaciæ vnc. i. Rhei pontici vnc. i.
 Rhœis syriaciculinarii vnc. i. Excipe succo
 rosarum in vino austero coctarum, & redi-
 ge in pastillos drachmæ vnius. Tragacan-
 tham verò succo præmaceratâ vnito. Hoc
 pharmacum nihil priori simile habet. Illud
 enim purgatorium est, hoc adstringens, his
 qui stomachum aut totû ventrem ob mul-
 tam humiditatem exolutum ac laxû habent
 conueniens: quemadmodû etiam in articu-
 lis eiusmodi laxitates contingunt, ligamen-
 tis ipsorum multa humiditate perrigatis,
 quæ plurimi Medici nervos ligatorios ap-
 pellare solent. Multæ enim eiusmodi affe-
 ctiones tum in ventre, tum in stomacho,
 sunt his qui multo potu se explent, aut fru-
 ctus humectantes, aut etiâ edulia talis tem-
 peramenti ingerunt. Quum itaq; multi sint
 qui tali victu vtantur, rationabiliter etiam
 prædictæ facultatis pharmaca sæpe succes-
 su clara euadunt, vt quæ prædominantem
 adstringendi vim habeant. Vbi verò aut
 vitiatos humores euacuare, aut affectû par-
 ticulam calfacere oportet, nõ solû nihil iu-
 uat ita adstringentiû pharmacorû vsus, sed
 etiâ nocet. Post præscriptû medicamentum,
 aliorum duorum Asclepiades meminit, quæ
 & ipsa

& ipsa ambo bona sunt, & ex multis composita, ac propterea multi ad varios affectus vsus, & præsertim posterius. Quod verò tale sit quale ipsum esse dicit, etiam nobis ipsis facile erit iudicare, vbi in memoriã reuocarimus simplicia in ipso pharmaca, qualia singula sint, ampliusq; methodum cõpositionis eius audiuerimus. Aster stomachicus. Facit ad eos quibus cibus in ventre acescit, ad tormina, destillationes, dolorem capitis, spuẽtes sanguinem, tabescẽtes, affectiones circa vesicam & vterum. Præparatur sic. Succi mandragoræ drach. 4. myrrhæ drach. 4. balaustii drach. 4. castorii drach. 4. croci drach. 4. opii drachm. 6. anisi drach. 8. seminis apii drach. 8. styracis drachmas. 8. hyssopi cretici drachm. 12. seminis hyoscyami albi drach. 12. Composito promore & digerito in pastillos, Dato pro viribus. Liquor sit affectioni conueniens.

Aster inexuperabilis, pharmacum accommodatum, sedans dolorẽ, inducens somnũ, multi vsus ad varios affectus. Nam & stomachi morbos mirabiliter sanat, à ructibus acidis, ægris concoctionibus, torminibus, voluulis, inflationibus. Facit & ad capitis dolores potatum, & foris illitum fronti aceto dilutum. Facit & ad oculorũ dolorẽ pastillus perdicii succo dilutus. Facit & ad-

den

dentium dolorē cauernæ inditus, tritus ac galbano exceptus, aut fici succo. Prodest ad influxus oculorum, & consillarū inflammationes, vino dulci dilutus, Ita vt ad oculos lanam eo imbutā imponamus, In consillis verò affectis tepesactum colluamus. Facit ad omnem sanguinis fluxum vino myrrite dissolutus, & ad veteres ac recentes tusses & destillationes dilutus vino Theræo, aut protropo, aut scybelite. Facit phthificis, suppuratis, marrubii succo dissolutus. Hæmoptoicis, dysentericis, cholericis, sanguinariæ succo dilutus, & ad omnis reptilis plagam cū rutæ decocto potatus. Soluit irritationes per circuitum repentes, duabus ante eius inuasionem horis, ex vini diluti cyathis. 3. acceptus. Menses etiā fœminarum ducit artemisiæ decocto dilutus. Facit & ad vesicæ affectiones vino mulso dissolutus. Similiter etiā his quæ ab vtero suffocantur auxiliatur. Facit arthriticis, podagricis, gentianæ decocto dilutus. Et de his quidem quæ efficit hætenus. Compositio verò hoc modo habet. Myrrhæ drachmas. 4. styracis drach. 4. nardi Indicæ drachmas. 4. casia fistulæ drach. 4. terræ lemnia quæ sphragis, hoc est, sigillum appellatur drach. 4. corticis mandragoræ drach. 4. In alio exemplari etiam piperis drach. 4. croci drach

drach. 6. succi papaueris drach. 6. seminis
 dauci cretici drach. 8. anisi drach. 8. fœselis
 maffiliensis drach. 8. seminis apii drach. 8.
 Myrrha & styrax, atque opiũ vino dissol-
 uuntur odorato & terũtur. Arida verò tun-
 duntur & cribrãtur, ac deinde simul miscẽ-
 tur, subiguntur, ac in pastillos cogũtur pon-
 deris drach. dimidiæ, & in vmbra resiccan-
 tur. Vſus ostensus est. In aliis exemplaribus
 pastillorum pondus drachmale proditur.

*Que Archigenes in primo pharmacorũ secun-
 dum genus prodidit, De affectionibus cir-
 ca stomachum. CAP. IIII.*



Vum multæ & variæ sint circa
 stomachũ affectiones, atque hæ
 omnes ferè in totũ ex crudita-
 te oboriantur, hoc totis viribus
 considerandũ est, & si quidem per aquarum
 aut aëris malignitatẽ lædantur: quod ma-
 ximè possibile est fieri, ea variando ac per-
 mutando hominẽ liberabimus. Si verò per
 inconſuetos cibos læſio fiat, eis interdice-
 mus. Si verò ob copiam, cibos cõtrahemus.
 Et in vniuerſum ex quacunque cauſa ſuſpi-
 cati fuerimus fieri læſionẽ, eam prohibebi-
 mus. Quod ſi quis ſibi ab omnibus his
 bono ordine caueat, & iuxta ipſum ſtoma-
 chum tamen cõcoctio impediatur, vñctio-
 nibus

nibus & exercitiis, vociferationibusque & aliis huiusmodi per expertum artificem adhibitis stomachus corroboretur. Verum ructu acido affectis coriandrum cochlearii mensura ante reliquum cibum edendum dato, & merum insuper bibendum. Quod si quandoque moderata cruditas & quæ contemni possit oboriatur, longiore tempore in lecto decumbendum est, & si negotia id non permittant, quanto possibile est, omnis distentio, ac labor, ampliusque æstus ac ira vitanda sunt. Serius etiam quam pro consueto tempore ex feruida aqua laundum est, & in priore balnei domo aqua tepida hausta, omnia in stomachum coacervata pituitosa reuomenda, & modico cibo itemque potu prima die vtendum. Si verò fortis ciborum corruptio fiat, stomachique morsum sentiant, ac ipsos eructent, ampliusque nausea afficiantur, aqua tepida exhibita vomere cogito, donec omne corruptum expurgetur, deinde caput molibus linteolis ad ignem calfactis irrigato, aut huiusmodi aliquo non inani ductu locos circa stomachum foueto; & præcordia mitigato, summas item partes pingui frictione aut etiam cōstrictione lenito, atque ita in lectulo quiescere finito, ac in ediam per totam sequentem diem perferre. Nisi
absur

absurdum quid inde consequatur, & satis firmi sint, lauādo eos, vt prædictum est, curato. Infirmiores verò moderatè ad diem vnam refectos, in sequentem lauato, moderatis cibis ac potibus ad triduum vti iussos. Et cruditatis quidem talis quædā (vt rudi quædā forma expressi) curatio existit. Verum de his quæ ex ipsa proueniunt, velut profluuiū ventris, aut bilis per vomitum ac secessum reiectione, aut aliis eiusmodi, in proprio loco dicetur. Cæterum in aliis stomachi molestiis, his quidem qui stomacho exoriuntur, cum exolutione aut animi deliquio, aut appetentia perditā, ex qualicunq; tandem causa, præter febrē, cyath. 3. aut. 4. aquæ frigidæ absorbendos dato, bis aut ter per interualla: & si quidem inde mitius habeant, ipsos reuocatos tum cibo, tum etiam aliis refocillare tentabis: si verò permaneat malum, ligatis & * constrictis extremitatibus, eiusmodi quendam cremorem assiduè absorbendum dato, velut palmularum, malorum cotoneorum, pisorum, mespilorum, baccarum iuniperi, pampinorū vitis, rosarū, Mali item punici nucleum non habētis succum, aut nuces pineas. 20. & seminis cucumeris grana. 25. baccas myrti. 20. croci obolum dimidium, & rosarum duarum folia, ex aqua bibenda exhibeto. Aut aquā frigidam cum

* Alias cal
factis.

cum omphacii succo præbeto. Aut florem
 rosarū cum nardo & aqua frigida, aut etiā
 portulacæ semen ammisceto, aut atriplicis
 semen, aut malorū cotoneorū decoctum.
 Aut cucumerū satiuorum semina quinquaginta trita, ex frigida præbe. Aut oryzā
 coctam cum butyro edendam exhibe. Aut
 tragoriganum tritam & exsuccatā cū aqua
 edendam præbe. Aut fabas Aegyptias decē,
 & nardi celticæ obol. 2. vtraque tosta & tri-
 ta bibenda exhibe, cum mali punici acidi ac
 dulcis succo & aqua, pari vtriusq; mensura.
 Aut mentæ ramulum contritum bibendum
 dato. Aut cœnanthen similiter tritam cum
 nardo Indica bibendum dato. Aut lentes
 coctos tritos ex aqua præbeto. Aut phœ-
 nicobalanos cum rosis. Aut marrubii suc-
 cum cum melle, & vbi paululum quieuerint
 vinū cum polenta exhibeto. Aut cardamo-
 mi drac. 1. cum aceti multū cyathis tribus po-
 tandā dato ac quiescere finito. Porro his
 qui saliuam multam in stomacho aggrega-
 runt aridam conyzam manducandam dato.
 Forinsecus verò stomacho imponentur vi-
 tis folia viridia trita, aut mala cotonea, aut
 palmulæ, aut mespila cum cerato, aut myrti
 folia tenera vel rubi, vel lentisci, trita cum
 polentæ flore frigida subacta, aut portula-
 ca viridis similiter præparata, aut caseus re-

cens mollis cum polēta & apii foliis, aut feridis folia cum aceto & polenta ac apii foliis. Si verò multum sint æstuoſi, veſicam aqua expletam imposito. Aut niuem ſuperdato, aut cucurbitarum ramenta imposito, & omnino omnia quibus in cardiacis vtimur. Dolores autem ſtomachi lenit, & maximè his quibus triſtitia aut deſperatio accedunt, lac aſininum, aut muliebre, aut bubulum, ſilicibus incoctis potatum. Aut vngentum nardinū vel aliquod pretioſum dato ex aqua. Aut decoctū floris iunci odorati, roſarū flore ſimul inſperſo. Aut portulacæ ſuccum quandoque per ſe, quādoq; cum nardo. Aut oui vitellum toſtum & in farinam comminutum, cum polenta bibendum dato. Aut amaras nuces cum cucumeris ſemine & nuce pinea. Aut rumicis ſylueſtris ſeminis obol. tres, bibendos præbet. Omnes verò circa ſtomachum dolores & diſplicentias ac moleſtias ſedari aiunt, cochlea aſſyrica cruda integra vorata. Exoluto autem ſolum & nauſeabūdo factō ſtomacho, lactucæ albæ ſemen modicum, ex aqua cyathis quatuor aut vno bibendū dato. Aut paſſerum ſtercus aridū velut polentā, ſiue aquā biberint, ſiue vinū, inſpergito. Aut maſtiche chix cochlearium ex aqua frigida dato. Aut glaciē ieiunis quoti-

die

die exhibeto, vt ea assiduè manducata saliuam expuant. Aut conyzam aridā manducant. Si verò vnā cum humectatione etiam inflammatio aliqua adsit, cœnanthen cum meliloto, aut rosam siccam cum cerato rosaceo parum resinæ vstæ habente impone. Aut acaciæ & aluminis melii pares partes dupla cerati proportionē excipe, & vt malagma impone. Cæterum quibus bilē atram generantibus stomachus inflatur, spongiâ aceto acerrimo calido imbutâ ad stomachum imposito, atque hoc maximè tempore distentionum, & si postea etiamnum perseverarint, alumen liquidum cum atramento sutorio trito melle exceptum imposito. Aut hæc & aloë pari portione mista & cerato myrteo excepta imposito. Aut hederæ foliis vino coctis pro cataplasmate vtitor. Aut plantaginis cum sale tritis. Aut armentariæ bouis stercus aridum vino coctum, aut marrubiū cū pane & rosaceo subactū, aut bulbos rufos & alumen pari portione imposito. Post hæc antidotus apyretos appellata, aut hiera, aut alia quæpiam, quæ cuique per experientiam cognita est, in potu exhibenda est. Incibo stomachicis conueniunt, beta, lens, tragus, oryza, alica, malis cotoneis, aut palmulis, aut mespilis, aut mali punici nucleo

carentis granis, aut melapiis simul incoctis, aut teneris lentisci, aut myrti, aut rubi ramulis ammistis. Panis sit summe tantum fermentatus, aut penitus absque fermento, praparatus. Ex olerib. conueniunt cruda, cichorium, meconides lactuca, eryngiū, intubus, gingidiū, seris, lactuca. Cocta maxime comoda est brassica & sisarū. Ex reliquis autē coctis conueniunt cochleæ & bulbi. Ex carnib. venter, rostra, pedes, turdi, perdices, attagenæ, turtures, palūbes, anates, lepores, dorcades. Ex piscib. squillæ, gammari, natatrices siue colymbenæ, locustæ, loligines, sepia, ex his qui duras carnes habent nulli. Ex testaceis maxime buccina, purpuræ, pettines, glauci, cerri, glandes, siue balani. Verum Sisarum à reliquis omnibus acceptum, ut stomacho gratum, & refectiōi commodum, ad plerasq; omnes stomachi accessiones conueniens est. In potu prodest vinum quod vnusquisque libenter bibit. At verò his qui inflantur & stomacho distenduntur, polii fasciculum coquito & bibendū dato, aut calaminthæ decoctum per noctem sub dio expositū, modico melle, & piperis drac. vnā, ammixtis, bibendum præbeto, aut spōgiam acerrimo aceto imbutam pedibus ac brachiis imposito vsq; quo bullæ excitentur, maxime si cibos reiecent. Aut fœni graci
fari

farinā aceto subactam, aut sinapi tritū cum aceto, vsquequo rubefiat locus. Aut psylliū aceto & aqua maceratū & in mortario tusum, pari portione carniū cochlearū ammixta, in malagmatis forma imposito. Quæ stomachicis dolorem eximant. Cuminum tostum & apium, vtrūque modica portione cum aqua bibendū præbe. Aut aloës obol. 2. cum vino mulso, aut vino, aut aqua bibendos dato. Aut abrotoni & thymi vtriusque obol. 2. ex vino præbe bibendos. Ligaturas insuper extremarum partiū fortiter adhibe, & circa ipsum stomachum cucurbitulis & fomentis variis vtere. Quod si vehementer valida sit distentio, etiam venæ sectio efficax auxiliū erit, & alui solutio per supposititiā glandem. Deinceps post præscripta Archigenes de fame ingēti, bulimo Græcis appellata, itemq; de singultu prodit quæ sequuntur. Porro eos qui ex ingenti fame in viis aut alio quopiam modo animo linquntur, reuocabimus odoramentis aceti, aut pulegii, aut quæ fortè obtingit terra aceto macerata, aut malis, aut piris, aut aliis similibus fructibus, qui ad manū sunt. Panē insuper odorandū dabimus, & ingerere cogemus. Ad hæc enim singula cōfestim excitantur, & præterea ad suillam carnem assatam ac coctam, & in vniuersum ad omne


quod multū alit, & præsertim ea quæ odorem nidorosum ac probè cōditum habent. Per huiusmodi enim odores vt plurimum tales reuocātur. Nihilominus tamen etiam extremæ partes ipsorū constringēdæ sunt, ipsiq; excitandi tū maxillarū punctura, tum capillorū ac aurium distentione. Refocillabis porrò ab exolutione & deliquio animi, panem in vino diluto, aut etiam aliud quippiā ex his quæ acervatim reficere vires possunt, exhibēdo: velut sunt oua sorbilia, bulbi, cochleæ. Erenim singula hæc stomachi humiditatem eximunt, & in modica mole multā vim complexa cumulativè corroborant. Singulisque autem rutā cū vino dato, aut nitrū in aqua mulsæ, aut opium, aut castorū, aut abrotonum, aut aristolochiam, aut daucum creticum, aut cuminū, aut anisum, aut zingiberis radicem, aut scillam cum aceto & oleo, aut tordilion, aut dictamnū, aut calaminthen, aut acorum, asarū item & nardum celticam, & pulegium, singula tum per se, tum simul mixta.

*Pharmacum nostrum ex succo malorum
cotoneorum constans.*

Magnæ equidem oris vëtris affectiones à prædictis pharmacis curantur. Moderatas verò omnes ferè, præter eas quæ ex vehemēti ardore fiunt, subscriptū
med

medicamentum iuuat. Succimalorum cotoneorum sext. 2. mellis Attici sextarios 2. aceti sesquisextarium. Si verò multum acre fuerit sextarium vnũ. Zingiberis quadrantem, piperis albi * vnci. i. Arida insperges, * *Vet. cod. vbi malorum succus cum melle & aceto co habet virtus ad lentum ignem, Attici mellis crassius dicitur.* tudinẽm acceperit. Aliud ex malorum cotoneorum carne constans. Malorum cotoneorum carnis libras tres, mellis libras tres, aceti albi lib. tres, piperis quadrantem, zingiberis quadrantem, petroselini Macedonici vnciam vnã.

De pharmacis quæ forinsecus ori ventris imponuntur. CAPVT V.



Mocant quidem plurimi medici haud scio quare, velut Asclepiades & Andromachus, omnia pharmaca quæ forinsecus imponuntur, siue adstringendo condensent, siue indurent, Malagmata, quæ vox emollitionis significationem habet. Verum nos permittemus ipsis etiam si non propriè appellent. Quæ autem conscripserunt ad stomachi affectiones commoda pharmaca, per experientiam non illorum solum, sed etiam nostram approbata, ea nunc adscribemus, ab his quæ Asclepiades prodidit initio facto.

Quæpharmaca Asclepiades ad stomachi affectiones in quarto externorum tradidit, quæ Marcelle inscribit.

EVeni ad stomachi subuersiones, doloresq; facit partim etiam ad inflammationes. Oenantes drach. 8. croci. * drach. 2. drach. 4. rosarum siccarum drach. 4. meliloti drach. 4. mastiches drachm. 4. ramentorum succini drach. 4. carnis phœnicobalanorū quadrantem. Vini myrtei quod satis est. Arida tundito & per angustissimum cribrum concernito, & cum vino myrteo diluito, ut cerati spissioris crassitudinem accipiant, his carnē phœnicobalanorum addito, & conquassata cerato ex rosaceo apparato excipito, & linteolo infarta ori ventris imposito. Facit & ad oculos inflammatos. Aliud Oenāthes drach. sex, croci drach. 4. myrrhæ drach. 4. floris rosarum drach. quatuor, meliloti, mastiches, utriusque drach. 4. aloës drach. quatuor, corticis mandragoræ drach. quatuor. Carnis palmularum quadrantem. Excipe cerato ex rosaceo apparato. Asclepiadæ qui philophysicus dictus est, hoc est naturę studiosus, ad stomachi subuersiones, facit & cœliacis & dysentericis. Seminis hyoscyami drach. quatuor, seminis apii drach. quatuor, floris rosarum drachm. 2. seminis anisi drach. duas, succi hypocythidis drach. duas, myr

myrrhae drachm. 2. croci sesquidrachmam,
 opii sesquidrachmam. Arida tundito & per
 augustissimum cribrum excernito. Hypo-
 cystidem verò & myrrham, & papaveris suc-
 cum, vino myrteo dissoluta aridis adicito,
 & pastillos formato, eosque in umbra resic-
 cato. Vñus tempore quantum opus est tu-
 sum, melle cocto excipito, & deinde linte-
 o infarta locis affectis imponito. Si fortis
 fuerit fluxio, succi hypocythidis aliam ad-
 huc drachmam addito, & floris rosarum tan-
 tundem. Aliud Galli Marci Asclepiadei,
 ad easdem affectiones. Seminis hyoscyami
 drach. tres, florum rosarum drachm. 2. anisi
 drac. duas, seminis apii drach. 4. opii drac. 1.
 succi hypocythidis drac. 2. myrrhetroglo-
 dytidis drac. 2. croci sesquidrachmam, vini
 myrtei quod satis est, mellis cocti quod suf-
 ficit, præpara ac utere vt dictum est. Eius-
 modi pharmaca etiam bibuntur, & valde au-
 xiliantur. Cohibito autem fluxu & sequen-
 te dolore, tantum pondus cerati rosacei ad
 pharmaci confectionem addere oportet.
 Si verò multa fluxio contingit, ad pharma-
 cum succi hypocythidis drach. tres, conii-
 cio, & flores rosarum aliam drachmam. Vi-
 giliis infestantibus, etiam succi papaveris
 aliam drachmam addo. Aliud Nicerati,
 cœliacis, dysentericis valde generosum.

V s

* Omnes Oenanthos * drach. duas, rosarum siccarū
vet. cod. vnc. i. mastiches vnc. i. aloës vnc. i. gallarū
habēt vn- omphacitidū vnc. i. aluminis rotūdi vnc. i.
cias duas. acaciæ vnc. i. ceræ lib. i. picis brutiæ qua-
drantem, olei myrtei lib. i. arida cū liquidis
committito. Aliud valde præclarū. Oe-
nanthos vnci. i. omphacii vnci. i. gallæ om-
phacitidis vnc. i. aluminis scissi vnci. i. aca-
ciæ vnc. i. cytinorum mali punici, balaustii,
mastiches, singulorum vnci. i. vini myrtitæ
quantum satis est his subigēdis, carnis phœ-
nicobalanorum sexuncē, excipe cerato len-
tiscino præpara ac vtere vt dictū est. Hæc
quidem igitur præscripta pharmaca facul-
tatis sunt adstringentioris. Quæ verò de-
inceps ab Asclepiade prodita sunt, mixtam
facultatem habent, adeo vt etiam indura-
tas inflammationes curēt, & propterea etiā
hepaticis vtilia sunt. Opus enim habēt etiā
illi adstringentium ad laxantia mixtura, nō
tamen æque vt stomachici. In stomachicis
enim medicamētis qualitas adstrictoria præ-
dominatur. Malagma Nilo inscriptum.
* Hæc ve Facit ad præcordiorum * distentiones &
tu. cod. articulorum] dolores, dissoluit omnem du-
ritiē, facit & ad exarticulata & luxata post
declinationem inflammationum impositū,
facit spleneticis & hepaticis. Ceræ librā
vnā, ammoniaci thymiamatis libram vnā
olei

olei cyprini libram vnam, croci semunciā,
 aceti quod satis est. Ammoniacum dissol-
 uito, deinde sic arida adicito. Aliud ex
 libris Arii Asclepiadei. Ammoniaci thymia-
 matis lib. duas, diligenter tritas in vas ficti-
 le conice, eiq; floris salis libram vnam, ad-
 de, & olei cyprini sesquilibram. Coque ad
 lentum ignem assidue agitando, atque ubi
 emplastri formam acceperint, adice ceræ
 lib. duas, qua eliquata & pharmaco amplius
 non inquinante, eximito ipsum & in mor-
 tarium transsero, conquassatumq; diligen-
 ter reponito ac vtitor. Malagma Nilei
 crocerum, pharmacum accommodatum ad
 prædictas affectiones, facit & ad erysipela-
 ta. Hoc vsus est Licinius Atticus. Ammo-
 niaci thymiamatis lib. vnam, ceræ lib. vnā,
 rosacei lib. vnā, croci vnci. vnā, aceti quan-
 tum sufficit, præparato pro more. Aliud
 Melinum inscriptum aromaticum, hepati-
 cis, stomachicis, & ad præcordia distenta, &
 omnem neruorum per consensum affectio-
 nem. Ammoniaci thymiamatis drachm.
 100. ceræ ponticæ drach. centum, meliloto-
 rum drach. duodecim, croci, myrrhæ, bdel-
 lii singulorum drachm. octo, olei cyprini
 libram vnam. Aliud facit stomachicis,
 hepaticis, ad præcordia inflammata, & o-
 mnem neruorum per consensum affectio-
 nem.

nē. Cera drach. 100. croci drach. duodecim
 ammoniaci thymiamatis drach. 100. myr-
 rhæ drach. 12. bdelli drach. 8. confectio-
 nedychroi quadrantē, vini dulcis quantum
 sufficit, olei cyprini lib. 1. prapara pro mo-
 re. Aliud Neapolitæ Aromaticum inscri-
 ptum, pharmacum accommodatum ad inter-
 nas affectiones. Ammoniaci thymiamatis
 lib. 3. ceræ lib. 7. rosacei lib. 3. confectio-
 nis

**Pro mel-* hedychroi libræ dimidium, **mellis libræ*
le vet. cod. dimidium, nardi celticæ libræ dimidiū, flo-
habet me- ris iunci odorati libræ dimidiū. Vini dulcis
liloti libræ quod satis est. Arida cum liquidis subacta
dimidium cōmittito. Malagmata bona inflamma-
 tionum citra debilitatem inueteratarum,
etiā addit quæ ad hepatis inflammationes similiter con-
cypere lib. ueniunt. Malagma Asclepiada ex meli-
dimidiū. loto, Hieraticon, hoc est pōtificium inscri-

ptum. Stomachicis, hepaticis, & ad viscerū
 dolores. Nardi celticæ drach. decem, cype-
 ri drach. 10. myrrhæ drach. 10. cardamomi
 3. 8. meliloti drach. 40. croci 3. 8. amomi
 3. 8. cypheos hieratici hoc est, sacrificulorū
 drach. 16. ammoniaci thymiamatis drach.
 quadraginta, resinæ terebinthinæ drachm.
 octuaginta, ceræ minam vnam, olei cyprini
 drachm. 120. Vini odorati Italici heminam
 vnam. Prapara vt dictum est ac vtere.

Aliud Basilicum, hoc est, Regium inscri-
 ptum,


ptum, faciens ad prædictas affectiones, omnemque per consensum neruorum affectionem, ceræ minas tres, ammoniaci thymiamatis minas. 2. resinæ frictæ minā vnā, meliloti minæ dimidium, propolis drach. viginti quinque, myrrhæ drach. 25. nardi celticæ drachm. 25. styracis drachm. 25. cyperi drach. 25. iridis illyricæ drach. 25. cardamomi. panacis, vtriusque drachm. 25. croci, cassiæ, mastiches, opobalsami, amomi, floris iunci odorati singulorum drachm. 16. Vini Italici odorati quantum sufficit. Arida cum nardini Asiani aromatici libris quatuor subacta pro more præparata. Malagma polyarchion. Facit peripneumonicis, stomachicis, splenicis, hydropicis, facit ad affectiones circa vesicam aut vterū, ad omnem neruorum per consensum affectionem. Ceræ minam vnā, terebinthinæ minam vnā, bdellii minā vnā, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, cyperi, singulorum minam vnā, meliloti, amomi, nardi indicæ, croci, myrrhæ, thuris, xylocinamomi, singulorum drach. 25. olei cyprini heminam vnā. Vini Italici quod satis est, præparat pro more ac vtere quandoque immixtio, quandoque dissoluto cum cerato cyprino. Polyarchi pharmacum accommodatum. Facit ad prædictas affectiones, & omnem neruorum per
con

consensum affectionem. Facit etiam ad assiduas cruditates, & corrumpentes cibum, & vomentes bilem, ac omnes inueteratas affectiones. Vfus est eo Iulius Agrippa, compositio hoc modo habet. Castorii ammoni, vtriusque fescunciam, piperis albi fescunciam & longi fescunciam, myrrhæ quadrantem, confectionis hedychroi quadrantem, carpobalsami quadrantem, croci quadrantem, foliorum malabathri, cassiæ rosas referentis, panacis, opobalsami, nardi indicæ singulorū quadrantem. floris iunci odorati, cinamomi, vtriusque trientē, pyretri, croci, cardamomi, singulorū trientē, ciperi semissem, iridis illyricæ aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum semissem, ceræ lib. 4. terebinthinæ. lib. 2. resinæ laricis quadrantem. In alio exēplari, etiā bdellii trientem, ammoniaci thymiamatis trientem. Vnguenti nardini Asiatici lib. 3. Vini falerni quod satis est, præpara pro more. Ego autem adiicio mastiches, cinamomi ammoniaci thymiamatis styracis, aloës, opobalsami singulorum quadrantem. Malagma Andromachi ex meliloto. Nardi celticæ

* Vet. cod. drach. * octo, cyperi drach. 8. iridis illyricæ
habēt dra drach. 8. myrrhæ drach. 8. croci drach. 4.
chmas 10. meliloti drach. 25. ammoniaci thymiamatis
drach. 50. terebinthinæ drachm. 50. ceræ,
dra

drach. 100. cyprini hemina dimidiū, aceti quod satis est. Quidā ammoniaci drac. 100. cōiiciunt, facit ad omnia interna. Malagma polyarchi ex epistola ad omnia interna. Cyperi minam vnā, cardamomi minam vnā, mannæ tantundem, ceræ tantundem, terebinthinæ frictæ sesquiminā, aut liquida minas. 3. cyprini quantum sufficit. Ego etiam bdellii appono minā vnā. Aliud, altera descriptio. Cyperi, cardamomi, amomi, bdellii, thuris, balsami, singulorum minam vnā ceræ sesquiminam, resinæ frictæ minas 4. cyprini hemina dimidium. Vini odorati sesquiheminam. Præpara vt moris est, ac vt ere velut præscriptis. Vt ego componere soleo. Cyperi, cardamomi, amomi, bdellii, thuris, singulorum minam vnā, ceræ minæ dimidium, resinæ frictæ aut tenebinthinæ minas quatuor cyprini heminam i. cassiæ minæ quartam partem, ammoniaci thymianatis minæ quartam partem nardi indicæ, croci, myrrhæ, singulorum minæ quartam partem. Vinum odoratum.

De Hepate & eius affectionibus. CAP. VI.



Vum hæc tractatio postrema omniū à me cōscribatur, omnibus sanè manifestum esse opinor, quod ex duobus his alterum

rum verum sit. Aut alias omnes inutiles esse & superuacaneas, si quis ex hac sola sufficiens sit omnes affectiones curare, quæ medelam per pharmaca requirant. Aut si quidem illæ vtilis existant, primùm ipsas legendas esse, & in memoriã reuocandas ab his qui hinc aliquid cōmodi auferre velint. Ipsas etenim methodos curandi prædictas affectiones, in 14. libris de curandi methodo inscriptis prodidi: nunc verò tanquam his ipsis cognitis, citra prædictas demonstraciones in memoriã reuoco, ostēdens omnino quomodo nos pharmaca cōponamus, & quæ à prioribus scripta sunt iudicemus, indeque in vsum agere ac assumere confidamus, & sanè vtilis hæc speculatio existit. Nam empirici qui suã artem rationis expertem esse volunt, omnia quidem legēda esse cēsent, quæ à probatis medicis sunt cōscripta, non autē statim in vsum assumēda esse, sed prius iudicanda, an singula ex ipsis ea quæ promittunt opere etiam demonstrare possint. Nos autē experiētiã in omni arte magnum quid posse persuasi, speculationes tum per rationalem methodū, tum per rationalem indicationē inuētas, ad ea quæ ab ipsis de iudicationis historia tradita sunt, apponimus, demonstrantes qualem facultatem ad ambulandum vtrunque crus exhibet,

bet, talem in medicina experientiã & rationem habere. Itaque in tractatione de simplicibus pharmacis per vndecim libros cõscripta, singulorũ sponte naturæ productorum pharmacorũ facultatem qua methodo quis inueniat recensuimus, atque etiam ad particularem ipsorum materiam progressi, vtilissimã ad artis opera facultatẽ omnem secundum species prodidimus. Consequenter autem ab illo opere, etiam curatiuã tractationem, quomodo quis optimè non solum simplicibus, sed etiam cõpositis vtatur, exposuimus: simulque vias compositionis ipsorum omnes indicauimus. Cæterum in proposito iam opere, quomodo varietas cõpositorum medicamentorum inducta sit ostendimus, in certos iuxta speciem scopos tum cõpositionem, tum vsum ipsorũ deducentes, ampliusq; iudicationem eorũ quæ iam ante scripta sunt docentes. Quum igitur consequenter post prædicta, ad affectuum hepatis doctrinam progredi velimus, affectus circa ipsum consistentes non nuda doctrina, sed ratione exquisitos referemus, & ab vniuersalibus scopis curationis ipsorum: quos in curandi methodo tradidimus: ad compositorũ doctrinam perueniemus. Primũ igitur omnium discernendum est. Num debilitas quædam visceris

adfit, quemadmodum etiam de ventre diximus, aut etiam alia quædã affectio ipsum apprehenderit, aut citra debilitatem affectum sit, inflammatione aut induratione, aut abscessu laborans, aut obturatione. Quemadmodum etiam an erysipelatosam habeat affectionem, aut vlcus, aut aliquam putrefactionem. Nam & in hoc hepaticam affectionem dicunt, quemadmodum etiam ore ventris affecto plerique medici ac idiotæ stomachicam affectionem vocant, in multis symptomatibus, non tamen omnibus circa vnam affectionem accedentibus contingentem, sed circa multas, vna quadam generali communitate comprehensas, & tamen inter se in tantum differentes, vt aliquæ ipsarum maximè contrariæ existant. Quomodo enim non maximè contrariam quis dixerit frigidam intemperaturam calidam, humidam siccam? quanquam secundum genus eadem sint: fermè autem omnia contraria eadem genere si quis dixerit, non peccabit. Contrariorum enim notio contingit, vbi plurimum inter se distarint. Plurimum autem distant à mediis in quocunque genere, ea quæ extrema sunt, adeò vt contraria sæpe quidem eadem videantur iuxta communis generis fines, sæpe verò generalioribus contrariis supra ipsa ascendentibus, ab illis

com

cōprehendantur. Illa ipsa verò ob id omnino contraria sunt, quod quum vnus generis sint, plurimum inter se distent, adeò vt quæ his subiacent primum & supremum genus commune habeant. Atque hoc quidem hoc loco semel à nobis obiter & accessio- nis loco dictum, semper in memoria teneatur, ne videlicet cuipiam videri possit à se ipso dissentire, qui aliquando vnā affectionem in duobus hominibus eandem esse dixerit, aliquando non vnā, neque eandem, sed duas contrarias. Intemperie enim vnā quandam affectionē generaliter appellant, sed quæ in contrarias differentias secetur. Licet enim secundum hoc quod diximus, duo & tria & plura, iuxta particulares differentias inter se contrariissimæ esse, & secundum hoc debilitatis hepatis affectionem vnā esse: quam intemperiem vocant: præfatus, non malè rursus dixero, non vnā, sed octo affectiones esse, propterea quod tot differentie intemperierum existant. Et enim rursus iuxta aliam sectionem, duæ intemperierum differentie fiunt, & rursus iuxta aliam tres, hæ quidem in qualitatibus solis, affectis partibus alteratis, hæ verò cū humoribus quibusdā, aut in spaciis affectarum partiū cōtentis, aut in ipsis corporibus iri- gnis ab illis factis. Circa ventrem igitur

& intestina, vna in singulis est cavitas, quæ vitiatâ humiditatē suscipere potest. Verùm circa hepar tot numero sunt, quot sunt arteriæ & venæ. Quum verò hæ omnes angusta oscula habeant, qua parte sima huius visceris cum gibbis coeunt ac cōmittuntur, obturatio & oppilatio vitiosorū humorū aliquando contingunt, ad quas putrefactio consequitur, breui in frigidis intemperaturis, in calidis verò non citò, sed temporis progressu accedens. Fit autē intemperatura iuxta propriā hepatis substantiā, quam Erasistratus putat præterfusionē quādam: parenchyma Græcè appellat, & non principalissimā visceris partem esse. Fit etiā intēperatura circa contentas in ipso venas & arterias, & iuxta materias in spaciis ipsarum contentas. Quum autē habeat hoc viscus non vnā sed plures facultates actionum, quas vitæ tempore operatur, easq; tot numero, quot sunt actionū species, Contingit sæpe vnā ipsarū præcipuè ladi, sæpe duas & tres, atque omnes quatuor simul. Actio nanque ipsius vna quidem attrahere cibum & alimentū in sese. Altera verò obuoluere & continere, donec permutans ipsum sui ipsius faciat partem. Est igitur hæc ipsius facultas principalissima & ferè prima, concoquerē videlicet & permutare ac alterare
atque

atque assimilare sibiipſi alimentum, quam alteratiuam vocamus: quæ verò iuxta hanc alterationem remanent recrementa, ea per aliam facultatem, quam excretiuam & expulſoriam nominamus, expelluntur. Oſtenſum autè eſt quod hæ facultates omnes in omnibus ſunt corporis partibus per omne vitæ tempus. Omnes enim familiare ſibi attrahunt, & alienū excernunt, attractumq; temporis progreſſu alterant, quo tempore etiam retinent & cōſtringunt. Vocatur autem alteratio ipſa uſque quo in ſimilitudinem partis quæ nutritur tranſmutatur, concoctio. Vbi verò iam parti apponitur, nutritio. Quum igitur hepar præ imbecillitate ex ventre & inteſtinis alimentum trahere non poteſt, liquida & nondum iuſto modo exſuccata, per ſedem excernuntur, & ſi quidem venter ſimul cum hoc viſcere fuerit imbecillis ac non probè cōcoquens, cruda. Si verò validus fuerit, concocta quidem, ſed liquida, propterea quod nulla, aut omnino modica diſgeſtio ac diſtributio ad hepar eſt facta. Si verò traxerit quidem hepar in ſeipſum ex ventre & inteſtinis alimentum, ſanguificare autè ipſum præ debilitate nequit, quemadmodū in ventre multiformis corruptio cōtingit eorū quæ cruda remanēt, ſic etiam circa hepar. Dico au-


tem nunc cruditatem solam, non comprehendens hoc sermone tardam concoctionem. quod si velis alimentum crude per-
manens, & alterationem quæ fit à particula iuxta naturam non assumens, itidem crude appellare, neq; ego fugio appellationem, si mihi saltem differentia rerum conseruetur. Peior enim est transmutatio in peregrinam qualitatem iuxta cruditatem facta, moderatior verò ea est in qua alimentum suam naturam quam diutissimè seruat, nulla alteratione ex particula quæ ad ipsum concoquendum à natura destinata est, suscepta, Atqui & tertia præter has, species est frustratæ concoctionis quum semiconcoctum sit alimentum. Et ex hac sanè exacta concoctione frustrata hepaticis sanguinolentus humor per aluum excernitur, talis consistentiæ veluti si quis sanguinem cum aqua confudisset, & pleriq; sanè medici imaginem eius depingētes scripserunt talem eius compagem esse, velut si quis victimæ recēs mactatæ carnes aqua lauasset. Et plurimæ hepaticæ affectiones ab eiusmodi excretionibus initium capiunt, nondum magnam debilitatem hepate habente, sed adhuc concoquere, & alimentum alterare velut in formam sanguinis potente: aucta autem affectione, nihil amplius tale excernitur sed
mul

multiformes aliæ qualitates & compages, velut à ventre ex cruditate laborante. Verùm in ventre ciborum ipsorum corruptiones manifestè apparēt, circa hepar verò distributum alimentũ ad sanguinem prius in viscere existētē ammiscetur, corrumpiturq; temporis progressu etiam hic, vnà cum alimento circa ipsum non concocto. Calida igitur intemperie circa viscus existēte colliquationes fiunt, primũ humorũ, deinde etiam carnis ipsius hepatis, & euacuatur per ventrem bilis crassa, graueolens, & abundè colorata, quemadmodũ in pestilentibus febribus contingit. Frigida verò intemperie existente, neq; assiduæ excretiones, neque multæ fiunt, Durat tamen affectus diutius, & per aliquos dies profluet ipsis venter maiori copia, cuius neque foetor similis est his quæ ex calore sunt liquefacta, neque color similis, aut compages, verũ minus graueolentia ab his excernuntur speciem putrefacti sanguinis, non colliquata carnis habentia, aliquãdo verò id quod excernitur velut sanguis niger apparebit, Verũ diligenter consideranti neque sanguis niger est, neque grumus, sed velut limus quidam sanguinis crassi, qui prope ad atrã bilẽ accedat, & plures ac agrè iudicabiles colores circa eiusmodi affectionem in egestionibus apparēt.

In vtraque autē intemperie tum calida, tum frigida, quando intemperatura humida & sicca fuerint ammixtæ, liquidiora in humiditatis complexu, sicciora verò ex siccitatis copula, fient recrementa. Scopus igitur curationi in eiusmodi affectionibus sit cōmunis quidem, iuxta intemperiei contrarietatem, peculiaris autem vnicuiq; per cuiusque contrarietatem. Affectio igitur Hepatica peculiariter appellata, veluti etiam cœliaca & stomachica, citra tumores præter naturā circa ipsas partes contingit. Inflāmatū enim esse hepar, aut abscessu laborare, aut induratum esse, medici dicunt, aut aliud quippiā tale, Non tamen hepaticum vocant hominem ipsum cui tale quippiā accidit: Verūm quando citra manifestum aliquod in viscere malum, in propriis actionibus debilitatur, tunc ægrum hepaticum appellant. Videamus igitur primū ea quæ scripserunt hi qui ante nos de pharmacis optimè & studiosissimè tradere sategerunt, initio ab his quæ Andromachus prodidit factō. Hic enim vir in libro internarum affectionum curationes cōtinente multas hepaticas confectiones conscripsit, quarum omnium faciam mentionem hoc loco, ipsius verbis in medium adductis, & primū sanè Antidotōs adscribam.

Que

Quæ pharmaca ad Hepaticos ab Andromacho sunt conscripta. CAP. VII.



Andromachiantidotus Cyphoides ad hepaticos, & omnia thoracis vitia. Vuæ passæ carnis drach. 25. alii drachm. 100. croci drachmam vnā, alii obolos tres, calami drach. 2. & dimidiam, bdellii drach. duas, & dimidiam, cassiæ sesquidrachmam, cinamomi obolos tres, spicæ nardi drach. 3. floris iunci oderati drac. 2. & dimidiam, myrrhæ drach. 4. terebinthinæ drach. 4. alii drac. 16. ramentorum aspalathi drac. 2. mellis drachmas. 16. vini quod satis est. Hæc quidem est Antidoti descriptio: Appellauit autem hæc cyphoidem, hoc est, cypheiformem, ob similitudinem. Nam & odore & gustu similis est cyphi ab Aegyptiis appellato, qui sanè primi hoc pharmacum composuerunt, & vtuntur eo quotidie ad vaporem edendum accenso in deorum honorem. Plurima autem eorum quæ in illo thymiamate & suffumigio scripta sunt, eadem sunt cū his quæ in hoc pharmaco habentur, quin & suffumigari hoc ipsum similiter vt cyphi potest. Compositum est autem ex moderate adstringentibus, & resiccantibus ac discutientibus vitiosos serosos humores, & corrigentibus humorum maliciam, & contra-

X s

riam vim habētibus aduersum putrefactiones, quorum plurima ex aromatū sylua existunt. Habet itaq; pharmacum hoc cinamomum omnes putredinosas & venenosas facultates corrigens, non solum serosorum & aliorum humorum, sed etiam lethalium pharmacorum. Quemadmodum & feris virus eiaculantibus contrariū existit. Consequenter autem post cinamomum, cassia eandem vim habet, optima videlicet & cognata ipsi cinamomo, & post hanc omne aromatum genus velut hic est nardus, & iuncus odoratus, calamusque & myrrha. Hæc enim ad propositum pharmacum iniecta sunt, iuxta iam dictam ratiocinationem & modum. Quemadmodum etiam ex his quæ apud nos gignuntur, aspalathus & crocus, adstringens & concoctorium pharmacum, & quod corrigit putrefactiones. Cæterum vua passa contemptilis videri possit, ob familiarem eius vsum, at vero hoc ipsum eam facit vtiliorem: nã quum familiaris nobis sit, in tantum adstringens est, quantum opus habet viscus affectum. Habet autem & vim aliquam concoctoriam crudorum humorum, & vim coercendi maligna, sitque ipsa haud facile putredini obnoxia, & ultra hæc secundum totam substantiam visceri ipsi familiaris est & pro

propria. Didicimus enim quod alimenta secundum totam suam substantiam proprietatem ac familiaritatem habent ad ea quæ aluntur, quod maximum est in huiusmodi affectionibus curandis quæ iuxta intemperiem fiunt. Optimè enim in ipsis faciunt quæ vnà cum hoc quod intemperiem curant, etiam alere possunt, & ob id etiam vinum conuenientissimum est, citra inflammationem, aut erysipelas, autem abscessum, aut calidā intemperaturam, ægrotantibus. Nam & nutrit, & concoquit, & roborat, & putrefactioni resistit, & si intemperies ex humiditate facta sit & frigidityte, eam citra omnem molestiam ac securè persanat. Eadem est & mellis facultas præterquam quod non condensat substantiam corporum quæ contingit, sed pro hoc vim extergendi, & aperiendi, ac pueros reddendi meatus, & vrinam ciendi, non parua sanè auxilia possidet. Porro ammixtum est à compositore pharmaci bdellium, sufficienter emolliens & concoquens, velut didicimus, ampliusque moderatè discutiens. Consimilem fermè vim terebinthina resina habet, supra hoc quod angustos meatus extergit & expurgat, quibus auxiliis viscus curandum opus habet, quo osculorum venarum in ipso com-
mis

missuræ laxæ & ab obturatione liberè per-
 maneant. Didicimus nanque quomodo ob-
 turatio efficiat putrefactiones. Aliqui tamē
 huiusmodi confectionum compositores,
 quemadmodum etiam prius in stomachicis
 dictum est, opium aut hyoscyamum, aut
 quippiam aliud ex refrigerantibus miscen-
 do, ad calidas intemperies vtile pharmacū
 effecerunt. Et ob id etiam Philonis Anti-
 dotus mirifice semel tantum exhibita, he-
 paticam intemperiem sanauit, id quod &
 compositor eius testatum reliquit. Verū
 ex pharmacis hepaticis ab Andromacho
 conscriptis nullum est huiusmodi. Et sanē
 vehementer refrigerans nullum esse debet,
 sed qualia tum ab aliis, tum ab Asclepiade
 sunt scripta. Nunc igitur hepaticas antido-
 tos consequenter ab Andromacho prodi-
 tas subscribam, modo memoria nos tenea-
 mus, nullam ipsarum calidis intemperatu-
 ris conuenire, sed aut humidis aut frigidis,
 aut ex vtriusque compositis, aut certe hu-
 midis quidem fortiter, calidis verò mode-
 rate. Conscribentur autem omnes iuxta
 ipsius Andromachi dictionem. Alia Cy-
 phoides ad hepaticos, ex libris Galli, ad
 tusses item & reiectiones. Croci drach. 1.
 myrrhæ drachmam vnā, bdellii drach. 4.
 aspalathi obolos. 4. iunci odorati drach. 3.
 cala


calami drach. 2. cassiæ drac. vnam, nardi indicæ drachni. vnam, terebinthinæ drach. 6. carnis passerum vuarum drach. 160. mellis heminam dimidiam. Vini chii quod satis est ad macerandam vuā passām, bdelliumq; ac myrrham. Resinam verò melle liquefacto, & deinde omnia mixta ac trita reponito. Alia ad Hepaticos & Ictericos. Amygdalarum amararum drach. 2. anisi drach. 1. absinthii, cumini, seminis apii, singulorum drach. vnam, cornu cerui obol. 3. trita cum aqua in pastillos triobolares redigito, ex eisq; vnum mane ac vesperi, cum vino mulso dato. Nectarea Antidotus ad hepaticos & arquato laborātes, helenii sesqui libram, crocomagmatis lib. 2. aristolochiæ vnc. 1. petroselini vnc. 1. piperis nigri vnciā dimidiam, myrrhæ vnc. vnam, mel. quod satis est. Antidotus hepatica Athanasia appellata. Facit & ad nephriticos & ictericos, multum mouet sudorem. Croci drach. 2. cinamomi drach. 1. nardi drach. 2. cassiæ, myrrhæ, iunci odorati, singulorum drach. vnā, melle Attico excipe. Datur fabæ græcæ magnitudine, febricitantibus ex aqua mulsa. Hepatica admiranda, qua Pharnaces herbarius ægrotus vsus est. Croci drach. 2. mei, asari, phu pontici, dauci, petroselini, myrrhæ, singulorū drac. 4. nardi Indicæ & celti

celticæ vtriusque drach. 6. costi, cassiæ iun-
 ci odorati, singulorum obol. 3. carpobalsa-
 mi drach. 3. & dimidiam, rubiæ drac. 8. succi
 radiceis dulcis drach. 3. hemionitidis herbæ
 drach. 3. polii drach. 3. succi balsami drac. 6.
 confectionis hedychroi drac. 5. mellis quod
 satis est. Vtere, ad omnia vitia efficax est,
 nucis ponticæ magnitudine, cum vino mul-
 so. Antidotus Hepatica à Nearcho lau-
 data. Radicis panacis, rubiæ, eryngii, eupa-
 torii, helenii radiceis, polii, costi, aristolo-
 chiæ, piperis, scolopendrii herbæ, seminis
 cucumeris, chamæpityos, radiceis gentianæ,
 milti siue rubricæ sinopidis, fellis vrsini,
 spicæ nardi, baccarum iuniperi, seminis bras-
 sicæ, seminis eruce, singulorum par pondus,
 melle Attico cocto excipe ac vtere. An-
 tidotus Hepatica Dioscori. Cinamomi,
 cassiæ, vtriusque drach. 4. croci, nardi, costi,
 seminis balsami, hyperici, glycyrrhiæ, sin-
 gulorum drach. 8. Excipe melle Attico, ac
 exhibe nucis ponticæ magnitudine. Alia
 ad Hepaticos, & reliquos internos affectus,
 vt Aristocles. Piperis grana. 40. myrrhæ
 drac. 8. croci, costi, mei, acori, nardi, dauci se-
 minis, petroselini, scordii, singulo. drach. 4.
 cinamomi drach. 12. cassiæ drach. 12. Mellis
 quod sufficit. Datur nucis ponticæ magni-
 tudine. Potio ad hepaticos spleniticos,
 neph

nephriticos, hydropicos, auxiliatur & stomachicis, & molestiis ex partu, & cōuulsis. Prodest cōualescentibus & se reficientibus ex infirmitate, facit ad viciosos humores, iſtericos & tusses, ac pleuriticos. Est etiam antidotus ad letalia pharmaca, & ad ferarū plagas. Nardi indicæ drach. 2. costi drach. 7. cassiæ drachm. 1. croci drach. 1. piperis albi obol. 5. alii drach. 2. seminis apii drach. vnā, obolos. 3. iridis Illyricæ tantundem, acori drach. 1. obol. 1. opobalsami drac. 1. succi arimasculi drac. 3. Vuæ passæ exacinatæ drachmas. 6. Terito cū passo, aut melle excipito & drach. 1. cū vino dulci diluto dato, aut cū aquæ mulsæ cyathis. 4. aut vt cōueniēs fuerit. Hæ quidem sunt Hepaticæ cōfectiones ab Andromacho proditæ. Transibo autem iam inde ad eas quas Asclepiades tradidit in tertio internorum, Quæ Mnasoni inscribit.

Confectiones Hepaticæ ab Asclepiade conscriptæ.

CAP. VIII.



Rimā equidē cōfectionē Asclepiades Antonij Musæ esse dicit hoc modo cōpositam. Succichorii cyathum vnū cū aquæ calidæ cyathis. 3. dato, mellis Attici cochleario addito. Aut filicis vel anethi succi cyathum vnum cum aquæ mulsæ cyath. 3. dato. Aut picridis recentis, aut seridis recētis
suc

succi cyathum vnum cum aquæ mulsæ cali-
 dæ cyathis tribus. Hæc prima est descriptio
 trium pharmacorum in Asclepiadæ libro.
 Cichoria itaq; & seris cibarii generis exi-
 stunt, Apud nos nanque rurales ambo hæc
 edunt & cruda & cocta. Vtitur eis etiam
 Erasistratus abunde in affectionum circa
 aluum cura. Facultas horū olerum subfri-
 gida est & subamara ac moderatè adstrin-
 gens, & propter has qualitates, optima phar-
 maca calidis intemperaturis ipsius hepatis
 existūt. Ultra hoc enim quod moderatè re-
 frigerant, amplius & robur visceri addunt
 per adstrictoriam facultatem. Insuperque
 commissuras osculorum venarum in sima
 visceris parte ad eas quæ in gibba sunt, ex-
 tergent. Neque verò frigidas intemperies
 magnopere lædunt, quemadmodum quæ
 frigidam humiditatē absq; adstrictione aut
 amaritudine possident, facere solent. Iuva-
 re etiā viscus talium olerum substantia po-
 test, etiam si citra serosorum aut aliorū hu-
 morum vitiationem intemperies fiat per se,
 & cum humiditatis cuiuscunq; complexu,
 ex mixtura enim mellis, humiditatē per vri-
 nam educunt. Quapropter etiam si siccata
 tusa quis portioni inspergat, itidem iuuant.
 Quin & decoctorum decoctum potatum
 multum commodi affert. Si verò non cali-
 da

da aliqua intēperies infestet, aut si obturatio quædam sit circa viscus, magnopere auxiliantur ex vino albo tenui potata, cū his quæ vrinam ciunt. Vtilis autem non solum succus ipsorum est tum recens, tum exsiccatus, sed & ipsa olera exsiccata tusaq; ac trita potui inspersa, & eorum decoctum in potu acceptum, auxiliantur. Cæterum ad visceris expurgationem & meatuum apertionē, citra manifestam calfactionem aut refrigerationem, optimū pharmacū filix est, prædominantem habens amaram qualitatem. Anethum verò nihil forte habet ad huiusmodi affectiones, sed modicè refrigerati ac condensati visceris curatium existit. At verò catapotium ex chamæpity, cuius itidē meminit, eiusdem cum prædictis facultatis est. Amarum enim & hoc pharmacum est. Nihil igitur mirum est, ipsam chamæpityn tum per se, tum cum cichorio potatam, hepaticas intemperaturas iuuare. Quemadmodum Asclepiades scripsit in hæc verba.

Catapotium hepaticis. Radicis chamæpityos drach. octo, radicis cichorii drachm. quatuor, contunde & excipe melle cocto, ac præbe nucis ponticæ magnitudinem, & aquæ calidæ cyathos tres insuper bibēdos. Hæc Asclepiades scrip sit. Iuuant autē prædictæ herbæ hepaticos, nō solum radicibus

Y

ipfarum acceptis & praparatis velut Asclepiades prodidit, sed & succo, & decocto, & arida comina vna cum semine tusa ac trita, assumptis. Quin & Sphendarni, id est, aceris radix tusa trita, nam & huius meminit, eiusdem est cum prædictis facultatis. Exhibet autem ex ea drach. i. cum vini mulsi diluti cyathis tribus. Insuper & ex nardo celtica pharmacum: cuius item meminit: his consimile est. Scripsit autem ipsum sic. Nardi celticae partes tres, absinthii partem vnam, tusa & cribrata melle cocto excipito, & mystrum delingendum dato, Et quod post hoc scriptum est consimile ipsi existens in reliquis, plus habet de vi expurgandi ipsum viscus per vrinas. Scripsit autem sic Asclepiades de ipso. Pastillus hepaticus. Anisi, seminis apii, asari, amygdalarum amararum mundatarum absinthii, singulo. drach. 4. præparatum cum aqua & reduc in pastillos, ac exhibe drach. i. cum vini diluti cyathis 4. febrientibus cum aqua mulsa. Hoc pharmacum leniter quodammodo est calidum, propter vrinam cientium mixturam. Reliqua verò omnia superiora, aut prædominantem habent frigiditatem, aut omnino neque hanc, neque caliditatem. Verum vim extergendi. & vias digestionis ab obturatione vindicandi, omnia habent. Alia insuper medi-

ca

camēta Asclepiadae scripta sunt, partim extergendi ac aperiendi & secandi vim habentia, partim verò calidiora paululum quàm sunt media, media autē dico quę neq; calfaciunt, neque refrigerant manifestè. Vnum verò inter ipsa calfactorium est, vbi ait, costi triti cochlearium præbe cum aquæ mulsæ calidæ cyath. 3. Reliqua verò quę prope ad medium temperamentum accedunt, ad caliditatem vergūt, hæc sunt. Helenii drac. duodecim, crocomaginis drac. octo, excipe cichorii succo & fac catapotia, ea quę pro viribus exhibe, datur ad summum drachma ex vini mulsæ diluti calidi cyathis tribus.

Hoc pharmacum poterat absque helenio etiam calidis intemperaturis conuenire.

Quando verò helenium extergētibus ammixtum est, ad caliditatem vergit, nisi quis omnino modicum de eo cum multa frigida permisceat. Quin & id quod ex fœniculo constat calfactorium est, sic habēs, fœniculi drach. 1. petroselini drach. 2. anisi, amygdalarum amararum, absinthii, singulorū drac. vnam, croci, myrrhæ, vtriusque obol. tres, excipe aqua ac redige in pastillos, & dato drac. vnam, vt supra prædictum est. Etenim hoc loco fœniculum quidem & petroselinum, multum calfaciunt: reliqua verò moderatè, amygdalæ verò attenuatoriæ sunt

facultatis, & præsertim si fuerint amaræ. Medium autem quodam modo inter calfacientia & refrigerantia est hoc pharmacū, quod Asclepiades scripsit hoc modo. Eclegma hepaticum Paulini, auxiliatur confestim, chamæpityos siccæ lib. 1. myrrhæ vnci. vnā, passi protropi sexta. 3. Chamæpityn & vinum dulce coquito, & vbi superfuerit tertia pars, liquorem exprimito, eiq; mellis Attici libram dimidiam adiecito ac rursus coquito. Postea verò myrrham addito assiduè agitando, atque vbi dissoluta fuerit, ab igne ablata reponito, & ante cibum mystērū exhibeto. Scripsit & ex cochleis pharmacum hepaticum Asclepiades huiusmodi. Cochlearum trium carnem valde probe terito, & affusis vini nigri cyathis tribus calfacito, ac bibendum dato. Videntur autē hæc iuxta totam substantiam efficacia esse, non secundum vnam aut alteram qualitatem. Quale est & Lupinum hepar, cuius abunde experimentum habemus. Vfus autem ipsius consimilis cochleis est, teritur enim exacte hepar lupinum, & datur drach. 1. cum vino aliquo dulci, qualia sunt theræum creticum, & scybelites, ac dulce protropum. Bigna enim hæc sunt viscera, ipsum nutrire potentia, & media iuxta calidi & frigidi oppositionem, & ob id talia pharmaca omnib

nibus intemperaturis conuenire videntur, vt quæ ex substantiæ proprietate commoditatem de se exhibent, & neque calidas, neque frigidas intemperies lædant. Atqui in febricitantibus manifesta febris, aut nõ obscure, velut solet aliquibus hepaticis accidere, melius est ex aqua calida pharmacum præbere, aut ex aliquo prædictorum succorum, velut est seridis succus. Ad induratas hepatis affectiones. Et ad has Asclepiades quatuor pharmaca his verbis scripsit: Confectio ciens vrinam, facit ad induratas hepatis affectiones, ad splenicos, & ægrè se à morbo recolligentes, ac hydropicos, & in vniuersum bonum colorem inducit. Croci, nardi, cassiæ, singulorum drach. 2. costi, floris, iunci odorati, cinamomi, myrrhæ stactæ, singulorum drach. 1. mellis costi drach. 25. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudine cum vini mulsi cyath. 4. Alia qua vsus est Pacificrates. Vrinam multam ducit. Seminis dauci sesquidrachmam, radicis rhei ponticæ, floris iunci odorati, seminis balsami, cedridum, anisi, nardi indicæ, croci, cinamomi, cassiæ, phu, asari, petroselini, chamæpitryos, singulorum * drachmam vnam, men- * Aliàs
tæ siccæ obolos tres, nucleorum pinearum sesqui-
nucum repurgatarum numero L. Excipe drach.
melle cocto & dato nucis ponticæ magni-

tudinem, cū vini mulsi diluti cyathis tribus.

Alia antidotus ex felle vrsino, pharmacum accommodatum ad induratas hepatis affectiones. Chamæpityos, marrubii, seminis petroselini, gentianæ, seminis viticis, fellis vrsi, sinapis, seminis cucumeris, scolopendrii, panacis, rubricæ lemnix, rubiæ, seminis brassicæ, aristolochiæ, piperis, nardi indicæ, costi, seminis apii, seminis erucæ, eryngii, polii, echii, eupatorii, baccarum iuniperi, singulorum drachmam vnam, tusa, cribrata, melle excipe. Datur nucis anellanæ magnitudo in vini mulsi cyathis duobus.


Alia accommodata, facit & ad alias internas affectiones citra tussim. Radicis gentianæ, chamæpityos, marrubii seminis petroselini, fellis vrsi, sinapis, seminis cucumeris scolopendrii, panacis, rubricæ sinopicæ, rubiæ, seminis brassicæ, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costi, seminis erucæ, eryngii, baccarum iuniperi, seminis flixini, chamædryos, dictamni cretici, seminis cestri, seminis dauci, singulorum vnciam vnam, mellis Attici quod satis est. Datur nucis ponticæ magnitudo, liquor fit passi cretici cyathi duo. Hoc pharmacum vsu & experimento approbatum est. In alio exemplari etiam pelecini tantundem habetur. Circa prædicta quatuor pharmaca

recte fecit Asclepiades quod non simpliciter adscripsit, velut in aliis, quod ad hepaticos ipsis sit vtendum, sed cum appositione, ad induratas videlicet affectiones. Humidæ etenim visceris affectiones, exolutum & imbecille ipsum facere solent, veluti sunt articuli laxati: siue autem cum frigiditate, siue cum caliditate, siue sine his, laxitas ipsius sola constiterit, penitus adstringentibus pharmacis opus habet: verum hoc aut cum calfacientium mixtura, si frigida qualitas prædominetur, aut cum refrigerantium, si calida. Quæ verò ob frigidos & crassos ac viscosos humores in solidis corporibus imbibitos indurantur: ex necessitate frigidam habent affectionem. Quare & calfacientibus simulque tenuium partium pharmacis opus habent. Hæc enim sufficientia sunt, & ad viscositatem humorum induratis partibus infarctorum extergendam, & ad secandam crassitudinem, & discutiendos ita extenuatos. Verum in quinto de simplicium pharmacorum facultate, vbi de eiusmodi affectionibus sermo mihi habitus est, emollientium medicamentorum mixturam laudaui, nimirum vt præparantem indurata corpora, & prædictis pharmacis idonea facientem: citra verò præmollitionem, diffunduntur quodammodo

ea ipsa corpora, & euestigio manifestā im-
 minutionem habent, sed in immedicabiles
 reliquias terminatur res vbi fuerint super-
 resiccata. Hæc eadem & in 14. methodi cu-
 ratorii nobis sunt dicta. Igitur & circa he-
 par coniectare oportet emollientium mi-
 xturā, nam quum cōpagis humectæ sit he-
 patis corpus, valde moderatis opus habet
 emollientibus: prædominatur itaq; in ipso,
 præter aliarum partium induratarum mo-
 rem, calfacientium & attenuantium mixtu-
 ra. Meritò itaque ex præscriptis quatuor
 pharmacis Asclepiades postremum maximè
 laudat, vt quod multam de se experientiam
 præbuit: ex aromatis enim componitur at-
 tenuare ac discutere valēribus: aliaq; phar-
 maca adsumpsit, acria secantiaq; ac discusso-
 ria: mitigatoria autem his ammixta sunt, cu-
 cumeris semen ac iuniperi bacca. Deinde
 verò mel & eryngium, velut vrinam cien-
 tia his addita sunt, quo ex tersæ visceris affe-
 ctionis per vrinæ deductio fiat.

*Quæ Archigenes ad Hepaticos in secundo
 pharmacorum secundum genus scripsit.*

CAPVT IX.



In hepaticis cōueniente prægres-
 so ductu per alimēta, vnctiones,
 communia cataplasmata, venæ
 sectionē, cucurbitas, sinapismos,
 dro

dropaces, & consimilem diætam, amplius
cōscribendis compositis potionibus & ma-
lagmatis optime ipsiſ conuenientibus vta-
ris. Et potionibus quidem hiſ. Senecionis
decoctum vt valde commodum exhibeto.
Nascitur autē huius caulis maximē in tegu-
lis. Aut vngēti nardini cochlearia. 4. quo-
tidie bibenda dato, & maximē in induratis.

Aut aristolochiæ obol. 3. propinato febriē
tibus ex aqua, febre carētibus ex vino, val-
de benefacit. Aut trifolium acidum in aqua
coquito ad tertias, & per triduum bibendū
dato pro vice cyathum vnū. Aut fel vrsi-
nū in vase leniter feruefacito, & in sole re-
ficcato, atque ex eo hepaticis cochlearium
vnum dato. Aut radicis rubi corticis minā
vnā, cum aquæ congio vno, in nouo vascu-
lo ad residuum quartæ partis coquito, & ad
succum per noctem sub dio expositū mellis
cyathos sex, ammisceto, & ieiunis ad tri-
duum bibendum dato. Aut pseudobunii
obolum vnū dato cum * melle ieiunis. Aut * Aceto
dauci & fœniculi radicis vtriusque minam *mulso ve-*
dimidiam cum aceto mulso ad tertias co- *tu. cod.*
quito, & ieiunis cyathum vnum exhibe-
to. Aut glycyrrhizæ succi obolū vnum
aut duos ieiunis dato, & aluum subducit, &
vrinam mouet. In magna duritia abro-
toni succum quā crassissimum præbe bi-

714 DE COMPOS. PHARMACO.
bendum. Aut acori obolum i. panacis tan-
tundem, cum aqua propinato. Aut spicæ
nardi decoctum assiduè exhibeto. De Ca-
taplasmatis. Cataplasma porrò Hepati-
cum fit, malis cotoneis cum farina ordeacea
& fœno græco coctis. Aut semine lini tri-
to cum polenta in vino cocta. Aut ipso li-
ni semine cocto in passo, aut crudo trito cū
melle subacto. Aut capparis radice in aceto
mulso cocta. Aut farina ordeacea cum fi-
cubus. Aut oleæ radice in vino cocta. Aut
myrobalano tusa cum vino. Aut cerato ex
phœnicobalanis facto. Summe enim ad he-
patis inflammationes facit, maximè in qui-
bus etiam stomachus affectus est, & costæ
distentæ sunt. Aut palmulæ reiecto inter-
no nucleo diligenter tūdito, & cum æqua-
li parte cerati rosacei in mortario probè
vnito, rosaceū adstillando atq; ita imponi-
to. Aut myrrhamamineo vino macerato,
& palmulis ammisceto, & linteolo infarta
imponito. Cæterùm malagmata quibus
quis vti possit in inflammatione hepatis ci-
tra manifestā causā, post irrigationes &
cataplasmata, iā ante scripra sunt in sermo-
ne de oris ventris inflammatione, nimirum
communia illi & hepati existētia, in quibus
sunt etiam quæ ex meliloto præparantur,
& polyarchium. Verū etiam nunc appo-
nen

nentur quædã ex ipso Andromacho. Malagma Andromachi ad hepaticos. Ammoniæ Thymiamatis, drach. 144. alii drach. centum habent bdellii drach. 24. alii centum, aceti heminas quatuor, cyprini heminam vnã, ego verò heminæ dimidium.

Malagma Apollophanis. Cera drac. 80. ammoniæ thymiamatis drachm. 80. terebinthinæ drach. 40. mannæ thuris drac. 40. cum irino contundito.

Malagmata à Damocrate conscripta ad hepar & præcordia. Quædam ex eis etiam ad totum ventrem & splenem.

CAPVT X.

Afecta si quis per stomachum præcordia,
Et per iecur, intestina per, dein per colum,
Per ventriculum, aut viscus aliud sic proprie
Dictum, volet inquam læsa quis præcordia
Malagmate integere bono, & percominodo.
Primum paratum habebit hoc longe antea,
Infirmum enim atque inualidum est factum recens.
Cera capit quod ponticæ libras duas,
Ammoniæ Thymiamatis solam libram,
Terebinthinæ frictæ pariter solam libram,
Vstæq; resinæ picæ simul, libram,
Et post trientem cardamomi seminis,
Aridæ cyperi tantundem, item myrrha bonæ,
Pondusq; par vni horum, iridis mox candidæ,
Sextantem & inde celticæ spicæ integræ,

H3

His unciam unam & dimidiam croci boni
 Et sex meliloti, item duas, bessum puto.
 Verum melilotum præstiterit hic Atticum,
 Recentis & cyprini libras olei duas.

Oleum cyprinum tu cum reliquis liquoribus
 Et decoque lenta flammula, & deradito.
 Deinde tusa cribrata & reliqua, vino bono
 Rigata pernoctem integram & totam diem
 Vinum omne donec combibant seponito.
 Unctusq; post cyprino manibus, hæc pharmaca
 Mortario amplo vni, & simul committito.
 Molliq; pelle tecta sic reponito.

Aliud Malagma eiusdem.

Aliud valens atque idem si accesserit.
 Verum hoc magis affectus vitiantes mox habitum,
 Quicumque non cum flatibus, feruentibus
 Et phlegmonis ledunt diutioribus,
 Et viscera irritant gravibus doloribus,
 Inuat: solubiles male & iam duritias
 Dissolvit, exoluta earum compage,
 Paratur hoc modo, ut bona terebinthina
 Libram mediam, tantumq; cera pontica,
 Fœniq; græci unam capias puri libram.
 Et de nitro, & de panace unicam libram,
 Rursus anisi seminis unicam libram,
 Pinguedinis puræ vituli simul libram,
 Pondusq; par contusæ & albidæ iridis,
 Parum de aceto, tres cyathos sine dimidio,
 Mellis duas libras recentis Attici,

Am

Ammoniaci thymiamatis solam libram
 Quidam addidere, verum alij libras duas.
 Sic tusa, cribrata, & cataplasmati modo
 Cum melle mixta, & pauca aceti stillula,
 Donec fuerint mollita tactui coquito:
 Atque hinc liquatā ad cerulam, & pinguedinē,
 Terebinthinam & calentem adhuc adycito.
 Et vasculo maiore derafa excipito,
 Manibus subacta dein simul committito.
 Nec vtere mox, inualidum est factum recens.

Aliud Damocratis malagma.

Odorum & hoc, tollensq; mox vitia hepatis,
 Affectiones renibus, colo & graues,
 Stomacho simul & vuluæ diutiusculis.
 Idemq; iam corrupto habitu super datur,
 Morboq; longo pallidis, hydropicis,
 Et qui male concoquunt cibum, & fastidiunt.
 Habet hoc amomi Scythici, xylobalсами,
 Et cardamomi, bdellijq; lucidi,
 Aridæ Cyperi, thuris boni, omnium parem
 Modum, libram, post cassiæ daphnidiidis,
 Myrrhæ bonæ, pariter croci, de singulis
 Libræ trientem, aut amplius quid paululum.
 Nardi bonæ post Syriacæ uncias duas,
 Terebinthinæ puræ bonæ libræ duas,
 Albeq; ceræ perpolitæ vnā libram,
 Recentis vngenti cyprini libram vnicam,
 Vini falerni hinc optimi sextarium.
 Contusa alia cribro tenui concernito.

Thus,

Thus, bdellium, in mortarium conicito.
 Myrrham bonam, simul crocumq; his addito,
 Fractisq; pauco cyprinum vino indito,
 Dein tundito, mellisq; crassitudinem
 Formato, & his aromata mox trita addito.
 Et quod superest vinum addito, committito
 Totam diem noctem simul quo combibant.
 Terebinthinam vero, cyprinum, ceram & simul
 Igni liquata lentulo, his affundito.
 Vinctisq; post manibus per unguen quodpiam,
 Subacta sic committito, & reponito.
 Nec mox parato uti velis tu pharmaco,
 Sed tempore interiecto, & hoc ceratulo
 Partimposito, ut mollius sit, addito,
 Quamquam potes solo uti etiam, raro tamen.

Aliud Damocratis malagma.

Aliud malagma ad iam relatas commodum
 Affectiones, si fuerint diutinae,
 Confert lienosis vel omnium optime,
 Si palluerint, & si febricitauerint,
 Aquamq; habeant praecordia his si pauculam,
 Mu tam nequeunt curare enim malagmata.
 Ficus cape pingues sicciores, sed nouas.
 Et semine eiecto, simul umbiliculo,
 Appende drachmas quinquies tres ac decem.
 Albaq; cerae pontica parem modum,
 Myrobalani pinguis libram post integram,
 Nitri marini sed libram modo dimidiam,
 Aluminis scissi duas supra & decem

Drac

Drachmas, superq; dimidiam, triobolon.
 Et mox onychus, quod sic vocatur, bdellij
 Addes parem tu aluminis dictum modum,
 Nitro parem florem lapidis sed Asij,
 Ammoniaci tantumq; thymiamatis.
 Et seminis post filiculæ, & nasturtij,
 Et cardamomi, quàm optimiq; origani,
 De singulis sextarij quartam modo.
 Viniq; post, irini vnguinis, quod sufficit.
 Paratur at tandem malagma in hunc modum,
 Vino rigatum suaueolenti bdellium;
 Mortario emollito, & hinc adiicito
 Ficus, simul rursusq; rite tundito,
 Quo trita vini stillulis fiant probe,
 Mixtura mox addatur inde inspersilis.
 At post rigatam feruida ceram ex aqua
 Mollem manibus factamq; latam adiicito,
 Et tusa mox ligni radio compingito,
 Guttis & vnguinis frequens madefacito.
 Vfus malagmatum omnium, quæ ventriculo
 Induntur, & stomacho, simul interaneis,
 Est tempus, in quo quicibus congestus est,
 Non amplius resudet, sed aluum iam subiit.

FINIS OCTAVI
 LIBRI.

CA

CAPITULA NONI

LIBRI.

De ictericis. Cap. I.

De splenis affectionibus. Cap. II.

De hydrope siue aqua inter cutem.

Cap. III.

*De pharmacis dolorē sedantibus anodynis
& colicis appellatis.* Cap. IIII.

De dysentericis. Cap. V.

De affectionibus & vitijs sedis. Cap. VI.


De hæmorrhoidibus. Cap. VII.

Ad pudendorum affectiones. Cap. VIII.

De priapismo. Cap. IX.

Ad vteri affectus. Cap. X.

CLAV



CLAVDII GAL- LENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE

pharmacorum secundum locos,

Liber nonus, Iano Cor-


nario medico, in-

terprete.

*

De Ictericis.

CAP. I.



IVNT quidem Ictericira-
tione bonę iudicationis in
febribus, proriente nimi-
rum ad cutem bilioso hu-
more, & facilè sanè hi cu-
rantur balneis aquarũ po-
tabiliũ, & olei discussorii affric-
tu, omniũq; rarefacientiũ
cutem, Quale est anethinum
oleum, & chamæmelinum ac
cicinum. Post hæc etiã vngenta
faciunt, gleucinum, *cro- * Alias
cinum, deinde irinum & amaracinũ. Ve. comagi-
rũ alias confectiões priuatim Ictericas num.
appellatas suis autoribus, ne putes ad hu-
iusmodi ictericos convenire, neque enim
hoc illi ipsi de his prodiderunt, sed ad eos

Z

ictericos qui vasorum circa hepar obturationem habēt. Imò etiam eos qui ex inflammatione icterici fiunt. Itaque qui icterum seu Regium morbum ex obturatione incurrunt, sine febre permanent, Qui verò ex inflammatione, omnino febricitant. Quicumque igitur in pharmacis ictericis adscripserunt, in quibus ea ipsa convenire dicant, hi recte fecerūt. Qui verò indiscriminatim & simpliciter protulerunt, non parum peccauerunt. Etenim quæ multum medicamentaria sunt, itidemque facultate calida, magnopere febricitantes lædunt. Talia sunt gentiana, struthion, helenium, costus, aristolochia, polium, centaurea. Conveniūt autē ictericis ex inflammato hepate, quæcunque inflammationes sanant. Quemadmodum etiā his qui ex obturatione omnia quæcunque strenue extergent, etiam si medicamentariam substantiam habeant, & calidæ sint facultatis. Si verò coincident simul obturatio & inflammatio, laxantibus simulque extergentibus opus erit. Fugienda autem quæcunque medicamentariæ substantiæ, & calidæ facultatis existūt. Quum igitur & plerique ante me Ictericæ pharmaca indiscriminatim conscripserint, ego propria discrimina singulis ipsorum adiciam, quo sciatis quibus nā in febribus citra pericu-

rich

riculum vti queatis, & quibus maius ex
acerbatione febris & inflammationis detri-
mentum subsequatur, quam ex extersione
emolumentum resultet.

*De pharmacis Ictericis ab An-
dromaco scriptis.*

Andromacus quatuor pharmaca ad
Ictericos indiscriminatim tradidit,
minimè quidē periculosi vsus in his qui nō
febricitant, verū nō securi in febricitanti-
bus, & maximè si cum vino aut vino mulso
ea exhibeat, quēadmodū aliquando damus
in febribus inoderatis, & visceris obtura-
tione. Quare ex aceto mulso nō valde aci-
do securius tunc ea pharmaca propinantur,
sunt autē quæ ab Andromacho describun-
tur pharmaca quatuor, quæ iuxta illius di-
ctionē sic habent. Ad Ictericos. Incolo-
cynthidis calicē vinū fundito, calfacito, ac
bibendū dato subducit aluū. Idē & thus fa-
cit. Aliud ad Ictericos. Adianti obol. 3.
nardi obol. 2. absynthii drach. vnā, myrrhæ
obol. 3. Excipe passo, ac dato nucis auellanae
magnitudine, ex aquæ cyathis. 2. Aliud ad
Ictericos quo vtor. Struthion cū croco co-
loratū, nucis pōticæ magnitudine ex aqua
aut aqua mulsa dato. Datur & Anchusa co-
chlearii mensura. Aliud ad Ictericos, vt
Apollonius. Erui drach. 24. cornu cerui

Z 2

vsti drach. 8. thuris drach. tres, nardi Celi-
 Alis 1. ticæ drach. duas, nardi Syriacæ drach. 1.
 piperis sesquidrachmam, floris iunci odo-
 rati drach. vnam myrrhæ obol. 2.* cassiæ

Cod. vet. obol. 1. cinamomi obol. 1. Vtere sicco cum
 addit hic vini mulsi ciathis tribus.

costi obol.
 dnos.

De pharmacis Ictericis ab Asclepiade
 scriptis in tertio internorum.

EX his quæ antea dixi cognobile sit,
 etiam si citra discriminē pharmaca pro-
 dantur, quæ fugienda sint febricitanti-
 bus. Consuevit autem Asclepiades aliquan-
 do distinguere apponendo, febrientibus
 hoc modo exhibere oportere medicamen-
 tum, Non febrientibus hoc modo, vbi ve-
 ro omnino nihil apponit, his in non febrien-
 tibus magis est vtendum, quemadmodum
 sanè etiam, quando ex vino solo, aut vino
 mulso vsum fieri debere censemus. Ta-
 lia enim non febrientibus conueniunt. Ve-
 rum scripta ab ipso pharmaca hæc sunt. Po-
 tio ad Ictericos. Cichorii succi ciath. 6. fe-
 brientibus per se dato. Non febrientibus
 autem cum vini cyath. 3. Aliud, Sola-
 ni succi cyath. 1. Vini mulsi diluti dimidium,
 Aliud inspersile. Anchusæ tenuissimè tri-
 ta cochlearia 2. cum aqua potabili exhibe.
 Aliud, Strophili cochleariū 1. dato cum vini
 mulsi diluti ciathis 3. Aliud Nicerati ciēs vri-
 nam.

nam. Cicerum siccorū sextariū. i. rosmarini manipulum, aquæ sextar. 6. fœniculi manipulum, asparagorū palustrium radicum manipulum, præparato ac dato, vt dictum est, coctum ac excolatū liquorem, febrientibus simpliciter & assiduè bibendū. Nō febrientibus cum vino diluto. Aliud, Cicerum sextar. i. adianti manipulum, aquæ sextar. sex asparagorum palustrium radicum manipulum, præparato & exhibeto velut dictum est. Pastillus ad Ictericos, facit & Hepaticis. Amygdalarum amararum mundatarum drach. 4. anisi, absinthii, vtriusque drach. i. nardi Indicæ, asari vtriusq; drach. i. tusa & cribrata aqua subigito, ac formatis pastillis drach. i. cum vini mulsi cyathis tribus nō febrientibus dato. Aliud quo vsus est Charixenes. Asari, absinthii, vtriusq; drach. 8. feminis anisi, fœniculi, apii, amygdalarum amararum repurgatarū, singulorū drach. 4. Aqua subige ac forma pastillos, & exhibe vt dictum est. Nicerati errhinum Medicamentum quod naribus attractum, morbum regium expurgat. Quando reliquum corpus iuxta naturam habuerit, oculi verò pallidi permanserint, acetū acerrimū cochlearium vnum in balneo naribus attrahendum exhibe, detrahit multæ bilis fluxionem. Eiusdem aliud. Nasturtii vi-

ridis folia tenera, aut rosmarini viridis folia tenerrima terito, & expresso inde liquore vt prædictum est vtitor. Aliud eiusdem. Elaterium cum lacte muliebri tritum naribus infundito, & attrahere iubeto.

* Hæc ex
vet.cod.
sunt ad-
dita.

* Aliud cyclamini succum ex aqua tritum, vtitor vt prædictum est.]

Quæ pharmaca Archigenes ad Ictericos conscripsit, in secundo pharmacorum secundum genus.

AD Ictericos conuenienti diætâ & ductu per frequentes deambulationes & multam vngentorum frictionem vtarris, ampliusque fomentis siccis & subscri-

* Alter ex ptis medicamentis. Aiunt eos qui in febribus morbum regium incidunt, rubi canini fuluo fructu comesto, statim pro-

citra febrē bē iuuari, Auxiliatur & chelidonia herbæ & sic viscus cum vino aut aqua mulsâ potatus.

Aut adianti vel rubiæ radicis obol. tres, cum aqua mulsâ exhibe. Aut struthion

cum melle delingant. Aut fellis vrsini cyathum bibendum dato. Aut hyperici drachmam vnâ ex vino mulso propinato, vel aquæ mulsæ cyatho vno. Aut helxinæ decoctum ad dies quinq; vel sex cum vino mulso. Aut stercoris canini albi sextantem, cum mellis quadrante ad triduum bibendum dato. Aut lichenas in petris nas-

cen

scentes cum aqua mulsa propina. Aut lichenis in tegulis vel lapidibus nascentis drac. 1. ex meraco propina. Aut nasturtium cū olei cyatho vno bibendū præbeto, radicē verò eius in nares indito. Aut absinthii cochlearia. 4. anisi cochlearia. 3. exhibeto ex aceto mulso. Aut oxylapathi siue lapathi radicis tritæ acetabulum, dato ex aqua mulsa: si nō febriat cū vino aut vino mulso. Aut adianti & mentæ & rubiæ parem mensuram in aqua feruefacito, & hemina inde bibendā exhibeto diutius ad solem insolato, ac sitienti & anheloso, quo post acceptum potū exudet. Statim transmutat colorē. Aut adianti & myrrhæ eius dimidiū, ieiuno à balneo exhibeto in vini hemina dimidia. Aut leporis coagulum cū meraco ad dies. 5. vel. 6. præbeto. Aut Scolopendrii drac. 4. ieiunis ex vino ad dies. 5. vel. 6. dato. Aut mentæ & rubiæ ac adianti æquas portiones cum aquæ cyathis duobus propinato. Aut betæ foliorum crudorum drac. 6. myrrhæ obol. 2. cum aqua mulsa ieiunis exhibeto, aut prælotis ac ieiunis cū vini hemina dimidia dato. Aut adianti drach. 1. myrrhæ drach. 2. mentæ drach. 1. in aquæ heminis duabus coquito donec medietas super sit, deinde vbi plurimum deambulauerit probè fricato, & spiritu adhuc sublimiore existente bibendā

dato. Hoc ad biduum facito. Aut cicer erui-
num in aqua sub dio per noctem exponito,
aquamq; bibendā dato, & cicer insuper co-
medendum mane ac vesperi. Inde verò per
triduum absinthium ex aqua mulsa bibant.
Aut cum cyclamini succo purgatis naribus
lauato. Aut herbam Orontium appellatam
coquito, & cū decocto lauato, & decoctum
confestim viride reddes. Aut venā sub lin-
gua secato. Quod si ad nullum horū auxi-
liorum malū cedat, expurgatione per scam-
moniam & exquisita diæta vtantur, atq; ita
ad exercitia progrediantur.

De splenis affectionibus. CAP. II.



Vòd omnes corporis particulæ
familiarē sibiip̄s ex venis tra-
bant humorem, in cōmentariis
de naturalibus facultatibus edo-
cti, in iisdemq; etiam quòd velut fecē san-
guinis, ex qua atra gignitur bilis, hoc viscus
alimentum habet instituti, & vltra hæc me-
moriam tenentes ea quæ incurādi methodo
de Splene sunt dicta, facilè assequemini ea
quæ nūc referētur. Quorum primū & prin-
cipalissimum hoc est, Quod hoc viscus à
natura celerrimè indurari soleat, sanguine
nimirū in venis ipsius obturato, & ob cras-
situdinem neque excerni, neque discuti fa-
cilè potente. Attenuantibus igitur opus ha-
bet

bet pharmacis citra manifestam caliditatē,
 vt ne vehementius incraſſeſcat ſuccus craſ-
 ſus in ipſo obturatus. Quo verò actiones
 ipſius conſeruentur, ex auſteriis aliquid his
 ammiſcetur, quale eſt etiam adſtringentiũ
 genus. Didiciſtis enim in naturalium facul-
 tatum commentariis, Quòd quum omnes
 particulae ſuae conſervationis gratia habeant
 facultates, tum familiarium attractoriam,
 tum alienorum expulſoriã, itemq; aſſimila-
 tricem ſibiipſis eorũ quæ attraxerint, Ali-
 quibus ipſarum inſuper ineſt, per accidens
 magnopere iuuare totum corpus. Ex horũ
 genere eſt & lien, qui ex hepate in ſeipſum
 velut fecem ſanguinis trahit, quemadmodũ
 veſica in hepate bilem, & renes vrinam. Si
 igitur præ imbecillitate eiufmodi ſangu-
 nem ad ſeſe trahere non poteſt, vitioſus hu-
 mor vniuerſo corpori affricatur, Ob id
 itaq; naturalem ipſius firmitatē custodire
 oportet, quò cõueniens ipſi alimentũ attra-
 hat, per quam actionē vniuerſo corpori ad
 humorum bonitatem confert, & generata
 in ipſo recrementa in ventrē demittere po-
 teſt, vnà cum ciborum recrementis excer-
 nenda. Ea gratia igitur valde amara medi-
 camenta ipſi offerimus, quãdamque ipſis
 ex auſteris miſcemus. Quãdam verò ad
 materiam cõmoda, ad ceratorum videlicet

Z s

& malagmatum præparationē, apponimus, quale pharmacū est cera, & resina, & pix, & bitumē, & quęcūq; alia huiusmodi. Iuxta primā autē rationē acetū & acetū mulsum, visceri commoda sunt, vtpote secare & attenuare crassos humores potentia, citra calfactionem. Quemadmodū igitur in aliis particulis ea quę per cataplasmata, aut liquida pharmaca imposita, aut assusa fotu auxiliantur, in alio opere relata sunt: Ita & nunc relictis his quę inflammato spleni cōmodant, eorum solū mentionē faciam quę indurato visceri opitulantur, quod ipsum etiā in medicamentariis libris fecerunt qui ante me scripserunt, propriē eos splenicos appellantes, qui induratā splenis affectionē habent.

Pharmaca potabilia ab Andromacho ad splenicos conscripta.

POtio ad splenicos Antipatri, vt Nilus. Carnis myrobalani drach. 3. hemionitidis herbę, quam quidā asplenū, quidam scolopendrā dicunt drach. 6. corticis radicis capparis drach. 4. costi drach. 4. chamædryos drach. 6. polii drach. 3. radicis cotyledonis drachm. 2. corymborum hederę nigrę grana. 25. ammoniaci thymiamatis drach. 4. feminis hyperici drach. 2. galbani drach. 2. feminis periclymeni drach. vnam, aut radicis drach

drachm.3.nasturtii nigri sesquidrachmam,
 succi fructus scillæ drach.16. Dantur oboli
 duo in aceto mulso. Aliud splenicis po-
 tabile. Glandis vngentariæ drach.4. he-
 deræ albæ grana.24.costi drach.2. seminis
 periclymeni drach.2.hyperici drach.vnam,
 alii drach.4.galbani drachm.vnam,obol.2.
 nasturtii drac.4. Excipe succo scillæ cocto.
 Dato fabam græcā in aceto mulso. Aliud,

Carnis myrobalani drachm.3. hyperici
 drach.6.seminis periclymeni drach.6. radi-
 cis dauci drach.6.rubiæ,acori,phu pontici,
 croci,singulorum drachm.6.iunci odorati
 drach.tres,Mei drach.6. nasturtii, chamæ-
 pityos,radicis capparis,singulorum drac.6.
 polii drachmas.6.alii drach.tres,ammoniacy
 thymiamatis drach.tres,cum aceto mulso
 pastillos duorum obolorum ponderis for-
 mato,& vnum in aceto mulso dato. Facit
 & ad hepaticos,& hydropicos. Aliud fa-
 cit ad splenicos. Trixaginis drach.qua-
 tuor,polii drach.5.chamæpityos drac.qua-
 tuor,rubiæ drach.5.ammoniacy thymiamat-
 is drach.tres,artemisiæ drach.tres,myro-
 balani drach.quatuor,corticis radicis cap-
 paris drachmas tres,aristolochiæ drach.6.
 tragacanthæ drachmas duas,cum aqua in
 pastillos triobolares redigito,ac dato ex
 aceto mulso. Aliud Stomacho cōmodum.

Vtere

Vtere etiam ad omnem affectionē splenis, facit & ad conuulsa, inflata, & vitia muliebria. Myrrhæ drach. 4. nardi Indicæ drac. 4. corticis radicis capparis drachmas. 4. costi drach. 5. radicis panacis drac. 4. radicis peucedani drach. 4. dictamni drachmas. 4. polii drac. 2. corticis radicis periclymeni drachmas. 4. rubiæ drach. 3. & dimidiam, ammoniaci thymiamatis drach. 4. & dimidiā, aliqui etiam iridis drac. 4. & dimidiam. Excipe aceto mulso, præbe obol. 2. in aceto mulso. Aliud Splenicis, orthopnoicis. Struthii, scillæ assatæ, panacis, radicis capparis, singulorum drac. 5. crocomagmatis drac. 2. & dimidiam, excipe aceto & præbe in aceto scillitico. Aliud, Struthii, corticis radicis capparis, trixaginis, panacis, singulorum drach. 10. fructus myricæ drach. 3. Excipe aceto scillitico, & drachmā. i. ex aceto scillitico exhibeto.

*Pharmaca potabilia ab Asclepiade, ad
Splenem conscripta.*

Cynoglossi manipulum cum vini cyathis. 3. terito, & expressum liquore ante cibum bibendum dato, facit & succus persæ. Colligere autem oportet herbā sinistra manu ante solis exortum. Aliud. Trixaginis manipulum cum vini sextario vno
co

coquito, & expressum liquorem reponito,
atque ex eo cyathos. 2. ante cibum dato.

Pharmacum insperfile Splenicis. My-
ricæ fructum tustum & cribratum reponito.
Vfus verò tempore cochlearia. 2. cum aceti
mulsi diluti cyathis. 3. dato. Aut herbam
pelargitin appellatam tustam ac cribratam
dato vt prædictum est. Aliud, Asini aut
equi syluestrium lienem siccatum tundito
ac reponito, & cochlearia. 2. cum vini diluti
cyathis. 3. exhibeto. Catapotium Sple-
nicis. Corymborū hederæ albæ grana*. 3. * Aliàs. 6.
deuoranda præbe, & aceti mulsi cyathos. 3.
insuper bibendos. Catapotium Andreæ
pæonium dictum. Myricæ fructum tustum
& cribratum galbano excipe, & in catapo-
tia redige, eaquæ pro viribus exhibe. Pa-
stillus splenicus tumorem eliquat. Fru-
ctus ericæ drach. 4. piperis albi, nardi Sy-
riacæ, ammoniaci thymiamatis, singulorū
drachm. 2. Arida tunduntur & cribrantur,
ammoniacum aceto scillitico dissoluitur,
& aridis additum in pastillos cogitur, fiunt
autem pastilli drachmæ pondere, daturque
drach. 1. ex aceti mulsi cyathis. 3. Qui phar-
macum hoc tradidit, dixit porcellum ad tri-
dum hoc bibisse, & postea resectum, sine
liene inuentū esse. Alius splenem tamen-
tem eliquans & consumens. Ammoniaci
thy

thymiamatis, foliornm rubi tenerimorum,
vtrorumq; drac. 8. corticis capparis drac. 4.
myricæ fructus, herbæ aspleni quæ & sco-
lopendrium & hemionitis dicitur, vtriusq;
drach. 2. nuclei scillæ assatæ & purgata, pi-
peris albi, vtriusq; drach. 2. Excipe aqua &
redige in pastillos, atq; exhibe drach. 1. cum
aceti mulsi cyathis. 3. Chrysermi pastil-
lus, splenicis, hydropicis, Cit vrinam, mollic
aluum. Scillam magnam luto oblitā assato,
& corticem detrahito ac quod ad fundū est
durum, ex nucleo verò libras. 2. accipito, se-

* *Græco* minis dauci * drach. 8. hoc est vnciam vnā,
di. habent anisi, seselis, radicis panacis, iridis, singulo-
3 *β* *α* *φ* *ο* *ρ*. rum tantundē, seminis vrticæ, baccarum ce-
dri, vtrorumq; drach. 12. myrrhæ drach. 4.
erui moliti chœnicem. Vini odorati quod
fatis est. Subacta in pastillos redigito. Da-
tur drach. vnam, cum aceti mulsi cyathis. 3.

Alius Eugerasiæ. Scillæ assatæ depu-
rata minas. 2. radicis bryoniæ minas. 8. pi-
peris albi tantundem, petroselini tantundē,
seminis dauci cretici tantundē, erui moliti
tantundem, cedridū, hoc est, cedri baccarū
sextarios. 6. aceti bessē, iridis, radicis pa-
nacis, myrrhæ, singulorum quadrantē. Vini

* *Drac. 1.* falerni quantum satis est his in pastillos co-
habēt vet. gendis, formatos autem pastillos in vmbra
sol. resicca, & * vnciam 1. cum vini diluti cya-
this

his tribus exhibe.

Epithemata & emplastra eiusdem Asclepiade ad recentes splenis inflammationes.

Foliorum tenerrimorū arboris sambuci lib. 3. aloës lib. 1. cum aceto subigito, & linteolo infarcta imposito. Aliud, Ericæ fructus semissem, galbani lib. 1. alii semissem, fructum tundito ac cribrato, atque ita galbanū addito, ac diligenter misceto, atq; in linteolum impacta imposito. Pharmacum Idiotæ accommodatum. Visci quercini lib. * 1. calcis viuæ lib. 1. viscum in ** Vet. cod. habent li-* vas fictile coniectū ac prunis appositū dissoluito, & dissoluto calcem viuā inspergi- *bras. 2.* to, misceto, & calidum albæ pelli infarctum imposito. Oportet autem cum adhærente adhuc pharmaco lauari, atque ita sinere donec sua sponte cadat. Curam item habere oportet vt disparatæ splenii partes refecentur. Aliud, Visci quercini lib. 1. calcis vnc. * 1. floris lapidis Asii trientē, cedriæ vnc. 1. * *Aliàs se-* preparato pro more, ac vt ere quotidie au- *missum.* ferens pharmacū, & spongiis calidis fouens locos, rursusq; imponens. Hoc pharmacum vrinā mouet. Malagma auri colorē referens, valde cōmodū. Cera, resinæ pinus & frictæ singulorū libras. 2. arsenici, aluminis scissi, calcis viuæ, singulorū sextantē. aceti, olei, vtriusq; cyath. 8. Apparato pro more.

Aliud

Aliud valde generosum, quo vsus est Andromachus. Cera, resina pinus, picis Brutiae aridae, singulorum lib. 2. arsenici, aluminis scissi, calcis viuae, singulorum sextantē, acethi cyath. 8. praepra pro consuetudine. Facit ad splenicos, hydropicos, & ad praecordia distenta. Facit & ad Ischiadicos, arthriticos. Nos ad pharmacum hoc apposuimus myrrhae sextantem & vnciam dimidiā, visci trientem.

*Ad induratas splenis affectiones, Vsus est
Tryphon Gortyniates.*

FOeni graeci moliti, sinapis, mannae thuris, singulorum sextarium vnum, retributorū à myrobalano expressa reliquorum sextarium dimidiū, spumae nitri quadrantem, tenuissime trita ac mixta, cedria cocta excipe, vt emplastri liquidi habeant spissitudinem. Vsus eius est per interualla, pharmacum autē impositum fasciis complecte & oblige. Tēpus imponendi est ante balneum, quantū possibile est ægrum ferre, postea verò obligatum adhuc in balneum inducito, & pro reliqui corporis curatione in solium demittito, atq; ita in aqua fasciam resolutito. Aliud ad splenicos per vnam diem sanans. Verū supra pharmaci impositionem per tres dies certo viuendi modo vtimur. Myrrhae, mannae thuris, vtriusque
qua

quadrantem, sinapis Alexandrini, nasturtii, vtriusque sextantem, aceti scillitici quod satis est. Sinapi & nasturtium tundito ac cribrato, mannam verò & myrrham dissoluito, eisque arida addito, & simul aceto subacta ad malagmatis formam reducito, & à secunda hora vsque ad nonam imposito. Postea verò duabus fasciis obligatum in balneum inducimus, atque vbi laxatae fuerint in calidæ solium demittimus. In solio verò longiori temporis spacio moretur, cruribus extra aquam emotis. Ne verò in animi deliquium delabatur, acetum & pulegium odoret, & fascias paulatim resoluat. Egresso porrò è balneo salsamentum citra panem exhibendum est, & vinum mari mixtum. Sequenti die eadem offerenda sunt. Tertia verò gymnasijs utendum quæ spiritum acutum reddere valent.

Aliud Arii Tarsensis. Vsus est per intervalla. Ficuum pinguisimarum, sinapis radicis capparis corticis, singulorum lib. vnam, aceti quantum satis est. Aliud Diodori. Sinapis, nasturtii, fœni græci, seminis lini, retrimetorum ab expressa myrobalano reliquorum, singulorum drach. octo. Excipe cedria cocta aceto scillitico ammixto. Vsus est ante balneum, pharmacum bonum est, & post usum sanguinem mingunt.

Aa

*Pharmaca ab Asclepiade in quarto exter-
norum conscripta, ad splenicos, &
hydropicos. Quæ iuxta di-
ctionē eius sic habent.*

E Pithema splenicis, tumorem eliquat.
Foliorum tenerorum sambuci libr. 3.
aloës pinguis lib. vnam, terito cum aceto,
& linteolo excepta imposito. Aliud,
Fructus ericæ lib. vnam, galbani lib. vnam,
fructum tundito & cribrato ac galbano ex-
cipito, rursusq; tundito vngenti Irini fece
admota, quo ad malagmatis formam redi-
gantur, deinde linteolo infarcta imposito.

Malagma ad splenicos. Myrobalani cor-
ticum tusorum cribratorum minam dimi-
diam, & retrimentorum ab expressio succo
eiusdem residuorum tantundem, ceræ drac.
sex, resinæ terebinthinæ drach. 32. galbani
drach. decem, irini parum. Arida cum liqui-
dis committito. Aliud valde præclarum.

Farinæ myrobalani quadrantem, nitri
vnciam vnam, alii vncias quatuor, ceræ se-
missem, terebinthinæ bessem, aceti quod
sufficit, splenem eliquat. Malagma ex Ce-
dria splenicis, hydropicis, medicamentum
accommodatum. Vrinā cit multam, & sple-
nem eliquat. Oportet autem vnā cum phar-
maco lauari, & quod ab eo disparatum est,
à splenio videlicet de corporis cuticula, de-
sec

secures. Sinēdū enim est adhārescens phar-
 macum, donec sua sponte dilabatur. Com-
 positio hāc est. Visci quercini lib. i. calcis
 viuae semillem, floris lapidis Asij trientem,
 cedriaē quadrantē. Viscum ærea patina co-
 quito, & postquam fuluum factum fuerit,
 cedriam adiucito, asidueq; moueto ac arida
 trita inpergito. Deinde ab igne ablata ali-
 qualiter frigefieri finito, atq; in pellem al-
 bam à spina appellatam infarcta affectis lo-
 cis imposito, & vnā cum pharmaco lauare
 iubeto, donec splenium sua sponte dilaba-
 tur. Oportet tamen vt prædictum est dispa-
 ratas splenii partes defecare. Aliud valde
 præclarum. Floris lapidis Asij sextantem.
 lapidis gagatæ vnci. vnam, calcis viuae bes-
 sem, visci quercini lib. vnam. Præpara ac vte-
 re vt dictum est. Malagma Anthiochi-
 dis, ad splenicos, hydropicos, Ischiadicos,
 arthriticos, præparatum est Fabulæ. Ce-
 ræ lib. tres, resinæ terebinthinae lib. tres, re-
 trimentorum ab expressa myrobalano re-
 liquorum lib. vnam, spumæ nitri lib. vnam,
 floris lapidis Asij lib. vnam, ammoniaci thy-
 miamatis libram vnam, olei cyprini libras
 tres. Acetum ad ammoniacum dissoluen-
 dum. Aliud Fabullæ compositum valde
 præclarum, ad easdem affectiones. Myr. * Hæc ex
 rhæ stactæ libras duas, * bdellii onychis *ret. cod.*

lib. 2. medullæ ceruinæ. libr. 2. ammoniaci
 thymiamatis lib. 2. iridis siccæ lib. 2. Jopo-
 panacis lib. vnam, galbani lib. vnam, masti-
 ches lib. vnam, floris lapidis Asii lib. vnam,
 styracis lib. 1. succi sycomororum lib. vnā,
 canchryos lib. vnam, piperis albi semissem,
 ceræ lib. 5. terebinthinæ lib. 5. pharmacum
 est tusile, id est, quod cōtunditur. Oporter
 autem tundentes vngenti Irini fecem ad-
 mouere, donec quā mollissimum pharma-
 cum reddatur. Repositum enim mollissi-
 mum euadit. Malagma quod aurei colo-
 ris appellamus. Auripigmenti vnc. 1. alu-
 minis scissi sextantem, calcis viuæ sextantē.
 Arida tundimus ac cribramus, & in morta-
 rium coniicimus, hisq; aceti cyathos octo,
 superfundimus, & probè trita liquidis exci-
 pimus. Sunt autem liquida hæc. Ceræ lib.
 * His ad- duas, resinæ frictæ lib. 2. pinus libr. 2. * hæc
 dit vetu. friges fieri post eliquationem sinimus, & sic
 cod. olei cō erasa tritis adiicimus. Nos ad pharmaci præ-
 munis cya parationem etiam myrrhæ sextantem appo-
 thos octo. suimus. Aliud, hoc est vsus Andromachus.
 Facit splenicis, hydropicis, & ad præcordia
 distenta. Facit item Ischiadicis, Arthriticis,
 & ad inueteratas affectiones. Ceræ librā
 vnam, picis brutiæ lib. vnam, pro resina fri-
 cta, picem addimus, olei cyath. octo, auri-
 pigmenti auricoloris sextantem, aluminis
 scis

scissi sextantem, calcis viuae sextantē, præpara
 ra vt dictū est. Nos ad pharmacū etiā myr-
 rhæ sextantē, & visci quercini trientē appo-
 suimus. Ad inueteratas induratas splenis
 affectiones. Authemerom ab eo quod per
 vnam diem curat appellatum. Oportet au-
 tem cum pharmaci impositione ægrum ad
 triduum conuenienti diata vti. Myrrhæ,
 mannæ thuris, vtriusque quadrantem, sina-
 pis Alexandrini sextantem, nasturtii sextan-
 tē, aceti scillitici quod satis est. Arida tun-
 dito & cribrato, & cum aceto ad malagma-
 tis formam subigito, & linteolo excepta ab
 hora secunda vsq; ad nonā imposito, ita vt
 complectaris & contineas incumbens ma-
 lagma fasciola obligata. Deinde verò ita
 obligatum in balneum mittito, & vbi pro-
 pè laxata fuerit, in solium desidere facito, &
 pedes extra solium extendere iubeto, ac lon-
 giori tempore in ipso immorari. Cæterum
 ad reuocandos in animi deliquiū collapsos
 acetū cum pulegio naribus admouemus, &
 paulatim resolvere fascias tentamus. Sint
 autem duæ fasciæ malagmati incumbētes,
 quū enim fasciæ tollūtur, auferimus etiam
 incumbens malagma, & post affectos locos
 sufficiēter fouemus. Egresso de balneo sal-
 samētū citra panē exhibemus, & vinū marī
 mixtum. Idem etiam sequenti die facimus.

Et tertia similiter, insuperq; gymnasiis utimur quæ spiritum acutum reddere possunt.

*Aliud Tryphonis Gortyniatæ Cretensis
pharmacum accommodatum.*

FOeni græci moliti sextariū vnum, re-
trimentorum ab expressa myrobalano
reliquorum sextarium dimidium, spumę ni-
tri quadrantem. Omnia trita cedia excipe.
Verū hanc prius coctam condensare opor-
tet ad cerati spissitudinem. Vsus est ante
balneum, quantum ager ferre potest. A bal-
neo cerotarium imponimus. Aliud Au-
themerō inscriptum, liberat ab affectione.

Pyrethri drach. 20. myrobalani bessem,
nasturtii bessem, seminis vrticæ bessem, pi-
peris bessem, sinapis sextariū dimidium, o-
mnia trita & aceto subacta per intervalla
imponito ad horas tres si eger tolerare pos-
sit. Deinde ablato pharmaco lauari iube. In
balneo verò cerato vtēdum est ex rosaceo
apparato. Aliud tumorem liquefacit.
Floris lapidis Asij, nitri rubri, retrimentorū
expressæ myrobalani, ammoniaci thymia-
matis, singulo. drac. 24. corticis radicis cap-
paris drach. 8. seminis raphani drach. 10. aut
succy cyathū vnum, aceti acerrimi quod sa-
tis est, visci quercini drach. 40. ammoniacū
sambuci succo, aut myricæ, aut trifolii dis-
solue, Arida verò tunde & angustissimo cri-
bro

bro ex cute, ac aceto subige, indeque ammi-
xto visco omnia simul contunde, & vtere.

*Pharmaca ad splenicis ab Archigene in
primo medicamentorum secun-
dum genus conscripta.*

IN splenicis porrò pracedente similiter
tota diætā, ex describendis compositio-
nibus his vtitor. Potus quidem sit aqua in
qua ignitum ferrum sæpe sit extinctum, nō
febrientibus cum vino. Febricitantibus ve-
rò aqua sola. Aut anagallidis ceruleū flo-
rem habentis obolum vnum exhibeto cum
aceto mulso. Aut serpillum cum aceto. Aut
panacis radicem viridem cum aqua mulsa.

Aut semen similiter. Aquam mulsam ve-
rò per noctem sub dio exponito. Aut cor-
ticis radicis periclymeni & seminis eius quā-
tum tribus digitis apprehendi potest, in vi-
no albo meraco calido ieiunis bibēdum ad
dies 40. exhibeto. Aut vulpis hepar fic-
cum cum aceto mulso exhibe bibendum.


Aut cuminum Aethiopicū similiter vt he-
par ex aceto mulso. Aut radicis ari corti-
cis drachmā dimidiam cum aceti mulsi cya-
this 3. Aut polium similiter cū aceto mul-
so. Aut hederæ albæ grana tria cum ace-
ti mulsi cyathis 3. Aut arida trita cappa-
ris folia propinato. Cataplasmata autem
eadem impones splenicis quæ hepaticis,

Aa 4

Ampliusq; cinerem ex ferraria officina cum aceto. Aut capparim maceratam aceto ac tritam cerato cyprino exceptam. Aut nasturtium & fœnum græcum, ac calcem viuam, & nitrum, cum inelle mollita imposito. Aut fœnum græcum, & calcem, ac nitrum, item cum melle imposito. Aut lepidii folia imposito. Quū verò iam morsum perceperint in balneū inducito, & ablato pharmaco in feruidæ soliū demittito ac detineto, Aegrè enim ferunt nimiam mordacitatem, verū sani exeunt. Idem etiā in Ischiadicis facit. Aut myrobalani expressę retrimētū aceto maceratū, rosaceo cerato excipe ac impone. Aut fœni græci & nasturtii par pondus, mannæ duplum, calcis viuæ parum, cum melle splenia velut emplastra facito ac imposito. Aut fecem acris aceti imposito. Aut capparis radicem cum aceto. Aut spongiam acerrimo aceto imbutā. Egregiè faciūt myrobalani cortices, & nitri tertia ipsorum pars, trita aceto subigito, & resinam ac ceram cum modico oleo liquefacta affundito, & mollitis vtitor. Perseuerante malo cucurbitas cum scarificatione affigito. Amuleta autem, & per contrarietatem quandam naturalem ad hepar & splenem facere credita, hæc sunt. Venam retro sinistram aurem secato, & detracto sanguini

guine affectum splenem confricato.

De hydropese sine aqua inter cutē. CAP. III.



Ydropicorum medicamenta, & alia cōmunia ad splenicos ipsos, itemq; quædam multiplicis vsus, ad varias affectiones, tū iam prædictas, tum duritias & vbi quid discutere oportet, etiam si iam purulenta sit compages, dicere aggrediar, initio ab his quæ Asclepiades tradidit sumpto.

Pharmaca ab Asclepiade conscripta ad prædictas affectiones in quarto externorum, quæ Marcellæ inscribit.

EPithema hydropicis valde cōmodum, quod adiacentem humorem absorbet. Farris, quod zeam vocant, moliti sextar. 2. floris lapidis Asij sextar. 1. mannæ libr. vnā. Probe trita adipe suillo veteri probe subactō, & vino per integram noctem macerato, excipito. Sit autem tanta adipis copia quanta ad molle faciendum pharmacū satis est. Aliud, Besasa: est autem semen rutæ syluestris quod in Syria nascitur, & vernacula lingua Harmala ab illis appellatur: huius tusi sexta. 1. mannæ sextarium dimidium, adipis suilli veteris quantum sufficit, præparato vt dictum est. Aliud, Fi. * Spumæ cum pinguisimarū lib. 3. * origani lib. 1. nitri vet. Quidam cumini lib. 1. sulphuris viui quæ. cod.

Aa 5

drantem, cochlearū Affricanarū lib. 1. Arida tundito & cribrato, & tufis ficubus vnā cū carne cochlearū excepta, ac in linteolum infarcta imposito, melle cocto sufficienti addito. Aliud ex Critone. Fœni graci moliti ac cribrati sext. 2. sulphuris viui lib.

* Hæc ad 2. & dimidiā. * in aliis lib. 2. nitri lib. 2. abdit vetu. *finthii sicci contusi sextar. 2. & dimidium.]*
cod. Arida tenuissimè trita melle cocto excipito, Inde q; linteolo infarcta per noctem im-

posito. In die vttere & gestatione, & confectione subscripta. * Ceræ lib. 1. picis aridæ lib. 1. lapidis asij lib. 1. olei veteris lib. 1. *huic loco* arida cū liquidis misceto.] Malagma Ipoterium inscriptum. Resorbet humiditates ex alto, & duritias dissoluit. Ceræ, picis aridæ, vtriusq; lib. 2. aluminis liquidi, sulphuris viui, mannæ, nitri rubri, sing. lib. 1. resinæ frictæ li. 4. olei veteris heminā 1. aceri quantum satis est ad arida dissoluenda. Præpara ac vttere vt probato. Aliud præclarū Ipoterium pharmacū accommodatū. Facit hydro- picis, splenicis, & ad inueteratas affectiões. Resinæ frictæ libr. 4. ceræ libr. 2. sulphuris

* Mannæ viui lib. 1. * picis liquidæ lib. 2. aluminis li-
 libr. vnā, quidi lib. vnam, nitri rubri lib. vnam, Aristo
addit vet. lochiæ quadrantem, bdellii quadratē, amo-
cod. mi racemi quadrantem, radicis cucumeris
 syluestris quadrantem, aloës semissem py-

rethri quadrantē, ammoniaci thymiamatis
quadrantē, visci quercini quadrantē, succi sy-
comororū quadrantē, aceti sesquiseptariū.

Aut pro aceto vini Italici tantundem, olei
heminas tres, præparato pro more. Ma-
lagma ex baccis lauri, ad splenicos, hydro-
picos. Dissoluit omnē duritiā, absorbet ab-
scessus in profundo. Cerae lib. i. resina pi-
nus lib. i. picis Brutiae lib. i. baccarum lauri
ficcarū lib. vñā, nitri rubri lib. vñā, ammo-
niaci thymiamatis lib. i. adipis vitulini sub-
acti lib. i. arida tundito & cribrato per an-
gustissimum cribrū. Liquefabilia liquan-
tur & frigefacta aridis adiiciuntur, atque ita
cōtusis simul ac repositis utimur. Aliud,

Baccarum lauri lib. i. picis lib. i. mannæ
lib. i. adipis taurini lib. i. ammoniaci thy-
miamatis lib. i. cerae lib. vñā, præparato ut
prædictum est. Emplastrū tonsoris appel-
latione, ad splenicos, & hydropicos. Hoc
tonsor quidam vir Bithyniēsis vsus, ischia-
dicos à coxendicum morbo penitus libera-
uit. Picis aridae lib. 4. cerae lib. 2. resina pi-
nus lib. 2. ammoniaci thymiamatis lib. 2. ni-
tri rubri lib. 2. *adipis taurini lib. i. In alio ^{*Baccarū} lauri ari-
exemplari etiā iridis lib. 2. habetur, cāchryos darū lib.
vñc. 18. farinae fœni græci sextarius i. pol-
linis sextar. i. radice chamæleonis nigrae dit vet.
tenuissimè tusa sextar. i. cumini tenuissimè cod.

triti

triti sesquiseptarius, passi sextar. i. In alio
 exemplari anisi triti sextarius dimidius ha-
 betur, & pollen deest. Aliud Bithynum
 appellatum, pharmacum accommodatum
 ad prædictas affectiones. Picis Brutiae lib.
 4. resinæ pinus, cere, ammoniaci thymiamatis,
 singul. lib. 2. medullæ ceruinæ lib. 1. adipis
 taurini subacti, lib. 1. succi sycomororū
 lib. 1. floris lapidis Asii semissem, radicis cha-
 mæleonis cōtusæ semissem, baccarum lauri
 siccarum libram dimidiam, farinæ loliaceæ
 lib. dimidiam, seminis dauci Cretici contusi
 trientem, petroselini trientem, cumini Ac-
 thiopici trientem, anisi trientem, salis hispa-
 ni sexuncem, aphronitri sexuncem, cyprini
 sexuncem. Vini falerni quod satis est. Arida
 cum liquidis pro more apparato. Mala-
 gma ex seminibus, pharmacum accommoda-
 tum ad prædictas affectiones, hoc vsus est
 Olympius. Ceræ drac. 100. terebinthinæ
 drach. 100. ammoniaci thymiamatis drach.
 100. adipis taurini drac. 100. anisi drac. 100.
 *Aliàs 50 foeni græci drac. 100. petroselini drac. *100.
 ammi, iridis Illyricæ, vtriusq; drach. 50. pa-
 naxis drach. 50. nitri drach. 50. glycyrrhizæ
 drach. 50. cyperi drach. 25. sabinæ drach. 25.
 sampsuchi drach. 25. meliloti drach. 25. car-
 damomi drach. duodecim, & dimidiam, cas-
 siæ fistulæ drach. duodecim, & dimidiam,
 nar

nardi Celticæ, radicis dauci Cretici, vtriuf-
que drach. 12. & dimidiā. Mellis heminam
& dimidiam. Vini odorati quod sufficit.
Præparapro consueto more. Aliud, Ce-
ræ minam vnā, ammoniaci thymiamatis
minam vnā, terebinthinæ minam vnā,
sampsuchi* minam dimidiam, iridis Illyri-
cæ minæ quartam partem, hoc est drach. 25.
seminis lini tosti minæ quartam partem,
*adipis taurini minæ quartā partem, radi-
cis cucumeris syluestris, anisi, seminis apii,
ammii, cumini, fœniculi, nitri, singulorum
minæ quartam partem, piperis drach. 12. &
dimidiam, mellis heminam, vini sesquihe-
minam, cyprini sesquiheminā, aceti sesqui-
heminam. Composito ac vtitur.

*Hic vet.
cod. addit
baccarum
lauri, cy-
peri singu-
lorum.

*Hic etiā
fœnigræ-
ci, panacis
vtriusque
minæ

quartam
partem.

* Aliās
vncias.

Ex Andromacho ad hydropicos & inflationes.

Picis liquidæ lib. 2. ceræ lib. vnā, nitri
*drac. 6. sulphuris viui sexuncem, alu-
minis sexuncem. Ad hydropicos Cleo-
phanti. Ceræ, resinæ, spumæ nitri, singu-
lorum drach. 100. galbani drach. 12. & dimi-
diam, propolis drach. 12. & dimidiā, ammo-
niaci thymiamatis drach. 12. & dimidiam,
cyprini cyathos duos aceti cyathos duos.

Ex Archigenis secundo libro pharma-
corum secundum genus.

HYdropicis diætā ac viuendi modum
cōuenientē cōstitue. Pro cataplasma-
te

re autem stercus bouis armētariæ impone.
 Resicca autem ipsum stercus diligenter, &
 tritū in posca velut crudam hordeaceā fa-
 rinam coque, in spersa sulphuris viui quar-
 ta parte. Cataplasma verò per omnem ven-
 tris amplitudinem impone. Malsa verò ca-
 taplasma ad ipsos præparauit ex elaterio,
 staphide syluestri, hyssopo, felle tauri, æqua-
 libus partibus ipsorum ficubus contusis ex-
 ceptis. Aut radices cucumeris syluestris
 minam vnā in vino coquito, & ficuū mi-
 nam dimidiā similiter coquito, atque hæc
 simul terito affuso eorum decocto, donec
 malagmatis forma euadat, Indeque altheæ
 radices tritæ tantundem ammisceto; simul-
 que coquito ac terito, atque ita imposito.
 Aut caprinū stercus in vrina pueris impubis
 veneris expertis, vel ipsius capræ vrina co-
 ctum ad strimentitiā spissitudinē redigito,
 ac imposito, Egregiè ipsum per aluū pur-
 gat. Aut veratrum nigrum, fel taurinum,
 nitrum, piper, æquis partibus cū melle aluo
 per dimidiæ horæ spatium imposito. Por-
 rò per omne curationis tempus vnā ali-
 quam ex his potionibus ipsis propinato.
 Cotyledonis drach. i. scyllæ aridæ mundæ
 drach. i. in vino mulso diluto quotidie ex-
 hibe. Aut corticis radices Ari drach. i. Aut
 encori, quam aliqui chamelæan appellant,
 tene

teneras eminentias ad calamorū radices na-
scētes exsuccato, ac succi cyathos 3. prædi-
ctis ammixtis quotidie exhibero. Optimè
facit & hoc. Cancrī fluuialis sicci triti, pedi-
bus ac eminētis omnibus amputatis, drach-
vnā, asari drach. 1. misceto aqua ex ipso flu-
mine vnde cancrī extracti sunt accepta, &
propinato. Aliquādo verò pro asaro, opo-
balsami par pondus additur. Aut coralli
drach. 1. aluminis scissi drach. 1. obol. 2. cum
calaminthæ cremore terito, & in pastillos
duorū obolorū ponderis redigito, & obo-
lum inde ex calaminthæ aqua bibēdū dato.
Summe facit & ad nephriticos. Aut radi-
cem calaminthæ coctam propina. Aut sion,
quod lauer Latini dicūt itidem coctū pro-
pina, idēq; etiā edendum exhibe. Aut tri-
buli folia siue radicē cum vino dato. Aut
in balneo cum sale & oleo diligēter, vsque
quo exudent, illitos educito, & solis testi-
bus exudantibus ablutis, primū linteis, de-
inde etiā reliquis amiculis cōtectos curato,
ac panē furnaceū * cum sufficiētibus caricis * Aliquū
edendum dato: vinū verò nigrū Italicum *codices hīc*
aut Spicatū recēs, in quo ficū triens in vini *habēt cum*
sextariis sex, incoctus est, donec tertia pars *africanis*
superfuit, bibēdū exhibeto purgat per vri. *caricis.*
nam. Aut vrina capræ cochlearium vnum
cum nardi drac. 1. calfactum bibendū dato.

Aut

Aut cucumim syluestrē vino nardino vel amineo macerato, & ex cremore ter cyathum vnū bibendum præbeto, & paulatim vsq; ad cyathos tres progreditor. Aut fefeli in potu vel cibo exhibe. Aut daphnoides tritum lupini magnitudine inspergens bibendum dato, Ducit vrinam multā. Aut corticem radicis Ari ex vino. Aut squamæ aris drach. .i. panis medulla excipito, & catapotia facito ac exhibeto. Fortiter aquam ducunt. Aut aris vsti drach. .i. rutæ ramulos tres, stercoris colubæ drach. .i. salis cōmunis parū, cum vino Ephesio & aqua, ita vt tota mixtura * hemina dimidiæ sit, præbeto. Summe faciunt & Theriacæ omnes vrinam cientes. Insuperq; potiones aquam ducentes, quæ unicuique per experientiam cognitæ sunt minimè periculosæ. Similiter & catapotia. Caterum hydropicos diutius ad solem, cōtecto capite, inungito ex oleo multo sale ammixto, & multa falsugine calida perfundito. Inflatos verò maximè locos, vesicis magnis probè inflatis quotidie continenter pulsato, Inde enim arctantur ac cōtrahuntur. Scarificatis item ipsorū talis & vulnusculis impactis, ipsos in ferulo aut lectica gestato ac circūuehito, Multus enim humor hoc modo ipsis profluere solet. Ad easdē affectiones Cōfectio Biēnii.


* Alias
cyathi di-
midij.

Cro

Croci, opii, opopanacis, myrrhæ, iridis,
 acori, mandragoræ, asari, costi, nardi Indi-
 cæ, dauci cretici, mei, singulorum drach. 8.
 piperis albi & longi, gentianæ, stœchadis,
 cassiæ, phu ponticæ, singulorum drach. 8.
 excipe melle.

*De pharmacis dolorem sedantibus,
 anodynis & colicis appellatis.*

CAP. IIII.



Viusmodi pharmacis magni do-
 loris, aut vigiliarũ gratia, aut ne
 per violentam tussim lancine-
 mur, velut in sanguinis reiecta-
 tione & grauibus distillationibus aliquan-
 do contingit, vti solemus. In moderatiori-
 bus tamen prædictis affectionibus, confe-
 ctiones ex seminibus priuatim tussiculares
 appellatæ sufficiũt, quæ & ipse omnino ali-
 quid ex soporiferis seminibus habent: ve-
 rum modicũ inter multa adeò semina, quæ
 odorata & tenuiũ partium ac urinã cientia
 existunt. Appellant autẽ hæc Medici sæpe
 citra appellationis seminis appositionem,
 Cuminũ dicẽtes, & daucum, & seseli, apiũq;
 & anisum. Eiusmodi igitur pharmacorum
 compositiones inter tussiculares appellatas
 cõfectiones sunt relatæ, Verũ dolorẽ sedã-
 tes anodynæq; & colicæ dictæ, quæ eiusdẽ
 quidẽ generis cum illis sunt, multo autẽ fa-

B b

cultatibus illas exuperant, in hoc sermone
ostēdentur. Prima itaq; ex ipsis priscis tēpo-
ribus, vt apparet, celebris fuit quam Philo-
prodidit, & de qua ipse hanc Elegiam fecit.

Philonis Antidotus.

En me Tarsensis Medici prægrande Philonis
Inuentum, mala quod multa dolore leuo.
Siue colum doleas, seu tu iecur, auxiliabor.
Seu lapis infestet, difficile aut lotium.
Et medcor spleni hinc, orthopnœe q; moleste,
Convulsa atque tabem protinus exupero,
Pleuritimq; malam, & spatū vomitumq; cruoris
Euinco, mortis terror & hostis ego.
Viscera tentantes omnes ego sedo dolores,
Interna & quicquid membra dolore quatit,
Tußim, Singultum, destillantesq; fluores.
Sisto, etiam si quid strangulet excipio.
Me dedit ille autor sapienti munera magna
Discipulo, stupidos nil ego curo viros.
Odorum foliumq; pilum pueri cape, cuius
Fulget adhuc campis Mercurij ille cruor.
Pondus ad humanos sensus perpendito prudens,
Dein drachmæ pondi Nauplion Euboicum.
Inde Menœtiadæ occisoris ponito drachmam,
Qui pecoris densis ventribus excipitur.
Viginti & drachmis candentis coniice flammæ,
Et tobidem faha post suis Arcadice.
Et drachmam dictæ falsæ radice, ab ipsa
Terra, pissæ quæ Ioue clara manet.

Quum

Quumq; pion scribes, voci caput amplius addes.

Masculum Achiuorum nominis articulum.

Indeq; post drachmas expense sumito lancis

*Quinque be, atque isthaec prouidus excipito
Natarum tauri textura Cecropidarum.*

Sic mecum Tricæ progeniesq; facit.

In his versibus Philo iubet croci drach. 5. coniici, pyrethri vnam, Euphorbii vnā, spicæ nardi vnam, piperis autem albi & hyoscyami par pōdus, vtriusque drach. 20. opii verò drach. 10. Primi quidem igitur duo versus crocum indicāt, vt qui fuluus colore sit, & tenuis ad formam pilorum. Cruorem autem croci fulgere adhuc in campis Mercurii dicit. Adolefcens enim crocus appellatus cum Mercurio disco ludens, & in curiosius consistens, illapso in caput ipsius disco, statim mortuus est: ex sanguine autem ipsius in terram actō, crocus natus est: fulgere verò cruorem dixit, hoc est sanguinem iam occisi, propter coloris croci splendorem. Scribitur autem non solum campis, sed & herbis in versu, hoc modo, fulget adhuc herbis Mercurii ille cruor. Cæterum pōdus croci drach. quinque, esse vult, quum ad humanos sensus perpendere iussit, qui quinque numero existūt. Quod verò drach. quinque esse velit, & neque obolos, neque libras, neque aliud quicquam tale, per se-

quentia cōmonstrat, primum quidem quum ait, Dein drachmæ pōdo Nauplion Euboicum. Deinde verò & consequenter quum aliis idem drachmæ nomen apponit. Nauplion itaque Euboicum, pyrerthrum vocat. Propterea quod Nauplius magnis pyris incensis, vt aiunt, circa Euboia portum, multos Græcorum decepit, vt perirēt tanquam ad regionem portus bonos habentē applicantes. Id ipsum vero ob Palamedis necem ipsum fecisse tradunt. At verò & Euphorbium similiter his ænigmatice vocauit, quum ait, Inde Menotiadae occisorisposito drachmam. Quandoquidem poëta Patroclum sic loquentem facit.

*Sed me parca ferox, Latona, & filius aufert,
Atque vir Euphorbus.*

Pecoris autem hoc est ouium ventribus excipi & adseruari Euphorbiū ait, propterea quod hos solos nō corrumpit, & ob hoc in his reponi pharmacum potest. Est porrò Euphorbium plantæ cuiusdam spinosæ in Maurusiorum terra nascentis succus, facultate calidissimus, & de ipso libellus paruus scriptus est Iubæ regi Maurusiorū. Consequenter verò Philo ait, Viginti & drachmas candentis coniice flammæ, piper album per hoc significans. Est autem stomacho cōmodius & acrius quàm nigrum. Viginti
insu

insuper drachmas seminis hyoscyami iniicere iubet, * quod etiā enigmaticæ descri- * Sic vet. bēs ait, Totidē fabæ suis Arcadicæ,] *Quan cod.* do quidem aprum Erymanthium Hercules occidisse fertur, qui in Arcadum terra fuit connutritus. Quin & nardi ipsius drach. i. coniiciendam censet, quam radicē falso dictam appellat, quandoquidem spica nardi verē nominatur, Vult autē eam Creticam esse, quū ait, ab ipsa Terra pissæo quæ Ioue clara manet. Quādoquidem fabularū scriptores Iouem in dictæo Cretæ monte educatum aiunt, occultatum ibidem à matre Rhea, ne & ipse à patre Saturno deuoraretur. Apposuit autem Ioui epitheton pissæi, quemadmodum multi etiam extra poëticam, in cōmuni sermone dicere solent, per Aesculapiū Pergamæum, per Dianā Ephesiam, per Delphicū Apollinem, per Vestam Eleusinam. Quidam verò non Creticā terram, sed Indicam indicatā esse aiunt, ex qua ebur affertur, ex hoc enim statuam Iouis in Pissā factam ac formatam esse. His omnibus & papaueris succum ammisceri iubet, qui recepto à medicis more priuatim opiū appellatur, quum nullus aliorum succorum quantumuis multi sint in neutro genere: opium videlicet, nominetur, Quando igitur ipsum nomen opion, ex voce. o. &. pion.

componitur, ob id sanè inquit.

Quumq; pion scribes, voci caput amplius addes,

Masculum Achiuorum nominis articulum.

Indeq; post drachmas expense sumito lancis.

Quinque bis, &c.

Hoc est iniice & opii drach. 15. Superest postremum quo omnia hæc trita excipiuntur, ipsum Mel, itidē coniecturaliter ab ipso appellatum, Natarum tauri textura, quādoquidem ex putrescentibus tauris apes generari tradunt. Quod autem Atticū ipsum Mel esse velit, ea gratia addidit, Cecropidarum, hoc est, Atheniensium. Cæterum per extremum versum ostendit etiā Asclepiadas hoc pharmacum sic præparare, Ex Tricca enim generis sui originē ducunt, ex quorū ordine & poëta est. Hæc fermè prima antidotorū dolores sedantiū celebris facta est. Iuxta hæc autē aliis partim ad ipsam appositis, partim detractis, aut apponderationibus permutatis, posterius magnum antidotorū dolores sedantiū numerū fecerūt, quas etiam colicas vocant, denominatione ab affectione quæ maximos dolores habet deducta. Ego verò primū quidem generales cōponendi ipsas modos referam, deinde velut consueui, etiā particularium materiarum seriem quantum latissimè se expandit
sub

subscribam. Opium itaq; fortissimū est ex his quæ sensum stupefaciunt ac somnū soporiferum inducūt. Operatur autē hæc etiā solum sapa dilutū, deinde tomēto exceptū ac sedi inditū, itemq; fronti ac naribus illitum. Si verò cū alio quopiā vini ipsius moderante misceatur, moderatius hæc facit. Verūm quæ ammiscentur ipsi, aut cōcoquere, aut mitigare dolorosam affectionē oportet, aut humores affectionē efficientes discutere, aut secare, aut attenuare, aut iuxta totam substantiam alterare. At verò neque ignorare nos puto optimū esse compositionis scopū, qui trium cōiectationi sit intentus: Nimirum vt & sensus stupefat, & nulum in posterū inde circa particulam detrimentum permaneat, ampliusque vt affectio ipsa maximè inde iuuetur. Ad hæc igitur respiciens Philo mihi videtur hoc pharmacum de quo iam proposuimus dicere, composuisse, Ex opii quidem & hyoscyami mixtura somnum soporiferū, & sensitivæ facultatis stuporem inducere volēs. Quo verò citius distribuerentur, & totum affectuum partium profundum penetrarent, calfacientia ammiscuit, pyrethrum, & euphorbium, & piper, quæ nocentes humores discutere possunt, & extergere viscosos, ac secare crassos, & ventosos flatus attenuare

ac euacuare. Est autem non modica conco-
ctoria vis omniū frigidarū affectionum in
nardo sita, Verūm Creticā nardum iniicere
non oportet, neque omnino eam quæ apud
nos nascitur, quam montanā & herbā Nar-
diten magis quā nardū appellant, Est igitur
Celtica nardus optimum pharmacum,
efficiens quæcunq; etiā Indica cardus solet,
Verūm ab ipsa viribus deficit, velut etiā à
Celtica, Montana, Quemadmodū autē ex
aromaticis appellatis medicamentis Philo-
sola nardū iniecit, Sic posterialius aliud
apposuit, aliqui autē plura. Quæ verò appo-
nuntur sunt, flos iunci odorati, & cassia, ci-
namomum, amomū, & costus. Quemadmo-
dum autem rursus crocū addidit, crudorū
humorum concoctoriū, itemq; affectionū
medicatarum, Sic alii myrrham & castoriū
amiscuerunt. Plurimi autē ex ipsis, neque
male in hoc facientes, & hæc familiaria se-
mina, de quibus etiam antea in cōfectioni-
bus ex seminibus cōstātibus dictum est, ad-
diderunt: quo videlicet amarorū medica-
mentorum iniucunditatē mitigent, & totū
pharmacum ad distributionē & urinæ pro-
pulsionem instigent. Si verò & humorum
crassitudo attenuari expetat, etiam hoc
ipsum faciunt, Dico autem apii semē, cumi-
ni, dauci, petroselini, anisi, & quæcunque
eius

eiufmodi exiftunt. Apponam igitur iam & copiam ac feriem particularium materierũ à prioribus medicis vfu ac experientia cognitarum.

*De colicis pharmacis ab Andromacho
conſcriptis.*

PRima itaq; iptarum in hæc verba ſcripta eſt. Colica Caſſi. Anifi drach. 6. ſeminis apii drach. 12. nardi drach. 4. alii drach. 6. caſtorii drach. 3. petroſelini drachm. 4. alii drach. 3. piperis albi drach. 5. & longi drach. 5. myrrhæ drach. 6. iunci odorati drach. tres, ſucci papaueris drach. 6. croci drach. 3. Excipe melle cocto. Quidam etiam cinamomi drach. 1. aut caſſiæ drach. 2. Datur ad ſummum nucis regiæ parvæ magnitudo ex aquæ calidæ cyathis. 3. minimum nucis ponticæ magnitudo. Colica ſecũda ab Andromacho ſcripta hæc eſt. Colica Caſſii, vt Criſpus. Facit & foris impoſita. Anifi drach. 12. ſeminis apii drach. 24. nardi Indicæ tantundem, caſtorii drachm. 6. ſeminis petroſelini drach. 16. myrrhæ drach. 12. piperis albi drachmas. 12. & longi drachm. 10. iunci odorati drach. 6. opii, croci, caſſiæ ſingulorũ drachmas. 12. coſti, acori, vtriuſque drach. 6. Excipe melle cocto. Præbe nucis ponticæ magnitudine ex aquæ calidæ cyathis. 3. Hæ igitur præſcriptæ duæ confectiones ex me-

Bb 5

dicamentis de quibus paulò ante dixi compositæ sunt. Quæ verò deinceps sequitur, qua se vsum esse ipse ait, habet etiam alia quædam præter priora, eiusdē generis cum opio & hyoscyami semine existentia, velut malorum mādragoræ succū, aut qui ex radice ipsius expressus est, & succum cicutæ, Habet item phu ponticū, quod partim nardo celticæ, partim petroselino & vrinā cientibus seminibus simile existit. At verò sylvestris brassicæ semen ex maximè attenuatoriis est, & quæ multum siccare ac discutere possunt. Ex vrinā cientibus est & Meon, & asarum. Illyris verò quam neq; nominavit iridem Illyricā, concoctoriū est & attenuatorium pharmacum. Stœchas autem à putrefactione vindicat & attenuat. Ipsum pharmacum autē sic describitur. Colica Tullii qua vtor. Succī malorum mandragoræ drachm. 8. aut succi radiceis eiusdem drach. 10. phu pontici drac. 8. seminis brassicæ sylvestris drac. 8. succi cicutæ drac. 16. costi, piperis albi, & longi, myrihæ, opii, singulorum drach. 8. opopanacis drach. 6. stœcadis, seminis dauci, Mei, asari, singulorum drach. 12. cinamomi, illyridis, acori, singulorum drach. 8. Sequitur post præscriptas Colica Abascanti, quam apud me consonam reperi. Anisi drach. 10. seminis fœselis, drach.

drach. 20. petroselini, nardi Indicæ, piperis
 albi & longi, singulorū drac. *3. & obol. 4. *Aliàs. 6.
 opii drach. 10. myrrhæ drachm. 10. cumini
 Aethiopici, castorii vtriusq; drach. quinto,
 iunci odorati, croci, vtriusque drach. 5. Ex-
 cipe ac præpara cum melle cocto. Coli-
 ca admirabilis qua vtor, & ad voluulosos
 & qui sterco fursu euomunt in magnis
 doloribus, datur magnitudine fabæ in aque
 frigida cyath. 3. aut. 4. Piperis albi, seminis
 hyoscyami, vtriusque drac. 40. opii drach-
 mas. 20. croci drach. 10. spicæ nardi, euphor-
 bii, pyrethri, singulorū drachmas duas, ex-
 cipe melle cocto. Alia non inefficax ad-
 iaptotos ob id dicta, ad omnem etiam infla-
 tionem. Sisonis, seminis hyoscyami, piperis
 albi singulorum drach. 40. succi papaueris
 drach. 20. croci drach. 6. opobalsami
 drach. tres, excipe melle. Colica Teren-
 tii Valentis. Sisonis, piperis albi, seminis
 hyoscyami, singulorum drach. 40. succi pa-
 paueris drach. 20. croci drach. 8. alii drac. 6.
 corticis radice mandragoræ drach. 3. mel-
 lis quod satis est. Quidam etiam opobalsa-
 mi drach. 3. Colica Apollonii. Nardi
 drach. 2. castorii, fœniculi, succi mandrago-
 ræ, costi, singulorum drachm. 1. asari, spicæ,
 vtriusq; drach. 3. opopanax drach. 1. dau-
 ci Cretici drach. 3. cinamomi drac. 5. piperis
 albi

albi & longi, iridis, myrrhæ, singulorum
 drach. 2. lemnia sphragidis. drac. 10. absin-
 thii drach. 2. excipe melle. Datur drach. 1.
 ex aqua. Colica vt Nicoftratus, Isotheos
 appellata, empta talentis duobus. Facit ad
 stomachicos, oculorum dolores, & vexa-
 tiones, vuluæ labores, ex aqua mulsa inco-
 cta ruta. Croci sesquidrachmā, nardi drach-
 mas duas myrrhæ drach. 8. costi, piperis albi
 & longi, galbani, singulorū drach. 1. opo-
 balsami drach. 4. cinamomi, succi mandra-
 gora, castorii, singulorum drach. 2. feminis
 dauci drach. 4. & dimidiā, sagapeni drach. 3.
 cassiæ drach. 4. excipe melle Attico. Co-
 lica vt Scribonius. Cineris cornu cerui
 teneri vsti heminam, piperis albi, myrrhæ,
 vtriusq; drach. 2. ex tritis cochlearium vnū
 exhibeto. Et cochleam vnā crudā tritā cū
 vini cyathis duobus & aqua calida. Co-
 lica qua assiduè vtebatur, perfectè liberans
 & malum extirpans. * Zingiberis drach. 3.
 corticis salicis drac. 3. rutæ ramulos tres aut
 quatuor, phœnicobalanorum drach. 3. aquæ
 cyathos. 6. conicito in vasculum nouum, &
 coquito donec tertia pars supersit, & biben-
 dum dato ad triduum post irritationem, &
 facto interstitio idem facito, ad plures dies
 pharmacum in potu exhibendo. Colica
 Tullii bona, qua & ipsa vtor. Seminis
 bras

* Aliàs
 myrrhæ.

brassicæ syluestris, phu pontici, vtriufq; se-
 missem. piperis albi & longi, * mei] seminis * Vet. cod.
 dauci, singulorum drachm. 9. castorii, costi, * Sic vet.
 opii, corticis mandragoræ, * nardi Indicæ, codi. sin-
 asaris, illyridis, singulorum drac. 6. stœcha- gulorum
 dis drach. 9. cinamomi drachm. 1. cassiæ da- drach. 6.
 phnitidis drach. 18. excipe melle cocto. Da liquoris pa
 fabæ Aegyptiæ magnitudine. Colica quâ natus dra-
 admiratus est Ariston, vt Diophantus Ly- chm. 4.
 cius. Succicentaureæ, castorii, scillæ assa- seminis ci-
 tæ, piperis albi & longi, myrrhæ, rutæ hor- cutæ drac.
 tensis, hyssopi, abrotoni, iridis Illyricæ, sin- duodecim
 gulorum drac. 2. croci, ammoniaci thymia- myrrhæ,
 matis, radicis acori, phu pontici. Zingibe- nardi In-
 ris, veratri albi, singulorum drach. 1. excipe dice, asa-
 aceto mulso. Datur etiam drach. 1. ex aceto ri, ac ori,
 mulso. Colica vt Publius in Putiolo & illiridis
 Apollonio. Polii drac. 6. scordii drac. 12. &c.
 gentianæ drachm. 5. seminis rutæ syluestris
 drach. 4. succi cyrenæici drach. 3. rubricæ
 lemnæ drac. 5. myrrhæ, drach. 7. opobalsa-
 mi drach. 8. piperis albi drach. 2. & dimidiâ,
 cachryos, drac. 4. verbenacæ herbæ drac. 2.
 pentaphylli drach. 5. excipe melle Attico.
 Da magnitudinem nucis ponticæ. * Vet. cod.

Quæ Asclepiades ad coli affectus prodidit. Antonini

Parmacum inspersille ad coli inflatio- pharmacu
 nes, * Antonii pharmacopolæ, huius valde præ
 vsus sanus erat. Chrysobalani drach. 2. se- ciarum.
 felis,

felis, astragali, vtriusque sextantem, illyri-
 *Vet. cod. ca, *tragacanthi, vtriusque vnc. vnam. Hæc
 tragoriga simul tusa & cribrata, cochlearii vnus plus
 ni pro tra minus mēsurā, ex aquæ calidæ cyathis qua-
 racanthi. tuor, ante cibum exhibeto. Aliud, Gal-
 linarum interanea omnia exempta & in vas
 fictile cōiecta afflato, ac trita reponito, vsus
 verò tempore cochlearium vnum & dimi-
 dium, & seminis dauci cretici tusi & cribra-
 ti tantundem, ex aquæ mulsæ calidæ cya-
 this tres, exhibeto. Ad coli inflationes
 Chariclis. Cumini Aethiopici drach. 6.
 seminis apii, drach. 5. seminis dauci Creti-
 ci drach. 2. piperis albi drach. 1. tusa & cri-
 brata reponito. Dantur ex eo cochlearia
 duo, cū aquæ mulsæ cyathis tribus. Aliud,
 Seminis rutæ syluestris aridi, seselis massili-
 ci, vtriusque drachm. 8. petroselini drach. 4.
 finonis Syriaci drach. 4. piperis albi drac. 2.
 tusa & cribrata exhibe vt dictum est. Ecle-
 gma colicis Nectareum. Facit & pleuriti-
 cis, & dyspnoicis. Deducit mulieribus men-
 ses. Est & concoctorium. Cumini hispa-
 ni vnc. vnā, piperis albi, Zingiberis, vtriusq;
 tantundem, vini dulcis aut Scybelitæ, aut
 protropi sextarios tres, vini falerni sexta-
 rium vnum. Mellis Attici libram vnā. Ari-
 da tunduntur & cribrantur crassiore cri-
 bro, Deinde cū vino coquuntur donec ter-

ria

tia pars supersit, deinde affunditur vinum
 dulce ac rursus coquitur. Mouere autem
 oportet ramulis rutæ virga salicis exceptis,
 & salicis cortice obligatis. Habenda est ad
 manum etiam altera virga similiter rutæ
 ramulos recentiores cōplectēs, quo priori-
 bus exsiccatīs recentioribus moueas. Post-
 quam autē liquor semel atque iterū ebul-
 lierit, iniice mel ac rursus coque, & exco-
 latum per saccum liquorem repone. Vsu
 expetente * mystra tria ante & post cibum * Vet. cod.
 præbe. Alia Scribonii Largi ex salice. Li- *mystum*
 berat à tota affectione. Corticis salicis *unum vel*
 drach. 4. Zingiberis aridæ drach. 3. phœni- *duo ante*
 cobalanos. 6. numero, aquæ sextarium *vnū cibum.*
 & dimidium. Coquito omnia rutæ ramu-
 lis mouens, & vbi tertia pars liquoris resti-
 terit, tum excolato, & cyathos duos quo-
 tidie bibendos dato. Hoc verò per triduum
 facere oportet, & post triginta dierum in-
 terstitium rursus repetere, quo per annum
 potiones. 36. fiant. Bibitur enim hoc phar-
 macum per annum totum. In aliis exem-
 plaribus hoc modo habetur. Corticis sa-
 licis viridis drach. 5. Zingiberis ficci drac. 4.
 piperis albi drach. 4. palmularum passarum
 maximarum, quas Græci patetos appellant,
 numero duas, aut tres, rutæ viridis ramu-
 los. 5. aquæ pluuiæ sextarios. 3. coquito ad
 ter

tertias, & dato vt prædictum est. Alia
 Paccii Antiochi, à tota affectione liberans.
 Cornu cerui recēsenati molliſſimi vſti ad
 albedinem cochlearia. 3. maioris magnitu-
 dinis, piperis albi grana. 10. aut. 9. myrrhæ
 parum odoris gratia, omnia terūtur, & co-
 chlea Africana varii coloris vnā cum testa
 itidem teritur, vino falerno per ſaccum nō
 excolato affuſo. Sit autem vini menſura
 cyathorum trium. Hæc omnia in fictili va-
 ſe permixta ad prunas calfacimus, diligēter
 mouentes, ne quid ex pharmaco ſubſidat.
 Calfactū verò in iſtis irritationibus biben-
 dum dato, itemq; ſequentibus duobus die-
 bus. Oportet autem diem vnā ante, cibum
 differre, & reliquis diebus prædio ſolo vti,
 in eoq; aſſumere cibum qui facilè confici
 poteſt. Alia cōfectio. Succifœniculi ſex-
 taria. 4. mellis Attici ſextar. 2. croci drach-
 mas. 4. crocum in linteolum purum ligato,
 Succum verò & mel mixta in vaſe fictili
 coquito, & faſciculo croci moueto. Vbi ve-
 rò denſata fuerit ad arteriacæ ſpiſſitudinē,
 Crocum quidem expreſſum reiicito, phar-
 macum verò reponito. Vſus tempore my-
 ſtrum vnū aut duo ante cibum dato. Co-
 lica ex Sinone, qua vſus eſt Valens. Facit in
 ſummis doloribus data nucis ponticæ ma-
 gnitudine, ex aquæ calidæ cyathis tribus,
 & con

& confestim minuit dolores, & maximè si pruritus per totū corpus fiat. Facit & ad inueteratos splenicos, & ad voluulosas affectiōes. Facit hepaticis anelosis & ad febres per circuitū repetētes, ac vuluæ strangulatus, & vesicæ affectus. Est & arteriaca bona. Sinonis syriaci aut hispani drach. 60. piperis albi drach. 40. seminis hyoscyami albi drach. 40. opii, corticis mādragoræ, vtriusq; drach. decem, croci drach. sex, mellis cocti quod satis est his excipiendis. Quantitas exhibitionis ostensa est. Alia exemplaria sic habent. Sinonis hispani drach. 60. piperis albi, seminis hyoscyami, vtriusq; drach. 40. cornu cerui vsti, opii, vtriusque drach. 20. corticis mandragoræ drach. decem, croci drach. sex, mellis quod sufficit. Confectio Lingonis colica, data ex frigida statim soluit dolores. Seminis hyoscyami albi drach. 20. opii, seminis dauci cretici, vtriusq; drach. 10. petroselini drach. sex, croci, spicæ nardi, pyrethri, singulo. drach. 4. euphorbii, obobalsami, cinamomi, singulo. drach. 2. Excipe melle cocto, & exhibe fabæ Aegyptiæ magnitudine cum aquæ tepidæ aut frigidæ cyath. 3. in irritationibus. Colica sedans dolorem, qua vsus est Cassius. Facit & ad internorum affectiones, pharmacum est valde bonum. Anisi, nardi Syriacæ, myrrhæ,

Cc

singulo. drac. 8. piperis albi & longi, vtriufque drac. 12. seminis seselis drac. 6. opii tantundē, croci, castorii, perroselini, iunci odorati, singu. drac. 4. mellis Attici cocti quod satis est, Datur pontice nucis magnitudine.


Colica sedans dolorem Lucii, confestim eximit dolores, inscribitur Sicula. Myrrha, succi hyoscyami, opii, singulorū drac. 8. radice mandragoræ, piperis albi, croci, thuris, singulo. drach. decem. Excipe melle & præbe fabæ Aegyptiæ magnitudinem ex aquæ calidæ cyathis tribus ad noctē. Colica sedans dolorē Euschemo Spadoni inscripta. Bibitur in dies triginta. Seminis brassicæ sylvestris, phu, cinamomi, iridis Illyricæ, acori, asari, opopanax, myrrha, nardi Indicæ, opii, costi, succi mandragoræ, castorii, singulo. drach. 6. triū piperis generū,

* Hæc ex mei, seminis dauci cretici * stœcadis singul.
 vet. cod. drac. octo, seminis cicutæ] decorticati, drac. duodecim, excipe melle cocto ac præbe fabæ Aegyptiæ magnitudinem, febre carentibus cum vini mulsi diluti cyath. 4. febrientibus cū aqua mulsa. Hac etiā in infusis utebatur nucis pōtica magnitudine, cum fœni græci decocto cyathorum quatuor, & oleo cui ruta incocta est item cyathorum quatuor. Ad easdem affectiones confectio Breniti. Croci, opii, opopanax, myrrhæ,
 iri

iridis, acori, mandragoræ, asari, costi, nardi
Indicæ, dauci Cretici, Mei, singulo. drach.
sex, piperis albi & longi, gentianæ, siæcha-
dis, cassiæ, phu pontici, singulorum drach.
octo, excipe melle.

De dysentericis.

CAP. V.



DE dysentericis equidem quæ in
vniuersum nosse oportet, iã an-
te dictum est, tum incurãdi me-
thodi libris, tum etiam nunc in
sermone de hepaticis habito, Reliquum est
igitur de vere dysentericis agere, in quibus
neque hepar affectum est, neque alia aliqua
affectio est, præter intestinorum vlceratio-
nem, aut nudam, aut cum putrefactione ali-
qua obortam, quam Medici consueti vo-
cabulo Nomen appellant. Quæcunque igitur
ad tales affectiones cõmoda sunt, phar-
maca & iam frequenti experimento cog-
nita, ea in principio subscribentur.

*Quæ ab Andromacho ad dysenteriam
scripta sunt.*

POtio ad dysentericos & hemoptoicos.
Floris rosarum, opii, acaciæ, gummi,
singulo. drac. tres, balaustii tantundem, suc-
ci hypocisthidis tãtundem, gallarum drac.
duas, seminis plantaginis tãtundem, & succi
eius tantundem, lycii Indici drachm. i. succi
rosarum drach. i. Fac pastillos drach. vnius.

CC 2

Vtere varie. Ad dysentericos & cœliacos, confectio ex fructibus. Mala punica integra 20. mala cotonea 20. erui sextar. 1. prunorum syluestrium sextar. 2. Sorborum Ephesinorū sexta. 2. Rhois Syriaci sexta. 3. pira Terentiana 20. mala Cestiana 30. siliquas 40. baccarum myrti nigrarum sexta. 3. mustiaminei ad tertias decocti sextar. 48. Coquito simul ad mellis spissitudinem & in figulino reponito. Alia ex fructibus ad eadem. Stomachum subuersum restituit, Imponitur etiam forinsecus. Mala punica decem, cotonea 20. mala orbiculata 15. sorborum sextar. 2. mespilorum sextar. 1. glandium sextar. vnum. Rhois Syriaci sextar. 1. rubi fasciculum manipulem, baccarū myrti nigrarum sextarium vnū, palmas passas, patetos Græci dicunt triginta, acinorū aridorum sextarium dimidium, prunorum syluestrium sext. 1. siliquas magnas decē, cēnāthes sexuncem, cornorum sextarium vnum mala citria quinque, pafsi Cretici sextarios sexdecim. Coquito simul & reponito in vitro. vtere vt priore. Ad dysentericos quator. Gallæ, fructus ericæ, opii, singulorū drachm. quatuor, cum aqua redigito in pastillos duorum obolorum. Dato ex aqua aut vino. Ad dysentericos Clidion. Nar-di, croci, vtriusque drach. octo, aloës drach. qua

quatuor, ego drach. duas, thuris drac. duas,
 acaciæ drach. quatuor, myrrhæ drach. qua-
 tuor, succi hypocisthidis drac. quatuor, alii
 drac. sex, rosarum siccarum drach. quatuor,
 ly. ii Indici drach. 4. tragacanthæ drach. 4.
 opii drac. 4. alii drac. 1. obol. 2. piperis drac.
 duas, alii etiam iridis drach. 2. Excipe aqua.
 Quidam etiam cinamomi drach. 2. & dimi-
 diam gallæ drac. 2. fac pastillos obolorum
 duorum ponderis. Exhibe cum vino myr-
 teo. Ad dysentericos & cœliacos pastil-
 lus Beritii. Nardi, croci, vtriusque drach.
 duas, myrrhæ, succi hypocisthidis, aloës,
 opii tragacanthæ, lycii Indici, gallæ, anisi,
 acaciæ, piperis, rhei pontici, singulo. drach.
 vnam, tragacantham in vino macerato, &
 reliqua trita commisceto, pastillosq; drach-
 mæ vnus formato, atque ipsos ex vino da-
 to. Clidion ad dysentericos. Acaciæ *succī * *Vet. cod.*
 papaueris vtriusq; .j ʒ. 25. seminis hyoscya-
 mi drach. 56. baccarū myrti tusarum ʒ. 160.
 rhois Syriaci drac. 70. & succi eius ʒ. duas,
 & dimidiam, thuris drach. 75. Omnia torre-
 facta terito & vino nigro excipito. Datur
 summum drachmam vnam. Ad dysente-
 ricos & cœliacos. Vini falerni sextar. sex,
 mellis Attici libr. 6. coquito simul ad mul-
 tam spissitudinem, vt ere pleno cochleario
 ad delingendum dato.

*Ad dysentericos & omnia interna vitia,
pastillus ab Eudemo seniore.*

CRoci, cassiæ fistulæ, vtriusque drac. 2.
nardi drach. 1. myrrhæ, aluminis succi
papaveris, singulo. drac. 2. cum aqua pastil-
los formato, & dysentericis ex vini cyathis
duobus dato, febrientibus ex aqua, hepati-
cis & peripneumoniciis ex aqua mulsa. Ita
etiampleuriticis & tussientibus. Aliud,
ad dysentericos. Seminis fœniculi, anisi,
apii, malicorii, singulo. drach. 4. opii drac. 2.
cum aqua redige in pastillos duorum obo-
lorum. Dato vnum ex aqua. Ad dysente-
ricos & cœliacos ex libris Antipatri. Pi-
peris nigri drach. 4. gallæ drach. 4. myrrhæ
drach. 2. croci drach. 2. nardi drachm. 1. lycii
drach. 1. succi hypocisthidis, acaciæ, ramen-
torum loti, gūmi, singu. drach. 2. opii, aloës,
anisi, singulo. drach. 1. Rhois obsoniorum,
drac. 2. Excipe succo rubi & vtere. Ad dy-
sentericos, cœliacos, & hæmoptoicos, è Cor-
nelio medico. Myrrhæ, thuris, aloës, croci,
opii, rhois Syriacæ & coriariæ, lycii indici,
acaciæ, malicorii, succi hypocisthidis, gallæ,
balaustiorum, singulo. par pondus in pastil-
los cogito, & ad noctem febre carentibus
ex vino, febricitantibus ex frigida dato.

Aliud ad dysentericos Valentis. Myri-
cæ fructus, rhois Syriaci, opii, petroselini,
fin

singulorum par pondus torreto ac terito,
 & cum aqua in pastillos reducito magnitu-
 dine fabæ, Da in noctem febricitantibus ex
 aqua calida, non febrientibus ex vino. Ad
 dysentericos ex scriptis Lucii. Styracis
 drac. 2. opii, croci, acaciæ, gallæ, fructus my-
 ricæ singulo. drach. 1. cum aqua pastillos fa-
 cito ac dato fabæ Aegyptiæ magnitudinē
 cum vino. Ad dysentericos & hæmoptoi-
 cos, statim à prima portione cohibet fluxū.
 Cochlearum vstarum drach. 12. cornu cerui
 vsti drach. * 20. obol. 2. baccarum myrti ni- * Aliàs 5.
 grarum drac. 15. opii torrefacti drachm. 5.
 obol. 2. gallæ tostæ drach. 5. obol. 2. ænan-
 thes drach. 6. succi hypocisthidis drach. 5.
 obolos 2. radicis mandragoræ drach. duo-
 decim, succi rhois, terræ asteris, vtriusque
 drach. 12. rhois culinari drac. quatuor, mali-
 corii tostæ drach. septem, thuris drach. octo,
 corticis pinus torrefacti drach. sex, seminis
 apii drach. 14. hyoscyami tostæ drac. decem,
 rhois coriarii sexta. 2. acaciæ tostæ drach. 5.
 obol. 2. Vini nigri, quo rhus coquatur vt
 crassissimus succus fiat. Coquito itaq; cū
 vino, atq; colato, & cum succo reliqua sub-
 acta in pastillos drachmales, & triobalares,
 ac diobolares cogito, & pro habitu exhibe-
 to, febricitantibus cū aquæ calidæ cyathis
 trib. Non febrientibus cum vini cyathis 2.

In aliis exemplaribus cornu cerui drach. sex, obol. 2. habentur, & gallæ drach. 7. & obol. 2. & succi hypocisthidis drach. 8. obol. 2. & acaciæ tantundem. Ad dysentericos Flauii Pyctæ, id est, pugilis. Baccarum myrti aridarum tusarum sextarium vnum, rosarum siccarum tusarum sexta. dimidium, fecis malabathrini drach. 2. baccarum iuniperi drach. 30. pirorum aridorum tusorum sexta. 1. corticis pinus drach. 12. myrrhæ drach. 1. gallas siliquarum tusarum sextarium vnum. Dantur ad summum drach. octo. Dato aridum cum vino diluto. Quæ verò crassiora sunt palmulis pinguibus excepta exhibeto. Ad coeliacos. Sistit fluorem confestim. Fructus myricæ drachm. quatuor, rhois cibarii drach. quatuor, baccarum myrti nigrarum drach. quatuor, acaciæ drach. 2. succi papaueris drach. vnam, excipe malorum spissamento & fac pastillos drachmæ ponderis, ac vtere cum oui assati vitello. Vbi verò bibendum dare volueris, radicem rubi, aut myrtum, aut mala cotonea coquito, atque decoctum horum frigidum cyathorum tres, mensura cum pharmaco dato. Facit & lentericis. Potio ad internos fluores, forinsecus etiam cum melle cocto impositum facit.

* Ex vet. cit. * Apii seminis, hyoscyami, vtriusque drach. quatuor.] Anisi drach. duas, succi hy
po

pocisthidis sesquidrachmam, seminis rosarum sesquidrachmam, succi papaveris drach. vnam, myrrhæ drach. vnam, crocomagmatidis drach. vnā. Dantur cum aqua obol. 3. & duo, & vnus item. Potio ad omnem fluxionem & inflationem, Lucii Tarsensis.

Anisi, seminis apii, vtriusque drac. 2. seminis anethi, dauci, tordylly, singulo. drach. quatuor, opii, seminis hyoscyami, vtriusq; sesquidrach. Excipe aqua atque ita vtere. Potio ad fluxum muliebrē sistendum, vt Apollonius. Coralli obol. 3. balaustii obol. 3. gummi obolum vnum, excipe oui crudi candido, & dimidium totius cum aquæ cyath. quatuor, præbe.

Infusa Dysentericis commoda.

Infusum addysentericos, Isidori, ad exulcerationes factas in intestino recto. Cineris chartæ drach. 10. aluminis scissi drac. 4. auripigmenti drach. 4. sandarachæ drach. 3. squamæ æris, omphacii, vtriusque drach. 3. croci, succi papaveris, vtriusque drac. duas, calcis viuæ drachm. 5. Trita misce & excipe vino dulci, ac forma pastillos drachmarum trium, & duarum ac vnus ponderis. Vfus tempore vino austero diluuntur ad strigmentitiam crassitudinem, miscenturque succi ptisanæ cyathi duo. Infundito hæc simul ægroto ita vt tum de ptisanæ succo, tum

Cc 5

de pharmaco pro viribus ipsius sumas.

Infusum Faustini. Auripigmenti drach. 12. chartæ vstæ drach. 30. sandarachæ drac. sex, calcis viuæ drac. decē, alii 12. cogito in pastillos, quatuor drachmarum, & cū plantaginis succo, in quo spissamenta incocta sunt, infundito, aut vini diluti cyathos tres.

Infusum quo vtor Athenæi. Concordat Harpocræ, Magno Philadelpho, Aristolao. Omphacii drach. sex, aluminis scissi drac. 6. calcis viuæ, squamæ æris, vtriusque drach. sex, auripigmenti drachm. octo, sandarachæ drac. tres, chartæ vstæ drach. 15. Cum vino myrteo pastillos drachm. 4. aut 3. formato. Infunde cum vini diluti cyathis 4. & aquæ tepidæ cyathis duobus. Quandoque etiam cum aqua pluuiali. Infusum quo vtor.

Chartæ vstæ drach. 30. auripigmenti drac. duodecim, gallæ drach. nouem, calcis viuæ drac. sexdecim, bituminis drac. 16. sulphuris viui drach. 16. sandarachæ drach. sexdecim.

Infusum aliud vt Idius. Aëris vsti drac. vigintiquatuor, calcis viuæ, aluminis scissi, vtriusque tantundem, chartæ vstæ drachm. 30. auripigmenti drach. duodecim, sandarachæ drac. duodecim. Excipe vino myrteo, aut rosarum decocto, quæ cum vino austero ad dimidias coctæ sunt & expressæ, forma pastillos, eosque infunde cum aqua.

In

Infusum ab Eubulo. Squamæ æris drac.
 * viginti, chartæ vstæ drach. 16. calcis viuæ * *Aliàs 8.*
 drach. sex, auripigmenti drach. octo, sanda-
 rachæ drach. 15. * acaciæ drac. 5. Jomphacii * *Vet. cod.*
 drac. 3. fecis vini vstæ drach. 1. excipe vino
 myrteo, & infunde cum vino diluto cali-
 do. Infusum Heræ. Chartæ vstæ vnc.
 vnam, calcis viuæ vnciam diuidiā, cadmiæ
 vnc. vnā, auripigmenti vnci. vnam. Ex hoc
 arido cochlearia duo cum decocto baccarū
 myrti, aut vino myrteo cyathorum 4. men-
 sura infunde. Calcem verò cum succo plan-
 taginis extingue. Infusum aliud eiusdē.

Sandarachæ, auripigmenti, vtriusq; drac.
 octo, acaciæ drac. quatuor, calcis viue drac.
 quatuor, excipe vino austero, & coge pastil-
 los drachmarum trium. In debilibus verò
 minus cum vino diluto infunde. Aliud,

Sandarachæ drach. octo, calcis viuæ recen-
 tis drac. decem, chartæ vstæ drac. octo, alii
 drach. 30. malicorii, gallarum, acaciæ, singu-
 lorum drach. 5. mænarum aceto cōditarum
 ad dies viginti vnum, ac vstarum drach. 3.
 auripigmenti drachm. sexdecim. Vruntur
 mænæ in olla cruda. Et aliqui arido medi-
 camento vtuntur, aliqui in pastillos cum
 myrti baccarū decocto cogunt. Si verò nō
 moretur pharmacū retentū, ante eius vsum
 polygoni succum aut muriam infundito.

In

Infusum quo vtor Aphtha appellatum,
 Rhois Syriaci, gallarū vstarū vtriusque
 drach. 15. chartæ vstæ tantūde, seberis vsti
 drach. 15. panis Alexādrini sicci vsti drach. 15.
 auripigmenti drach. 8. sandarachæ drach. 10.
 acaciæ drach. 5. cerusæ drach. 8. calcis viuæ
 drach. 10. spumæ argenti drach. 3. Excipe
 vino veteri & forma pastillos, alios duarū,
 alios triū, alios quatuor drachmarū ponde-
 re. In principio quidem per plantaginis aut
 sanguinariæ, aut helxines succū infundito,
 qui si nō adsint, aquam, Si vero vigor sit. &
 morbus fortis cum dolore, cum fœni graeci
 aut seminis lini decocto infunde. In decli-
 natione autē cum decocto myrti & rubi vi-
 no coctorū. In pueris cyathorū duorū co-
 pia, In fœminis trium, in viris quatuor. In-
 fusum quo vtor Gemelli. Auripigmenti
 drach. 8. sandarachæ drach. 4. calcis viuæ
 drach. 8. squamæ artis drach. sex, aluminis
 scissi tantūdem, omphacii drach. 8. lycii In-
 dici tantūdem, succi papaueris drach. 4. suc-
 ci hypocisthidis tantūdem, croci drach. 2.
 *Sic vet. ego autē drach. 4. chartæ vstæ drach. *20.
 cod. alii verò drach. 16. excipe vino myrtite &
 fac pastillos drach. 4. & 3.] Infunde cum vi-
 no diluto. Infusum Agathii. Auripig-
 menti drach. 2. sandarachæ drach. 5. calcis
 viuæ drach. 3. chartæ vstæ drach. quatuor.
 Ex

Ex hoc pharmaco drach. 3. cum sale trito infundito in aquæ frigida cyathis sex.

Infusum Nicottrati ad dysentericos, quo Menander vsus est. Calcis viuæ drach. 1. gypsi drach. 8. acaciæ drach. duas, omphacii drach. 1. stibii drach. 3. thuris drach. 1. gallæ drach. 4. tragacanthæ drach. duas, cum vino myrteo cogito in pastillos. Reponuntur reliquiis ab expresso vuarum succo restantibus stipati, ne transpirent. Infusum ad dysentericos Thamyræ. Auripigmenti drach. 2. aluminis scissi drach. 2. cadmiæ tantundem, calcis viuæ nouæ drach. 1. chartæ vstæ drach. 2. suberis ex dolio vini falerni vsti drach. 7. & dimidiam. Cum sapa aut passo hispano apud te recocto, pastillos cogito. Cæterum pastillis rursus tritis cochlearia 2. infundito. Reliquis pro viribus cum lenticulæ decocto, Si lenticula nō adfit, rubū cū rosis aridis decoquito, & seorsum myrti baccas cum vino austero coquito, & vtriusq; cyathum vnū misceto. Quandoque verò vini cyathos 4. & rubi decocti cyathos duos. Facit item in potu acceptum pro viribus ad cochlearii plus minus mēsuram ex frigida aqua. Infusum vt Deletius Epagathus. Auripigmenti drach. 12. succi hypocisthidis drach. 3. sandarachæ drach. 3. chartæ vstæ drach. 30. calcis viuæ drach. 24. balau.

balauftii drach. 48. Balauftium in vino veteri austero coquitur. Deinde cū decocto reliqua teruntur, formanturq; pastilli drachmarum quatuor, quidam vnciæ ponderis faciunt. Infunduntur autem ante cœnam in myrti baccarum & lenticulæ decocto.

Quæ ab Asclepiade ad dysentericos scripta sunt, Quorum aliqua etiam cœliacis conueniunt.

Vini myrtitæ sextarios 3. Rhois rubri heminam 1. mellis Attici cocti lib. 1. Rhoem & vinum coquito rubi ramulis mouendo, & vbi tertia pars restiterit, liquorem exprimito, ei que mel adii cito ac rursus coquito donec spissetur. Datur mystrum ante cibum. Aliud, Rhois Syriaci, farina polentæ, vni passæ non exacinatæ, singulorum drach. 2. malicori tusi & cribrati drach. 1. excipe melle cocto, dato mystrum ante cibum* Pastillus cœliacis & dysentericis. Ouum crudum recens perforato & in vasculum euacuato, & cum testa subscripta mensurato, olei omphacini testam vni vnam piperis albi tenuissimè triti tantundem rhois syriaci tantundem gallarum omphacitidū tantundem farina tritici tantundem. Omnia subacta & mollita in pastillos redigito, & in sartagine fricta ante cibū dato. Aliud hoc scimus multos vsos à morbo

*Addit hic
cod. vet. et
post cibū.*

bo liberatos esse. Gallarum subtilissime tritarum cochlearium, piperis albi, rhois rubri, malicorii tenuissimè triti, singulorum tantundem. Omnia mollita oui luteo excipe, & in vacuam mali punici testam conice, atque obturato cum farina osculo ipsius ad prunas torre, deinde depurgata mali punici testa, cochlearium vnum comedendum exhibe. Catapotia, cœliacis, dysentericis. Gallarum omphacitidum non perforatarum drach. 4. opii hispani drach. 2. petroselini drach. 1. excipe aqua, fac catapotia, & da magnitudine ciceris: viriū tamen ratione circa mēsurā habita. Aliud Aspasii, pharmacū generosum. Petroselini, fructus ericæ rhois Syriaci, opii, singulorū drac. 2. cum myrti decocto in catapotia redigito, ac dato vt dictū est. Pastillus sedās dolorē, cœliacis & disentericis. Et bibitur & infunditur. Quandoq; etiā ipso pro cataplasmate vtimur excipientes melle cocto. Seminis hyoscyami drach. 4. seminis apii tantundē, anisi, florum rosarū vtriusque drach. 2. hypocisthidis, opii, vtriusque drach. 1. Cum aqua trita in pastillos reducito & obol. 3. exhibeto. Febrem nō habentibus cum vini diluti cyathis tribus, febricitantibus cum aqua. Aliud cœliacis, dysentericis pharmacum accommodatū, & bibitur & infunditur, &

& forinsecus impositū auxiliatur. Seminis apii, seminis hyoscyami, anisi, fœniculi, singulorum drach. 4. opii, Rhois Syriaci, vtriusque drach. 2. succi hypocisthidis, balauustii, singulorum drach. 1. excipe aqua & coge pastillos, dato vt prædictum est. Pastillus aromaticus, cœliacis, dysentericis, Berytii appellatus, pharmacum accommodatum. Sistit cōfestim. Croci drach. 4. nardi Indicæ, anisi, vtriusque tantūdem myrrhæ drach. 2. aloës Indicæ, succi hypocisthidis,

*Duo hæc
ex vet.
cod.

*lycii indicati, acaciæ] succi papaueris, gallarum omphacitidum, tragacanthæ, piperis albi, singulorū tantundem. Excipe vino & forma pastillos, dato obolos 3. Pastillus Philippi, ad dysentericos inueteratos, sedās dolorē, Bibitur & infunditur. Balauustii, acaciæ, succi hypocisthidis, Rhois, apii, thuris, myrrhæ, baccarū myrti nigrarū, croci, gallarū, lycii, aloës, Rheipōtici, malicorii, singulorū drach. 4. Excipe vino Italico, & coge pastillos pondere obolorū trium, da non febrientibus cum vino. Febrientibus cum aqua mulsa. Pastillus sedans dolorē, præclarè inducens somnum. Ad inueteratos dysentericos. Chartæ vstæ drach. 10. sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, aluminis scissi, omphacii, calcis viuæ, singulorum drach. 5. croci, opii, vtriusq; drach. 2.

Singu.


Singula diligenter trita in pastillos drachmales cum vino myrtite coagmentato, ac vtitor. Infundūtur ad summū ex eo drachmæ tres. Medium duæ, minimum vna. In cōficiendo autem omphaciū cum opio tibi sit in vino myrtite maceratū. Crocus seorsum teratur, deinde simul mixta probè terito, & additis aridis vnito, animaduersione habita ne pharmacū à calce viua exuratur. Si tamē tale quid consequatur, de myrtite sufficienter affunde vt omnia dissoluantur. Oportet autē calente adhuc pharmaco pastillos formare. Vsus iuxta appōderationis variationē, fit secūdum quod ægri subtili aut hebetes sensu præditi, id tolerare possunt, & secūdum magnitudinē affectionis. Infundito autē diligenter in non febri-
citantibus cum vini austeri diluti cyathis 6. in febrientibus cum aqua, aut decocto palmarum, aut rosarū, aut myrti. Ante infusionē detur panis nō febrientibus cum vino diluto, febriētibus ex aqua. Alius dysentericis non febrientibus, facit confestim.

Chartæ vstæ drach. 10. sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, aluminis scissi, omphacii, lycii Indici, acaciæ, succi hypocisthidis, calcis viuæ, singulo. drach. 5. croci, opii, vtriusque drach. 2. excipe vino myrteo, & forma pastillos magnitudine differentes.

D d

Infunduntur ad summū drach. quatuor. Infundere autē oportet quantitate pharmaci ad magnitudinem affectionis appōderata. Sitq; liquor passum creticū dilutū, & ex eo ad summum cyathi 6. infundantur. Epithemata cœliacis, dysentericis. Seminis hyoscyami albi, apii, vtriusq; trientē, anisi, floris rosarū, succi hypocisthidis, balauſtii, Rhœis Syriaci, singulorum sextantem, succi papaueris vnc. i. croci vnc. i. Hæc singula cum vino myrteo terito, deinde mista in pastillos cogito, eosq; in vmbra siccato. Inde verò quantū sufficit tundens & cribrans palmis p̄sis excipito, deinde linteolo infarcta vētri imposito. Aliud. Succiacacix, malicorii, seminis hyoscyami, opii, gallarum, omphacii, Rhœis Syriaci culinarii, singulorū quadratē, baccarū myrti nigrarū heminā vnā, tundito, cribrato, & vino austero subacta in pastillos coagmētato, eosq; in vmbra siccato. Vfus iam ostensus est.

De affectionibus & vitij sedis. G A P. VI.



Edis vitia & affectus ob multas causas difficilem curā accipiunt. Multo enim sensu particula hæc prædita est, dictum autē sæpe est eiusmodi particulas facilè per acriora & austera pharmaca irritari. At verò & ipse retrimētorū alimēti trāsitus per se mordax est,

est, & hoc magis vbi eruperit ipsa bilis, & ferofi quidam aliquādo humores, Quibus accedit & hoc, quod neque statum tempus habeāt medici ad imponēda pharmaca, sed plerūq; tempore minime conuenienti ægrī ad excernēdum cōcitantur. Quin & humiditas ac caliditas ipsius loci, siccantibus simulq; frigefacientibus opus habens, nō parum confert ad hoc vt ægrē curabilis anī affectio existat: si quidem mordent adstringentia, Verūm locus subtili sensu præditus, acrimoniā ferre non potest. Ob id igitur aptissima ipsis pharmaca sunt, quæ citra aspretudinem adstringūt, Qualia maximè sunt ex metallicis, quæ neque acria, neque acerba penitus existunt. Hæc enim lota citra mordacitatem id quod oportet operantur. Horum itaque in summa dictorū memores, deinceps materiæ syluā experimento cognitam subscriptam habebitis.

Medicamenta Sedis seu ani ab Andromacho conscripta.

Medicamentū sedis quo vtor. Cetrissæ, spumæ argēti, vtriusq; drac. s. thuris, aluminis scissi, vtriusque drach. tres, croci obol. 3. Vini & rosacei quod satis est.

Aliud ad sedē, vt Apollonius, quo vtor.

Lycii Indici, sextantē, cœsypī vnc. i. ceræ Tyrrhenicæ trientē, alii sextantē. Rosacei

Dd 2

quod satis est. Aliud, Butyri fescunciā, ceræ fescunciā, medullæ ceruinæ vnc. vnā, æsypi, vnc. i. thuris vnc. vnā, aluminis scissi quadrantē, lycii sextantem. Vini & rosacei quod satis est. Aliud vt Nicostratus. Ceræ Tyrrenicæ vnc. i. lycii Indici sextantē, balauftii vnciam dimidiā, æsypi vnc. i. acaciæ vnc. dimidiā, rosacei trientem. Aliud vt Herophilus. Rosarum siccarū aut viridium drach. 2. cerussæ drach. 2. pompholygis drach. 2. croci drach. 2. spumæ argenti lotæ drach. 2. meliloti drac. 2. iunci odorati drac. i. succi papaueris drac. i. æsypi drac. i. oui allati vitellum vnum. Rosacei quod sufficit, succi plantaginis cyathos duos.

Aliud faciens & ad pruritus. Spumæ argenti librā dimidiā, thuris, terræ samiæ, vtriūque vnc. vnam, æsypi sextantem, rosacei sextantem, melini libram dimidiam. Arida in vmbra cum vino falerno terito, æsypumq; infarcito, & affusis duobus vngentis terito ac cōmisceto. Aliud ad eundem quo vtor, ad condylomata, inflammationes ani ac rimas. Ammoniaci thymiamatis, lapidis hæmatitæ, thuris, aluminis rotundi, singulorum drach. 2. gallæ, croci, vtriūsq; drac. i. terebinthinæ drach. i. ceræ tyrrenicæ drac. 12. rosacei heminas 4. excipe pello cum Syriaco, in reliquis cum rosaceo.

saceo. Medicamentũ sedis ex cerebellis.

Adipis anserini curati, ceræ, thuris, medullæ cerui, florum rosarũ, pompholygis, cadmiæ, plumbi loti, singulorũ drach. quatuor, cerussæ drach. 8. cerebri gruis drach. 2. succi papaueris sesquidrachmam, cæsypi drach. 5. succi seridis heminā vnā, rosacei heminam dimidiam. Medicamentũ sedis à Rustico, quo vtor. Rosarum viridiũ drach. 8. lactis muliebris heminā vnā, spumæ argenti drach. 40. succi papaueris drach. 40. ova cruda integra duo, butyri drach. 16. cæsypi drach. 16. malicorii drach. 16. mellis drach. centũ, in alio exemplari heminā dimidiam, ceræ drach. 40. rosacei aut myrtei heminā dimidiā. Verũ Heras pro cæsypo adipẽ anserinũ pari pondere cõiecit, & spumæ argenti drach. 10. lactis heminas 4. & oui vitellum assatũ. Aliud à Tyranno. Spumæ argenti sextantẽ, cerussæ sextantem & vnc. dimidiam, thuris vnc. 1. myrrhæ vnc. 1. cadmiæ fescunciam, aluminis scissi trientem, ceræ trientem. Vinum & rosaceum.

Aliud samithræ ad multa commodum.

Spumæ argẽti drac. 12. cerussæ drac. *2. *Aliàs 12. chalcitidis drach. 2. misyos assati drach. 1. terebinthinæ drac. 6. olei & aquæ heminas quatuor. Pinguis cõpositio ad Achoras & pforas. Spumæ argenti, cerussæ vtriusque

Dd 3

drach. 32. atramēti futorii drach. 16. sulphuris viui drach. 8. olei myrtei & aceti quod sufficit. Aliapinguis Galli. Spumæ argenti drach. 24. cerussæ drach. 24. myrrhæ drach. octo, thuris drach. decem, olei myrtei drach. 14. Vini austeri tantundem. Aliapinguis qua vtor, Cleophanti. Olei myrtei, lentiscini, rosacei, singulorum drach. 16. cerussæ libram vnam, spumæ argenti lotæ sexuncem. Vini veteris Italici sextar. dimidium, ceræ trientē. Alia ex nouē medicamentis constans, Enneapharmacos dicta.

Mellis partem vnam, ceræ albæ partem vnam, medullæ ceruinæ, myrrhæ, vtriusque partem vnam, butyri partem vnam, adipis anserini, adipis vitulini, vtriusque partem vnā, terebinthinæ partem vnā, olei rosacei partem vnā, aliqui & ricinini partē vnam.

Alia Xanitæ multi vsus. Ceræ drach. 16. butyri drach. 10. œsypi drach. 10. adipis anserini drach. octo, terebinthinæ drach. 8. medullæ ceruinæ drach. quatuor. Rosacei parū. Alia ex ruta. Spumæ argenti minam vnam, rutæ minam dimidiam, alii minam vnam, aceti drach. quatuor, olei quod satis est. Alia ad obturationes & alia sedis vitia. Plumbi vsti & loti drach. decē, cerussæ drach. quatuor, ceræ drach. 12. adipis porcini vel anserini drach. quatuor, olei quan

quantum sufficit. Ad obturationes & vitia sedis compositio Icodoti, qua Astainus curatus est. Oesyphi drach. 1. obol. 3. adipis anserini per hyemem curati drachm. 6. per æstatem drach. 4. medullæ cerui aut cameli drach. 2. ceræ Tyrrenicæ drach. 8. plumbi vsti & loti drach. 4. ladani drach. 2. adipis vitulini drach. 4. terebinthinæ drach. 4. cerussæ drach. 2. spumæ argenti drach. 1. rosacei heminæ quartam partem, hoc est sesquicyathum, hoc est sextantē & vnciam dimidiam. Arida cū liquidis committito. Quando verò temporis progressu fuerit induratum, dissoluitur rosaceo, & adipe anserino, facit & ad contractos articulos. Ad condylomata quo melius nullū reperitur.

Aluminis scissi drach. 3. ceræ drach. 8. croci drach. 4. Cerussæ drach. 2. opobalsami drach. 1. oesyphi drach. 8. thuris drach. 4. aloës drach. 4. liquecibilia liquefacito ac cū ariditritis committito.

Ad prolabentem podicem. Asclepiadæ pharmacæ ex. v. externorum.

AD prolabentes podices vt Archelaus. Recrementi plumbi drach. 8. Rhois Syriaci drachm. 8. floris rosarum drach. 4. myrrhæ Minnæ drach. 2. admoue siccum, vbi prælaueris vino austero aut lentisci


D d 4

792 DE COMPOSIT. PHARMAC.
decocto. Aliud, Gallæ omphacinæ, malicorii sicci, rhois coriariæ, singulorum drach. 2. plumbi vsti drach. 4. spumæ argenti drach. 8. trita inspergito. Aliud, Balauſtii drach. 1. malicorii drach. 2. seminis hyoscyami drach. 2. cerussæ drach. 8. myrrhæ drach. 2. plumbi loti drach. 2. tritis vtritor.

Aliud, Corticis pinus, spumæ argenti, mannæ, singulorū drach. 2. pilularū cupressi aridarum drach. 2. plumbaginis drach. 2. trita insperge, vbi prælaueris vino acerbo.

Pharmacum nostrū ad procidentē sedē. Fructus ericæ, gallarum, acaciæ, cerussæ, succi hypocyſthidis, corticis pinus, thuris, myrrhæ Minnææ, singulorum drach. 4. arida trita insperge, vino austero prælotis locis.

De Hæmorrhoidibus. CAP. VII.



Væ Asclepiades in quinto externorum de hæmorrhoidibus scripsit, in subscripto sermone continentur. Quandoquidem verò plurimæ hæmorrhoides opus habent extractione ad facilem pharmacorum impositionem, necesse est etiam huiusmodi compositiones subscribere.

Estractorium hæmorrhoidum Magni Tarsensis, pharmacum accommodatum. Piperis, nitri, vtriusque drach. 1. terito & admo-
ueto ante reliquorū pharmacorum im-
posi

positionem. Aliud, Spumæ nitri, fel-
lis tauri, staphidis syluestris, singulorum
drach. i. trita adhibe, modico addito melle.

Aliud, Succiblinthii drach. i. fellis tau-
ri, staphidis syluestris, vtriusque drach. i.


Aliud vt Diogenes. Succicyclamini,
mellis, vtriusque parem mensurâ coquito in
vase æreo, ad cerati liquidi spissitudinem.

Aliud ex scriptis Largi, quod vix pro-
nuentes extrahit hæmorrhoidas. Succicentaureæ drach. 2. aluminis liquidi drac. 2.
misyos drach. i. staphidis syluestris drac. i.
excipe melle & anum obline, aut lanam ex
eo madefactâ in sedē inde. Postquâ verò
hoc pharmacum promptitudinē induxerit
ad egerendum, & tumor hæmorrhoidarum
prociderit, pharmaca ad hæmorrhoidas cō-
scripta adhibeto. Quâdo verò aliquod hu-
iusmodi pharmacum illitum sedē ac anum
ipsam extrahit, necessariò tales confectio-
nes adhibemus, qualis est & Nicodemi Ro-
mæ medicantis, quæ Euaphion à lenitudine
appellatur. Cerussæ vnc. i. spumæ argen-
ti quincuncē, cadmiæ bellem, aut pompho-
lygis vnc. i. olei myrtei bellem. Vini boni
bellem, butyri vnc. i. Ad sedem inflam-
matam ac prolapsam. Gallâ flauam coctam
ac tritam imposito, cū vino si fortiore vti
velis, aut cum aqua si mitiore. Succus item

Dd 5

Echini facit ad inflammationes & prolapsam sedē. Aliud, Corticis pinus drac. 8. pilularū cupressi aridarū drac. 2. prælotis vino austero inspergito. Cæterū ad ardētes sedis dolores, ouia assati vitellū vino albo terito, & cerato myrteo exceptū illinito. Verū ad pruritus cimoliā tritā cerato myrteo excipito. Ad rimas verò tū sedis, tum pudēdi, rasurā linteolorum vrito, eiusque cinerem cū pari amylo tritū succo foliorū oleæ ammixto, illinito. Pastillus ad eminetias. Aloës, croci, vtriusq; drac. 2. & dimidiam, aluminis scissi vnc. 1. terito vino Aminæo ac vtitor.

Ad pudendorum affectiones. CAP. VIII.



Uxulceratipudendi cognitio ex manifesto circa ipsum dolore cōtingit, vnā cum hoc quod & circa mictiones excernitur quid ex corpusculis vlceri ipsi insidentibus. Discernuntur autem hæc ab eis quæ ex vesica feruntur, quod statim circa primū exitū illa appareant, verū ex vesica delata ipsis vrinis ammixta sunt. Cæterū vlcera pudēdorū & circa sedē citra inflammationē cōsistentia, resiccātibus valde indigēt pharmacis, qualia sunt, quod ex charta vsta cōstat, & anethū vstum siccū, & cucurbita vsta. Verū siccis & recētibus vlceribus, etiā aloë bonū est pharmacum, si eius aridæ puluillus inspergatur.


Omnium

Omniũ autẽ maximẽ dolorẽ sedat, neq; vllominus efficax est pompholyx. Si verò humectiora sint vlcera, pinus cortex per se, & lapis hæmatites, verum si profunda etiã sint vlcera, manna prædictis addatur. Porrò quæ circa vterum aut vesicam sunt vlcerationes, iisdem pharmacis indigẽt, sed instrumentis insuper opus habent, quæ ipsa intromittant, quæ metrenchytæ & Catheteres Græcis appellantur. Aptiora itaq; sunt arida qualis est crocus, & pompholyx, & aloë, quæ facilẽ plantaginis aut alteri tali succo miscentur. Ad Scroti & pudendi dolores. Butyro & resina pari mensura vtere. Aut semen lini cum aqua coquito, & ammixta myrrhæ fermẽ decima parte, & resinæ tantundem imposito. Ad pudendum intumescens. Foliorum vitis tenerorum drach. i. cerussæ drach. s. trita cataplasmatibus vice impone. Vtere etiã marinæ aquæ frigidæ perfusione, & quiete, & colic religatione. Aliud. Lenticulam in aqua coquito, & cum mali punici cortice tritam imposito. Si verò à sudoribus vlcera in scroto fiant, gallã tritam cum alumine inspergito. Ad tubercula verò in pudendis nascentiã piri semẽ inspergito, & fel hircinũ oblinito. Caterũ fissuras ac rimas pudendorũ iuuat resina fricta cũ rosaceo trita ad
frig

strigmentitiam crassitudinē, ammixto etiā
 oui allati vitello. Aut rosacei, & amyli, ac
 thuris, singulorum vncia vna. Aut folio-
 rum hederæ aridorum vstorum cinis cum
 oleo in mortario plumbeo tritus. Ad in-
 flammationes autem pudendorū, vnam pas-
 sam exacinatam, & cuminū, trita imponito.
 Aut farinā hordeaceā aqua mulsa coquito,
 & vitis folia tenera cum polenta terito, o-
 mniaq; simul imponito. Aut cuminū tri-
 tum, cum butyri & resinæ æqualibus parti-
 bus eliquatis committito. Testiculos porrò
 vlcera aphthæ non absimili apprehensos, ex
 terra cimolia cum aqua oblinito, & exicca-
 ri sinito, Inde q; aqua calida ablutos myrto
 arida trita & modico smyrnio item trito
 conspergito. Excrescētem verò testiū car-
 nem cinis sarmentitius cū nitro & aqua su-
 baustus sanat cataplasmatibus vice impositus.

De priapismo.

CAP. IX.




Priapismus est auctio pudendi
 stabilis in longitudinē ac orbē
 tumefacti, citra rei Venereæ
 appetentiam. Est autem status
 ventosus videlicet qui membrū ipsum tu-
 mefacit, ex humoribus viscosis ac crassis
 generatus per moderatā caliditatem. Palam
 est igitur non oportere membra ipsa calfa-
 cere, sed refrigerare leniter per ceratū ro-
 faceum

faceum in aqua cōquassatū, itemq; per chamamelinum ceratū tum pudēdo, tum lumbis impositum. Victus & pharmaca exhibeantur attenuatoriæ facultatis citra manifestam calfactionem. Adhibēda sunt etiā naturali efficacia prædita per experientiam inuenta, nymphæaq; in potu danda ac viticis semen, Ruta etiam viridis obsoniis ammisceatur. Verūm hoc à principio ne fiat, multum enim calfacit, sed posterius post aliorū extenuantiū vsum. Quod si euacuatione vti libeat, per vomitum id fiat. Quæ enim per inferiorē ventrē fiunt euacuationes, sæpenumero vicinas partes fluxione infestant. Ad eos qui se in somno perminunt. Vesicam caprinā aut ouillā vstam ex posca bibendā præbeto. Et ad vesperam siticulosos somnum petere iubeto, facit & leporis testiculus in vino odorato feruefactus, atque ita potatus. Aliud, Calamintham & myrrham in vino ante cœnā bibenda dato. Oblinat autē & pudendū cimolia terra cum perdicii succo.

Ad vteri affectus.

CAP. X.



N vteri suffocatione contingit sensus ac motus priuatio, & pulsus obscurus ac paruus, & penitus interceptus. In aliquibus vero tum sensus, tum motus adest, itemq; ratio,

tio, verum vix respirant. Aliquibus etiam vox intercipitur. Aliis contrahuntur artus. Fiunt igitur & sensus & motus & spirationis interceptiones ob frigiditatem, quum ipsa sola perspiratione totius corporis per arterias contingente contenta sint, & respirationem per os non expetant, atque hoc ut dictum est ob frigiditatem. Quando sane in priori tempore probe purgata, & concipientes, ac viris coeuntes, his ipsis privatae fuerint, ut palam sit humidum & frigidum in ipsis semen totum corpus perfrigerare. Ad vulvae igitur strangulatus conuenit agarici drach. i. in potu accepta ex vino, Plantaginis semen & succus cum vino. Onyx detractus ex conchylio potatus. Acetum scilliticum absorptum. Ceterum olfactu excitant strangulatas, bitumen, castorium, galbanum, pix liquida, cedria, pili vsti, ruta, allium, cepa. Eandem in rem & cornu cerui suffitur. Et ruta cum melle lana excepta, in anum inditur.

Finis noni Libri.

CAPITA X. LIBRI.

De Nephriticis.

Cap. I.

De Ischiade coxendicium morbo, podagra, & morbo articulari seu arthritide. Cap. II.

De podagricis & arthriticis affectionibus.

Cap.

III.

CLAV

CLAVDII GAL- LENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE

pharmacorum secundum locos,

Liber decimus, Iano Cor-

nario medico, in-

terprete.

*

De Nephriticis. CAP. I.



Quod Nephriticas antidotos & compositiones appellent quæ renibus affectis cõmodãt, ex ipsa appellatione manifestũ est, Nephriticæ enim nihil aliud quàm renales sonant. Est autẽ differentia ipsarũ generalissima duplex, Quædam enim calculosos renes iuuant, Quædã verò inflammatos & vlceratos, quæ etiam ad vesicam similiter affectã cõueniunt. Maximè verò cõtrariæ inter se sunt prædictorum pharmacorum facultates. Quæ enim ad inflammatas & vlceratas affectiones cõponuntur, mitigatoriis medicamentis opus ha

habent. Quum verò impossibile sit hæc citò ad regiones renum peruenire, ob id ipsis pharmaca vrinam cientia miscemus. Quæ verò calculosis auxiliantur, vnica facultate indigent, quæ secare & extergere cum manifesta caliditate potest. Sunt autem talia ferè omnia amara. Quemadmodum igitur in aliis sic etiam in his materiã experimento cognitam deinceps subscribam, initiũ ab his quæ ad vlceratas & inflãmatas affectiones cõueniunt facturus, à quibus etiam Andromachus & Asclepiades orsi, inde ad cõpositiones calculos frangentes transierunt.

Confectiones renales ab Andromacho ad renum & vesicæ affectiones cõscriptæ.

POtio. Seminis lini, seminis papaueris albi, seminis cucumeris, tragacanthæ, singulorum drach. 2. amyli drac. 4. cū aqua in pastillos redigito, & ad vesicam vlceratã ac vrinæ emittẽdæ difficultatem exhibeto.

Alia, Nuces pineas. 30. amygdalas. 20. palmas quindecim, tragacanthæ drachm. 4. succi radicis dulcis drach. 2. croci obolũ. 1. myrrhæ obolum. 1. vino protropo diluito ac vtitor vt accommodato. Alia. Ad vesicæ affectus & vlcerationes pastillus quo vtitor. Seminis cucumeris drach. 12. seminis hyoscyami drac. 6. seminis cicutæ, opii, fœniculi, croci, singulorum drach. 3. cassiæ drach.

drach. 4. amygdala. 10. nuces ponticas. 10. feminis apii drac. sex, feminis maluæ syluestris drac. 3. Excipe passo cretico & præbe obol. tres, non febrientibus ex passo. Quidam cicutæ drach. 6. habent. Alia, ad eadem & vesicæ dolores. Croci, feminis befasæ, hoc est, rutæ syluestris, feminis maluæ syluestris, singu. drac. sex, feminis hyoscyami drach. duodecim, opii drach. sex, feminis apii drac. 12. nuces auellanas 8. amygdalas. 20. feminis cucumeris drach. 12. Mellis Artici quod satis est. Datur magnitudo nucis ponticæ cum vini mulsi cyathis 3. Alia, ad profluuia sanguinis ex vesica. Aluminic drach. 1. tragacanthæ drachm. 2. gummi obolum vnum. Dato ex passo quandoque obol. 1. quandoque duos. Alia, ad vesicæ affectiones vrinam ciens à Macedone profecta, facit & ad hepaticos, hydropicos, ictericos, nephriticos, ac omnia vesicæ symptomata, frangit etiam lapides. Acori drach. 50. phu drach. 25. nardi celticæ drach. 24. feminis dauci drach. 22. cinamomi drach. 32. mei drach. 16. asari drachm. 24. petroselini drac. 16. opobalsami drach. 16. & carpobalsami tantundem, croci drachm. vigintiquatuor, drach. viginti, radicis dulci drach. sexdecim, nardi Indicæ drach. sexdecim, cassiæ drach. duodecim, amomi drach. sexdecim,

E e

vuæ passæ drach. octo, tragacanthæ drach.
9. Arida melle excipito, & tragacanthū vi-
no ammineo macerato. Dato nucis ponti-
cæ magnitudinem cum vini cyath. 4. febrili-
tiantibus cum aqua mulsæ. Alia ad vesi-
cæ vlcera & inflānationes. Nuces pineas

* ἡ μίρον 20. seminis cucumeris, * sylvestris grana 40.
habent o- amyli obol. 3. nardi drac. vnam, seminis apii
mnes codi cyath. 2. Nardus & apium in aquæ sextario
ces quos le vno coquuntur, deinde ex decocto duo cya-
gerim id thi præscriptis ammiscentur. Alia ad cal-
est satini. culosos, quæ Basia vxor Marii curata est.

Frangit ita vt neq; rursus gignatur. Cas-
siæ drac. 2. seminis apii drac. 3. myrrhæ min-
næ drac. 4. piperis albi drac. 2. thuris drac.
3. lapidis syriaci masculi drac. 1. aut foeminæ
drach. 1. seminis pastinacæ, anisi, vtriusque
drac. 2. styracis drac. 3. iridis Illyricæ 3. 3. se-
minis papaueris albi drac. 2. spicæ nardi tan-
tundē, amygdalarū amararū mundarū, asa-
ri, vtriusq; drach. 3. seminis smyrnii, cyperi,
vtriusq; drac. 2. mellis Attici quod satis est.
Dato quotidie. Alia ad calculosos frāgēs
& paulatim expellens, donec mundā vesicā
reddat, deinde æger pellucida lotia red-
det, & quod maximum est, curat vt nō am-
plius renascantur. Seminis dauci, anisi, semi-
nis cucumeris, petroselini, myrrhæ, singulo.
drac. 6. cassiæ daphnoididis, cinamomi, nardi
cel

celticæ, singu. drach. 4. Terito & cum aqua ad parui lupini quantitatem coagmentato, & ieiunis quotidie per dies 30. ex aquæ cyath. tribus præbeto. Hoc verò pharmacum quæ admodum accepimus, cum quadam religione præparatur. Ligneo enim mortario ac pistillo tunditur, oportetque cum qui tundit neque anulum habere ferreum, neque calciam ta clavis ferreis transfixa. Hoc à rustico ut Mysterium accepimus. Alia ad nephriticos & omnem fluxionem, ut Apollonius.

Corticis mædragoræ tosti sesquidrachmā, anisi tosti sesquidrachmā, * hyoscyami seminis tosti, seminis papaveris nigri tosti, vtriusque sesquidrac. 7. tragacanthi, carnis palmarum, vtriusque drach. 3. dato cum melle.

Nephriticæ cōpositiones ab Asclepiade conscriptæ.

ANtonii Musæ. Fructuum pini, qui pityides vocantur, * tusorum & cribratorum drach. 20. seminis papaveris * albi, tragacanthæ, vtriusque drach. 2. Nardi celticæ, croci, anisi decorticati, radicis dauci Cretici, singulo. drach. 1. costi obol. 3. præpara cum protropo, & repone in pyxide, da nucis pōticæ magnitudinem cum protropi cyatho 1. & aquæ calidæ cyathis duobus. Alia, Seminis cucumeris satiui tosti drach. tres, seminis maluæ drach. 5. nucum pinearum drach. sex, seminis apii, drach. septem, seminis lini

* Ex vet. cod.

* Alias exacinatorum.

* Μελαλ-
vus habet
cod. græci.

drac. i. amygdalarum amararum mundatarum drac. 9. excipe passo, & exhibe ut prædictum est. Alia ad Nephriticos Onesidemi. Amygdalarum amararum drach. 16. seminis dauci cretici, seminis malue, vtriusque drach. sex, radicis iridis sylvestris drac. octo, cornu ceruini vsti, tragacanthæ, nardi celticæ, seminis cucumeris sativi, singulorum drach. sex, passi quantum sufficit, præpara ut dictum est. Aliud pharmacum accommodatum, hoc scimus multos Nephriticos vfos esse, & à tota affectione penitus liberatos. Oportet per multos dies in pharmaci huius usu perseverare. Datur & calculosis, & colicis medetur, ac vesicæ affectibus. Componitur hoc modo. Nucum ponticarum purgatarum, amygdalarum amararum mundatarum, seminis cucumeris repurgati, singulo. drac. 3. seminis cicutæ, croci, seminis maluæ, opii, singulo. drac. sex, seminis hyoscyami albi, seminis apii, vtriusque drach. 12. Cogito in pastillos cum melle, ac dato obol. 3. cum aquæ mulsæ cyathis. 3. In alio exemplari & besasa, hoc est, seminis rutæ sylvestris drac. 6. Ad callosas in renibus concretiones, Onesidemi. Symphytum, & fion, & Artemoniũ cū vino coquito, & expressi liquoris cyathos 2. cū pari aqua dato.

Aliud, Maluæ sylvestris radicē, & rutæ
syl

syluestris radicem, & apii montani radicem
 coquito, & eo qui dictus est modo exhibe-
 to. Aliud ad calculosos insperfile. Se-
 minis balsami partem vnam, lapidis qui in
 spongiis reperitur tantundem, pulegii ari-
 di, seminis maluæ syluestris, ocymi aridi,
 singulo tantundem, Tusa & cribrata repo-
 nito, & dato cochlearium cum vini diluti
 cyathis duobus. Aliud, Struthii radi-
 cis partem vnam, iridis syluestris siccae tan-
 tundem, oxallidis siccae tantundem, fremii
 luteum florem habentis sicci tantundem.
 Tusis cribratis vt dictum est vtere. Cata-
 potia Heraclidæ Tarentini. Dissoluunt ve-
 sicæ tofos, commodant & ad vesicæ stillici-
 diam. Piperis, galbani, vtriusque drac. i.
 succi lybici drac. 2. myrrhæ drac. 4. protro-
 pi quod satis est. Forma catapotia ciceris
 magnitudine, & 3. deuoranda dato, & * paksi * Aliàs vi
 cyathos 2. insuper bibendos. Aliud, Am- ni dulcis.
 moniaci. Thymiamatis, piperis, spumæ ni-
 tri, singulo. drach. i. carpobalsami drach. 2.
 myrrhæ drac. 4. excipe protropo, & forma
 catapotia ciceris magnitudine ac tria deuo-
 randa dato, ita vt vini dulcis quadrantem
 insuper propines. Hoc ad dies quadraginta
 octo, ægro præloto facies. Pastillus ciens
 vrinam. Detrahit lapillos & tofosas con-
 cretiones. Asari, petroselini, phu, Mei,

E c 3

singulo. drac. 4. acori, seminis anisi, seminis
 dauci, apii montani, carpobalsami, tragacan-
 thæ singulo. drach. 2. Tragacantham passo
 dissolutam aridis adicito, & pastillos for-
 mato, Indeque obol. 3. cum passi diluti cya-
 this 2. exhibeto. Alius pastillus Chariclis.
 Educit arenosas subsidentias. Facit ad affe-
 ctiones vlceras. Seminis apii, petroseli-
 ni, anisi, singu. drac. 16. floris iunci odorati,
 croci, tragacanthæ, singulo. drac. 6. seminis
 dauci Cretici, piperis albi, vtriusque drach.
 4. præpara vt dictum est, & da drach. 1. cum
 protropi diluti cyathis tribus. Antidotus
 ex lapidibus, vt Mithridates. Facit Nephri-
 tici & ad vesicæ affectus, atterit calculos,
 & tofos dissoluit. Seminis finyrnii, cype-
 ri, spicæ nardi, seminis papaueris albi, cina-
 momi, cassiæ fistulæ, piperis albi, seminis pa-
 stinacæ, singu. vnc. 1. Thuris non secti, semi-
 nis apii, croci, styracis iridis, amygdalarum
 amararum, acori, singulo. sesquunciam, lapi-
 dis Syriaci foeminæ aut masculi, vtriusque
 semunciam, myrrhæ Minnæ sextantem.
 Excipe melle. Datur nucis ponticæ magni-
 tudine. Alia Antidotus Biennitæ, phar-
 macum accommodatum, sedās dolorē, vtile
 & Nephriticis, hoc est, renalibus affectioni-
 bus, & ad vesicæ vlcerationes. Frangit lapi-
 des, & tofos per vrinam expellit. Iridis
 drac.

drac. 4. mei, seselis, chamædryos, hyperici,
 cneori, cāchryos, sing. tātundē amomi 3. 8.
 cinamomi 3. 12. rosmarini mōtani, nardi In-
 dicæ, croci cilicii, petroselini, polii, seminis
 rutæ sylvestris, dictamni cretici, singu. tan-
 tundē, glycyrrhizæ, lapidis Syriaci masculi,
 vtriusq; 3. 16. thlaspeos drac. 24. seminis vi-
 tici, myrrhæ, sphondylii, singul. tantundē.
 Cardamomi drach. 48. excipe melle cocto,
 & præbe nucis ponticæ magnitudinem cum
 vini mulsi diluti cyath. quatuor.

*Quæ Archigenes ad Renum affectiones
 scripsit in secundo pharmacorum
 secundum genus.*

EX renibus laborantes Nephriticos ap-
 pellatos, conuenienti diætâ adseruo.
 Et Ceratum quidem Rosaceum cū styrace
 ad malagmatis formam redactum impono
 Caterū Antiochus apud phricen Linopho-
 bum, valde iuxta naturalem contrarietate
 auxilio fuisse ait, ad mali euerfionē, Proto-
 tomi caulis decocti cyathos duos ieiuno ad
 dies nouem exhibitos. Inspergito autē salē
 modicum & magis proficies. Alia potio.


Foliorum rosarum, amygdalarum de-
 corticarum, thuris, æquales partes, capi-
 tum papaueris duplum. Excipe protropo,
 & in vas fictile repone in loco non hume-
 ctō, & obolos duos cum protropo exhibe.

Ee 4

Quidam pro amygdalis, amyllum cōiciūt,
& pro protropo aqua excipiunt, verū cū
protropo bibendum exhibent.

*De Ischiade coxēdicum morbo, podagra,
& morbo articulari siue arthritide.*

CAPVT. II.



HX genere Arthritidis est tum
Ischias, tū podagra. Quod enim
in omnibus articulis Arthritidis
est, hoc in vno iuxta coxendicē
quidem Ischiada, hoc est, coxendicum mor-
bum appellant, iuxta pedem autem poda-
gram. Incipit igitur plerūque podagræ ge-
neratio ex vno articulo, & progreditur in
omnes, temporis diuturnitate accedente.
Communem habent hi tres affectus humo-
ris redundantiam, quæ affectam occupat co-
articulationem, qua expleta in omnem par-
tem circumsitæ nervosæ particulæ tendun-
tur, & ex his dolor oritur. Aliquando qui-
dem igitur irruens humor sanguineus est,
vt plurimum verò pituitosus, aut ex pitui-
toso & bilioso mixtus, aut etiam sanguine
cum ipsis permixto. Quod si quis exactius
interpretari rem velit, non pituitosum hu-
morem, sed qui propriè crudus appellatur,
vt plurimum circa arthritidas prædominari
dixerit. Est autem hic crassus ad similitu-
dinem puris crassioris. Vbi verò in ipsis
art

articulis diutius moram traxerit, non solum crassior sed & viscosior redditur. Qui igitur tofi seu calli appellantur, horum generatio ex his est, & postquam fuerint producti, ne speraueris ad pristinam constitutionem exactè redire articulū posse. Cæterum differentiæ affligentium humorum facilè deprehendi possunt, tum coloribus, tum symptomatis conincidentibus, Itemq; per experientiam pharmacorum quæ adhibentur. Cognitio igitur ipsorum ex colore omnibus exposita est, symptomatis verò & accessionibus coincidentibus, tametsi non omnibus, neq; ex procinctu manifesta sit, tamen nō adeò difficilis cognitu existit. Biliosus enim sanguis multæ caliditatis sensum ægroto exhibet, & calfacientibus impositis exacerbatur, quemadmodum rursus à frigidis relaxatur. Verum ad humoris no-
 xii cognitionem conferet tibi etiam prægressa dicta, siue per exercitia, siue per otium transmissa, & per balnea post, aut ante acceptum cibum. Quemadmodum cōferet etiā horum gymnasiorum & eduliorum tum quantitas, tum qualitas, Item anni hora, & Regionis ac aëris constitutio, Insuperq; ætas, & habitus corporis, quorum omnium facultates sæpe in plerisque locis enarraui. Porro principiū curationis sit tibi euacua-

Ec 5

tio humoris affligere reperti. Siquidem humoribus ex æquo redundarit corpus, Venæ sectione primum omnium assumpta, deinde purgatione, quibus accedat pharmacorum dicendorum conueniens, & tempore, & ordine vsus, Ita vt in manibus & pedibus pharmacis fluxionem repellentibus vtamur, circa coxendicum verò iuncturam id facere vitemus. Quum enim in profundo ea sita sit, sanguis ex vicinis & ambientibus vasis ac musculis ad illam cōpellitur. Mitigatoriis igitur in principio medicamentis opus est in dolore circa coxendicem hærente, quæ neque refrigerent multum, neque fortiter calfaciant, qualibus sanè postea opus habet. Exacerbantur enim per ipsa fluxiones, caliditate nimirum plus attrahente ipsas quàm impediēte. Quandoquidem verò præsentis operis institutum est neque de cataplasmatibus, neq; de irrigationibus quicquam dicere, sed de methodo compositorum pharmacorum, ad hanc solam progrediar, initio ab Ischiade sumpto. Rarò equidē fit Ischias siue coxendicum dolor ex sanguinis multitudine, & citissimè curatur, venis circa poplitem aut talos sectis. Quemadmodū autem saepe sola sanguinis euacuatio sufficiens auxilium existit, sic contra in omni coxendicum dolore, & præsertim eo qui ex humo

mo

morum copia exortus est, si quis ante eua-
 cuationē totius corporis, acribus pharma-
 cis circa partē affectam vtatur, ægrè cura-
 bilem reddet affectionē, copia nimirum in-
 dissolubiliter ibidē condensata. Præter alia
 enim, & crassa & viscosa fit, ob calorem &
 ficcitatē acrium pharmacorū non dissimile
 quippiam affationi perpetiens. Tanquam
 igitur maximam vim ad affectionis cura-
 tionem habeat totius corporis euacuatio,
 ab ipsa incipiendum est, non solum à cruri-
 bus, sed & à cubito primū sanguinis detra-
 ctione facta. Auxiliantur etiā vomitus sp̄s
 Ischiadicis, magis vtique quā euacuatio-
 nes infernē per ventrem, vt qui reuellant
 deorsum repentem humorē. faciendi itaque
 sunt vomitus in principio ab accepto cibo,
 postea verò etiā per vomitoria medicamen-
 ta, initio à mediocribus facta. In quibus au-
 tem vehemens humorū densatio, quæ ægrè
 dissolui potest, à medicis intempestiue acri-
 bus pharmacis vtentibus facta est, his cu-
 curbita affixa maximē auxiliatur, & purga-
 tio per efficaciora infusa, quale est & quod
 ea colocynthide constat. Si igitur ea quæ
 nunc dicta sunt præ oculis habueritis, me-
 dicamentis sanè à prioribus medicis tra-
 ditis iuxta Methodum vtemini. Verūm
 in ipsis recensendis auspicabor ab his quæ
 ab

ab Andromacho scripta sunt, in illa parte libri de externis pharmacis conscripti, in qua præscriptis malagmatis propriè appellatis, inde etiam alia omniâ prodit, iuxta quemcunque tandem modum inueteratas affectiones iuuantia, in quibus est etiam Ischiadicorum appellatorum cura.

Compositiones ab Andromacho conscriptæ ad Ischiadicos.

SEminis rutæ sylvestris drach. 4. silphii drach. 4. spumæ nitri drach. 4. baccarum lauri drach. 4. abrotoni, colocynthidis medullæ, cardamomi, ammii singulorû drach. quatuor, rutæ viridis minæ octauâ partem. Quidam horum singulorû drach. 20. accipiunt, & picis, terebinthinæ, myrtei, ceræ, singulorum tantundem, adipis taurini, tantundem, galbani drach. 6. ammoniaci thymiamatis drach. 6. opopanacis drach. 4. sulphuris viui drach. 4. Quod hoc pharmacum fortiter calfactoriû sit, si memoria tenuerimus ea quæ in libris de simplicium pharmacorû facultate scripta sunt, nihil opus recentiore assertione. Est enim vehementissimû & calidissimû medicamentû sylvestris rutæ semen, & cum eo silphiû, & baccae lauri, deinde spuma nitri. Post hæc abrotonû, indeq; colocynthis, & cardamomum, & ammium. Ruta etiâ viridis minus quidem his,
non

non tamen cōtemnendam habet caliditatem, quemadmodum neq; sulphur viuum. Ex profundo itaque attrahere omnia hæc possunt humores articulum & iuncturam coxendicis vexātes. Quo verò Emplastrū ex ipsis fieret, picē & terebinthinā, ac myrteum, & ceram, ac adipem ammiscuit is qui pharmacum cōposuit. Verūm Ammoniacū thymiamā, & galbanū, vltra hoc quod conferunt ad emplastri compositionem, etiam emolliendi ac mitigandi vim quandam habent. Opopanax verò eiusdē cum ipsis est generis, sed fortiori facultate præditus. Alteram porrò cōpositionē ad eandem affectionem Andromachus sic scripsit. Aliud Malagma ad Ischiadicos, & alia multa. Cera drach. 72. terebinthinæ drac. 48. ammoniaci thymiamatis drachm. 33. propolis drach. 43. galbani drach. 36. bdellii drac. 25. croci drach. 5. opopanacis drach. 12. spumæ nitri, drach. 30. vngento irino admoto tundito. Aliud Protæ pelusiotæ ad Coxendicum & capitis dolorem, & ad omnes diurnos dolores. Cera drach. 24. ammoniaci thymiamatis drach. septē, terebinthinæ drach. 7. succi thapsiæ drac. 8. olei cyathum vnum. Quin & aliā compositionem inter malagmata Andromachus retulit hoc modo. Ad Ischiadicos ab Hera Cappadoce.

Picis

Picis liquida heminas tres, aut duas & dimidiam, ceræ lib. 1. resinæ pini lib. 1. nitri fefquilibram, sulphuris viui lib. 1. staphidis syluestris sextar. 1. pyrethri lib. dimidiã, fecis vini vstæ lib. 2. cardamomi sextar. 1. galbani lib. dimidiã, arida cum liquidis cõmitito. Hoc pharmacum etiam ipse Heras in proprio libro propè finem scripsit, sed non appositum est ad picem, aut duas & dimidiam, sed simpliciter scriptum est heminas tres. Præscripsit autẽ hæc verba. Ceratum ad Ischiadicos, quod eruit etiã valde inueteratas affectiones, hoc vsus sum in Frontino. Scripsit autem & alias duas Ischiadicas cõpositiones Heras, quarũ altera hoc modo habet. Ad Ischiadicos valde mitigatoria. Picis partes duas, sulphuris viui partẽ vnã, vtraque trita mixta dolenti loco imposito, verum prælauare ægrum oportet, vt agglutinetur pharmacũ & superne chartam superponere, ac sinere donec sua spõte dilabatur. Licet etiã lauare charta supraposita adhuc incũbente. In quibusdã exẽplaribus, picis pars vna habetur, & licet etiã sic preparare, modò sciamus nos efficacius esse ambo pari mensura misceri, debilius verò pharmacũ, in quo duplũ picis ad simplũ sulphuris coniicitur. Porrò quæ restat adhuc tertia cõpositionũ Ischiadicarũ, hoc modo
ab

ab Hera prodita est. Alia Ischiadica, hac
 usus sum in Frótino, statim in exacerbatio-
 nibus. Ceræ drach. 100. visci quercini drac.
 sexdecim, myrrhæ drach. sex, terebinthinæ
 drach. 25. galbani drach. sex, iridis Illyricæ
 drach. 6. cedriæ heminam dimidiā, cyprini
 heminam dimidiā. Ceram & cedriam cum
 cyprino liquefacito, deinde resinā & gal-
 banum, atque vbi iam ab igne auferre voles
 iridem inspergito, itēq; viscū indito. Abl-
 ta autē iam olla, in promptu sit tibi myrrha
 trita, ad quā liquefacta diffundes, & mixtis
 simul omnibus vteris. Quidam supra hæc
 omnia etiā Nitri drach. quinq; addiderunt.

*Que pharmaca Asclepiades in quarto externo-
 rum prodidit, Que Marcellæ inscribit.*

NOminat equidem & hic omnia huius-
 modi malagmata, apponit autem aliis
 quod ad Ischiada, aliis quod ad splenē, aliis
 ad latus, aut aliā aliquam partē conducant.

Quædā etiā varii vsus esse ait. Quæadmo-
 dum etiā hoc scriptū ab ipso in hæc verba.

Malagma Antiochidis, splenicis, hydropi-
 cis, Ischiadicis, arthriticis. Præparatum est
 Fabullæ Libycæ. Ceræ lib. 3. visci quercini
 lib. 3. resinæ terebinthinæ lib. 3. retrimenti
 ab expressa myrobalano reliqui lib. 1. spu-
 mæ nitri lib. 1. floris lapidis Asii li. 1. ammo-
 niaci thymiamatis lib. 1. olei cyprini lib. 3.

Acc

Acetum ad ammoniacū dissoluendū. Post hoc scribit rursus aliud sic. Aliud Fabullæ cōpositum valde præclarū, ad easdem affectiones, myrrhæ stactæ lib. 2. bdellii onychis lib. 2. medullæ cervinæ lib. 2. ammoniaci thymiamatis lib. 2. iridis illyricæ lib. duas, opopanacis lib. 1. galbani, styracis, vtriusque lib. 1. mastiches lib. 1. floris lapidis Agii lib. 1. succi sycomororū lib. 1. canchryos lib. 1. piperis albi lib. 1. cerę terebinthinæ, vtriusque lib. 5. tundendum est pharmacum, ita vt qui tundit fecem vngenti irini adhibeat, quo mollius pharmacum fiat.

Aliud deinceps Asclepiades scripsit hoc modo. Malagma quod & aurei coloris appellamus. Auripigmēti auricoloris, calcis viuæ vtriusque sextantē, aluminis liquidi & scissi vtriusque sextantē. Arida tundimus & cribramus, & in pilam cōiectis, aceti cyathos. 8. affundimus, & probè trita liquefactis excipimus. Sunt autē hæc. Ceræ, resinæ frictæ, & pinus, singulorū lib. 2. olei cōmunis cyath. 8. hæc liquefacta frige fieri sinimus, & erasa tritis ammiscemus. Nos ad pharmaci præparationē etiā myrrhæ sextantem addimus. Alii etiā sandarachæ sextantem apponūt, aluminis liquidi sextante sublato. Nos autē coniectis omnibus præscriptis conficimus, & fit efficacius. Post præscri

scriptum aliud subdidit hoc modo. Hoc
 vsus est Andromachus, facit splenicis, hy-
 dropicis, & ad præcordia distēta, facit Ischia-
 dicis, arthriticis, & ad inueteratos affectus,
 Cera, picis brutiæ, vtriusq; lib. i. Nos pro
 pice resinam frictam indimus, resinæ pinus
 lib. i. olei cyath. 8. auripigmēti auricoloris,
 aluminis scissi, calcis viuæ, singulorū sextā-
 tem. Præpara vt dictum est. Nos apposui-
 mus ad pharmacum myrrhæ sextantē, visci
 quercini trientē. Post relata alia quædā ad
 hydropicos & splenicos recenset, & inde
 rursus multi vsus cōpositionē tradit, quam
 etiam Ischiadicis conuenire ait, hoc modo.

Andræ Malagma. Cōpositio admiranda
 ad ea quæ velis perforare dissoluere, expur-
 gare, & velut excolare, educit ossa corru-
 pta, aculeos, & infixæ. Descriptū est etiam à
 Serapione Empirico. Facit & ad Ischiadi-
 cos, cōmodum est suppuratis, facit & ad in-
 duratas viscerū affectiones. Est & acopon
 bonum diutinis resolutionibus, & distortis
 corporis particulis. Facit etiā ad corrosa ac
 corrupta, educit enim aliena, & vlcus ad cica-
 tricē perducit. Grani Cnidii purgati, nitri
 rubri, salis ammoniaci, aristolochiæ creticæ,
 radicis cucumeris syluestris, terebinthinæ,
 singulorū drac. 20. piperis rotūdi & longi,
 ammoniaci Thymiamatis, & vt quidam vo-
 ff

sunt, amomi & xylobalsami, singulorum
 drach. 10. thuris masculi, myrrhæ, resinæ
 siccæ, visci subacti, singulorū drac. 10. succi
 mororū drach. 10. ceræ drach. 30. adipis ca-
 prini drach. 15. fecis vngenti Irini quantum
 satis excipiendis erit. Arida tunduntur &
 angustissimo cribro excernuntur. Liquesci-
 bilia verò singulatim diligēter tunduntur,
 deinde omnia simul miscētur, ac rursus tun-
 duntur admota Irini fece. Deinde vbi pro-
 bē fuerint vnita emollita reponimus. Quod
 si velis acopo vti, accipe pharmaci quadran-
 tem, adipis anserini quadrantē, olei cyprini
 quadrantem, ac mixtis vtitor. Postea verò
 cōsequenter sic scripsit. Aliud ad easdem
 affectiones. Pyrethri drach. 20. grani cni-
 dii, spumæ nitri, vtriusq; drach. 20. salis am-
 moniaci, aristolochiæ creticæ tenuis corti-
 cis, radicis cucumeris syluestris, terebiathi-
 næ, singulorū drach. 20. piperis rotundi &
 longi, ammoniaci thymiamatis, bdellii, xy-
 lobalsami, thuris, myrrhæ, cardamomi, amo-
 mi, adipis caprini, resinæ siccæ singulorum
 drach. 10. ceræ drac. 30. Visçi probē subacti
 drach. 8. succi mororū drach. 8. fecis vngen-
 ti Irini quod sufficit his excipiendis. Vini
 Italici quod satis est. Maceratis his quæ
 dissoluere oportet, pro more apparato. In
 alio exemplari neque xylobalsamū neque

Car

Cardamomū, neque Amomum reperi. Post hæc alia pharmaca prodidit, & deinde rursus Ischiadicorum meminit sic scribens.

Aliud eiusdem Epithema. Ischiadicis & arthriticis auxiliatur cōfestim. Fœnū græcum in vas fictile conicito, & ad ipsum poscam sufficiētem affundito, & prunis impositum donec dissoluatur coquito. Ad dissolutū verò mellis quod satis est iniice, ac rursus coque, deinde exēpta diligenter tere, & in linteolum infarcta locis affectis impone, fasciaq; obligatos sine. Hoc autē ad biduū & triduum facimus. Cæterum si in terendo pharmacum induretur, ex liquore quātum sufficit addimus, liquor autem tantus sit, ut tractile cataplasma reddatur. Aliud quod cōtinenter ad prædicta sequitur, hoc modo. Symphyti sesquilibrā rasam, & minutim cōcisam, ac in mortarium testaceum coniectam, diligenter terito, & ad tritam mānæ quadrantē addito, atque ouorū crudorum recentium trium numero candidum vnā cum luteo, & rursus terito, & vbi vnita fuerint, his adipis suilli veteris lib. i. adiicito, & cōquassata diligēter atque in linteolum infarcta imposito. Mitigat cōfestim, post præscriptū, aliud deinceps scripsit hoc modo. Aliud eiusdem Malagma, Ischiadicis statim in irritationibus imponitur,

Ff 2

appellatur Didymæa, facit ad attrita, & omnem neruorum per cōsensum affectum. Dissoluit omnē duritiem, facit etiā ad alias inflammationes. Delet malignas cicatrices, facit ad luxata & collisa, facit & ad mamillarū affectiones malignas. Cere, visci quercini, terebinthinæ, iridis siccæ, myrrhæ, galbani, singulorū drach. 48. olei cyprini aut vngētī Aegyptiaci quod satis est. Galbanū in oleum cyprinū, aut vngentum Aegyptiū cōiectum, ad ignē dissoluimus, & cerā molimus, ac reliquis mixtam probè tundimus, atq; his galbanū liquefactum cum cyprino iniicimus, ac rursus tundimus, malagma lenissimū tactui reddendo, quo vtimur. Consequenter etiam hoc Asclepiades subdidit.

Aliud eiusdē ex Ario. Facit ad colicos supra quā dici potest, in ipsīs vexationibus impositū, & pforas curat citra exulcerationē. Cere, picis liquidæ, vtriusq; lib. i. sulphuris viui, aluminis scissi, nitri rubri, singulorū lib. dimidiā, liquecibilia liquefacito, arida verò tundito & per angustissimū cribrū cōcernito, & ad liquefacta adii. cito paulatim ea inspergēdo ac assiduè mouēdo, indeq; in pilā trāslata ac tusa reponito, & vtitor. Deinceps rursus aliud prodidit hoc modo. Aliud eiusdē Malagma ex Silphio, Ischiadicis valde cōmodū. Ammii
drach.

drach. 12. silphii, seminis rutæ syluestris, baccarum lauri purgatarum, singulorū drach. 14. medullæ colocynthidis drachm. 2. nitri drach. 4. abrotoni thebaici drach. 4. cardamomi drach. 4. ceræ pōticæ minæ octauam partem, picis, resinæ, ammoniaci thymiamatis, singulorum minæ octauam partem. Liquida cum aridis committito. Consequenter & hoc ab Asclepiade scriptum est ita.

Aliud eiusdem, quo vsusest Antipater. Silphii, rutæ syluestris siccæ, baccarum lauri siccarum, spumæ nitri, medullæ colocynthidis, abrotoni thebaici, ammii, cardamomi, singulorum drach. 4. rutæ satiuæ viridis, picis siccæ, resinæ terebinthinæ, ammoniaci thymiamatis, adipis vitulini, singulorum minæ octauam partē, galbani drach. 16. opopanacis drach. 4. sulphuris viui drach. 4. olei cyprini heminas. 4. Vsus tēpore oportet prius coriandrum aridum vsū cyprino excipere, & ex eo coxendicem illinere, atq; post huius vsum malagma ipsum imponere. Post hoc rursus aliud scripsit hoc modo.

Aliud eiusdem Malagma, in Ischiadicis humores ex alto euocat ac transfert, liberatq; à tota affectione. Facit & dissolutis, & tremētibus, & affectionibus inueteratis. Picis liquidæ Brutæ lib. 3. fecis aridæ vsæ lib. 2. nitri rubri sesquilibram, resinæ pini

lib. i. ceræ li. i. staphidis syluestris lib. i. sulphuris viui lib. i. pyrethri librā dimidiam. cardamomi sextariū vnū, picē, cerā, resinā coquito, arida tundito & cribrato, ac cum liquefactis cōmittito, & vtitor. Post præscriptū adhuc aliud pharmacū subdidit ita habens. Aliud eiusdem quo vsus est Philocalus. Sinapis, fœni græci moliti, vtriusq; sextariū dimidiū, pyrethri, staphidis syluestris, nitri rubri, singulorū drach. 4. opoponacis drach. 2. galbani drach. 2. resinæ terebinthinæ lib. i. ceræ lib. i. olei cyprini lib. i. arida cum liquidis committito & vtitor.

Ischiadicorum cura à Damocrate conscripta, ex Iberide.

DAmocratis extat libellus Clinicus inscriptus, in quo versibus Iambicis: (quemadmodū solet) de tribus disserit medicamentis. Ac primò quidē de eo quod ex herba, quam ipse Iberidem appellat, cōstat. Secūdò ex semine dolores sedante cōposito. Tertiò verò purgatorio, & ab ipso Hierā appellato. De primo igitur in Ischiadicorum curatione in eo libello hæc scripsit. In Iberide inquit: medicū quendam amicum suum per hanc herbam curatum esse, quam herbā vt dixi, ipse Damocrates Iberidem appellat, vt qui ipse visu herbam cognovit, nomen autem eius nullum audierit, quum

quum etiam id ipsum ignorarit is qui eum
 vsum eius docuit. Verum ex signis quæ scri-
 bit videtur Iberidem appellare, quæ à Græ-
 cis lepidium nominatur, à regione in qua
 amicus eius curatus est appellatione ducta.
 Describit autem ipfius signa per hos lābos.

Herba hæc vbiq; multaq; frequens nascitur,
 Monumenta iuxta antiqua, muros & veteres,
 Tritasq; quondam publice pedibus vias,
 Quas iuxta aratrum duxit haud quis agricola,
 Semper virescens, solijs nasturtij
 Florentibus vere, attamen maioribus.

Caulem cubitalis longitudinis gerit
 Paulo minorem aut rursus ampliorem, ab hoc
 Aestate pendent folia, donec multa hyems
 Sarmentitiam deducat hæc ad imaginem, &
 Deiecta & exiccata depereant gelu.

Adnata radicitamen cernes alia.
 Aestate florem fert colore lacteo
 Multum tenuem variumq; valde cauliculum.
 Ad quæ sequitur semen penitus sic exiguum.
 Visum ferè vt fallens, oculos quoque effugiat.

Odorem habet radix at inde acerrimum,
 Verò similem quàm maximè nasturtio,
 Per hos qdẽ figurã versus herbæ indicauit.
 Cōsequenter autẽ vsum ipfius p huiusmodi.
 Hanc erutam larga satis cape copia
 Aestate, nam tunc optima & fortissima est
 Adhuc recens, succata fit sed debilior.

Tusam hinc probè, (Nam difficulter tunditur)
 Pauca subactamq; excipies axungia,
 Crurique toti & maxime coxendui
 Adhibebis, & ligabis, & fines duos
 Horas mulieribus, viris sed quatuor.
 Hinc balneo inductos nec vlllo ex vngvine,
 Nec smegmate vlllo pinguiore collines,
 Sudore sed modico exiliente, in solium
 Merges, iubens perferre, nam mordacitas
 Ingens caloris sensus atque exeritur.
 Verum hinc rigatos leniter producito.
 Illati enim quamvis manibus sint plurimum.
 Exibit attamen suis pedibus valens
 Quicumque consilium hoc bonum suscepit.
 Ad multum oleum miscebis hinc vinum modicum.
 Et contuties, & illines lotos eo.
 Ac mox madore terfo & pinguitudine,
 Totum teges cras mollibus tu velleribus,
 Iubens obire assueta vite munia,
 Quaecumque vult, & non grauatim suscipit.
 Hoc auxilium certum atque constans integre est.
 Et nullo alio adiciendo ei simul indigum.
 Quare dolore ablato adera radiculam,
 Curas beneficio tibi sanitas data est.
 Quod si tamen inde affectionis vestigium
 Quoddam super sit, post repetes hoc praesidium,
 Diebus ut multum decem his prateritis.

Hoc sanè vtendi modo & inueteratos
 capitis dolores, & alias omnes quacumque
 cor

corporis parte inueteratas & ægrè solubiles affectiones ac resolutiones se curasse ait, & omnino vitia in quibus alii sinapismo appellato, & auxilio ex thapsia cōflato vtuntur, se per hanc herbam. persanasse dicit. Porro de hac iberide etiā Archigenes scribit in secundo pharmacorū secundum genus, lepidium ipsam appellans. Dicit autem & splenicis & ischiadicis ipsam conuenire.

Ad ischiadas & perfrigerationes, Hygieni Hipparchi. Herbam Iberidē quam aliqui lepidium vocant, aut agriocardamū, id est, nasturtium syluestre colligito, & radicē eius tusam ac adipe porcino commolitam emplastri vice imposito ad dolentē locū ad horas tres, indeque in balneum mittito. Idē præsidium & veteres capitis dolores depellit, in consimili usu adhibitum, quē Damocrates medicus per versus prodidit.

De podagricis & arthriticis affectionibus.

CAP. III.



Idum antea est in sermone de ischiade ex fluxionibus generari eiusmodi affectiones, irruentibus in locos iuncturarum, quare etiam curatio ipsarū iuxta eundē fit modum, nimirum vt irruentes fluxiones euacuentur. Influentibus igitur adhuc ipsis, scopum afferendorū auxiliorū cōmuni rationi

Ff 3

influentium humorū subiicere oportet, ita ut repellamus ac restringamus. Vbi verò amplius non influant, ut discutiamus iam illapsos. Cæterum materia pharmacorum per quæ hæc sunt multiformis est, quæ admodum etiā in aliis affectionibus, excogitantibus videlicet à principio prudentioribus viris iuxta quandā artificialē coniecturam modò hoc, modò aliud, eorū quæ optima per experientiam sunt iudicata. Quapropter velut in aliis affectionibus, sic etiā in his, optima ex eis quæ priores medici experientia cognouerunt adscribam.

Pharmaca ab Asclepiade ad prædictas affectiones in quarto externorum prodita. Quæ Marcellæ inscribit.

E Pithema podagricis, Arthriticis sedans dolorem. Vsus est in ipsis vexationibus. Succus papaueris drach. 4. croci drach. 1. cum lacte bubulo aut caprino terito, & adiecto pane interno diligenter leuigato, ut molle cataplasma fiat, & rosaceo admoto mollito, ac utitur leni cataplasmate, forinfecus betæ aut lactuæ foliis, custodiendi eius gratia, impositis. Quandoq; opium & crocum cum lacte trita cerato rosaceo excipimus, & linteolo infarcta imponimus.

Aliud. Styracis drac. 2. opii drac. 1. confice ac utere ut dictum est. Aliud. Confestim

tim à dolore liberat, verùm ante pharmaci
 mpositionem agrũ lauare oportet, & tunc
 leteris locis imponere. Succı absinthii
 pontici, croci, opii, singulorum drac. i. ceræ
 ponticæ drac. 4. vngenti Irini drach. 6. vini
 cretici quantũ sufficit. Opiũ, absinthiũ, cro-
 cum dissolue, & dissoluta liquidis excipe, &
 lintheolo infarta impone. Aliud, Semi-
 nis cicutæ expressi drac. 6. croci drac. i. opii
 drac. i. passi cretici quod satis est. Trita ex-
 cipe rosaceo cerato. Epithema podagrico-
 rum arthriticorũ facit ad maximas affectio-
 nes. Vsus est eo Erasistratus sicyonius. Ra-
 dicis capparis tusæ & cribratę chœnicę vnã,
 feminis hyoscyami chœnicę dimidiã, radi-
 cis chamæleonis nigri chœnicis quartam
 partem, feminis cicutæ chœnicis quartam
 partem, radicis mandragoræ chœnicę. i. ra-
 dicis solani aut vt alii dorycnii chœnicis
 quartã partē. Omnia tusa & cribrata mixta
 in vasculum figulinum reponito, & probẽ
 obturato seruato. Vsus verò tempore chœ-
 nicis quartam partē inde accipito, & passo
 tritam in vas fictile non picatũ conicito, &
 addita fecis vini aridæ quarta heminæ par-
 te, ad prunas posita diligēter mouendo co-
 quito, donec bis aut ter efferueant, deinde
 ab igne ablata quàm calidissima imponi-
 to, aut quomodo perferre ægri possunt. Ve-
 rum

rùm ante huius cataplasmatismis vsum, pedes multa aqua frigida perfundere oportet, & spongiis detergere, atque ita pharmacum imponere. Supra verò cataplasma linteola tenuissima aceto imbuta imponantur, & fascia circumdata ad horas duas pharmacum incumbere sinatur. Postea verò eo ablato excitatas bullas acubus perforare oportet. Ab his enim humor mucosus multus ac glutinosus profluet post cuius excretionem multa aqua frigida pedes proluantur, & rursus pharmacum vt dictum est imponatur, ita tamen vt pro aceto aqua potabili vtamur, & ex ea rigatum lintheolum pharmaco superimponemus. Aliud eiusdem. Hoc pro cucurbitis & hirundinibus vtimur. Nam serosos sanguinis humores exugit: facit & ad tofos ac duritias vt inde dissoluantur. Farinæ fœni græci sextarium vnũ, floris lapidis Asii sextar. i. lomēti fabæ nigræ molitę farine lupinorũ vtriũq; fertar. i. Omnia mixta & aqua calida subacta, calida imposito, & fascia constringito. Oportet autem prius affectos locos perfundere, aut etiam in solio lauare. Quum verò fasciæ circumdatae madidæ accruentæ factæ fuerint pharmacum tollimus, & fotis locis pastillo ex amygdalis amaris vtimur, & malagmate quod crocum, iridem, & aristolochiam

hiam habet. Hoc ipsum verò inter mala-
 gmata ad podagrā descripta habetur. Pa-
 stillus podagricis, Arthriticis. Vfus eius est
 in ipsis irritationibus. Aloës lib. i. succi cē-
 aurii sexuncem, thuris* non seci trientem, * *Aliàs*
 myrrhæ trientē, floris lapidis Asi sextantē, *masculi.*
 opii sextantem, succi mādragoræ sextantē,
 aluminis scissi sextantem. Excipe passō, &
 fac pastillos. Vfu expetente lacte dissolutos
 cum pēnis illine, & supra illitionē lintheolū
 passō imbutum impone. Aliud pastillus
 Iupiter appellatus. Aloës drach. i. opii
 drach. 8. succi papaueris drach. 6. succi hyo-
 scyami drach. 6. aconiti drac. 4. hypocisthi-
 dis drach. 6. glaucii drach. 8. croci drach. 12.
 guinmi drach. 24. malorum mandragoræ
 drach. 20. aceti heminas duas. Mala cū ace-
 to coquito, & expressa prædictis ammisce-
 to, & ex dilutis ac probè leuigatis pastillos
 formato, eosq; in umbra ficcato. Vfus osten-
 sus est. Malagma arthriticis, podagricis,
 ex cicuta & agarico accommodatum. Se-
 minis cicutæ sextar. i. agarici sextar. i. fœni
 græci sextar. i. nitri vnc. i. ceræ lib. i. resinæ
 frictæ lib. i. olei veteris lib. i. medollæ cer-
 uinæ trientem, illyricæ trientem. Arida tusa
 per angustissimum cribrum concernito, li-
 queficientia verò eliquato, & frige fieri fini-
 to, & sic crasa aridis committito, & contusis

ac

ac repositis utitur. Aliud eiusdem. Cerae lib. i. olei veteris aut sabini sextar. i. foeni graeci sexta. i. cicuta sextarium dimidium, resinae frictae lib. i. nitri rubri dodrantem, floris lapidis Asii semissem, medullae ceruinæ trientem, Illyricae trientem. Praepara ut dictum est. Aliud Malagma eiusdem ex tedis, Titi Caesaris, facit podagricis & arthriticis. Emollit omnem duritiam. Visci quercini sesquilibram, thuris lib. i. cerae lib. i. tedarum pinguium lib. i. resinae pinus lib. i. Li-quescibilia coquito ac pinguibus tedis moueto. Postquam verò omnis pinguitudo ab ipsis effluerit, ab igne ablatum liquorem excolato, atque huic thus tenuissimè tritum inspergito, assidueque moueto donec ad compagem manus non inquinantem redigatur, & in mortarium translata reponito ac utitur. Aliud. Tedarum pinguis-simarum lib. i. thuris masculi lib. i. resinae pinus lib. i. visci quercini libram dimidiam, praepara ut praedictum est. Malagma ex lapide Asio podagricis, Arthriticis valde praclarum. Liberat à tota affectione. Vfus est in cessationibus. Visci quercini, terebinthinae, vtriusque lib. i. spumae nitri, floris lapidis Asii, thuris, singulorum libram dimidia, olei cyprini lib. i. adipis quantum satis est. Arida tunduntur & cribrantur, ac cum aqua

terum

teruntur, ad cerati liquidi spissitudinem.
 Liquefcebilia verò eliquantur, & tritis ad-
 ducuntur, quibus simul conquassatis ac re-
 positis vtimur. Aliud Visci lib. i. terebin-
 thinae lib. i. lapidis Asii, nitri, vtriusque triē-
 tem, mannae quadrantem, cyprini sextantē,
 aquae lixiuii figulini quod satis est. Aliud,
 ad Arthriticos valde praeclarum, auxiliatur
 confestim, humores in alto absorbens, visci
 lib. i. terebinthinae lib. i. adipis taurini, flo-
 ris lapidis Asii, vtriusque quadrātem, calcis
 viuæ quadrantē mannae quadrātem, cyprini
 lib. i. praepara vt dictum est. Aliud Dio-
 dori. Adipis taurini drach. 8. spumae nitri
 drac. 4. floris lapidis Asii drac. 2. In alio exē-
 plari drac. 4. olei cyathos. 2. arida cum liqui-
 dis committito. hoc pharmacū valde
 commodū est. Resorbet etiam
 collectiones circa articu-
 los consistentes, &
 à doloribus li-
 berat.

FINIS.



Lugduni,

Excudebant Philibertus Rolletius,
& Bartholomæus Fræ-
nus.

